

盆底疾病 “早” 知道

广州圆爱康生物科技有限公司

为什么我咳嗽会**漏尿**

为什么我**憋不住尿**

你知道吗？这些都是盆底疾病

为什么我阴道**松弛**，性交时有**排气**

为什么我的**盆腔痛**总治不好

为什么生完孩子，我夜里居然**尿床了**

为什么生完孩子，我的**子宫掉出来了**

1

盆底疾病概述

2

为什么会产生盆底疾病


3

盆底康复主要方法


PART1

盆底疾病概述

盆底




外层和中层盆底肌



盆底肌—封闭骨盆出口的“底”

内层盆底肌




耻骨直肠肌 (耻
骨阴道肌)

耻骨尾骨肌

髂尾肌


尾骨肌

肛
提
肌




肛提肌是盆腔脏器**支持力**的主要来源


盆底重要神经—阴部神经



阴部神经




盆底的生理功能



● 盆底肌



盆底功能障碍性疾病



盆底功能障碍性疾病 (pelvic floor disorders/dysfunction, PFD)是一组**盆底支持组织缺陷、损伤及功能障碍**造成的疾患。

尿

垂


粪

痛

性

etc

尿失禁常见的类型



压力性尿失禁




喷嚏、咳嗽或劳动、运动等腹压增高时出现不自主的尿液自尿道口漏出。

——国际尿控学会 (ICS)

国际妇科泌尿协会 (IUGA)

压力性尿失禁分度



急迫性尿失禁




有强烈的尿意后，尿液不能由意志控制而经尿道漏出者。

——国际尿控学会（ICS）



混合性尿失禁



尿失禁的患病率

成年女性
每3个人中就会有1个漏尿



45岁以上的女性
每2个人中
有1个人漏尿



患病率
(%)



年龄 (岁)

尿失禁造成的不良后果



尿失禁造成的不良后果



生理方面

尿失禁可导致会阴区皮疹、外生殖器官受摩擦**破溃**或**炎症**、**尿路感染**等问题。



心理方面


尿失禁患者因需穿戴卫生巾及尿裤，身体常有异味，常伴有**焦虑**、**自卑**、**无助**、**抑郁**等不良情绪。



社交方面

尿失禁患者因**担心身体异味**、**害羞**等原因影响社会生活及交往。

“社交癌”



这种情况你遇到过吗?

排尿、排便费力,

下体有**坠胀感**,

腰背部**疼痛**,

常常有种来例假时的**腹痛感**,


同房时不适或疼痛.....

盆腔器官脱垂




盆底支持组织薄弱盆腔器官下降移位引发的器官位置及功能异常。


盆腔器官脱垂




正常盆腔器官位置




阴道前壁膨出
(膀胱膨出)




子宫脱垂



阴道穹隆膨出



阴道后壁膨出
(直肠膨出)



肠疝



- 排便努挣，粪块干硬？
- 有便意但不能排便？
- 便次减少或排便不尽？
- 甚至没有便意？
- 排便时大汗淋漓，痛苦不堪？
- 排便时间过长？

慢性便秘



便秘指排便困难，排便次数减少，粪质变硬或有排便不尽感。排便次数减少指每周排便**少于 3 次**。


慢性便秘根据其病因分为功能性疾病和器质性疾病，有些药物也可导致便秘，但**大部分为功能性疾病**。

慢性便秘发病率


近10年来

- 饮食结构改变
- 生活节奏加快
- 社会心理因素影响
 - 生活区域
 - 工作压力
 - 文化程度

慢性便秘患病率呈上升趋势



◆ 我国成人慢性便秘患病率4%-6%



◆ 60岁以上患者上升到22%

粪失禁

指**肛门括约肌不受意识的控制**而自主地排便。

- 神经肌肉系统的病变或损伤如瘫痪;
- 胃肠道疾患;
- 精神障碍、情绪失调等;
- 盆底功能异常

粪失禁的患病率约为1.4-18.0%




慢性盆腔疼痛




无规律的下**腹部疼痛**、**性交痛**、**痛经**、**排尿及排便时腹痛**等

症 状



它是指**盆腔相关结构**出现的慢性或持续性疼痛，持续时间至少**6个月**


定 义



盆底区域在**脐水平以下膝盖以上**的部分，包括内外脏器结缔组织和盆底肌肉

部 位

慢性盆腔疼痛



耻骨直肠肌

耻骨尾骨肌

髂尾肌

尾骨肌

慢性疼痛的初始诱发因素通常是急性的
(如感染或炎症)

85-90%患者的慢性盆腔疼痛综合征起源于
肌肉

性功能障碍



女性性功能障碍(female sexual dysfunction, FSD)是指女性个体不能参与其所期望的性行为, 且在性行为过程中不能得到或难于得到满足。


性功能障碍

性欲障碍

性高潮障碍


性唤起障碍

性交疼痛障碍





性功能障碍



中国女性性功能障碍的患病率**56.8%~63.3%**

下泌尿道症状 (尿失禁、膀胱过度活跃、膀胱排空障碍)

排便功能异常 (便秘、粪失禁)

性功能障碍 (性生活困难、性高潮障碍)

你知道吗？这些都是盆底疾病

慢性盆腔疼痛 (膀胱尿道、子宫阴道、肛门直肠)

盆腔支持功能缺损 (盆腔器官脱垂)





智慧家康
ZHUIHUIJIAKANG

中国首家互联网+医养结合平台


PART2

为什么会产生盆底疾病？

妊娠及分娩损伤



妊娠及分娩损伤



a 第二产程开始时

b 第二产程结束时

都是“雌激素”惹的祸



智慧家康
ZHIHUIJIAKANG

让健康更简单一点!

年龄

雌激素

腹压

肥胖

盆腔手术史








盆底疾病的干船坞理论

结缔组织

盆腔器官


盆底肌肉



PART3

盆底康复主要方法

盆底肌肉功能的评估
(体格检查、阴道压力检测、盆底表面肌电检测)



如何有效地进行盆底评估

盆底肌肉形态的评估 (MRI、B超)

盆底肌肉功能的评估

改良牛津肌力分级

体格检查

新PERFECT方案

阴道压力评估

仪器检查

**盆底表面肌电评估
(Glazer评估)**

盆底康复主要方法

生活方式干预

电刺激

盆底肌训练

磁刺激

生物反馈

其他





生活方式干预



减轻体质量，尤其是
体质指数 (BMI) >30
 kg/m^2 者



戒烟，减少饮用含咖
啡因的饮料



避免或减少腹压增加
的活动




盆底肌训练


Kegel训练



盆底肌肉康复器





生物反馈



生物反馈 (biofeedback, BF) 是应用现代科学技术, 将人们正常意识不到的身体生物信号, 转变为可以被人察觉到的信号, 如视觉、听觉信号。

电 刺 激



- 电刺激可以兴奋外周神经和自主神经，并增强神经纤维敏感性。
- 电刺激可以增强肌力、促进组织修复、改善血液循环等。

电刺激治疗适应证-常规盆底康复



成就健康幸福的人生



电刺激治疗适应证-常规产后康复



1. 乳汁不足及乳汁淤积
2. 子宫复旧不良
3. 胃肠蠕动功能减弱
4. 尿潴留
5. 腰背痛
6. 腹直肌分离
7. 妊娠纹
8. 形体恢复

.....

磁 刺 激



磁刺激技术的本质是一个**电--磁--电**的过程，最终起作用的是由磁场诱导出的**电流**。

磁刺激是一种**不用电极的电刺激**。

特点：无痛、无创、非侵入、更深、更广。

磁刺激治疗适应证

其他应用方向

男性

- ✓ 前列腺术后
- ✓ 前列腺炎并发症
- ✓ 慢性盆腔疼痛
-

儿童PFD

- ✓ 小儿遗尿
- ✓ 小儿粪失禁
- ✓

性功能障碍

- ✓ 男性勃起功能障碍
- ✓ 性快感缺失
- ✓ 性交痛
-

术后盆底功能障碍

- ✓ 宫颈癌术后
- ✓ 前列腺癌术后
- ✓ 子宫全切术后
- ✓ 盆底重建术后
-

下尿路功能障碍

- ✓ 压力性尿失禁
- ✓ 急迫性尿失禁
- ✓ 混合型尿失禁
- ✓ 尿潴留
- ✓ 神经源性膀胱
-

盆腔器官脱垂

- ✓ 产后阴道前后壁膨出
- ✓ 轻中度盆腔器官脱垂
-

排便功能障碍

- ✓ 功能性便秘
- ✓ 大便失禁
- ✓ 盆底失迟缓综合征
-

疼痛问题

- ✓ 慢性盆腔疼痛
- ✓ 肛门直肠痛
- ✓ 产后腰背痛
- ✓ 梨状肌综合征
- ✓

主要应用方向

磁电联合



磁电联合**五**大优势:

- ✓ 患者疗效及体验感更好
- ✓ 适应证和适应人群更广
- ✓ 易于操作, 安全性更高
- ✓ 高收益, 高周转率, 低耗占比
- ✓ 临床科研价值



盆底康复时期



产后**早期**进行盆底康复锻炼，可以改善产妇产后 1 年内的盆底电生理指标，促进盆底组织的修复


产后**6个月内**进行盆底康复能够有效降低中老年女性盆底疾病发生的风险




Vollphyhaug I, Mørkved S, Salvesen KA. Pelvic organ prolapse and incontinence 15 – 23 years after first delivery: a cross-sectional study[J]. BJOG, 2015, 16(10) : 1111.

孙智晶, 朱 兰, 郎景和, 等. 产后盆底康复锻炼对女性盆底功能障碍性疾病的预防作用[J]. 中华妇产科杂志, 2015, 50(6) : 420


盆底疾病的四个早



你了解盆底疾病了吗？



盆底疾病
都有哪些



为什么会产
生盆底疾病



盆底康复主要
方法有哪些

让女性人人享有盆底健康

