



圆小洪·生物反馈电刺激治疗仪


广州圆爱康生物科技有限公司

目录

CONTENTS

- ▶ 1 . 产 品 介 绍
- ▶ 2 . 圆 小 洪 - 盆 底 版
- ▶ 3 . 圆 小 洪 - 产 康 版
- ▶ 4 . 圆 小 洪 - 直 肠 版

产品介绍



产品介绍

圆小泆 生物反馈电刺激治疗仪



圆小泆生物反馈电刺激治疗仪是一台掌上设备，它具有盆底表面肌电评估、神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激、凯格尔（Kegel）模板训练、多媒体游戏训练功能。可对用户的体表肌电信号进行采集，生成评估方案的同时由医生定制个性化训练方案进行反馈训练，可以对用户的肌肉施加电刺激及生物反馈来帮助患者改善及恢复盆底肌肉功能障碍。

产品介绍

圆小洪 生物反馈电刺激治疗仪



工作原理：

通过电刺激低频率震动，对肌肉进行电刺激，使肌肉紧张或松弛，来训练和改善肌肉功能，帮助病人重建并恢复肌肉正常运动。

主要治疗项目：

1、产后康复

乳房综合保养、生殖私密保养、健康塑形

2、盆底康复

子宫复旧、器官脱垂、尿失禁、尿潴留、阴道松弛、直肠膨出、盆底疼痛等

3、直肠康复

便秘、大便失禁、尿失禁、尿潴留、膀胱过度活动症、男性无炎症的前列腺疼痛、性功能障碍等

4、缓解疼痛

圆小洪·生物反馈电刺激治疗仪

四种训练模式，随时切换

与医院同原理

结合线上APP使用，蓝牙传输，自动存档训练数据



可实时做表面肌电评估，
随时了解训练效果

体积小，方便携带，可以
随时随地使用

专业医生在线一对一指导，
制定专属训练方案

圆小洪·生物反馈电刺激治疗仪

圆小洪家庭盆底康复仪是唯一一款具备盆底肌电评估，有正常人对照值的盆底评估产品。

一机在手，全家无忧，实时管理家人健康，专属医生辅助家人健康训练。

功能具备盆底肌电评估和四种训练模式，包括神经肌肉电刺激、**肌电触发电刺激**、Kegel模板训练、多媒体生物反馈训练，提供全方位的训练方案。

盆底肌训练探头为国际标准的中空探头设计，即用即弃，保护用户私密卫生安全，防治交叉感染，并有脱落保护功能，安全可靠。

评估后智能生成训练方案，**全球独一无二医生线上指导**，专业解读评估报告，随时随地个性化调整盆底训练方案，如同在医院做专业康复。



圆小洪·生物反馈电刺激治疗仪

圆小洪

蓝牙传输，方便快捷


蓝牙传输 简单快捷

传输更稳定、连接更简便、轻松做盆底肌训练




盆底表面肌电评估

连接设备



评估过程



评估报告



专业

智能

高效

盆底表面肌电评估

使用效果一目了然

用户使用报告


使用前

使用后

盆底肌肉功能评估报告

姓名:		性别:	女	年龄:	18	检查号:	1
测试日期:	2019-01-16	分娩类型:	(null)	分娩日期:	(null)		
阶段	指标	测试值	参考值				
前静息阶段	平均值	5.29	2-4 μ V				
	变异性	0.71	<0.2				
快肌 (I类肌) 测试阶段	快速收缩时间	0.20	<0.5s				
	最大值	59.20	35-45 μ V				
慢肌 (II类肌) 测试阶段	快速放松时间	0.20	<0.5s				
	平均值	13.64	30-40 μ V				
耐力测试	变异性	0.37	<0.2				
	平均值	17.15	25-35 μ V				
后静息阶段	变异性	0.55	<0.2				
	后10秒/前10秒比值	3.12	0.8-1.0				
耐力测试	平均值	3.43	2-4 μ V				
	变异性	0.24	<0.2				

盆底肌肉表面肌电图




报告解读简要说明:

1. 前静息阶段: 测试肌肉放松能力。平均值大于4 μ V, 提示肌肉可能存在过度活动, 可引起盆底肌肉缺血缺氧, 导致性交疼痛、尿漏、膀胱痛、外阴痛、便秘等症状。
2. 快肌 (II类肌) 测试阶段: 测试快肌肌力和反应速度。肌力不足可引起压力性尿失禁、性高潮障碍、阴道痉挛等。
3. 慢肌 (I类肌) 测试阶段: 测试慢肌肌力和收缩稳定性。肌力不足以及稳定性差可引起器官膨出或脱垂、阴道松弛、性冷淡、反复泌尿生殖道感染等。
4. 耐力测试阶段: 测试慢肌的耐力。均值和后10秒/前10秒比值的降低, 反映慢肌的耐力较差, 易疲劳, 可引起盆腔疼痛、阴道松弛等症状。
5. 后静息阶段: 测试肌肉收缩后放松能力。平均值大于4 μ V, 提示肌肉可能存在过度活动, 可引起盆底肌肉缺血缺氧, 导致性交疼痛、尿漏、膀胱痛、外阴痛、便秘等症状。

盆底肌肉功能评估报告

姓名:		性别:	女	年龄:	18	检查号:	1
测试日期:	2019-01-26	分娩类型:	(null)	分娩日期:	(null)		
阶段	指标	测试值	参考值				
前静息阶段	平均值	3.02	2-4 μ V				
	变异性	0.11	<0.2				
快肌 (II类肌) 测试阶段	快速收缩时间	0.21	<0.5s				
	最大肌	47.00	35-45 μ V				
慢肌 (I类肌) 测试阶段	快速放松时间	0.20	<0.5s				
	平均值	37.36	30-40 μ V				
耐力测试	变异性	0.33	<0.2				
	平均值	37.52	25-35 μ V				
耐力测试	变异性	0.30	<0.2				
	后 10 秒/前 10 秒比值	1.59	0.8-1.0				
后静息阶段	平均值	5.71	2-4 μ V				
	变异性	0.16	<0.2				

盆底肌肉表面肌电图



报告解读简要说明:

1. 前静息阶段: 测试肌肉放松能力。平均值大于4 μ V, 提示肌肉可能存在过度活动, 可引起盆底肌肉缺血缺氧, 导致性交疼痛、尿漏、膀胱痛、外阴痛、便秘等症状。
2. 快肌 (II类肌) 测试阶段: 测试快肌肌力和反应速度。肌力不足可引起压力性尿失禁、性高潮障碍、阴道痉挛等。
3. 慢肌 (I类肌) 测试阶段: 测试慢肌肌力和收缩稳定性。肌力不足以及稳定性差可引起器官膨出或脱垂、阴道松弛、性冷淡、反复泌尿生殖道感染等。
4. 耐力测试阶段: 测试慢肌的耐力。均值和后10秒/前10秒比值的降低, 反映慢肌的耐力较差, 易疲劳, 可引起盆腔疼痛、阴道松弛等症状。
5. 后静息阶段: 测试肌肉收缩后放松能力。平均值大于4 μ V, 提示肌肉可能存在过度活动, 可引起盆底肌肉缺血缺氧, 导致性交疼痛、尿漏、膀胱痛、外阴痛、便秘等症状。

神经肌肉电刺激

1

恢复盆底感觉

2

增强肌肉力量

3

增加慢肌纤维的抗疲劳性

4

促进盆底血液循环营养肌肉




肌电触发电刺激

将阴道电极放入阴道，用户主动收缩盆底肌达一定阈值，可触发阴道电极继续给予电刺激，继续激活盆底肌和盆底神经，通过向中枢神经系统提供了大量的输入冲动，使大脑中枢逐渐恢复对盆底肌肉的控制，重塑盆底神经肌肉兴奋性。

- 鼓励患者主动收缩盆底肌；
- 收缩活动反馈给大脑；
- 增加盆底与中枢的联系，从而逐步增强盆底肌力。



Kegel模板训练



根据盆底肌电图评估选择相应的模板训练

通过自主的、反复的盆底肌肉群收缩和舒张，增强盆底肌张力、恢复松弛的盆底肌。

正确掌握盆底肌肉的收缩训练是锻炼盆底肌肉的有效方法




多媒体生物反馈

◆原理：患者完全运用自己的意志（即收缩控制肌肉的能力）

来控制电脑动画。

◆特点：游戏牧师、易坚持、有趣味、目标明确、效果实时。



机器人特点

专业医师 在线指导

临床三甲医院妇产科医师在线指导您的盆底肌训练

专业医师

在线一对一指导




定制个性化训练方案

专业医生一对一在线指导

定制个性化训练方案


训练全程无中断



医患一对一交流


随时随地查看盆底评估和训练记录

圆小洪产康版智能训练仪




随时随地轻松做盆底修复

圆小洪-盆底版



盆底整体理论






1990年Petros和Ulmsten首次提出盆底整体理论，后来现代解剖学观点将盆腔分成前中后三个部分，根据不同部分发生疾病的不同在不同的科室进行治疗和处理。

肛肠科

妇产科


泌尿科

盆底的组成



“盆底的**骨骼、肌肉、筋膜、韧带、神经、血管**是一个有机的整体”


盆底的组成



Norton P A. Pelvic floor disorders: the role of fascia and ligaments.[J]. Clinical Obstetrics & Gynecology, 1993, 36(4):926.


盆底肌肉的功能





盆底功能障碍性疾病是一组**盆底支持组织缺陷、损伤、及功能障碍**造成的疾患。

盆底功能障碍性疾病




盆底功能障碍性疾病 (pelvic floor disorders/dysfunction, PFD)是一组**盆底支持组织缺陷、损伤、及功能障碍**造成的疾患。

FPFD 作为一种女性慢性疾病，严重影响妇女的健康和生活质量，尤其是妨碍妇女的工作和社会活动，被称为“社交癌”。是继高血压、抑郁症、糖尿病、骨质疏松症后，成为威胁妇女健康的5种最常见慢性疾病之一。

随着社会人口的老龄化，该病发病率明显增高，正常妇女盆底功能障碍的发生率为11%。


- ✓ 有预测30年后盆底功能障碍的发病率将增加**1倍^[1]**。
- ✓ 国内流行病学调查发现，成人女性PFD的患病率为**20%-40%**。
- ✓ 国外文献报道^[2]产后妇女大约有**1/3**有尿失禁，**1/10**以上有粪失禁，**1/7**以上有盆腔器官脱垂现象。




[1] 廖镜芳, 周冬梅, 钟东彩. 女性盆底功能障碍性疾病治疗的回顾性分析 [J]. 解剖学研究, 2010, 32(2): 130.

[2] 李环, 张巍颖. 产后盆底康复治疗最佳时机研究现状 [J]. 罕见疾病杂志, 2011, 18(2): 46 - 49.




妊娠对盆底的影响



阴道分娩对盆底的影响



Perineum and Urogenital Diaphragm of Female



剖宫产对盆底的影响

01

胎儿体重及羊水重量的增加，导致腹腔内的压力变大，易导致盆底肌出现松弛疲劳、肌力下降。

02

剖宫产后应激反应过度导致机体炎性因子水平升高，易导致盆底肌肉功能紊乱。



因此，不管是顺产或者剖宫产的女性均有可能发生盆底肌损伤，引发一系列盆底功能障碍性疾病。

其他因素对盆底的影响

慢性咳嗽、长期便秘、长期站立劳动、长期用力提重物。

机械性腹压增加

年龄增大

卵巢功能减退、雌激素下降

结缔组织先天性发育缺陷、家族倾向

遗传因素

手术

腹腔内（膀胱癌根治和子宫切除等）手术及盆腔手术

肥胖（BMI>24）、代谢性疾病（糖尿病）

营养因素

盆底功能障碍性疾病的危害

- ① **尿失禁**: 欲说还羞（出门逛街先找厕所，身上长期有异味）；
- ② **盆腔器官脱垂**: 小腹坠胀、痛，严重需要手术；
- ③ **性生活不和谐**: 影响家庭幸福生活；
- ④ **慢性盆腔疼痛、腰酸背痛**；
- ⑤ **阴道松弛、阴道口闭合不全**，长期反复泌尿生殖道感染；
- ⑥ 心情焦虑、抑郁，影响生活质量——“**社交癌**”。



尿失禁


盆腔器官脱垂

性生活不和谐


慢性盆腔疼痛

阴道松弛






临床中较常见的有六种尿失禁类型，分别为压力性尿失禁、急迫性尿失禁、混合型尿失禁、功能性尿失禁、充溢性尿失禁和反射性尿失禁，其中以压力性尿失禁最为常见，其次是混合型尿失禁，第三是急迫性尿失禁。三种类型尿失禁所占的百分比分别为 61%（压力性）、8%（急迫性）、31%（混合型）。



盆腔器官脱垂（pelvic organ prolapse, POP）是指由于盆底支持组织缺陷或松弛而引起的盆腔器官下降或移位引发器官的位置及功能异常，主要包括子宫脱垂和阴道前后壁膨出等，同时可伴有膀胱、直肠和小肠膨出。

最常见的症状是阴道口脱出块状物，伴或不伴腰部疼痛、下腹坠胀等多种不适症状，平卧时可减轻，许多患者同时伴有下尿路症状及尿失禁。

如何做盆底康复的预防与治疗



盆底功能障碍性疾病的治疗分为**非手术治疗和手术治疗**。

非手术治疗主要有**盆底肌锻炼、生物反馈疗法及电刺激**

疗法。盆底肌非手术治疗的原理是恢复“肌肉”功能，

以电刺激为主，使受损的肌肉、神经得到恢复，具有长

期疗效。

盆底康复适应症

- 35岁以上或产后42天妇女可作为常规盆底肌肉锻炼；
- 慢性盆腔炎；
- 各种尿失禁；
- 轻、中度子宫脱垂及阴道膨出；
- 阴道松弛、痉挛、性生活不满意者；
- 反复阴道炎、尿路感染患者非急性期；
- 产褥期症状（腰背痛、腹痛、尿储留、乳涨、耻骨联合分离等）；
- 乳房松弛、乳房下垂。



哪些人需要做盆底康复

想提高生活质量的女性

备孕期女性

产后女性

围绝经期女性

受盆底疾病困扰的女性

尿失禁、大便失禁患者

盆腔器官脱垂患者

盆底痛、性生活疼痛者

术后出现盆底并发症的女性

盆腔肿瘤术后

盆底重建术后

子宫切除术后

如何进行盆底康复

凯格尔运动训练法

1

盆底神经肌肉电刺激疗法

3

盆底磁刺激疗法

5

2

盆底康复器疗法（阴道哑铃）

4

盆底生物反馈电刺激疗法

6

圆小洪家庭盆底康复仪

盆底康复存在的痛点

家庭

距离
太远

隐秘性

资源紧缺

没精力


没时间

价格



别的产品存在的问题

没专业医生
进行指导



没有盆底评估

没有生物反馈



盆底肌修复（训练效果看得见）

1个月

刺激唤醒本体感受器、按捺膀胱逼尿肌缩短、肌肉被动训练，辅助使用一个月，对松弛、漏尿有明显改善，有利于恢复至产前状态。

2-3个月

通过2-3个月的刺激及按摩盆底肌肉收缩，对阴道前后壁膨出会有显著的效果。

6个月左右

通过半年的刺激盆底肌肉，结合收缩肛门运动而达到盆底肌肉收缩，脱垂几乎可以康复。



完美解决您的烦恼





☑ 即用即弃，保护用户隐私

☑ 卫生安全，防止交叉感染

圆小讲—多次用盆底肌阴道探头



✓ 水滴状结构，不易滑出阴道

✓ 大面积的金属片，刺激更为舒适

✓ 有脱落保护功能，安全可靠

操作指导



① 清洗双手




② 连接主机、探头、电极片




③ 温水润滑探头



④ 仰卧120°



⑤ 链接探头放入体内，注意探头金属片贴在大腿两侧



⑥ 电极片黏贴在髂前上棘

训练结束



⑦ 长按开机



⑧ 身体平躺，双腿放平张开与肩同宽



⑨ 开始训练



⑩ 长按关机



⑪ 拔出探头



⑫ 清理X-VPL探头
(一次性探头)


清洗VP01探头
(可反复使用)



⑬ 清洗双手

注：每次使用产品后，记得取出机器人内的电池

圆小洪-产康版





乳房综合护理

- 1 促进泌乳
- 2 乳腺疏通
- 3 消除乳胀
- 4 缓解乳腺炎
乳腺增生
胸部塑形



私密综合保养

- 1 子宫复旧
- 2 子宫内膜增厚
- 3 促进子宫内膜血供
- 4 卵巢恢复
卵巢低反应
促进卵巢血供
卵巢储备功能下降
慢性盆腔炎



人流术后恢复

- 1 人流后镇痛
- 2 人流术后子宫恢复
- 3 人流后子宫内膜恢复
- 4 人流术后卵巢恢复
人流术后月经过少



术后理疗

- 1 肠胃排气
- 2 促进肠道蠕动
- 3 产后尿潴留
- 4 术后尿潴留
妇科手术后麻醉致膨胀
排尿困难



健康塑形

- 1 腹直肌分离
- 2 腹横肌训练
- 3 腹斜肌训练
- 4 妊娠纹淡化
疤痕美肤
淡化疤痕
腹部松弛
大腿塑形
小腿塑形
- 1 手臂塑形
- 11 臀部塑形
- 12 肩颈调理
- 13 静脉曲张
- 14 产后水肿护理



缓解疼痛

- 1 产后宫缩痛
- 2 产后伤口痛
- 3 镇痛
- 4 耻骨联合分离
坐骨神经痛
痛经
肩颈疼痛
肌肉酸痛
腰背痛放松训练
- 1 产后腰背痛
- 11 盆底痛

产后症状对身体的影响

YUAN AI RANG

生产之后，宝宝给新妈妈及全家都带来了无尽的欢乐，但也会有一些产后并发症困扰着新妈妈，如乳腺炎、子宫恢复不良、产后尿失禁、产后腰背痛及盆底相关疾病等。

乳腺炎

产后最初的三个月，是乳腺炎的高发期。

产后尿失禁


尿失禁是孕妇的常见问题。导致尿失禁的内因是女性尿道相对较短，外因是生产时胎儿通过产道，使得膀胱、子宫等组织的肌膜受伤，弹性受损，尿道松弛而失去应有的功能。

子宫恢复不良

因婴儿吸吮时刺激乳头，可反射性地引起子宫收缩，所以哺乳时加剧，恶露经久不净要注意子宫内膜炎症，必要时要作B超检查，看有没有胎盘残留。

产后腰背痛

产后产妇长时间待在床上，活动过少，或锻炼方法不恰当，过早地参与劳动，这些原因都会导致腰背痛。




- 引起一系列的乳腺疾病（乳腺炎）
- 子宫复旧不全可使血性恶露持续时间延长，量多，有时大量流血，
- 恶露浑浊或伴有臭味。
- 卵巢功能下降，容易出现月经不调、阴道萎缩、降低排卵率以及造
- 成性冷淡导致性生活不和谐。
- 产后身体各种肥胖，影响美观和生活。



圆小讲—产康版

顺产康复时间-项目对照表



圆小讲—产康版

剖宫产康复时间-项目对照表

产后1天后

适用项目：
肌肉松解理疗
适用电极片：
方形电极片

产后第1周

适用项目：
促进泌乳
乳腺疏通
产后水肿护理
适用电极片：
丰胸电极片

产后第3周

适用项目：
子宫复旧
关节养护
适用电极片：
圆形电极片

产后第42天-2个月

适用项目：
盆底肌康复
腹直肌分离复位
适用电极片：
方形电极片
长条形电极片

产后第6-12个月

适用项目：
产后塑形
盆底肌康复
腹横肌训练
腹斜肌训练
乳房护理
适用电极片：
丰胸电极片
长条形电极片
长方形电极片

产后5小时

适用项目：
尿滞留
促进泌乳
适用电极片：
圆形电极片
丰胸电极片

产后2-3天

适用项目：
乳腺疏通
适用电极片：
丰胸电极片

产后第2周

适用项目：
产后体态
子宫复旧
产后心理
适用电极片：
圆形电极片
长方形电极片

产后4-6周

适用项目：
子宫复旧
妊娠纹淡化
适用电极片：
圆形电极片
长条形电极片

产后3-6个月

适用项目：
控制减脂
力量训练
盆底肌康复
腹直肌分离复位
产后塑形
适用电极片：
方形电极片
长条形电极片
长条形电极片

乳房综合护理




初乳就是女性分娩完之后刚刚分泌出的乳汁，初乳一般颜色偏黄，而且不够浓稠，所以很多没有经验妈妈都认为初乳脏脏的，所以直接挤掉。但事实上，初乳中不管是营养物质还是抗病因子都是极为丰富的，妈妈们应该让宝宝喝初乳，以增强免疫力补充营养。产后新妈妈经常会出现乳腺阻塞等情况，乳腺阻塞都是导致乳汁分泌不足的原因，乳汁分泌不足会导致宝宝营养跟不上。

圆小洪训练仪可以使产后妈妈的泌乳量增加，提高母乳喂养成功率使乳腺分泌乳汁流畅，预防乳腺炎。还能够消除副乳、预防产后下垂、乳房退化，从而达到塑形的效果。




私密综合保养



- 子宫复旧
- 子宫内膜增厚
- 促进子宫内膜血供
- 卵巢恢复
- 卵巢低反应
- 促进卵巢血供
- 卵巢储备功能下降
- 慢性盆腔炎

- 生殖系统发育成熟象征着人整体成熟。女性生殖系统的衰老又是在人的一生中最先开始的，女性的生理功能30岁左右达到高峰，而后逐渐下降，生殖系统衰老的症状也随之出现。
- 女性的生殖系统非常坚韧又非常脆弱，极不易保养，营养补充不足、健康维护不利、经期、房事、怀孕、分娩流产，节孕等，无一不损伤生殖系统，造成女性生殖系统病变和众多烦恼的主要原因。生殖系统健康与否直接关系整个机体的雌激素水平，生殖系统健康，内分泌随生理周期准确地分泌雌激素、黄体素，于是经来经去，不腰酸、不腹痛、心情轻松愉快。
- 常见的问题主要有产后子宫复旧不良、卵巢萎缩衰退、阴道松弛等。



私密综合保养

神经肌肉电刺激

对私密系统进行全方位清洁、排毒、净化私密系统，让你做“干净、清爽”的女人。

凯格尔训练

促进细胞的新陈代谢，修复机体的坏死组织，激活免疫力和自我修复能力。



肌电触发电刺激

减少私密系统内毒素和垃圾的堆积，降低囊肿、肌瘤等妇科炎症的发生率。

多媒体生物反馈训练

使女人面色红润，皮肤细腻有光泽，延缓衰老，推迟更年期。

通过圆小讲训练仪电刺激，促进盆腔肌肉收缩，筋膜张力增强，带动子宫韧带运动，消除盆腔淤血，减少产后出血，促进恶露排出，降低卵巢基质动脉的血流阻力，增加卵巢间质动脉收缩期峰值，改善卵巢的血液灌注，促进卵巢颗粒细胞的新陈代谢。有效的排出毒素，使内分泌恢复正常。

人流术后恢复

人流后子宫内膜恢复

人流术后子宫恢复

2

人流后镇痛

1

3

4

人流术后月经过少

5

人流术后卵巢恢复



术后理疗

术后尿潴留

产后尿潴留

3

4

5

妇科手术后麻醉致膨胀

促进肠道蠕动

2

肠胃排气

1

6

排尿困难



健康塑形



➤ 腹直肌分离

➤ 腹横肌训练

➤ 腹斜肌训练

➤ 妊娠纹淡化

➤ 疤痕美肤

➤ 淡化疤痕

➤ 腹部松弛

➤ 大腿塑形

➤ 小腿塑形

➤ 手臂塑形

➤ 臀部塑形

➤ 肩颈调理

➤ 静脉曲张

➤ 产后水肿护理

产后身材为什么变形

1. **腹直肌分离。**由于体重恢复正常，但腹直肌没有完全恢复正常，腹直肌分离有可能会造成女性腹部比较松垮，影响美观。
2. **内分泌变化。**由于宝妈在怀孕期间身体的各项激素水平都会变化，产后一时很难恢复到以前的激素水平，所以就会导致内分泌失调，影响新陈代谢的进行，体内垃圾堆积过多，就会越来越胖。
3. **生理结构变化。**生过孩子的宝妈都知道生产的时候是要开骨缝的，骨缝开到一定程度以后宝宝才会顺利出生。虽然在生产过后骨缝还会闭合，但是就像吹过的气球一样是很难回到原来的样子的，所以身材也会出现变形。
4. **孕期营养过剩。**怀孕期间为了宝宝的健康发育宝妈们会大吃特吃，除了宝宝吸收的少部分营养以外，都堆积在了宝妈的身上，长时间的营养过剩，会导致体内脂肪越积越多。
5. **月子期间饮食不合理。**坐月子期间，宝妈怕没有奶水使宝宝饿肚子，也会大量的补充营养，这又加重了脂肪的堆积，使身材越来越臃肿。



健康塑形



圆小洪康复仪通过电刺激肌肉、毛细血管收缩，促进血液循环，增强新陈代谢，淡化妊娠纹。

通过腹部电极片，给予不同强度的电刺激，使腹部肌肉兴奋性提高，腹部肌肉被动收缩，对肌群强化训练，唤醒因受损而功能暂停的肌肉的本体感受器，使分离的肌群恢复正常，达到锻炼腹部肌肉的目的。

对腹直肌分离、淡化妊娠纹、腰腹部减肥等有良好的效果。

缓解疼痛

产后身体疼痛怎么回事？

- **第一，分娩时太用力。**如果产妇在分娩过程中太过用力而导致肌肉拉伤，周围软组织也被损伤了，那么产后就会出现全身酸痛的现象。
- **第二，产后受风寒侵袭或太过劳累。**产妇在生孩子时会损失很多血，也会损耗大量的体力，所以产后妈妈的身体会变得非常的虚弱，身体众多组织器官都需要通过一段时间的调养才能恢复正常，而在产妇身体恢复的过程中只要遭受风寒侵袭或劳累过度，都很容易引发全身酸痛。
- **第三，产后风湿引起的全身酸痛。**产后全身酸痛多半是患上产后风湿，产后风湿的主要症状表现为身体皮肤、关节、肌肉等部位畏寒、怕风、酸痛等，同时还会伴有全身乏力、睡眠不佳、多汗、情绪烦躁等症，产后风湿的主要是因为产后身体虚弱、气血虚，身体遭受风寒湿邪入侵而造成的。

其主要的产后疼痛包含：腰背痛、肌肉酸痛、盆底痛等



缓解疼痛



➤ 产后宫缩痛

➤ 产后伤口痛

➤ 镇痛

➤ 耻骨联合分离

➤ 坐骨神经痛

➤ 痛经

➤ 肩颈疼痛


➤ 肌肉酸痛

➤ 腰背痛放松训练

➤ 产后腰背痛

➤ 盆底痛


缓解疼痛




产后腰背痛

- 国外研究产后腰背痛的文献很多，但研究腰背痛定义和方法并不一致。
- 很多文献把它具体分类分成腰痛、骨盆痛和腰骨盆联合痛来研究。但其本身均是腰背痛的一部分。
- 2014年美国N I H慢性腰背痛研究规范定义：
 - ①疼痛发作持续在 3 个月以上；
 - ②半年内疼痛发作时间加起来至少在半天以上。

圆小洪-直肠版



直肠概念




直肠是自肛缘起向上15cm的一段大肠。直肠周围多脂肪、无纵带，位于膀胱和生殖器官的背侧。直肠的动脉血供主要是来自肠系膜下动脉的直肠上动脉，来自髂内动脉的直肠中动脉和来自髂内动脉的直肠下动脉。

ASCO（2001结直肠外科的临床指导）、NIH、NCI提出了直肠的新概念。

直肠：肠管的最末的一段，上与乙状**结肠**相连，下与**肛门**相连。


直肠生理学结构



直肠位于盆腔内，是大肠的末段。沿骶骨和尾骨前面下行，穿盆膈，终止肛门。直肠在盆膈以上称盆部，以下部分叫肛门部和肛管。

男性直肠的前方是膀胱、精囊腺和前列腺，女性直肠的前方是子宫和阴道，故可经直肠触查这些器官。

直肠解剖结构



直肠为消化管的最末一段，位于盆腔内，其行程不是直线而有几个弯屈，它有三条横皱襞，其中两条在左，一条在右，高度不同，从下面看来三个皱襞互相掩叠，围直肠一周，支撑粪块。直肠近肛门的一段扩大成为直肠壶腹，里面有垂直皱襞6~10条名肛柱，肛柱上面有静脉丛。直肠终于肛门。肛门有肛门外括约肌及肛门内括约肌。肛门外括约肌是随意肌，属会阴肌。肛门内括约肌是肠内环肌加厚而成，属平滑肌，其作用是于大便临完结的时候彻底清除残存在肛门管里的废物。

直肠的功能



直肠位于消化道的末端，具有吸收、排便和分泌的功能作用。

- 1、直肠可以吸收少量的水、无机盐、葡萄糖以及一部分药物，也能分泌黏液，以利于大便的排出。
- 2、直肠具有储存大便的功能。
- 3、直肠具有防止大便不自觉排出的功能。

排便功能障碍

排便不仅是非意识性的反射活动，而且还受大脑高级中枢的意识性控制。

正常情况下，排便反射是在大脑皮质的控制下进行的。直肠的充胀刺激引起的传入冲动，同时还上传到大脑，并引起便意。在大脑皮质高级中枢的参与下，其下传冲动一方面可以加强骶髓排便中枢的活动，使腹肌、膈肌加强收缩，增加腹内压，促进排便。

病理情况下，如中枢神经系统损伤，骶髓排便中枢与大肠的神经联系被隔断以后，排便动作虽然仍可发生但变为无力而不完全，而且不受意识的控制。



功能性便秘



- ◆ 便秘是指正常的排便形态发生改变
- ◆ 排便次数减少
- ◆ 排便不畅、排便困难
- ◆ 粪便量减少
- ◆ 排出过干过硬的粪便

便秘临床表现

定义

是指粪便持久滞留堆积在直肠内
坚硬不能排出

成因

便秘未能及时解除，粪便滞留在直肠内，水分被持续吸收，乙状结肠排下的粪便又不断加入，最终使粪块变得又大又硬不能排出，发生粪便嵌塞

多见于

慢性便秘患者

症状体征

患者有排便冲动，腹部胀痛，直肠肛门疼痛，肛门处有少量液化的粪便渗出，但不能排出粪便



功能性便秘病因

饮食因素

精神心理
因素

遗传性
因素

激素、神
经递质等
调节因子
的异常

功能性便秘的发生与多种因素有关。

排便动力学异常

◆ 结肠蠕动无力或结肠蠕动不协调

结肠测压试验显示结肠动力降低是造成功能性便秘患者结肠排空延迟的原因之一，结肠蠕动不协调可导致结肠收缩无效，同样可引起结肠排空迟缓。

◆ 盆底肌功能障碍

功能性便秘患者在排便时耻骨直肠肌出现矛盾性收缩，部分便秘患者有直肠功能的异常，表现为排便时无法协调肛门外括约肌和盆底肌的活动，包括横纹肌功能不良，直肠平滑肌动力障碍、直肠感觉功能损害、肛门内括约肌功能不良等。

◆ 排便费力

引发慢性便秘主要有神经病变、肌肉病变和肠道 Cajal 间质细胞（interstitial cells of cajal, ICC）网络异常等。慢性便秘患者会出现肠神经节细胞数量减少、肠道神经化学信号出现异常。

大便失禁

急迫性大便
失禁

(urge fecal
incontinence, UFI)

被动粪失禁


(passive fecal
incontinence, PFI)

粪渗漏


(fecal seepage, FS)

大便失禁 (fecal incontinence, FI) 是指不能自主控制液体和固体粪便，肛门失禁是指不能控制气体、固体和液体粪便。

大便失禁的机制



大便失禁的原因



直肠疾病引起的危害

容易导致贫血

1

诱发妇科疾病

3

导致皮肤湿疹

5

2

直肠癌风险

4

影响肛门功能

6

降低生活质量



深度解决便秘问题

- ☒ 保护隐私
- ☒ 卫生安全
- ☒ 防止交叉感染

操作指导



① 清洗双手



② 连接主机、探头、电极片



③ 温水润滑探头



④ 采用合适的位置



⑤ 链接探头放入体内，注意探头金属片贴在大腿两侧



⑥ 电极片黏贴在髂前上棘

训练结束



⑦ 长按开机



⑧ 身体平躺，双腿放平张开与肩同宽



⑨ 开始训练



⑩ 长按关机



⑪ 拔出探头



⑫ 清理探头



⑬ 清洗双手

注：每次使用产品后，记得取出机器人内的电池

谢谢观看
Thanks for watching

