

居家关节康复

智慧医疗——可穿戴关节活动度测量仪



01 关节术后康复的意义

- ❓ 在院期间：3-7天甚至更短，医生或者护士口头宣教+自编康复手册。 ➡️ ❗ 缺乏系统性和标准性
- ❓ 出院后：根据出院和复查医嘱（口头），患者自觉训练。 ➡️ ❗ 依从性低，效果大打折扣。
- ❓ 简单活动、下地行走等简单锻炼方式。 ➡️ ❗ 缺乏更有效的针对性康复训练动作。



临床中经常会遇到一些患者因为术后没能进行很好的康复锻炼，从而影响手术效果。究其原因是因为对功能康复锻炼缺乏正确的认知，认为手术后需要制动、静养，只要骨头长好就万事大吉。殊不知，手术后如果长时间制动，会出现关节挛缩、僵硬、肌肉萎缩、骨折延迟愈合或不愈合等并发症，严重影响患者生活质量。



骨骼、肌肉是运动系统的基本组成部分，骨折后骨骼、肌肉、神经控制功能的协调一致是人体恢复运动能力的保证。

手术绝对不意味着治疗的结束，而康复才意味着治疗的开始！

02 关节术后康复的主要目的

01 加快软组织水肿消退

创伤导致局部出血、水肿，静脉和淋巴回流障碍，手术又加重了水肿。活动量减少，使肌肉对静脉回流的挤压作用消失。肌肉的收缩锻炼可以增加损伤肢体的血液循环，肌肉的挤压作用可增加静脉及淋巴回流，促进水肿消退。

02 促进骨折愈合

肌肉活动带来的局部血液灌注增加，为骨折断端提供了丰富的营养与氧气，奠定了良好的血运基础。同时，肌肉的收缩活动使骨折端产生适度的微动，这种生理性的微动刺激能够激发骨折端生成丰富的骨痂，加速骨折愈合。

03 减少关节僵硬

肌肉在骨折处的粘连是导致关节功能障碍的另一原因。粘连的肌肉失去正常的收缩功能，致关节活动障碍。早期的康复锻炼可最大程度减少关节及肌肉粘连的发生。

04 减少肌肉萎缩和肌力下降的程度


无论何种原因所导致的关节运动功能丧失，均可造成不同程度的肌肉萎缩。功能锻炼可以减少肌肉萎缩程度，并使肌肉尽快恢复正常肌力，还可以始终保持中枢神经系统对相关肌肉的支配，一旦固定解除后不需要重建这种关系。

05 减少卧床并发症

可以防止褥疮、皮肤压迫性溃疡、泌尿系感染、下肢深静脉血栓形成等并发症的出现。

06 促进神经肌肉反射，协调功能的恢复

例如人工髌、膝关节置换术后，经过本体感觉等训练，有助于下肢关节平衡和协调能力的恢复。



国内首款骨科术后远程康复监测系统；跟踪关节活动监测训练情况；量化功能数据，智能风险预警；及时反馈医生，助力患者管理；提升康复效果，降低医疗成本。

精准康复、智能管理

针对骨科垂直领域，帮助患者进行定制化康复服务，全流程的跟踪，精确测量、评估、同步状态，定制化私有方案，为患者提供最周到最精准的服务。

“G20龙头企业培育-基于移动互联和生物传感技术的骨科康复产品开发”研究成果之一，已与多家大型三甲医院展开深入合作。

指导

随时随地通过线上，远程对患者术后进行康复指导

监督

解决患者出院后，医生对患者康复失去监管的问题

伴随

医患互动帮助患者渡过长而枯燥的康复周期



康复进程云监控



个性化康复方案



交互过程游戏化



便捷的患者管理





无督导数据采集



安全线上交流






上肢康复动作：主要覆盖肩袖损伤、上肢骨折康复动作。

髋部康复动作：主要覆盖髋关节置换患者、下肢骨折（髋部）康复动作。


膝部康复动作：主要覆盖膝关节置换患者、膝关节韧带损伤患者、骨性关节炎未置换患者、下肢骨折（膝关节周围）康复动作。

踝部康复动作：主要覆盖踝部慢性损伤患者、踝部骨折术后患者康复动作。


其他辅助训练动作：此类动作主要用于锻炼肌肉力量、平衡能力和核心肌力或指导康复过程中需要特别注意的动作要领。




关节镜手术术后
康复训练



髋、膝关节置换术后
康复训练



四肢创伤骨折术后
康复训练



肩肘关节手术术后
康复训练



关节炎等疾患
保守治疗康复训练



扫码添加客服企业微信

广州圆爱康生物科技有限公司

☎ 020-84215665 13902332905

📍 广州市天河区华夏路28号富力盈信大厦12楼