

产后乳汁淤积的解决方法

调整饮食结构

保持饮食清淡，减少食用促进乳汁分泌的食物

适当热敷

利用热毛巾热敷乳房，可以促进局部血液循环，有助于乳腺导管的扩张，帮助乳汁排空。

按摩

专业的乳房按摩是治疗乳汁淤积的关键。

佩戴合适的胸罩

佩戴无钢圈或哺乳胸罩，可以改善血液循环，减轻局部压迫。

改变哺乳习惯

让婴儿张大嘴含住乳头和大部分乳晕，以减少乳汁淤积的风险。

低频电刺激

低频电刺激是治疗乳汁淤积的有效方法，具有省时、省力、无创、操作简单的优点。

电刺激治疗产后泌乳问题的原理

电刺激能够作用于乳腺细胞，通过电流的刺激促进乳腺细胞的增殖和活性增强。这有助于增加乳腺组织的分泌功能，从而提高乳汁的产量。

电刺激还可以作用于乳腺管，通过刺激乳腺管平滑肌的收缩和放松有助于疏通乳腺管，改善乳汁流通不畅的情况。这不仅可以促进乳汁的顺利排出，缓解乳胀的症状，还可以预防乳腺炎等乳腺疾病的发生。



适用人群

母乳不足、乳汁淤积、人流术后乳腺保养

禁忌症

- 1) 手术当天上节育器者；
- 2) 生命体征不正常；
- 3) 先天性心脏病；
- 4) 易受刺激者（精神病人）；
- 5) 带有心脏起搏器或植入金属器械；
- 6) 急性盆腔炎；
- 7) 子宫肌瘤未摘除者（3CM 以上）；
- 8) 后期大出血；
- 9) 卵巢囊肿、卵巢肿瘤；
- 10) 乳房化脓者。



扫码添加客服企业微信

广州圆爱康生物科技有限公司

☎ 020-84215665 13902332905

📍 广州市天河区华夏路28号富力盈信大厦

圆爱康 · 智慧家康
YUAN AI KANG ZHIHUIJIAKANG

整体康复 产后泌乳



院外延续护理服务：开启康复新模式

在康复过程中，许多患者由于时间、交通或身体状况的限制，难以坚持到医院进行重复性、周期性、规律性的康复治疗。我们紧跟时代的步伐，创新推出“整体康复 - 院内、院外延续护理服务”的居家康复模式，将医院优质的医疗资源通过线上平台延伸至患者家中，为广大患者提供更加便捷、高效的康复治疗解决方案。让每一位需要帮助的患者**居家都能享受到个性化、专业的康复服务。**



院外延续护理服务的优势

- 01 随时随地使用
- 02 医院同原理同效果
- 03 节约时间和成本
- 04 尊享“六师共管”健康管理服务群

在医院下单后，会自动进入专属的“六师共管”健康管理服务群，享受到专科医生、治疗师、专科护理、专业客服、线下督导、设备工程师的贴心服务，同时还可以在线交流病情，实时调整治疗方案。让专业医疗能力平移到居家康复中。



十月怀胎一朝分娩，伴随着分娩的喜悦，哺乳问题随之而来，很多宝妈都遇到过产后无奶，奶水不足、积奶堵奶等情况。

产后乳汁分泌不足

产后乳汁分泌不足是指产后哺乳期内，乳腺无乳汁分泌，或泌乳量少，不能满足喂养婴儿者。多发生在产后2-3天或半个月，也可发生在整个哺乳期。



乳汁分泌不足的原因有哪些？

1、饮食因素

产后经常摄入辛辣刺激性、油炸类的食物或者比较油腻的食物，会影响乳汁的分泌，从而造成乳少、乳堵的现象。

2、精神因素

产后长时间照看孩子可能会导致睡眠不足，使产妇处于紧张、焦虑等情绪，影响到垂体以及下丘脑功能，减少催乳素的分泌。

3、心理因素

部分人群产后对于泌乳知识了解较少以及过度担心乳房下垂，不能够及时哺乳，影响到乳汁的分泌，因此会诱发产后缺乳。

4、其他因素

重症营养不良、贫血等疾病因素也可导致乳汁不够。

乳汁分泌不足的解决方法

让宝宝勤吸吮

产后奶水不足的女性，要尽早让宝宝吸吮乳房。此外，还要增加宝宝吸吮乳房的次数，这有利于刺激乳房分泌乳汁。



进行饮食调理：

产后女性乳汁分泌不足时，可以多吃黄豆猪蹄汤、乌鸡汤、豆腐鲫鱼汤等汤水类的食物，有利于促进乳汁分泌。还要多吃牛奶、鸡蛋、鱼肉等蛋白质含量高的食物。

保持心情舒畅：

产后女性情绪低落也会影响乳汁分泌，建议女性要保持心情舒畅，避免焦虑紧张。



刺激泌乳，保持乳腺畅通

这是一种安全、有效促进乳汁分泌的方法，它通过电流刺激乳房，促进乳腺分泌。

产后乳汁淤积

产后乳汁淤积是指哺乳期的女性由于乳汁不能及时有效地排出，导致乳汁在乳腺腺叶及导管内积存而形成的一种状况。这是哺乳期常见的并发症，可发生在哺乳的任何时期。也被称之为“窝奶”“堵奶”“奶结”等。

产后乳汁淤积的常见原因

- 01 饮食油腻：产后饮食油脂含量过高导致乳腺管堵塞，造成乳汁淤积；
- 02 喂养不当：奶汁堆积导致乳房排泄不畅，如宝宝睡眠时间过长、影响哺乳习惯、改变吸吮乳汁的次数、限制宝宝喂奶次数与时间等；
- 03 乳头内陷：部分产妇可能有乳头内陷情况，宝宝在吃奶时吸吮乳头出现困难，长时间就会造成乳汁淤积；
- 04 急性乳腺炎：不正确地挤压及乳房按摩或乳头被宝宝吸破，导致病菌侵入。

产后乳汁淤积的症状

任何情况下的乳汁淤积都可以引发乳房局部胀痛，哺乳后缓解不明显，乳汁淤积初起无发热，无局部皮肤发红。如出现以下症状，你可能出现了乳导管阻塞：

- 1、乳房局部区域疼痛，发热，有可能发红；
- 2、乳腺管堵塞靠近皮肤，可触摸到明显边界，没有全身发热症状。
- 3、有部分妈妈可在乳头处看到微小的白色乳汁栓子（小白点）。

乳导管堵塞可引发乳腺炎，如果宝妈们处理不及时则会发生不良后果。

