

腹直肌分离的治疗原理和方法？

神经肌肉电刺激

低频电刺激治疗是目前临床上治疗腹直肌分离的主要方法。对腹直肌、腹横肌、腹斜肌及腹部主要肌群进行强化电刺激循环治疗，使腹部肌肉被动收缩，增强肌肉的收缩力，从而使分离的肌群恢复正常形态。



适用人群

产后女性

孕期的女性由于胎儿体积的增大都可能会出现腹直肌分离。

做过腹部手术的患者

由于做过腹部手术，例如剖腹产等，腹壁已经非常脆弱，没有很好的筋膜和肌肉完整性，导致出现腹直肌分离的概率增加。

缺乏运动

由于长期缺乏锻炼，会导致腹部肌群弱化，腹肌力量不足。

肥胖人群

禁忌症

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1) 妊娠期高血压不正常； | 2) 精神系统疾病； |
| 3) 盆、腹腔恶性肿瘤； | 4) 恶露未干净； |
| 5) 先天性心脏病； | 6) 后期大出血； |
| 7) 带有心脏起搏器或植入金属器械； | 8) 子宫肌瘤未摘除者（3CM以上）； |
| 9) 生命体征不正常者； | 10) 急性盆腔炎； |



扫码添加客服企业微信

广州圆爱康生物科技有限公司

☎ 020-84215665 13902332905

📍 广州市天河区华夏路28号富力盈信大厦12楼

圆爱康 · 智慧家康
YUAN AI KANG ZHIHUIJIAKANG

整体康复 腹直肌分离康复



院外延续护理服务：开启康复新模式

在康复过程中，许多患者由于时间、交通或身体状况的限制，难以坚持到医院进行重复性、周期性、规律性的康复治疗。圆爱康智慧家康紧跟时代的步伐，创新推出“整体康复-院内、院外延续护理服务”的居家康复模式，将医院优质的医疗资源通过线上平台延伸至患者家中，为广大产后妇女提供更加便捷、高效的康复治疗解决方案。让每一位需要帮助的妇女**居家都能享受到个性化、专业的康复服务。**



院外延续护理服务的优势

01 随时随地使用

在家休息，出差旅行，上班办公，下班休息都可以使用。



02 医院同原理，同治疗效果

专业的院外延续护理设备，与医院设备治疗原理及效果相同，让您在家即可享受到医院专业的康复治疗服务。

03 节约时间和成本


省去了往返医院的时间和成本，可以根据自己的日程安排治疗时间，做到了工作、生活、康复三不误。

04 尊享“六师共管”健康管理服务群

您在医院下单后，会自动进入专属的“六师共管”健康管理服务群，享受专科医生、治疗师、专科护理、专业客服、线下督导、设备工程师的贴心服务，同时还可以在线交流病情，实时调整治疗方案。让专业医疗能力平移到居家康复中。




腹直肌位于腹前壁正中两侧，被包埋于腹直肌鞘内，是一对肌肉。左右腹直肌内侧以腹白线相隔。自上而下被腱划（致密结缔组织索）分隔。腹直肌可以维持腹压，协助人体进行呼吸、排便、分娩等活动。



腹直肌分离是什么？

腹直肌分离是指腹直肌的左右两部分之间的距离增加了。即腹白线变宽了。临床上，一般以2CM或2指为标准。



腹直肌分离的原因是什么？


- 生理因素** 主要是由于怀孕分娩造成的。在怀孕期间，胎儿在子宫不断长大，导致腹白线变宽，逐渐形成腹直肌分离。
- 年龄因素** 随着年龄增长，皮肤、韧带、肌纤维的弹性逐渐下降，导致腹直肌分离的发病率升高。
- 其他因素** 腹压长期升高、肥胖或缺乏锻炼等因素可能导致白线的结缔组织受到一定的机械压力，进而发生腹直肌分离。

腹直肌分离的危害

- ♥ 导致腹部肌肉无力、腹部膨隆，影响美观；
- ♥ 长期严重的分离还可能影响脊柱和骨盆的稳定性，改变人体整体姿态；
- ♥ 增加腰痛以及慢性盆腔疼痛的风险；
- ♥ 增加罹患盆底功能障碍性疾病的风险；



如何判断腹直肌是否分离？



- 1、平躺仰卧，屈膝，露出腹部。
- 2、左手在头后支撑，右手食指和中指，垂直深入腹部，身体放松。
- 3、上身抬起，感觉到两侧腹肌向中间挤压手指，如果感觉不到挤压，那么就把手指向两边挪动，直到找到紧张的肌肉。

测宽度：掌心正对自己，测量两侧肌肉的距离。

测长度：拇指正对自己，测量腹直肌分离的长度。

结果判断：重度：>4指； 中度：3-4指； 轻度：2-3指； 正常：<2指