



KEEP IN
A GOOD MOOD

远程胎儿监护注意事项

- 01 监测时长为20分钟, 请选择安静舒适的地方, 能更好的进行监测;
- 02 挑选在饭后半小时, 或者一天当中胎动多的时间段做(多为晚上8~9点左右)相对能取得更准确数据;
- 03 监测时如有不适可以轻柔地更换姿势, 但不要采取仰卧位, 容易造成低血压影响宝宝。
- 04 宝宝睡眠周期为20-40分钟, 若因宝宝睡眠等原因影响结果, 宝妈可能需要再测一次。
- 05 保持良好的早睡早起生活习惯, 良好的习惯有助于宝宝也养成规律的活动节律, 有规律地进行监测;
- 06 请勿私自服用药物, 所有药物都需要在医师指导下服用, 因为有的药物直接影响到宝妈和宝宝的健康。
- 07 请保持良好的心态, 避免心情激动, 以免造成宝宝的不安, 影响监测。
- 08 监测完成后, 医生会判读结果, 客服人员会督导您执行建议, 请听取建议, 以免造成不良后果。

医用级远程胎监适合 所有孕妇进行妊娠监督 尤其是:

母体因素

1. 高龄: 尤其是高龄初产 (≥ 35 岁);
2. 妊娠合并全身性疾病: 高血压、心脏病、糖尿病等;
3. 高度焦虑, 情绪不稳定;
4. 有“剖宫产术”史或“子宫肌瘤剔除术”史等

胎儿因素

1. 珍贵儿 (试管婴儿等);
2. 胎儿宫内生长受限;
3. 母胎血型不合。

妊娠异常

1. 脐带因素: 脐带扭转或绕颈等;
2. 胎盘因素: 前置胎盘, 胎盘功能退化等;
3. 羊水量异常: 羊水过多或过少;
4. 过期妊娠等。

不良孕产史

1. 既往有死胎、死产、早产、畸形、多次流产史等
2. 此次妊娠有先兆流产、先兆早产保胎史等。

给宝宝一份24小时保障 GUARANTEE

第一步: 下载APP

搜索“智慧家康”下载APP



第二步: 远程监测

随时随地享受专业、贴心、安全的胎儿监护服务



第三步: 数据解读

三甲医院医生在线解读

客服企业微信



☎ 020-84215665 13902332905

📍 广东省广州市天河区高普路38号金发科技创新社区1栋701室

最终解释权归广州圆爱康生物科技有限公司所有

圆爱康 · 智慧家康
YUAN AI KANG · ZHIHUIJIAKANG



远程胎儿监护

——母胎安全的守护者

24 HOURS

什么是远程胎儿监护

远程胎儿监护是孕妇离开医院进行胎儿监护的一种技术。通过网络信息技术将胎儿的胎心、宫缩、胎动等图谱信息传送到监护中心,由专业医生解读并给出健康建议的一种远程医疗服务。



我们的服务 天天守护 时时守护

我们将提供专业的驻点指导人员,以及三甲医院医生团队为您服务,让胎儿监护“天天监护,时时监护”变成可能,全方位保证母婴安全。



孕妈为何要在家做胎儿监护?

可以在家评估胎儿宫内情况,及时反应胎儿宫内是否出现缺氧情况,及时发现宫缩,避免早产或急产在家情况,有效降低胎儿窒息、新生儿脑瘫、死胎、死产等灾难性事件。



宝妈:“老公,宝宝今天好像不怎么动了,但是现在是在晚上1点,要不要去医院呢?”

宝爸:“我们先做个远程胎监看看,等结果出来就知道该怎么办了。”



医生建议: 正常胎监, NST反应型, 基线变异, 加速都很好, 偶有宫缩, 正常的。宝妈加油! 如有规则腹痛, 阴道流血, 请及时就诊!

医生



感谢智慧康及时监护, 帮助我们的孩子平安出生。

24小时胎监的优点

以下情况可以帮助到您:



疫情原因

疫情之下, 不便或不能及时去医院, 此时只有确定母胎危急才能坐120到院, 远程胎监可以帮助排除紧急情况, 及时了解胎儿安危。



焦虑情绪

担忧宝宝早产、急产、脐带绕颈、缺氧等状况, 让宝妈产生焦虑情绪, 影响到宝宝健康, 多做几次远程胎监可以很好地打消这些顾虑。



意外情况

突然被撞到腹部、摔倒、受到惊吓, 这时需要赶紧确保胎儿安全, 可以马上做远程胎监, 以免因到医院路程远、排队等待被耽搁。



远离医院

需要去远离产检医院的地方: 因故回娘家、外出、旅行等, 可以带上远程胎儿监护, 给自己的宝宝更多保障。

真实案例

王女士 32岁 孕34周+2天

情况记录:

- 2022-09-21 20:29--20:52在家进行远程胎心监护胎儿情况; 远程值班医生建议: 胎心反应一般, 请复查。
- 2022-09-21 22:12--22:38在家复查胎监; 远程值班医生建议: 复查后基线偏快, 建议入院就诊。
- 2022-09-21 22:40平台客服电话通知孕妇及家属尽快到医院就诊, 孕妇同意。

跟踪记录:

- 2022-09-21 22:50孕妇到达医院妇产科急诊, 复测胎监还是欠佳, 急诊医生建议紧急剖宫产。
- 2022-09-22 凌晨孕妇因“胎儿窘迫”在腰硬联合麻醉下行子宫下段横切口剖宫产术, 术中见羊水清, 量500ml, 以枕左前位顺取一活男婴。

术中发现:

脐带扭转, 其中一根脐动脉见血栓形成。

