

心脏超声在运动康复治疗冠心病的效果和对患者生活质量影响观察

袁光星, 毛 君 (通讯作者)

(重庆市第十三人民医院 重庆 400053)

【摘要】目的: 对心脏超声在运动康复治疗冠心病的效果和对患者生活质量影响进行分析观察。**方法:** 选择2017年7月—2018年7月在我院进行了冠心病治疗的90例患者为对象,采取双盲法对患者进行分组,每组患者例数为45例。对照组患者采取常规的药物进行治疗,观察组则在对照组的基础之上加入了心脏超声以及运动康复治疗方式进行治疗,并对两组患者的疗效数据和生活质量数据进行分析对比。**结果:** 对照组中45例患者的治疗总有效率与观察组相比,差异显著, $P < 0.05$, 具有统计学意义;生活质量对比中,观察组显著高于对照组, $P < 0.05$ 差异具有统计学意义。**结论:** 心脏超声在运动康复治疗冠心病中有着缓解患者心绞痛、推动其心功能情况的改善,提升患者的生活质量,值得在临床进行推广。

【关键词】 心脏超声; 运动康复; 冠心病治疗效果; 生活质量**【中图分类号】** R445**【文献标识码】** A**【文章编号】** 2096-3807 (2019) 07-0137-02

冠心病又成为冠状动脉粥样硬化性心脏病,已经成为威胁人们身体健康的杀手之一。近几年来,随着人们对于这一疾病的治疗以及认识的了解和改进,采取药物治疗

以及机械治疗的方式对冠心病患者进行治疗取得了非常大的进步。我院选择了90例患者为对象,对心脏超声在运动康复治疗冠心病的效果以及患者在生活质量方面的影响

1.5 统计学方法

建立数据库,并以SPSS20.0统计学软件包分析,均数 $\pm$ 标准差($\bar{x} \pm s$)行 t 检验,例数(n)行 χ^2 检验;统计学差异则表示为 $P < 0.05$ 。

2 结果

2.1 观察超声心动图、心电图对本组慢性肺心病中肺动脉高压的检出率

本组慢性肺心病中肺动脉高压者共27例,其中超声心动图检出率是96.30% (26/27),心电图检出率是92.59% (21/27),超声心动图检出率高于心电图,但比较差异无统计学意义 ($\chi^2=0.353$, $P=0.552$)。

2.2 肺动脉高压组、肺动脉压正常组的RAP、RVP、PAPS、PAPD

肺动脉高压组患者的MPAP、PAWP、PVR水平均高于肺动脉压正常组 ($P < 0.05$),见表。

表 肺动脉高压组、肺动脉压正常组的MPAP、PAWP、PVR比较 (n , $\bar{x} \pm s$)

组别	例数	MPAP (mmHg)	PAWP (mmHg)	PVR (dyn $\cdot$ scm ⁵)
肺动脉高压组	27	29.78 $\pm$ 2.18	8.48 $\pm$ 1.45	351.15 $\pm$ 94.41
肺动脉高压正常	21	9.21 $\pm$ 1.46	4.35 $\pm$ 0.45	135.22 $\pm$ 14.54
t	-	37.194	12.564	10.362
P	-	0.000	0.00	0.000

3 讨论

慢性肺心病,即慢性肺源性心脏病,发生机制为肺循环阻力增强、肺动脉血压升高所致右心肥厚和扩大的一种病变,可能引发右心功能衰竭,严重时可导致患者死亡,危及患者生命安全,应早期诊断,及时治疗^[2]。而肺动脉高压作为慢性肺心病患者最常见的一种严重并发症,是因肺组织受损所致,可加重患者病情,并增加治疗难度,应

及时检测,改善病人预后^[3]。

超声心动图属于一种新型、无创性检查方式,其可利用超声波回声获得患者的血流信息,有无创、操作性强、无痛苦、安全可视等优势,可提升患者诊断期间的舒适性,从而改善其遵医行为,现已广泛用于临床诊断与治疗中,对于疾病治疗有一定的临床指导意义^[4-5]。笔者在本研究中以分组对照方式分析超声心动图对慢性肺心病患者肺动脉高压的诊断价值,结果显示:中超声心动图检出率是96.30%,高于心电图的92.59%,但二者比较无统计学差异,推测与样本量较小有关。同时,肺动脉高压组患者的MPAP、PAWP、PVR水平均高于肺动脉压正常组,可见超声心动图作为一种省时省力的新兴检测方式,可准确检测出慢性肺心病患者的肺动脉压相关参数,对慢性肺心病肺动脉高压患者的临床治疗有指导意义,可推广。

【参考文献】

- [1] 贾颖超, 杨章慧, 吕新校, 等. 多普勒超声心动图对肺源性心脏病右心功能的评价[J]. 医学影像学杂志, 2017, 27(6): 1179-1181.
- [2] 段丽英. 多普勒超声心动图对肺源性心脏病右心功能的评价[J]. 中国药物与临床, 2016, 16(4): 522-523.
- [3] 郑枫, 徐莉, 张国辉, 等. 实时三维超声心动图对肺动脉高压患者右室功能的评价[J]. 临床超声医学杂志, 2017, 19(9): 631-633.
- [4] 王芳韵, 金兰中, 马桂琴, 等. 超声心动图对新生儿持续肺动脉高压的诊断及疗效评价[J]. 中华全科医学, 2016, 10(9): 373-375.
- [5] 马海红, 李洪英, 胡雪梅, 等. 彩色超声心动图检查在高原心脏病肺动脉高压诊断中的临床价值[J]. 中国医学装备, 2016, 13(10): 52-55.

进行观察研究。现报道如下具体情况。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择了90例患者为对象,采取双盲法对患者进行分组,每组患者例数为45例。对照组中有男性患者26例,女性患者有19例,年龄为47~68岁,年龄平均值为(51.73±5.79)岁,病程为1至4个月。观察组中有男性患者28例,女性患者有17例,年龄为44~69岁,年龄平均值为(53.06±5.11)岁,病程为2~4个月。所有患者的资料均无统计学意义,具有可比性。

1.2 方法

对照组当中的患者主要采取阿司匹林以及血管紧张转化酶抑制剂以及β-受体阻滞剂及他汀类调脂药进行治疗。观察组则在对照组治疗基础之上加入心脏超声和运动康复进行治疗。心脏超声主要采取ES-2超声治疗,工作频率调为0.8MHz,声强平均值为1.4W/cm²,占空比为100%。取患者的仰卧位,将患者前胸进行暴露,超声的区域为:自患者右侧第三肋骨下缘由患者胸骨右缘经过胸骨向左进行平行到其左侧的锁骨中线为区域A。自患者胸骨左缘第三肋骨下缘至患者心尖部为B区域^[1]。心脏超声每天进行一次,每次20分钟。对患者进行运动康复治疗,在院内心脏内科进行,在患者运动是监测其心电图,运动强度的靶心率为70%~80%(预测最大心率为220与年龄之差),每天进行20分钟,患者运动的方式为划船、手臂摇车、活动平板以及功率自行车,每周进行五次,连续进行两周的治疗。

1.3 观察指标

对患者的治疗效果以及生活质量进行分析对比。疗效判定标准:患者未再发作心绞痛,且心绞痛的分级改善Ⅱ级或以上,心电图已经正常为显效。患者心绞痛发生的概率显著降低,心绞痛的分级为1级,心电图已经改善为好转。患者心绞痛的发作未降低,心绞痛分级,心电图未见改善为无效。患者生活质量的评价内容主要包含有治疗的信心、疾病了解和危险因素的了解度以及发生胸闷心悸、失眠焦虑以及食欲不振发生概率。

1.4 统计学处理

本研究所有数据均用SPSS21.0统计软件进行整合分析,治疗效率和生活质量的相关计数资料用例数和百分比表示, χ^2 检验, $P < 0.05$ 则表明差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 观察两组患者的治疗效率

对照组患者治疗的总有效率57.7%明显低于观察组的86.7%, $P < 0.05$ 差异具有统计学意义,见表1。

表1 两组患者治疗效率之间的对[例(%)]

组别	例数	显效	好转	无效	治疗有效率
观察组	45	25 (55.6)	14 (31.1)	6 (13.3)	39 (86.7)
对照组	45	17 (37.8)	13 (28.9)	15 (33.3)	26 (57.7)
χ^2	-	2.857	1.053	5.031	5.031
P	-	0.09	0.018	0.024	0.024

2.2 两组患者生活质量改善情况之间的对比

对照组中患者对于治疗的信心、疾病了解以及危险因素的了解度显著低于观察组,对照组患者发生胸闷心悸、失眠焦虑以及食欲不振的概率明显高于观察组,因此,在生活质量方面的对比中,观察组显著优于对照组,差异具有统计学意义 $P < 0.05$,见表2。

表2 两组患者生活质量改善情况之间的对比[例(%)]

组别	例数	战胜疾病有信心	对疾病有了解	对危险因素有了解	胸闷心悸	失眠焦虑	食欲不振
观察组	45	40 (88.9)	42 (93.3)	40 (88.9)	6 (13.3)	5 (11.1)	1 (2.2)
对照组	45	29 (64.4)	31 (68.9)	24 (57.1)	8 (17.8)	11 (24.4)	3 (6.7)
χ^2	-	7.516	8.775	13.846	1.338	2.737	1.047
P	-	0.006	0.003	0	0.047	0.002	0.031

3 讨论

当前,在进行冠心病的治疗时,药物治疗依旧是主要的手段,但是经过长期研究观察发现,这一治疗手段只能暂时延缓患者病情的发展,对于患者心功能以及心率的长效改善效果较低。心脏超声是物理治疗的方式之一,能够有效扩张患者血管,加快患者血流的速度,缓解冠脉痉挛,修复患者损伤的细胞,推进患者血管,进而达到治疗的目的。运动康复治疗则可以对患者的冠脉血供进行改善,增强其心脏功能,长期对患者进行规范的运动康复训练可以有效起到重构逆转心肌,提升患者的射血分数,推动患者的恢复^[2]。在本文的研究当中,选择了90例患者为对象,采取双盲法对患者进行分组,每组患者例数为45例。对比两组患者的疗效以及生活质量后发现,对照组中患者治疗的总有效率显著低于观察组,观察组患者的生活质量显著高于对照组, $P < 0.05$ 差异具有统计学意义。

综上所述,应用心脏超声在运动康复治疗冠心病的效果显著,既可缓解患者的心绞痛,并改善其心功能状况,又能有效提升患者的生活质量,因此,值得临床推广使用。

【参考文献】

- [1] 刘亮. 太极拳联合运动康复训练治疗老年冠心病的疗效及对不良心理和生活质量的影响[J]. 中西医结合心脑血管病杂志, 2016, 14(05): 475-477.
- [2] 韦红卫, 易秋艳. 康复运动对冠心病患者心脏自主神经功能的影响[J]. 中西医结合心脑血管病电子杂志, 2017, 5(16): 162-163.