

1 促进子宫复旧

子宫收缩的增强和频率的增加有助于宫腔内残留物的排出，如恶露、残留胎盘组织等，从而减少感染的风险。同时，子宫收缩还能促进子宫肌层的快速恢复，使子宫逐渐缩小并恢复到产前的形态和大小。



2 减少并发症

电刺激子宫复旧在一定程度上可以减少产后出血的发生，因为有效的子宫收缩有助于关闭子宫内的血管，减少出血。

适用人群

产后42天内子宫恢复不全的妈妈

人流术后子宫恢复不好者

月经量少(多)、闭经及更年期女性

禁忌症

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1) 手术当天上节育器者； | 2) 生命体征不正常； |
| 3) 先天性心脏病； | 4) 易受刺激者（精神病人）； |
| 5) 带有心脏起搏器或植入金属器械； | 6) 急性盆腔炎； |
| 7) 子宫肌瘤未摘除者（3CM 以上）； | 8) 后期大出血； |
| 9) 卵巢囊肿、卵巢肿瘤； | 10) 不能主动配合治疗者； |



扫码添加客服企业微信

广州圆爱康生物科技有限公司

☎ 020-84215665 13902332905

📍 广州市天河区华夏路28号富力盈信大厦12楼

圆爱康 · 智慧家康
YUAN AI KANG ZHIHUIJIAKANG

整体康复 子宫复旧



院外延续护理服务：开启康复新模式

在康复过程中，许多患者由于时间、交通或身体状况的限制，难以坚持到医院进行重复性、周期性、规律性的康复治疗。我们紧跟时代的步伐，创新推出“整体康复-院内、院外延续护理服务”的居家康复模式，将医院优质的医疗资源通过线上平台延伸至患者家中，为广大患者提供更加便捷、高效的康复治疗解决方案。让每一位需要帮助的患者**居家都能享受到个性化、专业的康复服务。**



院外延续护理服务的优势

- 01 随时随地使用
- 02 医院同原理同效果
- 03 节约时间和成本
- 04 尊享“六师共管”健康管理服务群

在医院下单后，会自动进入专属的“六师共管”健康管理服务群，享受到专科医生、治疗师、专科护理、专业客服、线下督导、设备工程师的贴心服务，同时还可以在线交流病情，实时调整治疗方案。让专业医疗能力平移到居家康复中。

什么是子宫复旧？


分娩后，随着子宫的缩复，子宫体积也将逐渐缩小，胎盘剥离面也会随之而相应缩小，再加上子宫内膜自身的再生，子宫通常在产后6周时恢复到接近怀孕前的状态，这个过程就称为子宫复旧。



子宫复旧的几个阶段


子宫颈复原

分娩后由于子宫颈发生充血、水肿，会变得比以前柔软许多，子宫颈壁也变得非常薄，7天后才会恢复原来的状态。7-10天后，子宫颈内口关闭。直到4周后，子宫颈才能恢复到孕前的大小。



子宫体复原

胎盘从子宫中娩出后，子宫开始收缩，此时用手可摸到腹部呈球形的很硬的子宫体，其最高处与肚脐水平相差无几。而在产后子宫体的高度每天会下降1-2厘米。到了产后第10-14天，子宫就会重新回到盆腔内。



子宫内膜复原

胎盘和胎膜与子宫壁分离，由母体排出以后，从子宫内膜的基底层，会长出一层新的子宫内膜。产后10天左右，除了胎盘附着面外，其它部分的子宫腔会全部被新生的内膜所覆盖，到产后2周左右，直径已经能缩小到3厘米-4厘米，在产后6-8周就能完全愈合。

如何判断产后子宫复旧是否良好？

01 如果子宫复旧良好，检视刚生完的子宫底，从肚脐可以触摸得到，大约两个星期，子宫就无法摸到，除非是患有子宫肌瘤。

02 恶露的颜色从鲜红、暗红、深黑到淡红色，最后无色。



什么是“子宫复旧不良”？



子宫复旧不良是指妊娠过程中增大的子宫在分娩后不能顺利收缩的情况。导致子宫复旧不全的原因主要包括胎盘或胎膜残留、子宫肌瘤、子宫肌炎或盆腔感染、分娩次数多、胎盘面积过大等。一般表现为：

- ♥ 血性恶露持续的时间较长
- ♥ 恶露颜色异常
- ♥ 恶露有异味
- ♥ 恶露淋漓不尽
- ♥ 不规则的或多量的阴道出血
- ♥ 下腹坠胀
- ♥ 小腹痛
- ♥ 骨盆和腰部疼痛

子宫复旧不良的危害

产后恶露不净有可能导致局部和全身感染，严重者可发生败血症，易诱发晚期产后出血，甚至大出血休克，危及产妇的生命。

子宫复旧不良是导致产后出血的主要原因，严重者可出现大出血，甚至危及生命。

长期出血会导致盆腔感染，出现下腹痛、腰酸等后遗症。

子宫位置恢复不好会导致恶露不尽、子宫脱垂、子宫异位，出现白带增多、尿失禁，影响生活质量，甚至影响再次受孕。



电刺激治疗子宫复旧不良的原理？

电流作用于子宫平滑肌，引起肌肉细胞的兴奋和收缩。模拟自然分娩过程中子宫收缩的生理过程，促进子宫平滑肌的主动收缩。

具体作用如下：

