

适用人群

产后出现上述尿潴留表现，经初步诱导（如热敷、听水声）无效。

拔除留置导尿管后，仍无法自行排尿或排尿不畅。

B超检查提示膀胱内残余尿量持续超标。

希望采用非药物、无创的方式尽快恢复膀胱功能。

神经肌肉功能障碍：

因麻醉、产程过长导致膀胱逼尿肌收缩乏力，或盆底肌肉松弛；

预防复发：导尿后需恢复膀胱功能，或有反复尿潴留倾向的产妇。

禁忌症

- 1) 贴片部位**皮肤存在破损、炎症、感染、瘢痕或皮疹**时禁用。
- 2) 装有**心脏起搏器等电子植入物**者禁用。
- 3) **孕妇及产后恶露未干净**时禁用。
- 4) 合并恶性肿瘤、泌尿生殖系统活动性感染（如尿道炎、阴道炎）、癫痫等**神经系统疾病**者禁用。
- 5) 对**贴片材料过敏**者需避免使用。
- 6) 严重的**心律失常、心力衰竭**等。
- 7) 治疗区域存在**恶性肿瘤**。
- 8) **急性深静脉血栓或血栓性静脉炎**。
- 9) **严重认知障碍或精神疾病**无法配合治疗者。



扫码添加客服企业微信

广州圆爱康生物科技有限公司

☎ 020-84215665 13902332905

📍 广州市天河区高普路38号金发科技创新社区1栋713室

居家康复 产后尿潴留



居家康复服务：开启康复新模式

在康复过程中，许多患者由于时间、交通或身体状况的限制，难以坚持到医院进行重复性、周期性、规律性的康复治疗。我们紧跟时代的步伐，创新推出“居家康复服务”新模式，将医院优质的医疗资源通过线上平台延伸至患者家中，为广大患者提供更加便捷、高效的康复治疗解决方案。让每一位需要帮助的患者**居家都能享受到个性化、专业的康复服务**。



居家康复服务的优势

- 01 随时随地使用
- 02 医院同原理同效果
- 03 节约时间和成本
- 04 尊享“六师共管”健康管理服务群

在医院下单后，会自动进入专属的“六师共管”健康管理服务群，享受到专科医生、治疗师、专科护理、专业客服、线下督导、设备工程师的贴心服务，同时还可以在线交流病情，实时调整治疗方案。让专业医疗能力平移到居家康复中。

产后尿潴留是产妇常见的产褥期并发症，若不及时处理，可能影响子宫恢复、增加感染风险。了解其成因、症状及科学应对方法，对产妇顺利康复至关重要。

什么是产后尿潴留？

产后尿潴留是指产妇在分娩后6~8小时内，膀胱内充满尿液却无法自主排出，或排尿后膀胱残余尿量超过150ml的情况。

您需要警惕的“信号”：



产后6-8小时内无法自行排尿



排尿不畅



排尿不尽感



下腹胀隆、胀痛



尿失禁（溢出性）



B超检查膀胱内残余尿量大于150ml



产后尿潴留的原因有哪些？

分娩损伤：

如产程过长、器械助产（产钳或胎吸）导致尿道或膀胱神经损伤。

心理因素：

产后焦虑、疼痛恐惧或环境不适（如医院环境）抑制排尿反射。

其他风险：

如多胎妊娠、巨大儿分娩或既往泌尿系统疾病史。

麻醉影响：

硬膜外麻醉或腰麻可能暂时抑制膀胱收缩功能。

生理变化：

妊娠期膀胱受压，产后子宫复旧缓慢或盆底肌松弛影响排尿。



产后尿潴留对女性有什么不良影响？



增加痛苦：膀胱过度充盈导致下腹剧痛，影响产后休息和恢复。

引发尿路感染：尿液长时间滞留是细菌滋生的温床，极易导致膀胱炎、肾盂肾炎。

影响子宫复旧：胀大的膀胱会向上推挤子宫，妨碍子宫收缩，导致产后出血风险增加和恶露排出不畅。


导致膀胱永久性损伤：长期过度牵拉会损害膀胱壁的弹性和收缩力，可能造成长期排尿功能障碍。

加重心理负担：给本已疲惫的新妈妈带来巨大的焦虑和挫败感。

肾功能损伤：严重尿潴留时尿液反流至肾脏，可能导致肾积水甚至肾功能损害。

子宫内膜修复的原理是什么？

低频电刺激是产后尿潴留的有效物理治疗手段，尤其适用于轻度尿潴留或导尿困难者。研究显示，约60%~70%的患者通过电刺激可恢复自主排尿，减少导尿次数，缩短住院时间。



作用原理：

1 唤醒膀胱逼尿肌：电流通过电极刺激骶部神经或膀胱区肌肉，唤醒因压迫、麻醉导致麻痹的膀胱逼尿肌，增强收缩功能；

2 松弛尿道括约肌：电刺激可缓解尿道括约肌痉挛，降低排尿阻力；

3 促进神经修复：长期治疗可改善膀胱神经传导功能，恢复排尿反射弧。