

常见产后康复评估与治疗方法

智慧家康——

内容大纲

01

什么是产后康复?

02

产后康复一到底是哪里康复呢?

03

产后常见疾病及康复方法

01 产后康复定义

02 产后康复一到底是哪里康复呢？

03 产后常见疾病及康复

定义 / 产后康复



定义

产后康复是指在科学的健康理念指导下，针对女性产后心理和生理变化进行主动的、系统的康复指导和训练。

内容

产妇产后乳腺的泌乳与形态的恢复、子宫复旧、盆底功能康复、形体恢复、心理以及营养等方面的检查和指导



目的

促进产妇在分娩后一年内快速、全面恢复身心健康

内容大纲

01

什么是产后康复？


02

产后康复—到底是哪里康复呢？

03


产后常见疾病及康复

LOREM / 妊娠期和产褥期母体变化




乳房

LOREM / 乳房重量变化




孕早期

01



孕中期

02



孕晚期

03

孕前两乳房平均重量约200g，孕后期增长为400-600g。乳头变大，两乳头之间的距离逐渐增大，乳晕变大变黑。

乳房

LOREM / 乳房腺体变化

孕早期


乳房逐渐长大，乳房皮肤下的血管变得明显突出。乳头也会渐渐变大，乳晕会变大变黑。有时会有发胀、刺痛感或者触摸时感到疼痛，走路时也能感到有些沉重。乳腺的小导管和腺泡迅速增生，腺泡增大。

孕中晚期

乳房仍然不断增大，但在分娩前，胸部增大的速度反而减慢，腺泡开始分泌，分娩前有初乳。

乳房

LOREM / 产后乳房



当宝宝出生、胎盘娩出，雌激素和孕激素的水平就会骤降。没有了孕期激素的抑制作用，催乳素就开始指挥制造乳汁的工作了，乳房会生产初乳。

子 宫

LOREM / 妊娠期子宫变化



非孕期/ 孕期	子宫体	子宫峡部	子宫颈	子宫内膜
非孕期	50g	1cm	宫颈粘液周期性 变化	8-10mm
孕期	1000g	7-10cm	腺体肥大增生, 粘液增多	孕早期可达 14-20mm

子宫

LOREM / 分娩后子宫变化

子 宫 颈

7天之后恢复原来的形状，7-14天宫颈内口关闭，产后4周，恢复到孕前。

子 宫 底

每天下降1-2cm，产后10-14天降入骨盆。4-6周后大小回复到孕前。



子宫内膜重新形成，产后2周左右，直径缩小3-4cm，6-8周完全恢复。

子 宫 内 膜

子宫


LOREM / 恶露观察



疼痛




疼痛



疼痛

LOREM / 腰背疼痛




因腹壁肌肉功能低下
所致的脊柱背伸肌牵
拉，引起脊柱前凸，
腰骶部压力不断增加，
受损严重

疼痛

LOREM / 腰背疼痛

产后每2-3个女性中就会有一个发生腰背痛




国外研究产后腰背疼痛的发生率为45%-76%。

疼痛

LOREM / 耻骨联合分离


正常情况下耻骨联合间隙为4~6 mm，孕期随着激素水平的变化，此间隙可增宽2~3 mm，如果间隙超过10 mm时，即出现耻骨联合分离，通常会出现一系列临床症状



形体

LOREM / 圆肩驼背

由于产后女性身体结构发生改变，导致身体力线改变，从而出现圆肩驼背、探颈等体态。





形体

LOREM / 骨盆

骨盆在人体中具有重要意义，而骨盆在孕产期发生了重要的改变，从而引发很多症状，这些症状从产后 6 周至产后 6 个月甚至终生。



Pelvis and Ligaments, Rear View, Female



形体

LOREM / 腹直肌分离

腹直肌位于腹前壁正中线的两侧，有前屈脊柱，降胸廓，增加腹压的功能。
两侧腹直肌鞘于腹正中线相互交织而成白线。



形体

LOREM / 腹直肌分离



正常或孕早期腹直肌

两侧腹直肌距离逐渐增大

盆底

子宫逐渐增大、腹压渐渐增加

盆底肌松弛





怀孕是一件值得全家人开心的大喜事，当然这期间也伴随着许多艰辛和不易；孕期准妈妈体内激素水平会发生显著变化，大脑中调节情绪的神经传递素会受到影响，使孕妈比往常更容易焦虑。

再加上准妈妈身体上发生的一系列变化，可能引起一些近乎病态的不适症状，比如：孕吐、尿频、抽筋、腰酸背痛、水肿等都会让孕妈心情变得糟糕起来。

内容大纲

01

什么是产后康复？

02


产后康复一到底是哪里康复呢？

03


产后常见疾病康复方法

LOREM / 产后常见疾病及康复方法

1. 产后子宫复旧不良
2. 产后乳汁不足及乳汁淤积
3. 产后尿潴留
4. 产后月子病
5. 产后盆底功能障碍性疾病
6. 产后腹直肌分离
7. 产后妊娠纹
8. 产后形体恢复
9. 骨盆前倾
10. 圆肩驼背
11. 产后心理



LOREM / 产后常见疾病及康复



LOREM / 乳汁分泌不足

1

喝下奶汤/喝中药


2

手法按摩

3

理疗：电刺激模拟婴儿吮吸

刺激乳房局部，模拟婴儿吮吸，反射性地促进产妇体内垂体泌乳素分泌增加，丘脑下部泌乳素抑制因子分泌减少，使乳汁分泌充足



乳房

LOREM / 乳汁排出不畅/淤积


1

手法按摩

2

理疗：电刺激增加通透性

通过电刺激产生的效果，可促进局部毛细血管扩张，增加血管通透性，加快血流速度，改善局部的血液循环，有利于乳汁的分泌和排出。




子宫

LOREM / 子宫复旧不良

拒绝产后42天检查

害怕妇科检查

恶露已尽，不需要查妇科



产后恶露不净有可能导致局部和全身感染，严重者可发生败血症。

恶露不净还易诱发晚期产后出血，甚至大出血休克，危及产妇的生命。

剖宫产所导致的产后恶露不净还容易引起切口感染裂开或愈合不良，甚至需要切除子宫。

子 宫



LOREM / 子宫复旧不良



缩宫素




中药




子宫复旧理疗

用于产妇骶尾部，促进盆肌肉收缩，筋膜张力增强，带动子宫韧带运动，消除盆腔淤血，减少产后出血，促进恶露排出，加速子宫复旧。



盆底

LOREM / 盆底功能障碍性疾病



盆底




LOREM / 盆底功能障碍性疾病

盆底功能评估：

产后42天进行，早期筛查，早期干预

盆底康复治疗：

盆底肌训练、生物反馈、电刺激、磁刺激、阴道哑铃



腰背部

LOREM / 有效治疗方式



腰背部

=====

LOREM / 有效治疗方式

药物治疗

口服止痛药物/局部药物注射

机理：缓解局部疼痛

针灸推拿

推拿：产后腰痛常用治疗手段。

机理：改善局部血液与淋巴循环，消除肌肉疲劳，松解痉挛的组织，改善关节活动范围。

腰背部

LOREM / 痛点揉法



患者俯卧位于治疗床，全身肌肉放松，对腰部肌肉揉按 5 分钟，进一步放松腰部肌肉。



在脊柱两侧仔细寻找压痛点并施力按压，力量以患者能忍受、不感到太痛苦为宜，按压约30-50次即可。



点揉后嘱咐患者下床做腰部活动，多数患者可感原有的腰痛症状减轻 70%-80%。

腰背部

LOREM / 中药熏蒸



中药汤剂：

调理气血、温经活血、祛风除湿、补益气血




中药热敷：

活血化瘀、舒筋通络、促进组织内血液循环，起到消炎、镇痛、缓解疼痛的目的。

LOREM / 电刺激+生物反馈


电刺激：

- 1.低频+高频 缓解局部疼痛
- 2.通过增强腹部肌肉力量缓解腰背部压力



生物反馈治疗：

逐渐放松长久以来处于疲劳的腰背部肌肉力量



疼痛

LOREM / 耻骨联合疼痛

首选剖宫产

影响产程进展

产后生活质量下降

增加产后抑郁症的发生

影响哺乳和母子间感情交流

热理疗

红外线灯照射，距离30~

50 cm，每次30 min，每

天2次；耻骨联合上敷以

50% 乙醇纱布

药物局部封闭治疗

利多卡因+地塞米松+糜蛋白酶

普鲁卡因+强的松+维生素B₁₂

作用：消肿止痛，改善淤血

低频电刺激

镇痛

放松肌肉

骨盆制动

促进软骨及韧带愈合

手法

“两夹一分开”

形体

LOREM / 圆肩驼背

通过圆肩驼背技术，不仅仅可以改善女性体态的问题，更能从螺旋连的角度，结合其他体态康复项目从根本上解决女性体态问题，帮助她们恢复健康和美丽。

一、振动治疗：(5分钟)

1.松解模式: 缓解肩背部压力

二、深度肌肉刺激治疗：(2分钟)

逐渐放松长久以来处于疲劳的肩背部肌肉力量

三、手法治疗(25分钟)

四、振动操作(6分钟)

肌肉激活训练



形体

LOREM /

骨盆

一、振动治疗：(5分钟)

1.松解模式: 缓解肩背部压力

二、深度肌肉刺激治疗：(2分钟)

逐渐放松长久以来处于疲劳的肩背部肌肉力量

三、手法治疗(25分钟)


1、牵拉松解背部肌肉

2、牵拉松解腹部肌肉(腹八推)


四、整脊床-骨盆调整(10分钟)

五、振动操作(6分钟)

1、全身肌肉激活训练



LOREM / 腹直肌分离



腹直肌分离发生是由于产后腹部肌肉松弛，腹壁紧张度下降，但又不能很快恢复到原有的位置和形态，多余的赘肉就会在腹部堆积突起。

LOREM / 腹直肌分离




LOREM / 腹直肌分离治疗—自主训练



仰卧：

抬腿，下巴微收，双手扶住右腿小腿上方，腰部紧贴垫子。然后吸气准备，呼气时右腿慢慢向远处蹬出，吸气不动，呼气慢慢把腿收回。也可换左腿交替进行。如此重复，每组6-8次，每次2-3组。


LOREM / 腹直肌分离治疗—自主训练



站立：

抬头、挺胸、提臀、收腹，后脑勺、背部、臀部紧贴墙面，双脚距离墙面30厘米左右，然后正常地吸气、呼气。如此重复，每组10-15次，每次2-3组。

LOREM / 腹直肌分离治疗-电刺激



电刺激治疗：

提高腹部肌肉的兴奋性，通过持续的被动收缩，唤醒因分娩而受损的腹部肌肉，达到改善腹直肌分离的目的。

形体

LOREM / 塑形



按摩和针灸

增加能量的消耗，促进体脂的动员及分解，从而达到减肥目的。



电刺激

促进新陈代谢，减少脂肪堆积，恢复腹部皮肤、肌肉、筋膜弹性和紧张度。



形体

LOREM / 塑形



运动

快步走、慢跑、脚踏车、运动平板、瑜伽和健美操等



饮食控制

高膳食纤维摄入有助于恢复体重。



形体

LOREM / 妊娠纹淡化

可可
油霜

苦杏仁油

橄榄油

抗妊娠
纹霜



形体

LOREM / 妊娠纹淡化



按摩



妊娠纹淡化



电刺激

通过刺激肌肉、毛细血管收缩，促进血液循环，增强新陈代谢。



LOREM / 病因

-  分娩：紧张、恐惧
-  心理：个性、角色不适应
-  内分泌：各激素急剧下降
-  社会：孕期负性时间
-  遗传：家族病史

1. 产后沮丧：

表现：情绪低落、易哭、易忘、失眠、焦虑

发病时间：产后3-4天出现、产后5-14天达峰

特点：发病早、持续短、症状轻


2. 产后抑郁

表现：失眠、缺乏兴趣、行为退缩、失去自理和照顾能力、自责心理、担心母子受伤害、重者自残举动

发病时间：产后2周，持续数周或一年

特点：发病晚、持续时间长、症状严重

心理疏导、缓解压力、团体心理生物反馈、产后运动训练等



总结

01

什么是产后康复?

02

产后康复一到底是哪里康复呢?

03

产后常见疾病及康复方法

A large red circle is centered on the slide, containing the text "Thank You". Surrounding this central circle are five smaller circles of varying sizes and shades of red and pink, scattered across the slide.

Thank
You