

低频电刺激联合人胎盘片治疗 刮宫术后子宫内膜薄 28 例临床观察

黄镇乐, 常瑞萍

(广州中医药大学附属医院/广东省深圳市中医院, 广东 深圳, 518000)

摘要 目的: 观察低频电刺激联合人胎盘片治疗刮宫术后子宫内膜薄的临床疗效。方法: 将 48 例子宫内膜薄患者随机分为 2 组。治疗组 28 例采用低频电刺激联合人胎盘片治疗, 对照组 20 例采用雌孕激素序贯治疗, 观察比较 2 组子宫内膜厚度及月经量变化。结果: 2 组月经量与子宫内膜厚度治疗前后组内比较, 差异均有统计学意义 ($P < 0.05$), 但治疗后组间比较, 差异无统计学意义 ($P > 0.05$)。结论: 低频电刺激配合人胎盘片治疗刮宫术后子宫内膜薄的效果与雌孕激素序贯疗法的效果相当。

关键词 刮宫术后子宫内膜薄; 电刺激; 人胎盘片; 雌孕激素

中图分类号 R271.913.2 **文献标识码** A **DOI**: 10.16808/j.cnki.issn1003-7705.2017.07.027

近年来, 随着药流失败清宫和人流率增加, 子宫内膜损伤、粘连等发病率逐年升高。由于多次人流刮宫手术造成子宫内膜损伤变薄。子宫内膜薄将会导致月经量少, 甚至闭经、不孕等。适宜的子宫内膜厚度是月经来潮和受精卵种植的必要条件, 因子宫内膜厚度是受精卵着床的关键条件之一, 也是子宫内膜容受性的关键因素之一, 如果卵泡成熟时子宫内膜厚度 $< 7.0\text{mm}$, 将影响受精卵着床及妊娠率^[1]。女性机体在一定的雌激素水平条件下, 彩超测量子宫内膜厚度不足 8mm 就称为子宫内膜薄^[2]。目前子宫内膜薄多采用单纯雌激素治疗、雌孕激素序贯疗法、中医药治疗等, 疗效均不满意。笔者采用低频电刺激联合人胎盘片治疗子宫内膜薄 28 例, 疗效较好, 现报告如下。

1 临床资料

48 例均为我院 2013 年 2 月至 2015 年 12 月就诊患者, 随机分为 2 组。所有患者的临床表现为月经量减少, 闭经, 继发不孕症; 病程 3 ~ 32 个月; 子宫内膜厚度 $3 \sim 7\text{mm}$; 刮宫术次数 $1 \sim 6$ 次; 连续观察 6 个排卵周期, 子宫内膜生长与卵泡不同步, HCG 日子宫内膜厚度 $< 8.0\text{mm}$; 排除雌激素水平低、孕激素水平不足和存在排卵障碍和缺乏生长激素等其他原因引起的子宫内膜薄。治疗组 28 例, 平均年龄 (26.2 ± 5.6) 岁。对照组 20 例, 平均年龄 (27.3 ± 5.3) 岁。2 组一般资料比较, 差异无统计学意义 ($P > 0.05$), 具有可比性。

2 治疗方法

2.1 治疗组 采用低频电刺激联合人胎盘片治疗。

于月经第 8 天进行仿生物电刺激治疗(法国 PHENIX USB 4), 患者取仰卧位, 无菌探头放入患者阴道内; 在盆腔中心位置贴放贴片状电极片 $50\text{mm} \times 50\text{mm}$, 从多个通道连接 PHENIX USB 4 神经肌肉刺激仪, 采用子宫内膜增厚方案刺激治疗, 刺激参数: 频率 40Hz , 脉宽 $250\mu\text{s}$, 电流强度据个体情况在 $10 \sim 50\text{mA}$ 之间。每天 2 次, 连续治疗 3d 后改隔天 1 次, 再做 2 次, 每次 $20 \sim 30\text{min}$ 。同时服用人胎盘片(北京顺鑫祥云药业有限责任公司生产), 每次 0.25g , 每天 2 次, 可服用至月经来潮。

2.2 对照组 给予雌孕激素序贯治疗。即月经第 5 天口补佳乐(拜耳医药保健有限公司广州分公司生产, 进口药品注册证号: 20130009, $1\text{mg}/\text{片}$), 每次 3mg , 每天 3 次, 口服, 连续 21d; 并于月经周期第 16 天开始口服黄体酮胶囊(浙江仙琚制药股份有限公司生产, 国药准字: H20041902, $50\text{mg}/\text{粒}$), 每次 100mg , 每天 2 次, 治疗 14d, 2 种药物同时停用 7d 后开始下 1 个周期治疗。

2 组均治疗 6 个月经周期。

3 疗效观察

3.1 观察指标 (1) 每月复诊, 记录彩超测量内膜厚度及月经量的变化; (2) 每个月经周期均采用彩超检测子宫内膜厚度以比较 2 组子宫内膜情况; (3) 根据效果确定下阶段治疗, 对子宫内膜厚度明显改善, 一部分要求生育者于排卵成熟时指导受孕。

3.2 统计学方法 采用 SPSS 17.0 统计学软件进行统计分析, 子宫内膜厚度测量结果采用 $(\bar{x} \pm s)$ 表示, 计数资料采用百分比表示, 2 组间比较采用 χ^2

第一作者: 黄镇乐, 男, 主治医师, 研究方向: 妇产科疾病的诊疗

检验,等级资料采用秩和检验。以 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

3.3 治疗结果 2组子宫内膜厚度及月经量治疗前后组内比较,差异有统计学意义;治疗后组间比较,差异均无统计学意义。(见表1)

表1 2组子宫内膜厚度及月经量比较($\bar{x} \pm s$)

组别	n	子宫内膜厚度(mm)		月经量(mL)	
		治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
治疗组	28	3.77 ± 0.98	6.51 ± 1.38 ^{ab}	13.31 ± 7.40	22.60 ± 9.41 ^{ab}
对照组	20	4.17 ± 1.24	5.75 ± 1.61 ^a	14.12 ± 8.20	18.57 ± 8.53 ^a

注:与本组治疗前比较,^a $P < 0.05$;与对照组治疗后比较,^b $P > 0.05$ 。

4 讨论

现今因各种原因需行清宫或人流手术,人流手术只伤及子宫内膜功能层,影响不大,通过机体自身月经周期中的雌孕激素撤退完成修复,反复刮宫很容易损伤子宫内膜基底层,导致子宫内膜表面上皮的重建发生困难,腺上皮不能再生,间质出现纤维化,玻璃样变或钙化,新生血管受损,内膜难以实现自我修复,缺乏内膜覆盖的子宫腔壁可发生纤维化甚至粘连,并影响细胞的生长、分裂^[3]和日后受精卵的着床,导致继发不孕和月经过少。对于女性出现子宫内膜变薄之后,临床治疗的目的是提高子宫内膜的厚度,常用的治疗刮宫术后子宫内膜薄的方法有放置宫内节育器,口服雌激素,雌孕激素序贯疗法等。戊酸雌二醇(补佳乐)具有天然雌激素成分,为天然雌二醇的戊酸盐,与人体内自身的雌激素结构相同,原料是谷固醇和胆固醇,主要来源于大豆。使子宫内膜修复,可刺激子宫内膜增生,促进子宫内膜生长^[4]。在临床中戊酸雌二醇的用量常可达到4~8mg/d^[5],但是雌激素作用部位不仅局限于子宫,对全身脏器也有一定的影响,大剂量的戊酸雌二醇会导致一些不良反应,如恶心、呕吐、头晕、乳房胀痛,甚至静脉血栓栓塞的风险升高^[6]。

本组通过采用法国 PHENIX USB 4 神经肌肉刺激系统刺激子宫血管平滑肌收缩和松弛,降低血管阻力;刺激改善盆腔微环境,增加子宫内膜血供,增加组织营养;刺激子宫内膜,加速组织修复和生理功能恢复,促进子宫内膜生长,增加子宫内膜厚度。而子宫内膜薄、宫腔粘连属于中医学“月经过少”“闭经”“不孕症”范畴,肾精亏虚,冲任血虚是主要病机。同时服用含少量雌激素的人胎盘片,通过丘

脑下部调节促性腺激素的分泌,促进卵泡发育和排卵;还能通过雌激素样作用或改善血清雌激素浓度或上调器官中雌激素受体数量等,促进卵巢功能,增加子宫内膜厚度,改善孕卵种植条件,同时激素能诱导一种特性蛋白质的信使RNA合成,这种诱导可致RNA蛋白质和磷脂的迅速合成。

本结果表明,采用仿生物电刺激同时配合服用人胎盘片治疗子宫内膜薄的效果与周期使用雌孕激素序贯疗法的效果无统计学差异,同时避免了由于服用雌激素引起的不良反应,并可以增强患者的性欲,是一种较好的治疗方法。

参考文献

- [1] 陈骞,孙海翔,胡娅莉,等. 子宫内膜厚度对体外受精-胚胎移植治疗结局的影响[J]. 生殖与避孕,2008,28(12):731.
- [2] 金丽萍,王蕊,梁竹巍,等. 278例不孕不育患者宫腔镜检查结果分析[J]. 中国妇幼保健,2008,23(29):4155-4157.
- [3] Jeng Q, Shen J, Huan SH. Related partial tmelectomy: aflew treatment choice for persistent or recurrent high glade M in -traeipithelial neoplasia[J]. Gynecol Oneol,2006,100(2):231.
- [4] 王艳华. 无痛技术在妇产科手术中的应用[J]. 中国实用妇科与产科杂志,2004,20(4):239.
- [5] 陈琨. 小剂量雌孕激素序贯疗法对修复子宫内膜的研究[J]. 贵阳医学院学报,2005,30(1):72-73.
- [6] 王海文,阮祥燕. 资癸女贞胶囊应用于子宫内膜薄性不育症的临床研究[J]. 首都医科大学学报,2014,35(2):248-252,733.

(收稿日期:2016-08-15)

消暑祛痱“三豆汤”

痱子是盛夏常见的皮肤病。中医学认为,痱子是由于暑热挟湿,蕴结肌肤,导致毛窍郁塞所致,防治痱子首先是要想办法祛除暑湿之毒。俗话说,常饮“三豆汤”,消暑祛痱保健康。3种豆子,即绿豆、赤豆、黑豆。将它们煮熬成汤,中医学称为“三豆汤”。方中绿豆性寒、味甘,具有清热解毒、消暑利尿的功效,是夏季防治中暑、热痱、疮痍的理想食物;赤小豆性平,味甘酸,能清热利水、散血消肿,对疮痍肿疖有较好的清解作用;黑豆性平味甘(生的性平,炒的性热,煮的性寒)有补脾益肾、祛湿利水、补血活血的功效。三豆合用,有清热解毒、健脾利湿之功,因而消暑祛痱有效果,是夏季防暑降温佳品。具体制法:用绿豆、赤豆、黑豆各10g,加水600mL,小火煎熬成300mL,连豆带汤喝下即可。(http://paper.entem.com.cn/html/content/2017-06/22/content_591262.htm)