




九星連珠 觀測法

朱咀

觀測九星連珠的方法，主要是用目視及攝影記錄，目視觀測可用普通的雙筒望遠鏡（例如 7×50 或 8×30）或天文望遠鏡，甚至可用肉眼測定各個行星的位置，估計它們的光度。每隔一段時間（如三天）觀察一次，將結果記在一份星圖（最好是六等或以上）便可。這些研究，都可以幫助了解這些行星的位置變化。

讀者亦可以用攝影方法記錄九星連珠的現象，用一部普通相機及一座腳架便可，菲林可試用四百度的高速菲林，用一百六十度或四百度的閃燈片也可，拍攝的地點要遠離城市燈光，距離調至無限遠，光圈較至最大，快門利用 B 檔，使用失打繩曝光十五至二十秒便可，若讀者知道如何沖晒菲林，那更加方便，可以使用強迫顯影方法，使曝光時間減至十至十五秒，在相片放大時便不會有星流跡出現。讀者也可以使用較慢速的菲林，曝光數分鐘甚至一兩小時，拍攝「星流跡」，利用一些樹木及建築物做前景，更可使到作品成為一幅藝術照片。如果讀者擁有天文望遠鏡，可用追蹤方法作較長時間曝光。因為是次九星連珠的分佈角度很大，用二十 mm 的廣角鏡也不能一次拍攝。用標準鏡頭可將行星的位置分成三四組拍攝。

九大行星的位置

一、水星—三月底，四月上旬水星接近太陽，不能觀測。四月下旬以後，水星

成為昏星，傍晚出現在西南天空，亮度約—1.0 等。六月廿六日西大距，西大距前後，水星成為晨星，日出前從東方升起，較易觀測。以後數月水星的高度較低，所以較難觀測。

二、金星—一月底至十月為晨星，四月距太陽 46°，星等—4.0 等，五、六、七、八月由雙魚座經金牛座雙子座到巨蟹座，亮度也逐漸變暗。十一月中旬以後，金星為昏星，至十二月，金星約在日落下約一小時後落入地平線。

三、火星—五、六、七月在太陽落山後前半夜在西南方天空，八、九月由室女座經天秤座到天蠍座，難於觀測。

四、木星—四月份晚七點出地平，以後升起時間逐漸提早，七月份日落不久，木星在正南方天空，前半夜一直可見，易於觀測。十一、十二月在大陽後面，看不到木星。

五、土星—四月至六月在日沒時，出現在東南天空，大半夜都可見到。七月至八月中旬，土星可見時間約四小時，九月份在西南方天空，約二小時即沒入地平線。九月以後在太陽另一面，較難觀測。

六、天王星、海王星和冥王星—它們距離比較遠，用肉眼很難直接看到。用雙筒或小型望遠鏡可以看到天王星和海王星。

五月十六日九大行星再次聚集於的扇形內，讀者可以把握時間，透過目視及攝影觀測，研究一下難得一見的「九星連珠」。

下期預告

學運：回顧與前瞻

醫學生專輯

Management & Labour Ideologies

訂購學苑

（為方便處理，請以英文填寫）

姓 名 _____

通訊地址 _____

訂閱期數 _____ 金額 \$ _____

本地訂戶：全年（9 期）HK \$25.00

每期 HK \$3.00

海外訂戶，另加郵費

支票抬頭請用「香港大學學生會」

