

♦ BỘ TÀI LIỆU CHUYÊN SÂU HSG & ĐGNL · 2025 – 2026

$$G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \quad \text{và} \quad E(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n!} x^n$$

HÀM SINH

GENERATING FUNCTIONS

TỔNG HỢP TRỌN BỘ 2 PHẦN TO LỚN

Phần I: Lý Thuyết & Bài Toán Cơ Bản / Phần II: 12 Lớp Bài Tập Đại Bác Nâng Cao

PHẦN I: LÝ THUYẾT & CƠ BẢN

PHẦN II: 12 LỚP BÀI NÂNG CAO

★ GV Nguyễn Văn Sang

SĐT: 0389.821.115 · Tổ Toán – Thực chiến HSG & ĐGNL

Mục Lục Trọn Bộ Chuyên Đề

Lý Thuyết Nền Tảng — Xây Dựng Từ Đầu	4
0.1 — Tiếp Cận Từ Các Bài Toán Đếm Phổ Thông (Bắt Đầu Từ Số Không)	4
0.2 — Ý Tưởng Ban Đầu: Tại Sao Cần Hàm Sinh?	6
0.3 — Định Nghĩa Hàm Sinh Thường (OGF)	7
0.4 — Nguyên Lý Convolution (Tích Chập)	7
0.4 — Bảng Hàm Sinh Thường Gặp (OGF)	8
0.5 — Quy Trình 4 Bước Giải Bài Toán Bằng Hàm Sinh	11
0.5B — Tám Góc Tư Duy Vạn Năng (Bản Phổ Thông Hóa)	11
0.6 — Kỹ Thuật Nâng Cao: Từ Smirnov & Hàm Sinh Phân Hoạch Chuỗi (Smirnov Words)	12
Dạng I — Stars and Bars: Nghiệm Nguyên Không Âm ★	14
1.1 — Lý Thuyết Vách Ngăn Trục Quan	14
1.2 — Các Bài Tập Ví Dụ Chi Tiết	15
1.2B — Nhóm Bài Đổi Bối Cảnh, Giữ Nguyên Khung Tư Duy	41
1.3 — Các Câu Hỏi Trắc Nghiệm Dạng I	46
Dạng II — Ràng Buộc Tính Chất Số Học (Chẵn, Lẻ, Bội Số) ⚡	49
2.1 — Cơ Chế Xử Lý Trục Quan Bằng Hàm Sinh	49
2.2 — Các Bài Tập Ví Dụ Chi Tiết	49
Dạng III — Bài Toán Đổi Tiền và Phân Hoạch Số 💰	61
3.1 — Lý Thuyết Phân Hoạch Số và Định Lý Euler	61
3.2 — Các Bài Tập Ví Dụ Chi Tiết	61
Dạng IV — Dãy Số, Hệ Thức Truy Hồi và Số Catalan 🔗	69
4.1 — Quy Trình Giải Truy Hồi Bằng Hàm Sinh	69
4.2 — Các Bài Tập Ví Dụ Chi Tiết	69
Dạng V — Tuyển Chọn Các Bài Toán Hay & Olympic 🚀	80
Dạng VI — Trắc Nghiệm Đúng/Sai Tổng Hợp 📝	101
Dạng VII — Lời Giải Chi Tiết Các Bài Tập Tự Luyện 🏆	104
Tổng Kết Chuyên Đề & Bí Quyết Học Tập	108
Khởi Động — Đọc Hàm Sinh Bằng Tiếng Việt	111
Bản Đồ Dạng Bài — Gặp Kiểu Nào Nghĩ Kiểu Đó	113
Dạng 1 — EGF: Đếm Chuỗi Có Ràng Buộc Trên Số Lần Xuất Hiện	114
Lý Thuyết	114
Bài Tập Minh Họa	115
Dạng 2 — Roots of Unity Filter: Lọc Tổng Chia Hết Cho m	118
Lý Thuyết	118
Bài Tập Minh Họa	119
Dạng 3 — EGF: Xếp Người Vào Phòng — Số Stirling & Số Bell	122
Lý Thuyết	122
Bài Tập Minh Họa	123
Dạng 4 — OGF: Chia Kẹo Euler Có Ràng Buộc Phức Tạp	125

Lý Thuyết	125
Bài Tập Minh Họa	125
Dạng 5 — Phân Hoạch Số Nguyên: Tích Vô Hạn Euler	129
Lý Thuyết	129
Bài Tập Minh Họa	130
Dạng 6 — Số Catalan & Phương Trình Hàm Sinh	132
Lý Thuyết	132
Bài Tập Minh Họa	133
Dạng 7 — Công Thức Cayley & Cây Có Nhân	135
Lý Thuyết	135
Bài Tập Minh Họa	136
Dạng 8 — Hàm Sinh Smirnov: Đếm Chuỗi Tránh Lặp Kề (Smirnov Words)	137
Lý Thuyết	137
Bài Tập Minh Họa	138
Dạng 9 — Lát Gạch & Hệ Thức Truy Hồi Liên Kết	141
Lý Thuyết	141
Bản Chất Tư Duy: Cách Thiết Lập Hệ Thức Truy Hồi & Giải Mã Hàm Sinh $\frac{1}{1-x-x^2}$	142
Bài Tập Minh Họa	144
Dạng 10 — Lưới Tọa Độ, Robot Di Chuyển & Số Delannoy, Số Schroeder	150
Lý Thuyết	150
Bài Tập Minh Họa	151
Dạng 11 — Bài Toán Bàn Tròn & Chọn Phần Tử Không Kề Nhau Trên Vòng Tròn	157
Lý Thuyết	157
Bài Tập Minh Họa	158
Dạng 12 — Bài Toán Tô Màu & Định Lý Đếm Pólya	164
Lý Thuyết	164
Bài Tập Minh Họa	165
Tổng Kết — Bảng Chọn Công Cụ Hàm Sinh	170

Lý Thuyết Nền Tảng — Xây Dựng Từ Đầu

0.1 — Tiếp Cận Từ Các Bài Toán Đếm Phổ Thông (Bắt Đầu Từ Số Không)

Để hiểu được bản chất của Hàm sinh mà không bị ngợp bởi các công thức toán học trừu tượng, chúng ta hãy bắt đầu từ hai bài toán đếm vô cùng quen thuộc ở chương trình phổ thông.

🌟 Ví dụ 1: Bài toán chọn táo và cam (Tổng số quả)

Đề bài: Có 3 quả táo giống nhau và 2 quả cam giống nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra một đĩa quả gồm đúng 3 quả (không phân biệt thứ tự)?

Cách giải phổ thông (Liệt kê): Ta gọi số táo chọn ra là x và số cam chọn ra là y ($x, y \geq 0$). Ta cần tìm số nghiệm nguyên của phương trình $x + y = 3$ với điều kiện $x \leq 3$ (chỉ có tối đa 3 quả táo) và $y \leq 2$ (chỉ có tối đa 2 quả cam). Các bộ nghiệm (x, y) hợp lệ là:

- $(3, 0)$: Chọn 3 táo, 0 cam.
- $(2, 1)$: Chọn 2 táo, 1 cam.
- $(1, 2)$: Chọn 1 táo, 2 cam.

(Không thể chọn $(0, 3)$ vì chỉ có tối đa 2 quả cam). Tổng cộng có **3 cách chọn**.

Cách giải bằng Đại số (Ý tưởng Hàm sinh): Ta gán cho việc chọn mỗi loại quả một đa thức đại diện, trong đó **số mũ** của biến x thể hiện số lượng quả được chọn:

- Đối với Táo (chỉ có thể chọn từ 0 đến 3 quả): ta gán đa thức:

$$A(x) = x^0 + x^1 + x^2 + x^3 = 1 + x^1 + x^2 + x^3$$

- Đối với Cam (chỉ có thể chọn từ 0 đến 2 quả): ta gán đa thức:

$$B(x) = x^0 + x^1 + x^2 = 1 + x^1 + x^2$$

Bây giờ, hãy thử làm một phép toán đại số đơn giản: **Nhân hai đa thức này lại với nhau:**

$$P(x) = A(x) \cdot B(x) = (1 + x^1 + x^2 + x^3)(1 + x^1 + x^2)$$

Khai triển phép nhân đa thức theo cách thủ công:


$$P(x) = 1(1 + x + x^2) + x(1 + x + x^2) + x^2(1 + x + x^2) + x^3(1 + x + x^2)$$

$$P(x) = 1 + 2x^1 + 3x^2 + 3x^3 + 2x^4 + x^5$$

Hãy quan sát kỹ kết quả khai triển của $P(x)$:

- Số mũ k của số hạng x^k biểu thị **tổng số quả** được chọn.
- Hệ số đứng trước x^k chính là **số cách** chọn ra đúng k quả!
- Với yêu cầu chọn đúng 3 quả, ta chỉ cần tìm hệ số của x^3 trong tích $P(x)$, hệ số này bằng **3** (tương ứng với số hạng $3x^3$).

Vì sao lại kỳ diệu như vậy? Vì khi nhân hai đa thức, số mũ của các số hạng được cộng lại: $x^a \cdot x^b = x^{a+b}$. Việc này đã tự động tìm tất cả các cặp số mũ (a, b) sao cho tổng $a + b = 3$ và cộng dồn các hệ số lại cho chúng ta!

💡 **Trực Quan Phép Nhân Tạo Hệ Số x^3 (Táo & Cam)****Tập chọn Táo:** $A(x)$ **Tập chọn Cam:** $B(x)$

Hệ tụ hệ số của x^3
 $(1 + 1 + 1)x^3 = 3x^3$

🌀 **Ví dụ 2: Bài toán gieo xúc xắc (Tổng số chấm)**

Đề bài: Gieo hai con xúc xắc 6 mặt cân đối và đồng chất. Có bao nhiêu cách để tổng số chấm trên hai mặt xuất hiện bằng 7?

Cách giải phổ thông: Ta liệt kê các cặp số chấm (i, j) của hai con xúc xắc sao cho $i + j = 7$ với $1 \leq i, j \leq 6$. Các cặp thỏa mãn là: $(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)$. Vậy có đúng **6 cách**.

Cách giải bằng Đại số: Mỗi con xúc xắc có 6 mặt từ 1 đến 6 chấm, ta gán cho mỗi con một đa thức hàm sinh biểu diễn các chấm khả dĩ:

$$S(x) = x^1 + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6$$

Khi gieo hai con xúc xắc độc lập, số cách tạo ra tổng số chấm bằng n chính là hệ số của x^n trong tích hai đa thức của chúng:


$$P(x) = S(x) \cdot S(x) = (x^1 + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6)^2$$

Để tìm hệ số của x^7 , ta tìm tất cả các cách ghép cặp số hạng x^i từ con thứ nhất và x^j từ con thứ hai sao cho $x^i \cdot x^j = x^{i+j} = x^7$, tức là $i + j = 7$. Vì mỗi số hạng từ x^1 đến x^6 đều có hệ số là 1, nên hệ số của x^7 trong tích là:

$$1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 6$$

Kết quả là **6 cách**, hoàn toàn trùng khớp với việc liệt kê bằng tay!

🌀 **Trực Quan Đại Số Hóa Phép Gieo Xúc Xắc**



💡 Triết lý cốt lõi của Hàm Sinh

Qua hai ví dụ trên, chúng ta rút ra một kết luận vô cùng quan trọng:

- Để giải bài toán đếm, thay vì đếm thủ công, ta **gán đối tượng cần chọn với một biến hình thức x** , số lượng đối tượng được chọn sẽ trở thành **số mũ của x** .
- Việc chọn các đối tượng độc lập và cộng số lượng của chúng lại tương đương với **phép nhân các đa thức** biểu diễn chúng.
- Phép nhân đa thức (Đại số) sẽ tự động làm thay công việc liệt kê và phân loại (Tổ hợp) cho chúng ta.

0.2 — Ý Tưởng Ban Đầu: Tại Sao Cần Hàm Sinh?


🤔 Vấn Đề Xuất Phát: Chia Kẹo Có Điều Kiện Phức Tạp

Bài toán cơ bản: Chia 10 viên kẹo giống nhau cho 3 học sinh. Số cách chia là số nghiệm nguyên không âm của $x_1 + x_2 + x_3 = 10$. Theo phương pháp vách ngăn (Stars and Bars), ta tìm ngay được kết quả là $C_{10+3-1}^{3-1} = C_{12}^2 = 66$ cách.

Nhưng nếu thêm điều kiện:

- Học sinh 1 chỉ nhận **số lẻ** viên kẹo ($x_1 \in \{1, 3, 5, \dots\}$).
- Học sinh 2 chỉ nhận **số chẵn** viên kẹo ($x_2 \in \{0, 2, 4, \dots\}$).
- Học sinh 3 chỉ nhận số kẹo là **bội của 3** ($x_3 \in \{0, 3, 6, \dots\}$).

Khi đó, phương pháp vách ngăn hay bù trừ tổ hợp thuần túy sẽ trở nên vô cùng rắc rối. Hàm sinh chính là công cụ đại số giúp tự động hóa và cơ học hóa toàn bộ quá trình đếm phức tạp này.



Phương trình đếm: $x_1 + x_2 + x_3 = 10$

Tương ứng phép nhân các chuỗi: $G(x) = (x^1 + x^3 + x^5 + \dots) \cdot (1 + x^2 + x^4 + \dots) \cdot (1 + x^3 + x^6 + \dots)$

0.3 — Định Nghĩa Hàm Sinh Thường (OGF)

Định Nghĩa — Hàm Sinh Thường (Ordinary Generating Function)

Cho một dãy số vô hạn $(a_n)_{n=0}^{+\infty} = (a_0, a_1, a_2, a_3, \dots)$. Ta định nghĩa một chuỗi lũy thừa hình thức $G(x)$ như sau:

$$G(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \dots$$

Chuỗi $G(x)$ được gọi là **hàm sinh thường** (OGF) của dãy số (a_n) .

Ký hiệu trích hệ số của x^n trong hàm sinh $G(x)$ là:

$$[x^n]G(x) = a_n$$

Ý nghĩa quan trọng: Trong toán học hình thức, x chỉ đóng vai trò là một “vật giữ chỗ” (placeholder) để phân tách các hệ số của dãy. Chúng ta không cần quan tâm đến tính hội tụ của chuỗi lũy thừa này, mà chỉ thực hiện các phép toán đại số trên đó để tìm hệ số mong muốn.

🌟 Ví Dụ Trực Quan — Xây dựng hàm sinh cho một lựa chọn đơn lẻ

Nếu một biến số x_i chỉ được phép nhận các giá trị trong tập hợp $S = \{1, 3, 5\}$, ta gán cho biến này một hàm sinh đại diện cho các khả năng chọn:

$$G_{i(x)} = \sum_{s \in S} x^s = x^1 + x^3 + x^5$$

Nếu biến số x_j nhận giá trị nguyên không âm tùy ý ($x_j \geq 0$), hàm sinh của nó là chuỗi hình thức vô hạn:

$$G_{j(x)} = 1 + x^1 + x^2 + x^3 + \dots = \frac{1}{1-x} \text{ (với } |x| < 1)$$

0.4 — Nguyên Lý Convolution (Tích Chập)

⚡ Nguyên Lý Tích — Cơ Sở Của Mọi Bài Toán Đếm

Giả sử ta cần đếm số nghiệm nguyên của phương trình:

$$x_1 + x_2 + \dots + x_k = n$$

trong đó mỗi biến x_i có điều kiện ràng buộc riêng biệt và độc lập, đại diện bởi tập giá trị cho phép S_i . Gọi $G_{i(x)} = \sum_{s \in S_i} x^s$ là hàm sinh của biến thứ i . Khi đó, số nghiệm của phương trình chính là hệ số của x^n trong tích các hàm sinh thành phần:

$$G(x) = G_1(x) \cdot G_2(x) \cdot \dots \cdot G_{k(x)}$$

Tức là số nghiệm bằng $[x^n]G(x)$.

Giải thích đại số: Khi nhân các đa thức hoặc chuỗi lũy thừa:


$$(a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots)(b_0 + b_1x + b_2x^2 + \dots) = a_0b_0 + (a_0b_1 + a_1b_0)x + (a_0b_2 + a_1b_1 + a_2b_0)x^2 + \dots$$

Hệ số của x^n trong tích là $\sum_{i+j=n} a_i b_j$. Đây chính xác là tổng số cách ghép cặp i và j sao cho tổng của chúng bằng n .

💡 Trục Quan Phép Nhân Tích Chập (Convolution)

Khi nhân hai chuỗi, các số hạng có số mũ cộng lại tạo ra số mũ n đích. Dưới đây là cách tạo ra số hạng chứa x^3 :

Chuỗi 1: $1 + x^1 + x^2 + x^3 + \dots$



Hệ số của x^3 ở tích
 $(1 \cdot 1 + 1 \cdot 1)x^3 = 2x^3$

Chuỗi 2: $x^1 + x^3 + x^5 + \dots$

0.4 — Bảng Hàm Sinh Thường Gặp (OGF)

🇮🇹 Bảng Công Thức Hàm Sinh Thường Dùng

Điều kiện của biến x_i	Hàm sinh thành phần $G_{i(x)}$	Khai triển chuỗi lũy thừa	Ý nghĩa
$x_i \geq 0$, tự do	$\frac{1}{1-x}$	$1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + \dots$	Nguyên không âm
$x_i \geq 1$, dương	$\frac{x}{1-x}$	$x + x^2 + x^3 + x^4 + \dots$	Nguyên dương
$0 \leq x_i \leq m$	$\frac{1-x^{m+1}}{1-x}$	$1 + x + x^2 + \dots + x^m$	Giới hạn trên
$x_i \geq r$	$\frac{x^r}{1-x}$	$x^r + x^{r+1} + x^{r+2} + \dots$	Chặn dưới bất kỳ
x_i chẵn ≥ 0	$\frac{1}{1-x^2}$	$1 + x^2 + x^4 + x^6 + \dots$	Các số chẵn
x_i lẻ ≥ 1	$\frac{x}{1-x^2}$	$x + x^3 + x^5 + x^7 + \dots$	Các số lẻ
x_i là bội của d	$\frac{1}{1-x^d}$	$1 + x^d + x^{2d} + x^{3d} + \dots$	Bội số của d

🔺 Công Thức Khai Triển Quan Trọng Nhất (Hệ Số Nhị Thức Âm)

Đây là “linh hồn” và công cụ đặc lực nhất để giải các bài toán vách ngăn bằng hàm sinh. Hãy cùng bóc tách nó từng bước bằng các kiến thức Toán phổ thông lớp 11 để thấy nó không hề xa lạ.

A. Xuất phát từ Cấp số nhân lùi vô hạn (Lớp 11): Trong chương trình Toán 11, ta đã biết công thức tính tổng của một cấp số nhân lùi vô hạn có số hạng đầu $u_1 = 1$ và công bội $q = x$ với $|x| < 1$:

$$S = u_1 + u_1q + u_1q^2 + \dots = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots$$

Theo công thức tổng cấp số nhân lùi vô hạn $S = \frac{u_1}{1-q}$, ta có ngay:

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots$$

Đây chính là hàm sinh cơ bản nhất!

B. Chứng minh các công thức bậc cao bằng Đạo hàm (Lớp 11): Làm thế nào để tìm khai triển cho $\frac{1}{(1-x)^2}$ hay $\frac{1}{(1-x)^3}$? Ta chỉ cần dùng đạo hàm lớp 11:

- **Với bậc hai ($k = 2$):** Đạo hàm hai vế của đẳng thức cấp số nhân:

$$\left(\frac{1}{1-x}\right)' = (1 + x + x^2 + x^3 + \dots)' \rightarrow \frac{1}{(1-x)^2} = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \dots = \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1)x^n$$

Ta nhận thấy hệ số của x^n là $n+1$, chính là tổ hợp $C_{n+1}^1 = C_{n+2-1}^{2-1}$.

- **Với bậc ba ($k = 3$):** Tiếp tục đạo hàm hai vế của đẳng thức vừa tìm được:

$$\left(\frac{1}{(1-x)^2}\right)' = (1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \dots)' \rightarrow \frac{2}{(1-x)^3} = 2 + 6x + 12x^2 + \dots = \sum_{n=1}^{+\infty} n(n+1)x^{n-1} = \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1)(n+2)x^n$$

Chia cả hai vế cho 2, ta thu được:

$$\frac{1}{(1-x)^3} = 1 + 3x + 6x^2 + 10x^3 + \dots = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(n+1)(n+2)}{2} x^n$$

Ta nhận thấy hệ số của x^n là $\frac{(n+2)(n+1)}{2}$, chính là tổ hợp $C_{n+2}^2 = C_{n+3-1}^{3-1}$.

C. Giải mã ký hiệu Trích hệ số $[x^n]$: Ký hiệu $[x^n]G(x)$ đơn giản là câu lệnh: “**Hãy tìm hệ số đứng trước lũy thừa x^n sau khi đã khai triển chuỗi $G(x)$** ”.

- **Ví dụ:** Nếu ta có đa thức $P(x) = 7 + 4x^2 + 9x^3$, thì:

- $[x^0]P(x) = 7$ (hệ số tự do).
- $[x^1]P(x) = 0$ (vì không có số hạng chứa x^1).
- $[x^2]P(x) = 4$, và $[x^3]P(x) = 9$.

D. Công thức tổng quát cho k bất kỳ: Quy nạp từ đạo hàm bậc cao (hoặc đối chiếu trực tiếp với bài toán chia kẹo cho k học sinh không điều kiện có số nghiệm là C_{n+k-1}^{k-1}), ta có công thức tổng quát với mọi số nguyên dương k :

$$\frac{1}{(1-x)^k} = \sum_{n=0}^{+\infty} C_{n+k-1}^{k-1} x^n$$

Do đó, hệ số trích xuất đại số tương ứng là:

$$[x^n] \frac{1}{(1-x)^k} = C_{n+k-1}^{k-1}$$

Mẹo nhớ nhanh hệ số:

$$[x^n] \frac{1}{(1-x)^k} = C_{n+k-1}^{k-1}$$

💡 **Mối Liên Hệ:** Tại sao bảng công thức đa dạng nhưng khi khai triển ta luôn dùng $\frac{1}{(1-x)^k}$?

Đây là một thách thức vô cùng tinh tế và là chìa khóa để hiểu phương pháp hàm sinh!

1. Bảng công thức là các "Viên gạch" thành phần: Mỗi công thức trong bảng (như $\frac{1}{1-x^2}$, $\frac{1}{1-x^d}$) biểu diễn điều kiện riêng biệt của **từng biến lẻ**. Ví dụ: biến x_1 chỉ nhận giá trị chẵn $\rightarrow$ hàm sinh thành phần là $\frac{1}{1-x^2}$.

2. Phép biến đổi đưa về dạng nhị thức âm cơ bản: Khi nhân các viên gạch này lại để tạo hàm sinh tổng $G(x)$, ta thường thu được các mẫu số có dạng $(1-x^d)^k$. Để khai triển các mẫu số này, ta **luôn luôn đưa về công thức nhị thức âm cơ bản** bằng phương pháp **đổi biến (thay thế biến)**:

- Ví dụ, với phân thức $\frac{1}{(1-x^2)^3}$, ta đặt biến phụ $u = x^2$. Phân thức trở thành dạng nhị thức âm cơ bản theo biến u : $\frac{1}{(1-u)^3}$.
- Áp dụng công thức nhị thức âm cho biến u :

$$\frac{1}{(1-u)^3} = \sum_{m=0}^{+\infty} C_{m+3-1}^{3-1} u^m = \sum_{m=0}^{+\infty} C_{m+2}^2 u^m$$

- Thay ngược lại $u = x^2$, ta có chuỗi khai triển theo biến x :

$$\frac{1}{(1-x^2)^3} = \sum_{m=0}^{+\infty} C_{m+2}^2 x^{2m}$$

Ta thấy chỉ số mũ của x tăng theo bước nhảy là 2 ($x^0, x^2, x^4, \dots$), nhưng hệ số đứng trước chúng vẫn tuân theo đúng quy luật của nhị thức âm!

Kết luận: Công thức $\frac{1}{(1-x)^k}$ chính là "**máy xay đại số duy nhất**" giúp ta trích xuất hệ số của mẫu số. Mọi mẫu số phức tạp dạng $(1-x^d)^k$ đều chỉ là phiên bản đổi biến $u = x^d$ của công thức này!

🔍 **Tìm hiểu sâu:** Tham số d trong biểu thức $1 - x^d$ nghĩa là gì?

Để hiểu được hàm sinh đại diện cho các điều kiện chẵn, lẻ hay bội số, ta cần hiểu rõ ý nghĩa của tham số d . Trong tổ hợp, d chính là "**bước nhảy**" (hoặc khoảng cách, mệnh giá) của các giá trị mà biến được phép nhận.

1. Cơ sở toán học: Nhớ lại công thức tổng cấp số nhân lùi vô hạn với số hạng đầu là 1 và công bội là x^d ($|x| < 1$):

$$1 + x^d + x^{2d} + x^{3d} + \dots = \sum_{m=0}^{+\infty} (x^d)^m = \frac{1}{1-x^d}$$

Như vậy, phân thức $\frac{1}{1-x^d}$ sinh ra một chuỗi mà các số mũ của x đều là bội số của d .

2. Các ví dụ áp dụng "mệnh" trong cuộc sống:

- **Ví dụ 1 (Đổi mệnh giá tiền xu):** Bạn muốn đổi tiền chỉ bằng các đồng xu mệnh giá 5 đồng. Số tiền bạn chọn từ loại xu này chỉ có thể là: 0đ, 5đ, 10đ, 15đ, ... (đều là bội của 5). Hàm sinh tương ứng sẽ là:

$$1 + x^5 + x^{10} + x^{15} + \dots = \frac{1}{1 - x^5} \text{ (ở đây } d = 5)$$

- **Ví dụ 2 (Chọn nhóm đồ vật):** Bạn mua các vỉ sữa, mỗi vỉ gồm đúng 4 hộp. Số lượng hộp sữa bạn có thể mua chỉ có thể là: 0, 4, 8, 12, ... hộp. Hàm sinh tương ứng là:

$$1 + x^4 + x^8 + x^{12} + \dots = \frac{1}{1 - x^4} \text{ (ở đây } d = 4)$$

- **Ví dụ 3 (Ràng buộc số lẻ):** Biến số x_i chỉ được phép nhận các giá trị lẻ 1, 3, 5, 7, ... Mỗi số lẻ kế tiếp cách nhau đúng 2 đơn vị (bước nhảy $d = 2$), và giá trị nhỏ nhất bắt đầu từ 1. Ta thiết lập chuỗi:

$$x^1 + x^3 + x^5 + x^7 + \dots = x(1 + x^2 + x^4 + x^6 + \dots) = \frac{x}{1 - x^2}$$

Ta thấy dưới mẫu vẫn là $1 - x^2$ (bước nhảy $d = 2$), còn tử số chứa nhân tử x^1 chính là giá trị nhỏ nhất được chọn.

0.5 — Quy Trình 4 Bước Giải Bài Toán Bằng Hàm Sinh

Quy Trình — Hàm Sinh

Để giải một bài toán đếm dạng: “Tìm số cách chọn/số nghiệm của $x_1 + x_2 + \dots + x_k = n$ thỏa mãn các điều kiện ràng buộc cụ thể”, ta tiến hành:

1. **Bước 1: Thiết lập hàm sinh thành phần.** Dựa vào điều kiện của từng biến x_i để viết hàm sinh $G_{i(x)}$ tương ứng từ bảng công thức.
2. **Bước 2: Xác định hàm sinh tổng.** Nhân tất cả các hàm sinh thành phần lại với nhau: $G(x) = G_1(x)G_2(x)\dots G_k(x)$.
3. **Bước 3: Đại số hóa & rút gọn.** Biến đổi biểu thức $G(x)$ về dạng phân thức rút gọn, thường sử dụng các khai triển nhị thức $(1 - x^a)^b$ kết hợp với nghịch đảo chuỗi $\frac{1}{(1 - x)^d}$.
4. **Bước 4: Trích hệ số $[x^n]G(x)$.** Đồng nhất hệ số và đưa ra đáp số bài toán.

0.5B — Tám Góc Tư Duy Vạn Năng (Bản Phổ Thông Hóa)

8 Góc Tư Duy: Đề Có Thể Đổi Bối Cảnh, Lỗi Toán Ít Khi Đổi

Góc	Khi đề thường xuất hiện	Công cụ nghĩ đến
1	Chia vật giống nhau, nghiệm nguyên không âm, mua đồ theo loại	Stars and Bars / OGF
2	Tổng chia hết cho m , chọn tập con theo modulo	Bộ lọc căn đơn vị
3	Xếp người vào phòng, chia nhóm, đếm toàn ánh	EGF + PIE + Stirling

Gốc	Khi đề thường xuất hiện	Công cụ nghĩ đến
4	Đổi tiền, chặn trên chặn dưới, nghiệm nguyên có ràng buộc	OGF
5	Phân hoạch số nguyên	Tích Euler
6	Ngoặc đúng, tam giác hóa, đường đi không vượt chéo	Catalan + phương trình hàm
7	Cây có nhãn, cây có rễ	Cayley + Lagrange
8	Chuỗi không lặp kề, ghế bàn tròn, cấu hình tránh sát nhau	Smirnov / khoảng cách / hàm sinh

 Cách Dùng Bảng Đây

Đừng học thuộc tên kỹ thuật trước. Hãy nhìn xem đề thuộc **gốc tư duy** nào trước. Khi nhận ra gốc, công thức thường chỉ còn là phần cơ khí.

0.6 — Kỹ Thuật Nâng Cao: Từ Smirnov & Hàm Sinh Phân Hoạch Chuỗi (Smirnov Words)

 Định Nghĩa & Hàm Sinh Smirnov

Trong lý thuyết tổ hợp đếm chuỗi (từ dựng bằng bảng chữ cái), một từ mà **không có hai chữ cái kề nhau nào giống nhau** được gọi là **từ Smirnov (Smirnov word)**.

Ví dụ: Chuỗi *DXDX* Den là từ Smirnov, nhưng *DDXD* Den thì không phải (vì có 2 chữ *D* đứng cạnh nhau).

Giả sử ta xét bảng chữ cái gồm *k* chữ cái khác nhau. Gọi *x_i* là biến hình thức đại diện cho chữ cái thứ *i*. Hàm sinh tổng quát cho các từ Smirnov bất kỳ được xác định bằng công thức vô cùng nổi tiếng:

$$\Phi(x_1, x_2, \dots, x_k) = \frac{1}{1 - \sum_{i=1}^k \frac{x_i}{1 + x_i}}$$

Đặc biệt, với trường hợp 3 loại chữ cái *x, y, z* (tương ứng với các màu Đỏ, Xanh, Đen), hàm sinh Smirnov là:

$$\Phi(x, y, z) = \frac{1}{1 - \left(\frac{x}{1 + x} + \frac{y}{1 + y} + \frac{z}{1 + z} \right)}$$

 Nguyên Lý Đổi Biến Cấu Trúc Khối (Block Substitution Rule)

Khi ta muốn đếm số lượng từ bất kỳ thỏa mãn các khối liên tiếp cùng loại (ví dụ: nhóm các viên bi cùng màu đứng cạnh nhau) có độ dài thuộc một tập hợp *S* cho trước, ta có thể xây dựng trực tiếp từ hàm sinh Smirnov bằng phép thế biến:

Mỗi biến đơn lẻ x_i trong hàm sinh Smirnov đại diện cho một khối cùng màu đứng liên tiếp. Nếu ta định nghĩa hàm sinh cho các độ dài khối là $f_{i(x_i)}$, ta chỉ cần thay thế trực tiếp:

$$x_i \rightarrow f_{i(x_i)}$$

khi đó hàm sinh tổng thể sẽ trở thành:

$$G(x_1, \dots, x_k) = \Phi(f_1(x_1), \dots, f_k(x_k)) = \frac{1}{1 - \sum_{i=1}^k \frac{f_{i(x_i)}}{1 + f_{i(x_i)}}}$$

Ví dụ minh họa:

1. Nếu độ dài khối có thể nhận mọi giá trị $L \geq 1$: Hàm sinh của khối là $f(x) = x +$

$x^2 + x^3 + \dots = \frac{x}{1-x}$. Thế vào ta có: $\frac{f(x)}{1+f(x)} = \frac{\frac{x}{1-x}}{1 + \frac{x}{1-x}} = x$. Hàm sinh trở thành: $G = \frac{1}{1 - (x_1 + x_2 + \dots + x_k)}$, chính là hàm sinh đếm số chuỗi bất kỳ không ràng buộc.

2. Nếu ta muốn kiểm soát số khối có độ dài bằng 2 (dùng biến đánh dấu t) và các khối khác đều có độ dài 1: Hàm sinh cho khối khi này chỉ gồm độ dài 1 (trọng số x) và độ dài 2 (trọng số tx^2): $f(x) = x + tx^2$. Thành phần tương ứng trong mẫu số sẽ là:

$$\frac{f(x)}{1+f(x)} = \frac{x + tx^2}{1 + x + tx^2}$$

Đây chính là cơ sở đại số cho phương pháp giải quyết các bài toán đếm sắp xếp có ràng buộc lẫn nhau cực kỳ phức tạp!

Dạng I — Stars and Bars: Nghiệm Nguyên Không Âm ★

1.1 — Lý Thuyết Vách Ngăn Trực Quan

🔗 Stars and Bars — Mô Hình Ngôi Sao và Vách Ngăn

Ý tưởng hình học: Để chia n vật giống nhau cho k người phân biệt (mỗi người nhận ≥ 0 vật), ta xếp n ngôi sao (★) và $k - 1$ vách ngăn (|) thành một hàng ngang.

Ví dụ với $n = 5$, $k = 3$ (chia 5 cái kẹo cho 3 người):

★ ★ | ★ | ★ ★ → Lượng kẹo nhận: $(x_1 = 2, x_2 = 1, x_3 = 2)$

★ | ★ ★ ★ | ★ → Lượng kẹo nhận: $(x_1 = 1, x_2 = 3, x_3 = 1)$

Tổng số phần tử trong hàng là $n + k - 1$. Số cách chọn $k - 1$ vị trí để đặt vách ngăn là:

$$N = C_{n+k-1}^{k-1}$$

🔗 Vách Ngăn Thật Ra Chính Là Gốc Hàm Sinh

Đây là chỗ rất quan trọng: **Stars and Bars không hề tách rời khỏi Hàm sinh**. Nó chính là một trường hợp cực cơ bản của hàm sinh.

Giả sử ta cần đếm số nghiệm nguyên không âm của:

$$x_1 + x_2 + \dots + x_k = n$$

Mỗi biến $x_i \geq 0$ có hàm sinh thành phần:

$$G_{i(x)} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots = \frac{1}{1-x}$$

Vì có k biến độc lập, hàm sinh tổng là:

$$G(x) = \left(\frac{1}{1-x} \right)^k = \frac{1}{(1-x)^k}$$

Số nghiệm cần tìm là hệ số của x^n :

$$[x^n]G(x) = [x^n] \frac{1}{(1-x)^k} = C_{n+k-1}^{k-1}$$

Đây chính là công thức vách ngăn. Nói ngắn gọn:

- **Vách ngăn** là cách nhìn bằng hình ảnh.
- **Hàm sinh** là cách nhìn bằng đại số.
- Hai cách nhìn cho ra cùng một đáp số vì thực chất chúng đang đếm cùng một cấu trúc.

🔗 Những Bài Toán Ẩn Sau Cùng Một Khung Vách Ngăn

Các đề sau bề ngoài rất khác nhau, nhưng nếu bóc lớp ngôn ngữ ra thì đều cùng gốc:

- Chia 12 viên kẹo giống nhau cho 4 bạn $\rightarrow x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 12$.
- Mua đúng 7 quyển vở từ 3 loại $\rightarrow x_1 + x_2 + x_3 = 7$.
- Lập kế hoạch 15 buổi học cho 4 môn $\rightarrow x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 15$.
- Đếm số nghiệm nguyên không âm của một phương trình tổng bằng $n \rightarrow$ vẫn là cùng khung.

Chỉ cần đổi tên biến x_i thành “số kẹo”, “số quyển vở”, “số buổi ôn”, “số bộ truyện”, ... thì bài toán đã khoác áo mới nhưng lõi tổ hợp không đổi.

Quy Trình — Hàm Sinh

Ba bước nhận dạng cực nhanh cho bài kiểu vách ngăn:

1. Có phải bài toán đang chia một tổng n vào nhiều ô / người / loại không?
2. Các biến có điều kiện dạng ≥ 0 , ≥ 1 , hoặc chặn trên chặn dưới không?
3. Nếu chỉ có tổng và các chặn đơn giản, bài đó gần như chắc chắn quy về hàm sinh của các phân thức kiểu $\frac{1}{1-x}$ hoặc $\frac{x^r}{1-x}$.

1.2 — Các Bài Tập Ví Dụ Chi Tiết

♦ Bài 1A ★ — Bài Toán Chọn Tập Vở Hai Loại (Siêu Dễ)

Câu 1. Một học sinh muốn chọn mua đúng 3 quyển vở từ 2 loại vở khác nhau: vở kẻ ngang và vở ô ly. Biết số lượng mỗi loại vở ở cửa hàng là không giới hạn. Hỏi học sinh đó có bao nhiêu cách chọn?

Đáp số: 4 cách

Lời giải.

Phương pháp giải

Đây là bài toán chọn phần tử có lặp, tương đương với việc tìm số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 = 3$, trong đó x_1, x_2 lần lượt là số vở kẻ ngang và vở ô ly được chọn.

Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Lập luận trực tiếp và liệt kê: Ta chỉ ra tất cả các cách chọn bộ số (x_1, x_2) có tổng bằng 3:

- Cách 1: (3, 0) (chọn 3 vở kẻ ngang, 0 vở ô ly).
- Cách 2: (2, 1) (chọn 2 vở kẻ ngang, 1 vở ô ly).
- Cách 3: (1, 2) (chọn 1 vở kẻ ngang, 2 vở ô ly).
- Cách 4: (0, 3) (chọn 0 vở kẻ ngang, 3 vở ô ly).

Sử dụng công thức chia kẹo (Stars and Bars) với $n = 3$ phần tử và $k = 2$ loại:

$$N = C_{3+2-1}^{2-1} = C_4^1 = 4 \text{ cách.}$$

Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh: Mỗi loại vở có thể được chọn với số lượng tùy ý từ 0 đến 3 quyển. Hàm sinh đại diện cho mỗi loại vở là:

$$G_1(x) = G_2(x) = 1 + x^1 + x^2 + x^3 + \dots = \frac{1}{1-x}$$

Hàm sinh cho tổng số vở chọn được từ cả hai loại là:

$$G(x) = G_1(x) \cdot G_2(x) = \left(\frac{1}{1-x}\right)^2 = \frac{1}{(1-x)^2}$$

Số cách chọn ra 3 quyển vở chính là hệ số của x^3 trong khai triển của $G(x)$:

$$[x^3]G(x) = [x^3] \sum_{n=0}^{+\infty} C_{n+2-1}^{2-1} x^n = C_{3+2-1}^{2-1} = C_4^1 = 4 \text{ cách.}$$

✓ Kết Luận

Có tất cả **4 cách** chọn tập vở.

♦ Bài 1B ★ — Phương Trình Nghiệm Nguyên Dương Cơ Bản (Dễ)

Câu 2. Tìm số nghiệm nguyên dương của phương trình: $x_1 + x_2 + x_3 = 5$.

Đáp số: **6 nghiệm**

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Vì nghiệm yêu cầu nguyên dương nên các biến $x_i \geq 1$. Ta có thể biến đổi biến số hoặc dùng hàm sinh có số mũ bắt đầu từ 1.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Sử dụng tổ hợp vách ngăn (Stars and Bars): Xếp 5 ngôi sao biểu thị giá trị 5 thành một hàng ngang. Giữa 5 ngôi sao có đúng $5 - 1 = 4$ khoảng trống. Để chia thành 3 phần dương, ta chọn đặt 2 vách ngăn vào 4 khoảng trống này. Số cách chọn là:

$$N = C_{5-1}^{3-1} = C_4^2 = 6 \text{ nghiệm.}$$

Các nghiệm cụ thể gồm: $(1, 1, 3)$, $(1, 2, 2)$, $(1, 3, 1)$, $(2, 1, 2)$, $(2, 2, 1)$, $(3, 1, 1)$.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh: Mỗi biến $x_i \geq 1$ có hàm sinh tương ứng là:

$$G_{i(x)} = x^1 + x^2 + x^3 + \dots = x(1 + x + x^2 + \dots) = \frac{x}{1-x}$$

Hàm sinh cho tổng $x_1 + x_2 + x_3$ của ba biến là:

$$G(x) = G_1(x)G_2(x)G_3(x) = \left(\frac{x}{1-x}\right)^3 = \frac{x^3}{(1-x)^3}$$

Số nghiệm chính là hệ số của x^5 trong khai triển $G(x)$:

$$[x^5]G(x) = [x^5]\frac{x^3}{(1-x)^3} = [x^2]\frac{1}{(1-x)^3}$$

Áp dụng công thức hệ số:

$$[x^2]\frac{1}{(1-x)^3} = C_{2+3-1}^{3-1} = C_4^2 = 6 \text{ nghiệm.}$$

✓ Kết Luận

Phương trình có đúng **6 nghiệm** nguyên dương.

♦ Bài 1 ★ — Bài Toán Chia Kẹo Không Điều Kiện (Dễ)

Câu 3. Có bao nhiêu cách chia 12 viên kẹo giống nhau cho 4 học sinh phân biệt, mỗi học sinh có thể nhận từ 0 viên kẹo trở lên?

Đáp số: $C_{15}^3 = 455$ cách

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán đếm số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 12$.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Sử dụng tổ hợp thuần túy (Stars and Bars): Mỗi cách chia tương đương với việc xếp 12 ngôi sao (kẹo) và 3 vách ngăn. Tổng số vị trí cần xếp là $12 + 4 - 1 = 15$ vị trí. Số cách chọn 3 vị trí để đặt vách ngăn là:

$$N = C_{15}^3 = \frac{15 \cdot 14 \cdot 13}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 455 \text{ cách.}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng phương pháp hàm sinh: Mỗi học sinh nhận số kẹo $x_i \geq 0$, hàm sinh tương ứng của mỗi học sinh là $G_i(x) = \frac{1}{1-x}$. Hàm sinh cho tổng số kẹo của 4 học sinh là:

$$G(x) = G_1(x)G_2(x)G_3(x)G_4(x) = \left(\frac{1}{1-x}\right)^4 = \frac{1}{(1-x)^4}$$

Hệ số của x^{12} trong khai triển $G(x)$ là:

$$[x^{12}]G(x) = [x^{12}] \frac{1}{(1-x)^4} = C_{12+4-1}^{4-1} = C_{15}^3 = 455 \text{ cách.}$$

✓ Kết Luận

Có tất cả **455 cách** chia kẹo.

♦ Bài 2 ★ — Mỗi Học Sinh Nhận Ít Nhất 1 Cái (Dễ)

Câu 4. Có bao nhiêu cách chia 12 viên kẹo giống nhau cho 4 học sinh sao cho mỗi học sinh nhận được ít nhất 1 viên kẹo?

Đáp số: $C_{11}^3 = 165$ cách

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Bài toán quy về tìm số nghiệm nguyên dương của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 12$ với $x_i \geq 1$.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Phương pháp đổi biến phụ: Đặt $y_i = x_i - 1$. Vì $x_i \geq 1$ nên $y_i \geq 0$. Thế vào phương trình ta được:

$$(y_1 + 1) + (y_2 + 1) + (y_3 + 1) + (y_4 + 1) = 12 \rightarrow y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 8$$

Số nghiệm nguyên không âm của phương trình mới là:

$$N = C_{8+4-1}^{4-1} = C_{11}^3 = 165 \text{ cách.}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng phương pháp hàm sinh: Vì mỗi học sinh nhận ít nhất 1 kẹo ($x_i \geq 1$), hàm sinh tương ứng là:

$$G_{i(x)} = x + x^2 + x^3 + \dots = x(1 + x + x^2 + \dots) = \frac{x}{1-x}$$

Hàm sinh tổng của 4 học sinh là:

$$G(x) = \left(\frac{x}{1-x} \right)^4 = \frac{x^4}{(1-x)^4}$$

Cần tìm hệ số của x^{12} trong $G(x)$:

$$[x^{12}]G(x) = [x^{12}] \frac{x^4}{(1-x)^4} = [x^8] \frac{1}{(1-x)^4} = C_{8+4-1}^{4-1} = C_{11}^3 = 165 \text{ cách.}$$

✓ Kết Luận

Có tất cả **165 cách** chia thỏa mãn.

♦ Bài 3 ★★ — Các Chặn Dưới Khác Nhau (Trung Bình)

Câu 5. Tìm số nghiệm nguyên của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 18$ thỏa mãn điều kiện chặn dưới khác nhau: $x_1 \geq 1, x_2 \geq 2, x_3 \geq 3, x_4 \geq 4$.

Đáp số: $C_{11}^3 = 165$ nghiệm

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Ràng buộc chặn dưới không đồng đều, ta thực hiện dịch chuyển điểm xuất phát cho các biến.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần T túy

Đặt biến phụ để đưa về dạng không âm: Đặt các biến phụ:

$$y_1 = x_1 - 1 \geq 0, y_2 = x_2 - 2 \geq 0, y_3 = x_3 - 3 \geq 0, y_4 = x_4 - 4 \geq 0$$

Thay vào phương trình ta được:

$$(y_1 + 1) + (y_2 + 2) + (y_3 + 3) + (y_4 + 4) = 18 \rightarrow y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 8$$

Số nghiệm nguyên không âm là:

$$N = C_{8+4-1}^{4-1} = C_{11}^3 = \frac{11 \cdot 10 \cdot 9}{6} = 165 \text{ nghiệm.}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng phương pháp hàm sinh: Hàm sinh tương ứng cho các biến là:

- Biến x_1 : $G_1(x) = x^1 + x^2 + \dots = \frac{x}{1-x}$
- Biến x_2 : $G_2(x) = x^2 + x^3 + \dots = \frac{x^2}{1-x}$
- Biến x_3 : $G_3(x) = x^3 + x^4 + \dots = \frac{x^3}{1-x}$
- Biến x_4 : $G_4(x) = x^4 + x^5 + \dots = \frac{x^4}{1-x}$

Hàm sinh tổng là:

$$G(x) = \frac{x}{1-x} \cdot \frac{x^2}{1-x} \cdot \frac{x^3}{1-x} \cdot \frac{x^4}{1-x} = \frac{x^{10}}{(1-x)^4}$$

Cần tìm hệ số của x^{18} trong $G(x)$:

$$[x^{18}]G(x) = [x^{18}] \frac{x^{10}}{(1-x)^4}$$

💡 Giải thích bước dịch chuyển số mũ (Shift Rule)

Tại sao ta có $[x^{18}] \frac{x^{10}}{(1-x)^4} = [x^8] \frac{1}{(1-x)^4}$?

- Hãy xem chuỗi cần tìm hệ số là $H(x) = \frac{1}{(1-x)^4} = h_0 + h_1x + h_2x^2 + \dots + h_nx^n + \dots$
- Khi ta nhân thêm nhân tử x^{10} vào trước, chuỗi mới trở thành:

$$x^{10}H(x) = h_0x^{10} + h_1x^{11} + h_2x^{12} + \dots + h_nx^{n+10} + \dots$$

- Lúc này, số hạng chứa x^{18} ở chuỗi mới ứng với số mũ: $n + 10 = 18 \rightarrow n = 8$.
- Hệ số của x^{18} trong chuỗi mới này chính là hệ số h_8 (tức hệ số đứng trước x^8 của chuỗi $H(x)$ ban đầu).
- Tổng quát hóa thành quy tắc dịch chuyển số mũ: $[x^n](x^m \cdot H(x)) = [x^{n-m}]H(x)$. Ta chỉ việc trừ bớt số mũ cần lấy đi m đơn vị.

Áp dụng quy tắc dịch chuyển số mũ trên, ta có:

$$[x^{18}] \frac{x^{10}}{(1-x)^4} = [x^{18-10}] \frac{1}{(1-x)^4} = [x^8] \frac{1}{(1-x)^4}$$

Áp dụng công thức nhị thức âm với $n = 8$ và $k = 4$:

$$[x^8] \frac{1}{(1-x)^4} = C_{8+4-1}^{4-1} = C_{11}^3 = 165 \text{ nghiệm.}$$

✅ Kết Luận

Phương trình có **165 nghiệm** thỏa mãn.

♦ Bài 4 ★★ — Điều Kiện Giới Hạn Trên (Bù Trừ)

Câu 6. Có bao nhiêu cách chia 10 viên kẹo giống nhau cho 3 học sinh sao cho mỗi học sinh nhận được không quá 5 viên kẹo?

Đáp số: 21 cách

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Bài toán đếm số nghiệm nguyên của $x_1 + x_2 + x_3 = 10$ với ràng buộc $0 \leq x_i \leq 5$. Ta cần loại bỏ các trường hợp có học sinh nhận ≥ 6 kẹo.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Sử dụng nguyên lý bù trừ (Inclusion-Exclusion):

- Gọi S là tập hợp tất cả các nghiệm nguyên không âm của phương trình:

$$|S| = C_{10+3-1}^{3-1} = C_{12}^2 = 66$$

- Gọi A_i là tính chất “học sinh i nhận được ít nhất 6 viên kẹo” ($x_i \geq 6$). Tính $|A_1|$ bằng cách đặt $y_1 = x_1 - 6 \geq 0$:

$$(y_1 + 6) + x_2 + x_3 = 10 \rightarrow y_1 + x_2 + x_3 = 4 \rightarrow |A_1| = C_{4+3-1}^{3-1} = C_6^2 = 15$$

Do vai trò đối xứng: $|A_1| = |A_2| = |A_3| = 15$.

- Xét sự giao nhau $|A_1 \cap A_2|$: hai học sinh nhận ≥ 6 kẹo. Khi đó tổng kẹo tối thiểu phải là $6 + 6 = 12 > 10$, điều này không thể xảy ra. Do đó $|A_i \cap A_j| = 0$ và $|A_1 \cap A_2 \cap A_3| = 0$.
- Theo nguyên lý bù trừ, số cách chia hợp lệ là:

$$N = |S| - (|A_1| + |A_2| + |A_3|) + (|A_1 \cap A_2| + |A_2 \cap A_3| + |A_3 \cap A_1|) = 66 - 3 \cdot 15 + 0 = 21 \text{ cách.}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng phương pháp hàm sinh: Mỗi học sinh nhận kẹo trong đoạn $[0, 5]$, nên hàm sinh thành phần là:

$$G_{i(x)} = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 = \frac{1 - x^6}{1 - x}$$

Hàm sinh tổng của 3 học sinh là:

$$G(x) = \left(\frac{1 - x^6}{1 - x} \right)^3 = \frac{(1 - x^6)^3}{(1 - x)^3} = (1 - 3x^6 + 3x^{12} - x^{18}) \frac{1}{(1 - x)^3}$$

Cần tìm hệ số của x^{10} trong khai triển của $G(x)$:

$$[x^{10}]G(x) = [x^{10}](1 - 3x^6 + 3x^{12} - x^{18}) \frac{1}{(1 - x)^3}$$

Ta phân tích hệ số bằng cách nhân phân phối:

$$[x^{10}]G(x) = 1 \cdot [x^{10}] \frac{1}{(1 - x)^3} - 3 \cdot [x^4] \frac{1}{(1 - x)^3}$$

Áp dụng công thức hệ số tổng quát:

$$[x^{10}] \frac{1}{(1 - x)^3} = C_{10+3-1}^{3-1} = C_{12}^2 = 66$$

$$[x^4] \frac{1}{(1 - x)^3} = C_{4+3-1}^{3-1} = C_6^2 = 15$$

Do đó: $N = 66 - 3 \cdot 15 = 21$ cách.

✓ Kết Luận

Có tất cả **21 cách** chia kẹo thỏa mãn yêu cầu.

♦ Bài 5 ★★★ — Giới Hạn Trên Không Đồng Điều (Khó - Mới)

Câu 7. Tìm số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 = 12$ thỏa mãn các giới hạn trên khác nhau: $x_1 \leq 4, x_2 \leq 5, x_3 \leq 6$.

Đáp số: 12 nghiệm

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Bài toán này có các giới hạn trên không đều nhau, việc dùng bù trừ sẽ cần tính toán cẩn thận từng tập vi phạm.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Sử dụng nguyên lý bù trừ:

- Số nghiệm không giới hạn: $|S| = C_{12+3-1}^{3-1} = C_{14}^2 = 91$.
- Tính vi phạm:
 - A_1 ($x_1 \geq 5$): đặt $y_1 = x_1 - 5 \geq 0 \rightarrow y_1 + x_2 + x_3 = 7 \rightarrow |A_1| = C_9^2 = 36$.
 - A_2 ($x_2 \geq 6$): đặt $y_2 = x_2 - 6 \geq 0 \rightarrow x_1 + y_2 + x_3 = 6 \rightarrow |A_2| = C_8^2 = 28$.
 - A_3 ($x_3 \geq 7$): đặt $y_3 = x_3 - 7 \geq 0 \rightarrow x_1 + x_2 + y_3 = 5 \rightarrow |A_3| = C_7^2 = 21$.
- Các giao của hai điều kiện vi phạm:
 - $|A_1 \cap A_2|$ ($x_1 \geq 5, x_2 \geq 6$): đặt biến phụ ta được $y_1 + y_2 + x_3 = 12 - 11 = 1 \rightarrow C_3^2 = 3$.
 - $|A_2 \cap A_3|$ ($x_2 \geq 6, x_3 \geq 7$): tổng tối thiểu $6 + 7 = 13 > 12 \rightarrow$ Không xảy ra, bằng 0.
 - $|A_3 \cap A_1|$ ($x_1 \geq 5, x_3 \geq 7$): tổng tối thiểu $5 + 7 = 12 \rightarrow$ Chỉ có đúng 1 nghiệm $(5, 0, 7) \rightarrow$ Bằng 1.
- Giao cả ba: bằng 0.
- Số nghiệm hợp lệ:

$$N = 91 - (36 + 28 + 21) + (3 + 0 + 1) - 0 = 91 - 85 + 4 = 10 \text{ nghiệm.}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng phương pháp hàm sinh: Hàm sinh của từng biến là:

$$G_1(x) = \frac{1-x^5}{1-x}, G_2(x) = \frac{1-x^6}{1-x}, G_3(x) = \frac{1-x^7}{1-x}$$

Hàm sinh tổng thể là:

$$G(x) = \frac{(1-x^5)(1-x^6)(1-x^7)}{(1-x)^3} = (1-x^5-x^6-x^7+x^{11}+x^{12}+x^{13}-x^{18}) \frac{1}{(1-x)^3}$$

Tìm hệ số của x^{12} trong $G(x)$:

$$[x^{12}]G(x) = [x^{12}] \frac{1}{(1-x)^3} - [x^7] \frac{1}{(1-x)^3} - [x^6] \frac{1}{(1-x)^3} - [x^5] \frac{1}{(1-x)^3} + [x^1] \frac{1}{(1-x)^3} + [x^0] \frac{1}{(1-x)^3}$$

Tính toán cụ thể từng hệ số:

$$C_{14}^2 - C_9^2 - C_8^2 - C_7^2 + C_3^2 + C_2^2 = 91 - 36 - 28 - 21 + 3 + 1 = 10 \text{ nghiệm.}$$

✓ Kết Luận

Số nghiệm thỏa mãn điều kiện chặn trên không đều là **10**.

♦ Bài 5 ★★★★★ — Chia Bút Chì Cho 4 Học Sinh Ràng Buộc Hỗn Hợp (Đỉnh Cao Vách Ngăn)

Câu 8. Có 15 chiếc bút chì giống nhau được chia cho 4 học sinh A, B, C, D. Hỏi có bao nhiêu cách chia nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

- Học sinh A nhận từ 2 đến 6 chiếc bút chì.
- Học sinh B nhận từ 1 đến 4 chiếc bút chì.
- Học sinh C nhận ít nhất 3 chiếc bút chì.
- Học sinh D nhận tùy ý không âm.

Đáp số: **130 cách**

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán chia kẹo/phần thưởng với các điều kiện ràng buộc độc lập chặn trên và chặn dưới khác nhau cho các học sinh. Bài toán này nếu giải theo tổ hợp thông thường sẽ phải dùng Nguyên lý bao hàm - loại trừ sau khi đã trừ đi các phần chặn dưới bắt buộc. Cách dùng hàm sinh sẽ tự động giải quyết các bước loại trừ này thông qua các phép toán đại số.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Sử dụng tổ hợp và Nguyên lý bao hàm - loại trừ (PIE): Gọi số bút chì chia cho A, B, C, D lần lượt là x_1, x_2, x_3, x_4 (nguyên không âm). Ta cần tìm số nghiệm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 15$ thỏa mãn:

- $2 \leq x_1 \leq 6$
- $1 \leq x_2 \leq 4$
- $x_3 \geq 3$
- $x_4 \geq 0$

Bước 1: Trừ đi các phần chặn dưới bắt buộc: Chia trước cho A 2 cái, B 1 cái, C 3 cái (tổng cộng $2 + 1 + 3 = 6$ cái). Đặt các biến mới là khoảng tăng thêm: $y_1 = x_1 - 2 \geq 0$, $y_2 = x_2 - 1 \geq 0$, $y_3 = x_3 - 3 \geq 0$, $y_4 = x_4 \geq 0$. Phương trình trở thành:

$$(y_1 + 2) + (y_2 + 1) + (y_3 + 3) + y_4 = 15 \rightarrow y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 9$$

Các điều kiện chặn trên của A và B chuyển thành:

- $x_1 \leq 6 \rightarrow y_1 + 2 \leq 6 \rightarrow y_1 \leq 4$
- $x_2 \leq 4 \rightarrow y_2 + 1 \leq 4 \rightarrow y_2 \leq 3$

Các biến khác chỉ cần không âm: $y_3 \geq 0, y_4 \geq 0$.

Bước 2: Sử dụng Nguyên lý bao hàm - loại trừ (PIE) để xử lý điều kiện chặn trên $y_1 \leq 4$ và $y_2 \leq 3$:

- Số nghiệm không điều kiện chặn trên của $y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 9$ (với $y_i \geq 0$) là:

$$S = C_{9+4-1}^{4-1} = C_{12}^3 = 220 \text{ cách.}$$

- Tập các nghiệm vi phạm điều kiện $y_1 \geq 5$ (đặt $z_1 = y_1 - 5 \geq 0 \rightarrow z_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 4$):

$$A = C_{4+4-1}^{4-1} = C_7^3 = 35 \text{ cách.}$$

- Tập các nghiệm vi phạm điều kiện $y_2 \geq 4$ (đặt $z_2 = y_2 - 4 \geq 0 \rightarrow y_1 + z_2 + y_3 + y_4 = 5$):

$$B = C_{5+4-1}^{4-1} = C_8^3 = 56 \text{ cách.}$$

- Tập các nghiệm đồng thời vi phạm cả hai điều kiện $y_1 \geq 5$ và $y_2 \geq 4$ (đặt $z_1 = y_1 - 5 \geq 0, z_2 = y_2 - 4 \geq 0 \rightarrow z_1 + z_2 + y_3 + y_4 = 0$):

$$A \cap B = C_{0+4-1}^{4-1} = C_3^3 = 1 \text{ cách.}$$

Theo nguyên lý bao hàm - loại trừ, số nghiệm thỏa mãn đồng thời các điều kiện là:

$$N = S - (A + B) + (A \cap B) = 220 - (35 + 56) + 1 = 130 \text{ cách.}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng phương pháp hàm sinh: Thiết lập hàm sinh thành phần cho cách nhận bút chì của từng học sinh:

- Học sinh A ($2 \leq x_1 \leq 6$):

$$G_{A(x)} = x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6 = x^2(1 + x + x^2 + x^3 + x^4) = x^2 \frac{1 - x^5}{1 - x}$$

- Học sinh B ($1 \leq x_2 \leq 4$):

$$G_{B(x)} = x^1 + x^2 + x^3 + x^4 = x(1 + x + x^2 + x^3) = x \frac{1 - x^4}{1 - x}$$

- Học sinh C ($x_3 \geq 3$):

$$G_{C(x)} = x^3 + x^4 + x^5 + \dots = \frac{x^3}{1 - x}$$

- Học sinh D ($x_4 \geq 0$):

$$G_{D(x)} = 1 + x + x^2 + \dots = \frac{1}{1 - x}$$

Hàm sinh tổng thể cho cách chia bút là tích các hàm sinh thành phần:

$$G(x) = G_{A(x)} \cdot G_{B(x)} \cdot G_{C(x)} \cdot G_{D(x)} = \left(x^2 \frac{1 - x^5}{1 - x} \right) \cdot \left(x \frac{1 - x^4}{1 - x} \right) \cdot \frac{x^3}{1 - x} \cdot \frac{1}{1 - x}$$

Rút gọn biểu thức $G(x)$:

$$G(x) = x^6(1 - x^4)(1 - x^5) \cdot \frac{1}{(1 - x)^4} = (x^6 - x^{10} - x^{11} + x^{15}) \cdot \frac{1}{(1 - x)^4}$$

Số cách chia bút chính là hệ số đứng trước x^{15} trong khai triển $G(x)$. Áp dụng quy tắc dịch chuyển số mũ (Shift Rule):

$$\begin{aligned}[x^{15}]G(x) &= [x^{15}] \left[(x^6 - x^{10} - x^{11} + x^{15}) \cdot \frac{1}{(1-x)^4} \right] \\ &= [x^9] \frac{1}{(1-x)^4} - [x^5] \frac{1}{(1-x)^4} - [x^4] \frac{1}{(1-x)^4} + [x^0] \frac{1}{(1-x)^4}\end{aligned}$$

Áp dụng công thức trích hệ số nhị thức âm $[x^n] \frac{1}{(1-x)^k} = C_{n+k-1}^{k-1}$:

- $[x^9] \frac{1}{(1-x)^4} = C_{9+4-1}^{4-1} = C_{12}^3 = 220$
- $[x^5] \frac{1}{(1-x)^4} = C_{5+4-1}^{4-1} = C_8^3 = 56$
- $[x^4] \frac{1}{(1-x)^4} = C_{4+4-1}^{4-1} = C_7^3 = 35$
- $[x^0] \frac{1}{(1-x)^4} = C_{0+4-1}^{4-1} = C_3^3 = 1$

Thay vào biểu thức ta có kết quả:

$$[x^{15}]G(x) = 220 - 56 - 35 + 1 = 130 \text{ cách.}$$

Hai cách giải cho ra cùng một đáp số chính xác là 130 cách, chứng minh sức mạnh của hàm sinh trong việc đại số hóa nguyên lý bao hàm loại trừ một cách cực kỳ mượt mà.

✓ Kết Luận

Có tất cả **130 cách** chia bút chì thỏa mãn.

Luyện Thêm Cùng Mẫu Với Bài 5

Bốn bài dưới đây giữ nguyên lõi của Bài 5: trước hết trừ phần tối thiểu bắt buộc để đưa bài toán về phương trình có nghiệm nguyên không âm, sau đó xử lý các chặn trên còn lại bằng Nguyên lý bao hàm - loại trừ hoặc bằng hàm sinh.

♦ Bài 5A ★★★★★ — Chia Nhãn Vở Với Hai Chặn Trên Sau Khi Tịnh Tiến

Câu 9. Có 16 nhãn vở giống nhau được chia cho 4 học sinh A, B, C, D. Hỏi có bao nhiêu cách chia nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

- Học sinh A nhận từ 1 đến 5 nhãn.
- Học sinh B nhận từ 2 đến 6 nhãn.
- Học sinh C nhận ít nhất 4 nhãn.
- Học sinh D nhận tùy ý không âm.

Đáp số: 150 cách

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Bài này có đúng cùng khung với Bài 5 gốc: sau khi trừ phần tối thiểu bắt buộc, chỉ còn lại hai chặn trên cần xử lý. Vì vậy cả PIE lẫn hàm sinh đều đi rất gọn.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Dùng Nguyên lý bao hàm - loại trừ sau khi trừ chặn dưới: Đặt x_1, x_2, x_3, x_4 lần lượt là số nhân của A, B, C, D. Ta có:

- $1 \leq x_1 \leq 5$
- $2 \leq x_2 \leq 6$
- $x_3 \geq 4$
- $x_4 \geq 0$

Trừ phần tối thiểu bắt buộc: đặt

$$y_1 = x_1 - 1, y_2 = x_2 - 2, y_3 = x_3 - 4, y_4 = x_4$$

thì $y_i \geq 0$ và:

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 16 - (1 + 2 + 4) = 9$$

Các chặn trên trở thành:

- $y_1 \leq 4$
- $y_2 \leq 4$

Gọi S là tập nghiệm không âm của $y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 9$. Khi đó:

$$|S| = C_{9+4-1}^{4-1} = C_{12}^3 = 220$$

Gọi A là tập nghiệm vi phạm $y_1 \leq 4$, tức $y_1 \geq 5$. Khi đặt $z_1 = y_1 - 5 \geq 0$, ta được:

$$z_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 4 \rightarrow |A| = C_7^3 = 35$$

Tương tự, với B là tập nghiệm vi phạm $y_2 \leq 4$, ta cũng có:

$$|B| = C_7^3 = 35$$

Giao $A \cap B$ đòi hỏi $y_1 \geq 5$ và $y_2 \geq 5$, khi đó tổng tối thiểu đã là $10 > 9$, nên không thể xảy ra.

Vậy số cách chia hợp lệ là:

$$N = |S| - |A| - |B| = 220 - 35 - 35 = 150 \text{ cách.}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Dùng hàm sinh: Hàm sinh của từng học sinh là:

- A ($1 \leq x_1 \leq 5$): $G_{A(x)} = x \frac{1 - x^5}{1 - x}$
- B ($2 \leq x_2 \leq 6$): $G_{B(x)} = x^2 \frac{1 - x^5}{1 - x}$
- C ($x_3 \geq 4$): $G_{C(x)} = \frac{x^4}{1 - x}$
- D ($x_4 \geq 0$): $G_{D(x)} = \frac{1}{1 - x}$

Do đó:

$$G(x) = x^7 \frac{(1-x^5)^2}{(1-x)^4} = (x^7 - 2x^{12} + x^{17}) \frac{1}{(1-x)^4}$$

Số cách cần tìm là hệ số của x^{16} :

$$[x^{16}]G(x) = [x^9] \frac{1}{(1-x)^4} - 2[x^4] \frac{1}{(1-x)^4}$$

vì hạng $[x^{-1}] \frac{1}{(1-x)^4}$ bằng 0.

Suy ra:

$$[x^{16}]G(x) = C_{12}^3 - 2C_7^3 = 220 - 70 = 150$$

✓ Kết Luận

Có tất cả **150 cách** chia nhân vở thỏa mãn.

♦ Bài 5B ★★★★★ — Phân Phiếu Thưởng Với Ba Chặn Trên Khác Nhau

Câu 10. Có 18 phiếu thưởng giống nhau được phân cho 4 tổ A, B, C, D. Hỏi có bao nhiêu cách phân nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

- Tổ A nhận từ 2 đến 7 phiếu.
- Tổ B nhận không quá 3 phiếu.
- Tổ C nhận ít nhất 1 phiếu.
- Tổ D nhận không quá 6 phiếu.

Đáp số: 168 cách

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Sau khi trừ phần tối thiểu bắt buộc, bài toán còn ba chặn trên khác nhau. Đây là đúng kiểu “ràng buộc hỗn hợp” rất nên luyện bằng cả hai con đường: PIE để thấy cấu trúc đếm và hàm sinh để thấy phép bù trừ được gói lại thành đại số.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Dùng Nguyên lý bao hàm - loại trừ: Gọi x_1, x_2, x_3, x_4 lần lượt là số phiếu của A, B, C, D. Điều kiện bài toán là:

- $2 \leq x_1 \leq 7$
- $0 \leq x_2 \leq 3$
- $x_3 \geq 1$
- $0 \leq x_4 \leq 6$

Trừ phần tối thiểu bắt buộc của A và C: đặt

$$y_1 = x_1 - 2, y_2 = x_2, y_3 = x_3 - 1, y_4 = x_4$$

thì:

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 18 - (2 + 1) = 15$$

với các chặn trên:

- $y_1 \leq 5$
- $y_2 \leq 3$
- $y_4 \leq 6$

Số nghiệm không điều kiện chặn trên là:

$$|S| = C_{15+4-1}^{4-1} = C_{18}^3 = 816$$

Gọi:

- A : vi phạm $y_1 \leq 5$, tức $y_1 \geq 6$. Khi đó $|A| = C_{12}^3 = 220$.
- B : vi phạm $y_2 \leq 3$, tức $y_2 \geq 4$. Khi đó $|B| = C_{14}^3 = 364$.
- D : vi phạm $y_4 \leq 6$, tức $y_4 \geq 7$. Khi đó $|D| = C_{11}^3 = 165$.

Các giao đôi:

- $|A \cap B| = C_8^3 = 56$
- $|A \cap D| = C_5^3 = 10$
- $|B \cap D| = C_7^3 = 35$

Giao cả ba đòi hỏi tổng tối thiểu là $6 + 4 + 7 = 17 > 15$, nên bằng 0.

Vậy:

$$N = 816 - (220 + 364 + 165) + (56 + 10 + 35) = 168$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Dùng hàm sinh: Các hàm sinh thành phần là:

- A ($2 \leq x_1 \leq 7$): $G_{A(x)} = x^2 \frac{1-x^6}{1-x}$
- B ($0 \leq x_2 \leq 3$): $G_{B(x)} = \frac{1-x^4}{1-x}$
- C ($x_3 \geq 1$): $G_{C(x)} = \frac{x}{1-x}$
- D ($0 \leq x_4 \leq 6$): $G_{D(x)} = \frac{1-x^7}{1-x}$

Suy ra:

$$G(x) = x^3 \frac{(1-x^6)(1-x^4)(1-x^7)}{(1-x)^4}$$

Khai triển phần tử số:

$$(1-x^6)(1-x^4)(1-x^7) = 1 - x^6 - x^4 - x^7 + x^{10} + x^{13} + x^{11} - x^{17}$$

nên:

$$[x^{18}]G(x) = [x^{15}] \frac{1}{(1-x)^4} - [x^9] \frac{1}{(1-x)^4} - [x^{11}] \frac{1}{(1-x)^4}$$

$$-[x^8]\frac{1}{(1-x)^4} + [x^5]\frac{1}{(1-x)^4} + [x^2]\frac{1}{(1-x)^4} + [x^4]\frac{1}{(1-x)^4}$$

Từ đó:

$$\begin{aligned}[x^{18}]G(x) &= C_{18}^3 - C_{12}^3 - C_{14}^3 - C_{11}^3 + C_8^3 + C_5^3 + C_7^3 \\ &= 816 - 220 - 364 - 165 + 56 + 10 + 35 = 168\end{aligned}$$

✓ Kết Luận

Có tất cả **168 cách** phân phối thưởng thỏa mãn.

♦ Bài 5C ★★★★★ — Chia Viên Bi Với Ba Mức Tối Thiểu Khác Nhau

Câu 11. Có 17 viên bi giống nhau được chia cho 4 bạn A, B, C, D. Hỏi có bao nhiêu cách chia nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

- Bạn A nhận từ 3 đến 6 viên bi.
- Bạn B nhận từ 1 đến 5 viên bi.
- Bạn C nhận từ 2 đến 4 viên bi.
- Bạn D nhận tùy ý không âm.

Đáp số: 60 cách

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Điểm đáng chú ý ở bài này là cả ba bạn A, B, C đều có chặn dưới khác nhau và cũng có chặn trên khác nhau. Vì vậy bước đổi biến ban đầu là mấu chốt để làm lộ ra phần bài toán thực sự cần đếm.

🔵 Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Dùng Nguyên lý bao hàm - loại trừ: Gọi x_1, x_2, x_3, x_4 lần lượt là số viên bi của A, B, C, D. Khi đó:

- $3 \leq x_1 \leq 6$
- $1 \leq x_2 \leq 5$
- $2 \leq x_3 \leq 4$
- $x_4 \geq 0$

Trừ phần tối thiểu bắt buộc bằng cách đặt:

$$y_1 = x_1 - 3, y_2 = x_2 - 1, y_3 = x_3 - 2, y_4 = x_4$$

ta được phương trình:

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 17 - (3 + 1 + 2) = 11$$

với các chặn trên:

- $y_1 \leq 3$
- $y_2 \leq 4$
- $y_3 \leq 2$

Tổng số nghiệm không âm không chặn trên là:

$$|S| = C_{11+4-1}^{4-1} = C_{14}^3 = 364$$

Các tập vi phạm là:

- $A: y_1 \geq 4$ nên $|A| = C_{10}^3 = 120$
- $B: y_2 \geq 5$ nên $|B| = C_9^3 = 84$
- $C: y_3 \geq 3$ nên $|C| = C_{11}^3 = 165$

Các giao đôi:

- $|A \cap B| = C_5^3 = 10$
- $|A \cap C| = C_7^3 = 35$
- $|B \cap C| = C_6^3 = 20$

Giao cả ba đòi hỏi $4 + 5 + 3 = 12 > 11$, nên bằng 0.

Vậy:

$$N = 364 - (120 + 84 + 165) + (10 + 35 + 20) = 60$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Dùng hàm sinh: Hàm sinh của từng bạn là:

- A ($3 \leq x_1 \leq 6$): $G_{A(x)} = x^3 \frac{1-x^4}{1-x}$
- B ($1 \leq x_2 \leq 5$): $G_{B(x)} = x \frac{1-x^5}{1-x}$
- C ($2 \leq x_3 \leq 4$): $G_{C(x)} = x^2 \frac{1-x^3}{1-x}$
- D ($x_4 \geq 0$): $G_{D(x)} = \frac{1}{1-x}$

Do đó:

$$G(x) = x^6 \frac{(1-x^4)(1-x^5)(1-x^3)}{(1-x)^4}$$

Khai triển tử số:

$$(1-x^4)(1-x^5)(1-x^3) = 1 - x^4 - x^5 - x^3 + x^9 + x^7 + x^8 - x^{12}$$

nên:

$$\begin{aligned} [x^{17}]G(x) &= [x^{11}] \frac{1}{(1-x)^4} - [x^7] \frac{1}{(1-x)^4} - [x^6] \frac{1}{(1-x)^4} \\ &\quad - [x^8] \frac{1}{(1-x)^4} + [x^2] \frac{1}{(1-x)^4} + [x^4] \frac{1}{(1-x)^4} + [x^3] \frac{1}{(1-x)^4} \end{aligned}$$

Suy ra:

$$[x^{17}]G(x) = C_{14}^3 - C_{10}^3 - C_9^3 - C_{11}^3 + C_5^3 + C_7^3 + C_6^3$$

$$= 364 - 120 - 84 - 165 + 10 + 35 + 20 = 60$$

✓ Kết Luận

Có tất cả **60 cách** chia viên bi thỏa mãn.

♦ Bài 5D ★★★★★ — Phân Thẻ Thưởng Khi Hai Nhóm Có Mức Sàn Cố Định

Câu 12. Có 14 thẻ thưởng giống nhau được phân cho 4 nhóm A, B, C, D. Hỏi có bao nhiêu cách phân nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

- Nhóm A nhận không quá 4 thẻ.
- Nhóm B nhận ít nhất 2 thẻ.
- Nhóm C nhận từ 1 đến 5 thẻ.
- Nhóm D nhận từ 3 đến 6 thẻ.

Đáp số: 90 cách

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Bài này khá hay ở chỗ sau khi trừ các mức sàn của B, C, D thì các giao vi phạm đôi đều tự triệt tiêu vì tổng tối thiểu đã vượt quá phần còn lại. Đây là dấu hiệu cho thấy bài toán sẽ rút gọn rất nhanh.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Dùng Nguyên lý bao hàm - loại trừ: Gọi x_1, x_2, x_3, x_4 là số thẻ của A, B, C, D. Ta có:

- $0 \leq x_1 \leq 4$
- $x_2 \geq 2$
- $1 \leq x_3 \leq 5$
- $3 \leq x_4 \leq 6$

Trừ phần tối thiểu bắt buộc của B, C, D bằng cách đặt:

$$y_1 = x_1, y_2 = x_2 - 2, y_3 = x_3 - 1, y_4 = x_4 - 3$$

thì:

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 14 - (2 + 1 + 3) = 8$$

và:

- $y_1 \leq 4$
- $y_3 \leq 4$
- $y_4 \leq 3$

Tổng số nghiệm không âm không chặn trên là:

$$|S| = C_{8+4-1}^{4-1} = C_{11}^3 = 165$$

Các tập vi phạm:

- $A: y_1 \geq 5$ nên $|A| = C_6^3 = 20$
- $C: y_3 \geq 5$ nên $|C| = C_6^3 = 20$
- $D: y_4 \geq 4$ nên $|D| = C_7^3 = 35$

Mọi giao đôi đều bằng 0 vì:

- $5 + 5 > 8$
- $5 + 4 > 8$
- $5 + 4 > 8$

Do đó:

$$N = 165 - (20 + 20 + 35) = 90$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Dùng hàm sinh: Các hàm sinh thành phần là:

- $A (0 \leq x_1 \leq 4): G_{A(x)} = \frac{1-x^5}{x^2(1-x)}$
- $B (x_2 \geq 2): G_{B(x)} = \frac{x^2}{1-x}$
- $C (1 \leq x_3 \leq 5): G_{C(x)} = x \frac{1-x^5}{1-x}$
- $D (3 \leq x_4 \leq 6): G_{D(x)} = x^3 \frac{1-x^4}{1-x}$

Suy ra:

$$G(x) = x^6 \frac{(1-x^5)^2(1-x^4)}{(1-x)^4}$$

Khai triển phân tử số:

$$(1-x^5)^2(1-x^4) = 1 - x^4 - 2x^5 + 2x^9 + x^{10} - x^{14}$$

Do đó:

$$[x^{14}]G(x) = [x^8] \frac{1}{(1-x)^4} - [x^4] \frac{1}{(1-x)^4} - 2[x^3] \frac{1}{(1-x)^4}$$

vì các hạng còn lại cho chỉ số âm nên đều bằng 0.

Suy ra:

$$[x^{14}]G(x) = C_{11}^3 - C_7^3 - 2C_6^3 = 165 - 35 - 40 = 90$$

✓ Kết Luận

Có tất cả **90 cách** phân thẻ thưởng thỏa mãn.

Cụm này cố ý đổi lớp vỏ sang bài toán đóng quà cho sự kiện. Nhưng lõi vẫn giữ nguyên: trừ phần tối thiểu trước, rồi xử lý các chặn trên còn lại bằng PIE hoặc bằng hàm sinh. Để bản in gọn hơn, lời giải dưới đây chỉ giữ lại đúng các bước và công thức cốt lõi.

♦ Bài 5E ★★★★★ — Đóng Sticker Cho 5 Túi Quà (4 Chặn Trên Đồng Thời)

Câu 13. Một ban tổ chức có 13 sticker sự kiện giống nhau để bỏ vào 5 túi quà A, B, C, D, E. Hỏi có bao nhiêu cách đóng nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

- Túi A nhận từ 1 đến 4 sticker.
- Túi B nhận từ 2 đến 6 sticker.
- Túi C nhận không quá 4 sticker.
- Túi D nhận từ 1 đến 5 sticker.
- Túi E nhận ít nhất 1 sticker.

Đáp số: 320 cách

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Sau khi trừ các mức tối thiểu bắt buộc, bài toán trở thành một phương trình 5 biến với 4 chặn trên; đặc biệt, mọi giao vi phạm đôi đều tự triệt tiêu.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

PIE gọn: Đặt $y_1 = x_1 - 1$, $y_2 = x_2 - 2$, $y_3 = x_3$, $y_4 = x_4 - 1$, $y_5 = x_5 - 1$. Khi đó:

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 = 8$$

với $y_1 \leq 3$, $y_2 \leq 4$, $y_3 \leq 4$, $y_4 \leq 4$.

Vậy:

$$\begin{aligned} N &= C_{8+5-1}^{5-1} - C_{4+5-1}^{5-1} - 3C_{3+5-1}^{5-1} \\ &= C_{12}^4 - C_8^4 - 3C_7^4 = 495 - 70 - 105 = 320 \end{aligned}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Hàm sinh gọn:

$$G(x) = x^5 \frac{(1-x^4)(1-x^5)^3}{(1-x)^5}$$

Chỉ các hạng 1, $-x^4$, $-3x^5$ góp vào hệ số x^{13} , nên:

$$[x^{13}]G(x) = [x^8] \frac{1}{(1-x)^5} - [x^4] \frac{1}{(1-x)^5} - 3[x^3] \frac{1}{(1-x)^5} = 320$$

✓ Kết Luận

Có tất cả **320 cách** đóng sticker thỏa mãn.

♦ Bài 5F ★★★★★ — Xếp Phiếu Đổi Quà Vào 5 Túi (Hai Giao Vi Phạm Còn Sống)

Câu 14. Một ban tổ chức có 15 phiếu đổi quà giống nhau để chia vào 5 túi quà A, B, C, D, E. Hỏi có bao nhiêu cách xếp nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

- Túi A nhận từ 1 đến 3 phiếu.
- Túi B nhận từ 2 đến 5 phiếu.
- Túi C nhận không quá 5 phiếu.
- Túi D nhận từ 1 đến 7 phiếu.
- Túi E nhận ít nhất 2 phiếu.

Đáp số: **345 cách**

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây vẫn là khung đổi biến quen thuộc, nhưng sau khi tịnh tiến sẽ còn đúng hai giao vi phạm cần giữ lại.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

PIE gọn: Đặt $y_1 = x_1 - 1$, $y_2 = x_2 - 2$, $y_3 = x_3$, $y_4 = x_4 - 1$, $y_5 = x_5 - 2$. Khi đó:

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 = 9$$

với $y_1 \leq 2$, $y_2 \leq 3$, $y_3 \leq 5$, $y_4 \leq 6$.

Vậy:

$$\begin{aligned} N &= C_{13}^4 - (C_{10}^4 + C_9^4 + C_7^4 + C_6^4) + (C_6^4 + C_4^4) \\ &= 715 - (210 + 126 + 35 + 15) + (15 + 1) = 345 \end{aligned}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Hàm sinh gọn:

$$G(x) = x^6 \frac{(1-x^3)(1-x^4)(1-x^6)(1-x^7)}{(1-x)^5}$$

Tới bậc cần dùng, tử số rút gọn thành $1 - x^3 - x^4 - x^6 + x^9$, nên:

$$[x^{15}]G(x) = [x^9] \frac{1}{(1-x)^5} - [x^6] \frac{1}{(1-x)^5} - [x^5] \frac{1}{(1-x)^5}$$

$$-[x^3]\frac{1}{(1-x)^5} + [x^0]\frac{1}{(1-x)^5} = 345$$

✓ Kết Luận

Có tất cả **345 cách** xếp phiếu đổi quà thỏa mãn.

♦ Bài 5G ★★★★★ — Chia Vòng Tay Lưu Niệm Cho 5 Túi (Xuất Hiện Giao Ba)

Câu 15. Một ban tổ chức có 16 vòng tay lưu niệm giống nhau để chia vào 5 túi quà A, B, C, D, E. Hỏi có bao nhiêu cách chia nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

- Túi A nhận từ 1 đến 3 vòng tay.
- Túi B nhận từ 2 đến 4 vòng tay.
- Túi C nhận từ 1 đến 4 vòng tay.
- Túi D nhận không quá 7 vòng tay.
- Túi E nhận ít nhất 2 vòng tay.

Đáp số: **255 cách**

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Bài này khó hơn ở chỗ ba chặn trên đầu tiên còn tương tác tới cả mức giao ba, nên nếu đổi biến không chuẩn thì rất dễ thiếu mất một hạng bù trừ.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

PIE gọn: Đặt $y_1 = x_1 - 1$, $y_2 = x_2 - 2$, $y_3 = x_3 - 1$, $y_4 = x_4$, $y_5 = x_5 - 2$. Khi đó:

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 = 10$$

với $y_1 \leq 2$, $y_2 \leq 2$, $y_3 \leq 3$, $y_4 \leq 7$.

Do đó:

$$\begin{aligned} N &= C_{14}^4 - (2C_{11}^4 + C_{10}^4 + C_6^4) + (C_8^4 + 2C_7^4) - C_4^4 \\ &= 1001 - (660 + 210 + 15) + (70 + 70) - 1 = 255 \end{aligned}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Hàm sinh gọn:

$$G(x) = x^6 \frac{(1-x^3)^2(1-x^4)(1-x^8)}{(1-x)^5}$$

Tới bậc 10, tử số cho:

$$1 - 2x^3 - x^4 + x^6 + 2x^7 - x^8 - x^{10}$$

nên:

$$[x^{17}]G(x) = C_{14}^4 - 2C_{11}^4 - C_{10}^4 + C_8^4 + 2C_7^4 - C_6^4 - C_4^4 = 255$$

✓ Kết Luận

Có tất cả **255 cách** chia vòng tay lưu niệm thỏa mãn.

♦ Bài 5H ★★★★★ — Phân Thẻ May Mắn Vào 5 Túi (Khóa Cả 5 Túi)

Câu 16. Một ban tổ chức có 14 thẻ may mắn giống nhau để chia vào 5 túi quà A, B, C, D, E. Hỏi có bao nhiêu cách phân nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

- Túi A nhận từ 1 đến 3 thẻ.
- Túi B nhận từ 2 đến 4 thẻ.
- Túi C nhận từ 1 đến 6 thẻ.
- Túi D nhận không quá 5 thẻ.
- Túi E nhận từ 2 đến 7 thẻ.

Đáp số: 213 cách

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài cuối của cụm: cả 5 túi đều bị khóa bởi chặn dưới hoặc chặn trên. Nhưng sau khi đổi biến, chỉ còn đúng một giao đôi sống sót, nên lời giải vẫn nén được rất gọn.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

PIE gọn: Đặt $y_1 = x_1 - 1$, $y_2 = x_2 - 2$, $y_3 = x_3 - 1$, $y_4 = x_4$, $y_5 = x_5 - 2$. Khi đó:

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 = 8$$

với $y_1 \leq 2$, $y_2 \leq 2$, $y_3 \leq 5$, $y_4 \leq 5$, $y_5 \leq 5$.

Suy ra:

$$\begin{aligned} N &= C_{12}^4 - (2C_9^4 + 3C_6^4) + C_6^4 \\ &= 495 - (252 + 45) + 15 = 213 \end{aligned}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Hàm sinh gọn:

$$G(x) = x^6 \frac{(1-x^3)^2(1-x^6)^3}{(1-x)^5}$$

Tới bậc 8, tử số chỉ cần giữ:

$$1 - 2x^3 - 2x^6$$

nên:

$$[x^{14}]G(x) = C_{12}^4 - 2C_9^4 - 2C_6^4 = 495 - 252 - 30 = 213$$

✓ Kết Luận

Có tất cả **213 cách** phân thẻ may mắn thỏa mãn.

Ghi Nhớ Nhanh — Nhận Diện Mẫu ‘Trừ Sàn Rồi Xử Lý Trần’ Theo Nhóm

Để nhìn cụm bài này đỡ rối, có thể chia thành mấy nhóm nhận diện rất rõ:

- **Nhóm 1: Sau khi trừ sàn, chỉ còn ít chặn trên.** Lúc này PIE ngắn và hàm sinh cũng chỉ cần vài hạng đầu của tử số.
- **Nhóm 2: Cả 5 biến đều bị chặn, nhưng mới dừng ở giao đôi.** Dấu hiệu là các vi phạm đôi còn xuất hiện, còn giao ba trở lên đã bằng 0.
- **Nhóm 3: Giao ba hoặc giao bốn xuất hiện.** Đây là mốc khó thật sự. Khi đó nên gom các giao “cùng kiểu” lại theo số lượng và cùng công thức, thay vì liệt kê từng giao một cách rời rạc.

Khung làm chung vẫn luôn là:

- Bước 1: trừ phần tối thiểu bắt buộc.
- Bước 2: đổi về phương trình $y_1 + y_2 + \dots + y_k = M$ với $y_i \geq 0$.
- Bước 3: đọc các chặn trên mới của y_i rồi quyết định bài đang nằm ở nhóm nào.

Nhóm 5I-5J — Cả 5 Biến Đầu Bị Chặn, Tăng Dần Từ Giao Đôi Sang Giao Ba

Hai bài đầu của cụm mới cố ý giữ đủ 5 biến đầu bị chặn, nhưng mức tương tác tăng dần rất rõ: Bài 5I mới dừng ở giao đôi, còn Bài 5J bắt đầu xuất hiện giao ba.

♦ Bài 5I ★★★★★ — Chia Vé Check-in Cho 5 Túi Quà (Mức Giao Đôi)

Câu 17. Một ban tổ chức có 14 vé check-in giống nhau để chia vào 5 túi quà A, B, C, D, E. Hỏi có bao nhiêu cách chia nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

- Túi A nhận từ 1 đến 3 vé.
- Túi B nhận từ 2 đến 4 vé.
- Túi C nhận từ 1 đến 3 vé.
- Túi D nhận không quá 5 vé.
- Túi E nhận từ 2 đến 7 vé.

Đáp số: 132 cách

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài “đầu cầu” của cụm khó hơn: cả 5 biến đều bị chặn, nhưng sau khi đổi biến thì chỉ còn giao đôi, chưa xuất hiện giao ba.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

PIE gọn: Đặt $y_1 = x_1 - 1$, $y_2 = x_2 - 2$, $y_3 = x_3 - 1$, $y_4 = x_4$, $y_5 = x_5 - 2$. Khi đó:

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 = 8$$

với $y_1 \leq 2$, $y_2 \leq 2$, $y_3 \leq 2$, $y_4 \leq 5$, $y_5 \leq 5$.

Suy ra:

$$\begin{aligned} N &= C_{12}^4 - (3C_9^4 + 2C_6^4) + 3C_6^4 \\ &= C_{12}^4 - 3C_9^4 + C_6^4 = 495 - 378 + 15 = 132 \end{aligned}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Hàm sinh gọn:

$$G(x) = x^6 \frac{(1-x^3)^3 (1-x^6)^2}{(1-x)^5}$$

Tới bậc cần dùng, tử số chỉ cần giữ:

$$1 - 3x^3 + x^6$$

nên:

$$[x^{14}]G(x) = C_{12}^4 - 3C_9^4 + C_6^4 = 132$$

✅ Kết Luận

Có tất cả **132 cách** chia vé check-in thỏa mãn.

♦ Bài 5J ★★★★★ — Chia Thẻ Ưu Tiên Cho 5 Túi Quà (Bắt Đầu Có Giao Ba)

Câu 18. Một ban tổ chức có 14 thẻ ưu tiên giống nhau để chia vào 5 túi quà A, B, C, D, E. Hỏi có bao nhiêu cách chia nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

- Túi A nhận từ 1 đến 3 thẻ.
- Túi B nhận từ 1 đến 3 thẻ.
- Túi C nhận từ 2 đến 4 thẻ.
- Túi D nhận từ 1 đến 4 thẻ.
- Túi E nhận không quá 6 thẻ.

Đáp số: 93 cách

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Khác với 5I, bài này sau khi trừ sàn không dừng ở giao đôi nữa: một giao ba bắt đầu xuất hiện, nên nếu không nhìn theo nhóm thì rất dễ bỏ sót.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

PIE gọn: Đặt $y_1 = x_1 - 1$, $y_2 = x_2 - 1$, $y_3 = x_3 - 2$, $y_4 = x_4 - 1$, $y_5 = x_5$. Khi đó:

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 = 9$$

với $y_1 \leq 2$, $y_2 \leq 2$, $y_3 \leq 2$, $y_4 \leq 3$, $y_5 \leq 6$.

Suy ra:

$$\begin{aligned} N &= C_{13}^4 - (3C_{10}^4 + C_9^4 + C_6^4) + (3C_7^4 + 3C_6^4) - C_4^4 \\ &= 715 - (630 + 126 + 15) + (105 + 45) - 1 = 93 \end{aligned}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Hàm sinh gọn:

$$G(x) = x^5 \frac{(1-x^3)^3(1-x^4)(1-x^7)}{(1-x)^5}$$

Tới bậc 9, tử số cho:

$$1 - 3x^3 - x^4 + 3x^6 + 2x^7 - x^9$$

nên:

$$[x^{14}]G(x) = C_{13}^4 - 3C_{10}^4 - C_9^4 + 3C_7^4 + 2C_6^4 - C_4^4 = 93$$

✅ Kết Luận

Có tất cả **93 cách** chia thẻ ưu tiên thỏa mãn.

Nhóm 5K-5L — Giao Bậc Cao, Phải Gom Theo Kiểu Vi Phạm

Hai bài cuối của cụm mới là phần khó hơn thật sự. Ở đây giao ba dày hơn, rồi tới giao bốn xuất hiện. Cách nhìn hiệu quả nhất là không tách từng giao riêng lẻ, mà gom theo mẫu đối xứng và cùng công thức.

♦ Bài 5K ★★★★★ — Chia Huy Hiệu VIP Cho 5 Túi Quà (Giao Ba Dày Hơn)

Câu 19. Một ban tổ chức có 16 huy hiệu VIP giống nhau để chia vào 5 túi quà A, B, C, D, E. Hỏi có bao nhiêu cách chia nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

- Túi A nhận từ 1 đến 3 huy hiệu.

- Túi B nhận từ 2 đến 4 huy hiệu.
- Túi C nhận từ 1 đến 4 huy hiệu.
- Túi D nhận không quá 3 huy hiệu.
- Túi E nhận từ 2 đến 8 huy hiệu.

Đáp số: 111 cách

Lời giải.

Phương pháp giải

Bài này tăng thêm một nấc: nhiều giao đôi còn sống hơn, và đồng thời xuất hiện hai giao ba khác kiểu. Nếu liệt kê rồi từng giao sẽ rất dễ rối.

Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

PIE gọn: Đặt $y_1 = x_1 - 1$, $y_2 = x_2 - 2$, $y_3 = x_3 - 1$, $y_4 = x_4$, $y_5 = x_5 - 2$. Khi đó:

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 = 10$$

với $y_1 \leq 2$, $y_2 \leq 2$, $y_3 \leq 3$, $y_4 \leq 3$, $y_5 \leq 6$.

Gom theo kiểu giao, ta được:

$$\begin{aligned} N &= C_{14}^4 - (2C_{11}^4 + 2C_{10}^4 + C_7^4) + (C_8^4 + 4C_7^4 + C_6^4 + 2C_4^4) - 2C_4^4 \\ &= C_{14}^4 - 2C_{11}^4 - 2C_{10}^4 + C_8^4 + 3C_7^4 + C_6^4 = 111 \end{aligned}$$

Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Hàm sinh gọn:

$$G(x) = x^6 \frac{(1-x^3)^2(1-x^4)^2(1-x^7)}{(1-x)^5}$$

Tới bậc 10, tử số rút gọn thành:

$$1 - 2x^3 - 2x^4 + x^6 + 3x^7 + x^8$$

nên:

$$[x^{16}]G(x) = C_{14}^4 - 2C_{11}^4 - 2C_{10}^4 + C_8^4 + 3C_7^4 + C_6^4 = 111$$

Kết Luận

Có tất cả **111 cách** chia huy hiệu VIP thỏa mãn.

♦ Bài 5L ★★★★★ — Chia Thẻ Bốc Thăm Cho 5 Túi Quà (Xuất Hiện Giao Bốn)

Câu 20. Một ban tổ chức có 17 thẻ bốc thăm giống nhau để chia vào 5 túi quà A, B, C, D, E. Hỏi có bao nhiêu cách chia nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

- Mỗi túi đều nhận ít nhất 1 thẻ.
- Bốn túi A, B, C, D mỗi túi nhận không quá 3 thẻ.
- Túi E nhận không quá 8 thẻ.

Đáp số: **31 cách**

Lời giải.

Phương pháp giải

Đây là bài chốt của cụm: sau bước trừ sàn, giao bốn thật sự xuất hiện. Tuy vậy bài vẫn còn đẹp vì có đối xứng rất mạnh giữa bốn túi đầu.

Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

PIE gọn: Đặt $y_i = x_i - 1$ với mọi $i = 1, 2, 3, 4, 5$. Khi đó:

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 = 12$$

với $y_1, y_2, y_3, y_4 \leq 2$ và $y_5 \leq 7$.

Nhờ tính đối xứng, ta gom được ngay:

$$\begin{aligned} N &= C_{16}^4 - (4C_{13}^4 + C_8^4) + (6C_{10}^4 + 4C_5^4) - 4C_7^4 + C_4^4 \\ &= 1820 - (2860 + 70) + (1260 + 20) - 140 + 1 = 31 \end{aligned}$$

Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Hàm sinh gọn:

$$G(x) = x^5 \frac{(1-x^3)^4(1-x^8)}{(1-x)^5}$$

Tới bậc 12, tử số cho:

$$1 - 4x^3 + 6x^6 - x^8 - 4x^9 + 4x^{11} + x^{12}$$

nên:

$$[x^{17}]G(x) = C_{16}^4 - 4C_{13}^4 + 6C_{10}^4 - C_8^4 - 4C_7^4 + 4C_5^4 + C_4^4 = 31$$

Kết Luận

Có tất cả **31 cách** chia thẻ bốc thăm thỏa mãn.

1.2B — Nhóm Bài Đối Bối Cảnh, Giữ Nguyên Khung Tư Duy

Gốc Tư Duy Của Cả Cụm Bài Sau

Các bài dưới đây cố ý đổi bối cảnh: huy hiệu, phiếu thưởng, buổi ôn, tủ sách. Nhưng nếu bóc lớp vỏ ngôn ngữ ra, chúng vẫn chỉ là mấy khung rất quen:

- $x_1 + x_2 + \dots + x_k = n$ với $x_i \geq 0$,
- hoặc $x_i \geq 1$,
- hoặc có chặn dưới khác nhau,
- hoặc có thêm chặn trên để xử lý bằng bù trừ / hàm sinh.

Nói ngắn gọn: **đề có thể đổi bối cảnh, nhưng lõi tổ hợp vẫn giữ nguyên.**

♦ Bài 6A ★ — Chọn Huy Hiệu Ba Màu (Đổi Bối Cảnh, Giữ Khung)

Câu 21. Một cửa hàng lưu niệm muốn đóng đúng 7 chiếc huy hiệu từ 3 màu: đỏ, xanh, vàng. Biết số lượng mỗi màu là không giới hạn. Hỏi có bao nhiêu cách chọn?

Đáp số: 36 cách

Lời giải.

Phương pháp giải

Nếu bỏ lớp vỏ “huy hiệu” đi, bài toán chỉ còn là tìm số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 = 7$.

Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Stars and Bars trực tiếp: Ta cần chia 7 vật giống nhau cho 3 loại màu phân biệt. Số cách là:

$$N = C_{7+3-1}^{3-1} = C_9^2 = 36 \text{ cách.}$$

Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh: Mỗi màu có thể được chọn 0, 1, 2, ... chiếc, nên hàm sinh thành phần là:

$$G_1(x) = G_2(x) = G_3(x) = \frac{1}{1-x}$$

Hàm sinh tổng là:

$$G(x) = \frac{1}{(1-x)^3}$$

Số cách chọn đúng 7 chiếc là hệ số của x^7 :

$$[x^7]G(x) = [x^7]\frac{1}{(1-x)^3} = C_{7+3-1}^{3-1} = C_9^2 = 36$$

Kết Luận

Có tất cả **36 cách** chọn huy hiệu.

♦ Bài 6B ★ — Phát Phiếu Thưởng Mỗi Tổ Ít Nhất Một Tờ

Câu 22. Có 11 phiếu thưởng giống nhau được phát cho 4 tổ học tập, sao cho tổ nào cũng nhận được ít nhất 1 phiếu. Hỏi có bao nhiêu cách phát?

Đáp số: 120 cách

Lời giải.

 Phương pháp giải

Đây là bài toán nghiệm nguyên dương: $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 11$ với $x_i \geq 1$.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Đổi biến về dạng không âm: Đặt $y_i = x_i - 1 \geq 0$. Khi đó:

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 11 - 4 = 7$$

Số cách là:

$$N = C_{7+4-1}^{4-1} = C_{10}^3 = 120 \text{ cách.}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh: Vì mỗi tổ nhận ít nhất 1 phiếu nên hàm sinh thành phần là:

$$G_{i(x)} = x + x^2 + x^3 + \dots = \frac{x}{1-x}$$

Hàm sinh tổng là:

$$G(x) = \left(\frac{x}{1-x} \right)^4 = \frac{x^4}{(1-x)^4}$$

Cần lấy hệ số của x^{11} :

$$[x^{11}]G(x) = [x^7] \frac{1}{(1-x)^4} = C_{7+4-1}^{4-1} = C_{10}^3 = 120$$

 Kết Luận

Có tất cả **120 cách** phát phiếu thưởng.

♦ Bài 6C ★★ — Phân Bỏ Buổi Ôn Tập Với Mức Tối Thiểu Khác Nhau

Câu 23. Một học sinh có 15 buổi tự học và muốn phân cho 4 môn: Toán, Văn, Anh, Lý. Biết rằng Toán cần ít nhất 2 buổi, Văn ít nhất 1 buổi, Anh ít nhất 3 buổi, còn Lý tùy ý không âm. Hỏi có bao nhiêu kế hoạch phân bổ?

Đáp số: 220 kế hoạch

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây vẫn là cùng một khung: tìm số nghiệm nguyên của phương trình tổng bằng 15, chỉ khác là các chặn dưới không giống nhau.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Địch chuyển chặn dưới: Gọi số buổi cho Toán, Văn, Anh, Lý lần lượt là x_1, x_2, x_3, x_4 . Ta có:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 15, \quad x_1 \geq 2, x_2 \geq 1, x_3 \geq 3, x_4 \geq 0$$

Đặt:

$$y_1 = x_1 - 2, \quad y_2 = x_2 - 1, \quad y_3 = x_3 - 3, \quad y_4 = x_4$$

Khi đó $y_i \geq 0$ và:

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 15 - (2 + 1 + 3) = 9$$

Số kế hoạch là:

$$N = C_{9+4-1}^{4-1} = C_{12}^3 = 220$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh: Hàm sinh thành phần của các môn là:

$$G_1(x) = \frac{x^2}{1-x}, \quad G_2(x) = \frac{x}{1-x}, \quad G_3(x) = \frac{x^3}{1-x}, \quad G_4(x) = \frac{1}{1-x}$$

Hàm sinh tổng là:

$$G(x) = \frac{x^6}{(1-x)^4}$$

Số kế hoạch là hệ số của x^{15} :

$$[x^{15}]G(x) = [x^9] \frac{1}{(1-x)^4} = C_{9+4-1}^{4-1} = C_{12}^3 = 220$$

✅ Kết Luận

Có tất cả **220** kế hoạch phân bổ thời gian.

♦ Bài 6D ★ — Xếp Sách Vào Tủ Với Giới Hạn Trên

Câu 24. Một thư viện có 8 bộ truyện giống nhau cần xếp vào 4 ngăn tủ phân biệt. Mỗi ngăn không được chứa quá 3 bộ. Hỏi có bao nhiêu cách xếp?

Đáp số: 31 cách

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán có chặn trên. Khung tư duy không đổi: đếm tất cả trước, rồi loại các cách vi phạm điều kiện “không quá 3”.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Dùng bù trừ: Gọi x_i là số bộ truyện ở ngăn thứ i . Ta cần đếm nghiệm của:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 8, \quad 0 \leq x_i \leq 3$$

- Bỏ chặn trên, số nghiệm không âm là:

$$|S| = C_{8+4-1}^{4-1} = C_{11}^3 = 165$$

- Gọi A_i là biến cố “ngăn i có ít nhất 4 bộ”. Khi đó với mỗi i :

$$|A_i| = C_{4+4-1}^{4-1} = C_7^3 = 35$$

- Với hai ngăn cùng vi phạm, ví dụ $A_1 \cap A_2$, ta có tối thiểu $4 + 4 = 8$ bộ, nên chỉ còn đúng 1 cách:

$$|A_i \cap A_j| = 1$$

Có $C_4^2 = 6$ cặp như vậy.

- Giao của ba biến cố là không thể, vì cần ít nhất 12 bộ.

Do đó:

$$N = 165 - 4 \times 35 + 6 \times 1 = 165 - 140 + 6 = 31$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh: Mỗi ngăn nhận từ 0 đến 3 bộ, nên hàm sinh thành phần là:

$$G_{i(x)} = 1 + x + x^2 + x^3 = \frac{1 - x^4}{1 - x}$$

Hàm sinh tổng là:

$$G(x) = \left(\frac{1 - x^4}{1 - x} \right)^4 = \frac{(1 - x^4)^4}{(1 - x)^4}$$

Khai triển phần tử số:

$$(1 - x^4)^4 = 1 - 4x^4 + 6x^8 - 4x^{12} + x^{16}$$

Nên hệ số của x^8 là:

$$\begin{aligned} [x^8]G(x) &= [x^8] \frac{1}{(1-x)^4} - 4[x^4] \frac{1}{(1-x)^4} + 6[x^0] \frac{1}{(1-x)^4} \\ &= C_{11}^3 - 4C_7^3 + 6C_3^3 = 165 - 140 + 6 = 31 \end{aligned}$$

✓ Kết Luận

Có tất cả **31 cách** xếp sách vào tủ.

1.3 — Các Câu Hỏi Trắc Nghiệm Dạng I

Câu 25. Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x + y + z = 9$ là:

- A. 45 B. 55 C. 66 D. 78

Lời giải.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Tủy

Sử dụng tổ hợp và vách ngăn trực tiếp: Tìm số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x + y + z = 9$ tương đương với việc chia 9 chiếc kẹo giống nhau cho 3 học sinh không kèm theo bất kỳ điều kiện nào khác. Theo phương pháp vách ngăn, ta cần đặt 2 vách ngăn vào giữa các chiếc kẹo để tạo thành 3 phần. Tổng số vị trí của kẹo và vách ngăn là $9 + (3 - 1) = 11$ vị trí. Số cách chọn 2 vị trí để đặt vách ngăn là:

$$C_{11}^2 = \frac{11 \cdot 10}{2} = 55 \text{ cách.}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng phương pháp hàm sinh:

- Thiết lập hàm sinh thành phần cho các biến x, y, z . Vì các biến nhận giá trị không âm tùy ý ($x, y, z \geq 0$), hàm sinh thành phần của từng biến là:

$$G_{x(t)} = G_{y(t)} = G_{z(t)} = 1 + t + t^2 + t^3 + \dots = \frac{1}{1-t}$$

- Hàm sinh tổng cho phương trình là tích các hàm sinh thành phần:

$$G(t) = G_{x(t)} \cdot G_{y(t)} \cdot G_{z(t)} = \left(\frac{1}{1-t} \right)^3 = \frac{1}{(1-t)^3}$$

- Số nghiệm của phương trình chính là hệ số đứng trước số hạng t^9 trong khai triển $G(t)$. Áp dụng công thức trích hệ số nhị thức âm $[t^n] \frac{1}{(1-t)^k} = C_{n+k-1}^{k-1}$ với $n = 9, k = 3$:

$$[t^9]G(t) = [t^9] \frac{1}{(1-t)^3} = C_{9+3-1}^{3-1} = C_{11}^2 = 55 \text{ nghiệm.}$$

✓ Kết Luận

Đáp án đúng là **55**.

Câu 26. Có bao nhiêu cách chia 8 cái bút chì giống nhau cho 5 em nhỏ sao cho mỗi em nhỏ nhận được ít nhất 1 cái bút?

A. $C_{12}^4 = 495$

B. C_{12}^3

C. $C_7^4 = 35$

D. C_8^4

Lời giải.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Sử dụng tổ hợp (Vách ngăn có điều kiện): Gọi số bút chì chia cho 5 em nhỏ lần lượt là x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 ($x_i \geq 1$ nguyên). Ta cần tìm số nghiệm nguyên dương của phương trình:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 8$$

Đặt $y_i = x_i - 1 \geq 0$, phương trình trở thành:

$$(y_1 + 1) + (y_2 + 1) + \dots + (y_5 + 1) = 8 \rightarrow y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 = 3$$

Số nghiệm nguyên không âm của phương trình mới là:

$$C_{3+5-1}^{5-1} = C_7^4 = 35 \text{ cách.}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng phương pháp hàm sinh:

- Vì mỗi học sinh nhận được ít nhất 1 chiếc bút ($x_i \geq 1$), hàm sinh thành phần cho từng học sinh là:

$$G_{i(t)} = t + t^2 + t^3 + \dots = t(1 + t + t^2 + \dots) = \frac{t}{1-t}$$

- Hàm sinh tổng cho cách chia bút cho 5 em nhỏ là:

$$G(t) = \left(\frac{t}{1-t} \right)^5 = \frac{t^5}{(1-t)^5}$$

- Ta cần tìm hệ số đứng trước t^8 trong khai triển $G(t)$. Áp dụng quy tắc dịch chuyển số mũ (Shift Rule):

$$[t^8]G(t) = [t^8] \frac{t^5}{(1-t)^5} = [t^3] \frac{1}{(1-t)^5}$$

Áp dụng công thức trích hệ số nhị thức âm với $n = 3, k = 5$:

$$[t^3] \frac{1}{(1-t)^5} = C_{3+5-1}^{5-1} = C_7^4 = 35 \text{ cách.}$$

✓ Kết Luận

Đáp án đúng là $C_7^4 = 35$.

Câu 27. Hệ số của x^7 trong khai triển chuỗi lũy thừa hình thức $\frac{1}{(1-x)^5}$ bằng:

A. $C_{11}^4 = 330$

B. $C_{11}^4 = 330$

C. C_{12}^4

D. C_{10}^4

Lời giải.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Áp dụng trực tiếp công thức khai triển nhị thức âm: Theo định lý hệ số nhị thức âm, với mọi số nguyên dương k , ta có khai triển Taylor:

$$\frac{1}{(1-x)^k} = \sum_{n=0}^{+\infty} C_{n+k-1}^{k-1} x^n$$

Áp dụng trực tiếp cho trường hợp $k = 5$ và cần tìm hệ số của x^7 (tương ứng $n = 7$), ta có:

$$[x^7] \frac{1}{(1-x)^5} = C_{7+5-1}^{5-1} = C_{11}^4 = \frac{11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 330$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Giải thích thông qua ý nghĩa tổ hợp (Quy về bài toán chia kẹo): Hệ số đứng trước x^7 trong khai triển chuỗi hình thức $\frac{1}{(1-x)^5}$ thực chất chính là số nghiệm nguyên không âm của phương trình:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 7 \text{ (với } x_i \geq 0 \text{)}$$

Đây là bài toán chia 7 cái kẹo giống nhau cho 5 em nhỏ không kèm theo điều kiện ràng buộc. Áp dụng phương pháp vách ngăn không điều kiện, ta có số cách chia là:

$$C_{7+5-1}^{5-1} = C_{11}^4 = 330 \text{ cách.}$$

✓ Kết Luận

Đáp án đúng là **330**.

Dạng II — Ràng Buộc Tính Chất Số Học (Chẵn, Lẻ, Bội Số) ⚡

2.1 — Cơ Chế Xử Lý Trực Quan Bằng Hàm Sinh

⚡ Đại Số Hóa Các Ràng Buộc Số Học Bằng Lũy Thừa

Khi gặp điều kiện số học như biến chỉ nhận giá trị chẵn, lẻ hoặc bội số của d , ta chỉ giữ lại các số mũ tương ứng trong chuỗi lũy thừa:

$$\begin{array}{l} \text{Biến chẵn } (\geq) \text{ (0) (2) (4) (6) (8)} \quad \rightarrow G_{i(x)} = 1 + x^2 + x^4 + \dots = \frac{1}{1-x^2} \\ \text{Biến lẻ } (\geq 1) \text{ (1) (3) (5) (7) (9)} \quad \rightarrow G_{i(x)} = x^1 + x^3 + x^5 + \dots = \frac{x}{1-x^2} \end{array}$$

2.2 — Các Bài Tập Ví Dụ Chi Tiết

♦ Bài 1A ★ — Tổng Hai Biến Chẵn Đơn Giản (Siêu Dễ)

Câu 28. Tìm số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 = 6$ sao cho cả hai biến x_1 và x_2 đều phải nhận giá trị chẵn.

Đáp số: 4 nghiệm

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Các biến đều nhận giá trị chẵn và tổng rất nhỏ, ta có thể dễ dàng giải bằng cách đặt ẩn phụ hoặc khai triển hàm sinh trực quan.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Lập luận trực tiếp và đặt ẩn phụ: Vì x_1, x_2 chẵn không âm nên ta liệt kê các bộ nghiệm (x_1, x_2) có tổng bằng 6:

- Các bộ thỏa mãn là: $(6, 0), (4, 2), (2, 4), (0, 6)$. Tổng cộng có **4 nghiệm**.

Hoặc đặt ẩn phụ: $x_1 = 2a, x_2 = 2b$ với $a, b \geq 0$ nguyên. Thay vào phương trình ta được: $2a + 2b = 6 \rightarrow a + b = 3$. Số nghiệm của phương trình mới là:

$$N = C_{3+2-1}^{2-1} = C_4^1 = 4 \text{ nghiệm.}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh: Mỗi biến chẵn có hàm sinh tương ứng là:

$$G_{i(x)} = 1 + x^2 + x^4 + x^6 + \dots = \frac{1}{1-x^2}$$

Hàm sinh tổng thể cho hai biến là:

$$G(x) = G_1(x)G_2(x) = \left(\frac{1}{1-x^2}\right)^2 = \frac{1}{(1-x^2)^2}$$

Cần tìm hệ số của x^6 trong khai triển $G(x)$. Đặt $u = x^2$, ta tìm hệ số của u^3 trong $\frac{1}{(1-u)^2}$:

$$[u^3] \frac{1}{(1-u)^2} = C_{3+2-1}^{2-1} = C_4^1 = 4 \text{ nghiệm.}$$

✓ Kết Luận

Có tất cả **4 nghiệm** chẵn thỏa mãn.

♦ Bài 1 ★ — Tất Cả Các Điều Chẵn (Dễ)

Câu 29. Tìm số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 = 14$ sao cho cả ba biến x_1, x_2, x_3 đều phải nhận giá trị chẵn.

Đáp số: $C_9^2 = 36$ nghiệm

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Các biến đều chẵn, ta có thể đặt ẩn phụ để chia đôi tổng hoặc dùng hàm sinh chẵn.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Đặt biến phụ tổ hợp: Vì x_i chẵn nên ta đặt $x_i = 2y_i$ với $y_i \geq 0$ nguyên. Thay vào phương trình ban đầu ta được:

$$2y_1 + 2y_2 + 2y_3 = 14 \rightarrow y_1 + y_2 + y_3 = 7$$

Số nghiệm nguyên không âm của phương trình mới là:

$$N = C_{7+3-1}^{3-1} = C_9^2 = 36 \text{ nghiệm.}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh: Mỗi biến chẵn có hàm sinh $G_{i(x)} = 1 + x^2 + x^4 + \dots = \frac{1}{1-x^2}$. Hàm sinh tổng thể là:

$$G(x) = \left(\frac{1}{1-x^2}\right)^3 = \frac{1}{(1-x^2)^3}$$

Cần tìm hệ số $[x^{14}]G(x)$. Đặt ẩn phụ trong chuỗi $u = x^2$, ta cần tìm hệ số của u^7 trong:

$$[u^7] \frac{1}{(1-u)^3} = C_{7+3-1}^{3-1} = C_9^2 = 36 \text{ nghiệm.}$$

✓ Kết Luận

Phương trình có tất cả **36 nghiệm** chẵn.

♦ Bài 2 ★ — Điều Kiện Hỗn Hợp Chẵn/Lẻ (Trung Bình)

Câu 30. Đếm số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 = 12$ thỏa mãn: x_1 là số lẻ lớn hơn hoặc bằng 1, x_2 là số chẵn lớn hơn hoặc bằng 0, và x_3 tự do không điều kiện.

Đáp số: **21 nghiệm**

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Khi các biến có tính chất khác nhau, hàm sinh phát huy sức mạnh vượt trội khi nhân các chuỗi đại diện.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Lập luận tổ hợp chia trường hợp: Ta phân loại nghiệm theo giá trị lẻ của $x_1 \in \{1, 3, 5, 7, 9, 11\}$:

- Với mỗi $x_1 = 2k + 1$: Ta cần tìm số nghiệm chẵn x_2 và nghiệm tự do $x_3 \geq 0$ của $x_2 + x_3 = 11 - 2k$.
- Để $x_3 \geq 0$ nguyên, số lựa chọn cho số chẵn x_2 là số các số chẵn x_2 thỏa mãn $0 \leq x_2 \leq 11 - 2k$.
- Số lượng số chẵn trong đoạn này là $\left\lfloor \frac{11 - 2k}{2} \right\rfloor + 1 = 6 - k$ cách chọn.
- Cho k chạy từ 0 đến 5, tổng số nghiệm là:

$$N = \sum_{k=0}^5 (6 - k) = 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 21 \text{ nghiệm.}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh: Thiết lập hàm sinh cho từng biến:

- x_1 lẻ ≥ 1 : $G_1(x) = x + x^3 + x^5 + \dots = \frac{x}{1 - x^2}$
- x_2 chẵn ≥ 0 : $G_2(x) = 1 + x^2 + x^4 + \dots = \frac{1}{1 - x^2}$
- x_3 tự do ≥ 0 : $G_3(x) = 1 + x + x^2 + \dots = \frac{1}{1 - x}$

Hàm sinh tổng là:

$$G(x) = \frac{x}{1 - x^2} \cdot \frac{1}{1 - x^2} \cdot \frac{1}{1 - x} = \frac{x}{(1 - x^2)^2(1 - x)} = \frac{x}{(1 - x)^3(1 + x)^2}$$

Cần tìm hệ số $[x^{12}]G(x)$, tương đương $[x^{11}]\frac{1}{(1-x^2)^2(1-x)}$. Khai triển $\frac{1}{(1-x^2)^2(1-x)} = (1 + 2x^2 + 3x^4 + 4x^6 + 5x^8 + 6x^{10} + \dots)(1 + x + x^2 + x^3 + \dots)$ Để tìm hệ số của x^{11} trong tích này, ta chọn các số hạng từ hai chuỗi có tổng số mũ bằng 11:

$$\text{Hệ số} = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 1 + 4 \cdot 1 + 5 \cdot 1 + 6 \cdot 1 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21 \text{ nghiệm.}$$

✓ Kết Luận

Có tất cả **21 nghiệm** thỏa mãn điều kiện.

♦ Bài 2B ★ — Bội Số Đồng Điều (Phép thế biến mẫu $1 - x^d$)

Câu 31. Tìm số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x + y + z = 15$ sao cho cả ba biến x, y, z đều phải nhận các giá trị là bội số của 3.

Đáp số: **21 nghiệm**

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Khi các biến đều có tính chất bội số giống nhau, ta có hai cách tiếp cận: đổi biến trực tiếp trong phương trình để đưa về bài toán vách ngăn cơ bản, hoặc sử dụng hàm sinh với phép thế biến $u = x^3$ để thu gọn mẫu số.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Đặt ẩn phụ trực tiếp: Vì x, y, z đều là các bội số không âm của 3, ta có thể đặt:

$$x = 3a, y = 3b, z = 3c \text{ (với } a, b, c \geq 0 \text{ nguyên)}$$

Thay vào phương trình ban đầu:

$$3a + 3b + 3c = 15 \rightarrow a + b + c = 5$$

Số nghiệm nguyên không âm của phương trình này chính là số cách phân phối 5 phần tử vào 3 nhóm (bài toán chia kẹo Euler cơ bản):

$$N = C_{5+3-1}^{3-1} = C_7^2 = \frac{7 \cdot 6}{2} = 21 \text{ nghiệm.}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh: Mỗi biến chỉ nhận giá trị là bội số của 3 ($0, 3, 6, 9, \dots$), tương ứng với bước nhảy $d = 3$. Hàm sinh thành phần của mỗi biến là:

$$G_{i(x)} = 1 + x^3 + x^6 + x^9 + \dots = \frac{1}{1 - x^3}$$

Hàm sinh tổng thể cho cả ba biến là:

$$G(x) = G_1(x)G_2(x)G_3(x) = \left(\frac{1}{1-x^3}\right)^3 = \frac{1}{(1-x^3)^3}$$

Ta cần tìm hệ số của x^{15} trong $G(x)$, tức $[x^{15}]G(x)$. Thực hiện phép thế biến cấu trúc khó: Đặt $u = x^3$, ta quy về tìm hệ số của u^5 trong phân thức nhị thức âm cơ bản theo biến u :

$$[u^5] \frac{1}{(1-u)^3} = C_{5+3-1}^{3-1} = C_7^2 = 21 \text{ nghiệm.}$$

Kết quả này hoàn toàn khớp với phương pháp đặt ẩn phụ tổ hợp.

✓ Kết Luận

Có tất cả **21 nghiệm** thỏa mãn điều kiện.

♦ Bài 3 ★★★ — Điều Kiện Bội Số Khác Nhau (Khó)

Câu 32. Tìm số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x + y + z = 15$ sao cho x là bội số của 2, y là bội số của 3, và z là số nguyên không âm tự do.

Đáp số: **20 nghiệm**

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Tính chất bội số khác nhau làm cho các phương pháp phân hoạch thủ công rất dễ sót, hàm sinh sẽ tính toán đại số chính xác.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Đặt biến và liệt kê theo bội số: Đặt $x = 2a$ và $y = 3b$ với $a, b \geq 0$. Phương trình thành $2a + 3b + z = 15$. Vì $z \geq 0$ tự do nên với mỗi cặp (a, b) thỏa mãn $2a + 3b \leq 15$, có duy nhất một giá trị $z = 15 - 2a - 3b$ hợp lệ. Do đó số nghiệm bằng số cặp (a, b) thỏa mãn $2a + 3b \leq 15$. Ta liệt kê theo giá trị của $b \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$:

- $b = 0$: $2a \leq 15 \rightarrow a \in \{0, 1, \dots, 7\}$ (8 cách)
- $b = 1$: $2a \leq 12 \rightarrow a \in \{0, 1, \dots, 6\}$ (7 cách)
- $b = 2$: $2a \leq 9 \rightarrow a \in \{0, 1, \dots, 4\}$ (5 cách)
- $b = 3$: $2a \leq 6 \rightarrow a \in \{0, 1, \dots, 3\}$ (4 cách)
- $b = 4$: $2a \leq 3 \rightarrow a \in \{0, 1\}$ (2 cách)
- $b = 5$: $2a \leq 0 \rightarrow a = 0$ (1 cách)

Tổng số nghiệm: $N = 8 + 7 + 5 + 4 + 2 + 1 = 27$ nghiệm.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh: Hàm sinh cho x bội của 2: $G_{x(x)} = \frac{1}{1-x^2}$. Hàm sinh cho y bội của 3: $G_{y(x)} = \frac{1}{1-x^3}$. Hàm sinh cho z tự do: $G_{z(x)} = \frac{1}{1-x}$. Hàm sinh tổng thể:

$$G(x) = \frac{1}{(1-x)(1-x^2)(1-x^3)}$$

Tìm hệ số $[x^{15}]G(x)$. Ta phân tích phân thức hữu tỉ hoặc thực hiện khai triển:

$$\frac{1}{(1-x)(1-x^2)(1-x^3)} = (1+x+x^2+\dots)(1+x^2+x^4+\dots)(1+x^3+x^6+\dots)$$

Hệ số của x^{15} bằng số cách chọn x^i từ chuỗi 1, x^j từ chuỗi 2, và x^k từ chuỗi 3 sao cho $i+j+k=15$ với $i \geq 0, j$ chẵn, k chia hết cho 3. Điều này đồng nhất với cách liệt kê trong Cách 1, cho ra kết quả $N = 27$.

✓ Kết Luận

Phương trình có tất cả **27 nghiệm**.

♦ Bài 4 ★★★ — Hỗn Hợp Bội Số và Lẻ Phức Tạp (Khó - Mới)

Câu 33. Tìm số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 15$ sao cho: x_1 lẻ, x_2 chẵn, x_3 là bội của 3, và x_4 là bội của 4.

Đáp số: **12 nghiệm**

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Bài toán chứa nhiều ràng buộc số học đồng thời, giải đại số bằng hàm sinh sẽ rất nhanh chóng.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Đặt biến và liệt kê theo các bội số lớn: Đặt $x_1 = 2a + 1$, $x_2 = 2b$, $x_3 = 3c$, $x_4 = 4d$ với $a, b, c, d \geq 0$. Thay vào phương trình:

$$(2a + 1) + 2b + 3c + 4d = 15 \rightarrow 2a + 2b + 3c + 4d = 14$$

Đặt $s = a + b \geq 0$. Ta có phương trình: $2s + 3c + 4d = 14$. Với mỗi giá trị hợp lệ của s , số cặp (a, b) thỏa mãn $a + b = s$ là $C_{s+1}^1 = s + 1$ cách. Ta liệt kê theo cặp (c, d) thỏa mãn $3c + 4d \leq 14$ sao cho $14 - 3c - 4d$ chẵn (để $2s = 14 - 3c - 4d$):

- Nếu $d = 0$: $2s + 3c = 14$. Vì 14 chẵn nên c phải chẵn.
 - $c = 0 \rightarrow 2s = 14 \rightarrow s = 7 \rightarrow 7 + 1 = 8$ cách.
 - $c = 2 \rightarrow 2s = 8 \rightarrow s = 4 \rightarrow 4 + 1 = 5$ cách.
 - $c = 4 \rightarrow 2s = 2 \rightarrow s = 1 \rightarrow 1 + 1 = 2$ cách.

- Nếu $d = 1$: $2s + 3c = 10 \rightarrow c$ phải chẵn.
 - $c = 0 \rightarrow 2s = 10 \rightarrow s = 5 \rightarrow 5 + 1 = 6$ cách.
 - $c = 2 \rightarrow 2s = 4 \rightarrow s = 2 \rightarrow 2 + 1 = 3$ cách.
- Nếu $d = 2$: $2s + 3c = 6 \rightarrow c$ phải chẵn.
 - $c = 0 \rightarrow 2s = 6 \rightarrow s = 3 \rightarrow 3 + 1 = 4$ cách.
 - $c = 2 \rightarrow 2s = 0 \rightarrow s = 0 \rightarrow 0 + 1 = 1$ cách.
- Nếu $d = 3$: $2s + 3c = 2 \rightarrow c$ chẵn.
 - $c = 0 \rightarrow 2s = 2 \rightarrow s = 1 \rightarrow 1 + 1 = 2$ cách.

Tổng số nghiệm: $N = 8 + 5 + 2 + 6 + 3 + 4 + 1 + 2 = 31$ nghiệm.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh: Hàm sinh tổng thể là:

$$G(x) = \frac{x}{1-x^2} \cdot \frac{1}{1-x^2} \cdot \frac{1}{1-x^3} \cdot \frac{1}{1-x^4} = \frac{x}{(1-x^2)^2(1-x^3)(1-x^4)}$$

Cần tìm hệ số $[x^{15}]G(x)$, tương đương tìm $[x^{14}]\frac{1}{(1-x^2)^2(1-x^3)(1-x^4)}$. Tính toán này hoàn toàn đồng nhất với các trường hợp lập luận của Cách 1 và cho kết quả chính xác $N = 31$.

✓ Kết Luận

Phương trình có tất cả **31 nghiệm** thỏa mãn điều kiện.

♦ Bài 4 ★★★ — Xếp Sách Màu Trên Kệ (Nhiều Điều Kiện)

Câu 34. Một thủ thư muốn chọn ra đúng 10 quyển sách từ 3 loại sách có sẵn: sách Toán (bìa đỏ), sách Văn (bìa xanh) và sách tiếng Anh (bìa vàng) để xếp lên một ngăn kệ. Biết số lượng sách mỗi loại trong kho là rất lớn. Hỏi có bao nhiêu cách chọn số lượng sách của mỗi loại thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

- Số sách Toán được chọn phải là một số lẻ.
- Số sách Văn được chọn phải là một số chẵn.
- Số sách tiếng Anh được chọn phải là một số chia hết cho 3.

Đáp số: 5 cách

Lời giải.

Phương pháp giải

Gọi số lượng sách Toán, Văn, Anh được chọn lần lượt là x, y, z (với $x, y, z \geq 0$ nguyên). Ta cần tìm số nghiệm của phương trình: $x + y + z = 10$ thỏa mãn: x lẻ, y chẵn, và z chia hết cho 3.

Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Lập luận trực tiếp và chia trường hợp: Vì z là bội của 3 và $z \leq 10$ nên $z \in \{0, 3, 6, 9\}$. Ta xét từng trường hợp của z :

- **Trường hợp 1:** $z = 9$. Khi đó $x + y = 1$ với x lẻ, y chẵn.
 - Vì x lẻ và $x \leq 1$ nên $x = 1$. Khi đó $y = 0$ (chẵn, thỏa mãn).
 - Ta được bộ nghiệm: $(1, 0, 9) \rightarrow$ Có **1 cách**.
- **Trường hợp 2:** $z = 6$. Khi đó $x + y = 4$ với x lẻ, y chẵn.
 - Vì x lẻ và $x \leq 4$ nên $x \in \{1, 3\}$.
 - Nếu $x = 1 \rightarrow y = 3$ (loại vì y phải chẵn).
 - Nếu $x = 3 \rightarrow y = 1$ (loại vì y phải chẵn).
 - Không có bộ nghiệm nào thỏa mãn $\rightarrow$ Có **0 cách**.
- **Trường hợp 3:** $z = 3$. Khi đó $x + y = 7$ với x lẻ, y chẵn.
 - Vì x lẻ và $x \leq 7$ nên $x \in \{1, 3, 5, 7\}$.
 - Nếu $x = 1 \rightarrow y = 6$ (chẵn, thỏa mãn) $\rightarrow (1, 6, 3)$.
 - Nếu $x = 3 \rightarrow y = 4$ (chẵn, thỏa mãn) $\rightarrow (3, 4, 3)$.
 - Nếu $x = 5 \rightarrow y = 2$ (chẵn, thỏa mãn) $\rightarrow (5, 2, 3)$.
 - Nếu $x = 7 \rightarrow y = 0$ (chẵn, thỏa mãn) $\rightarrow (7, 0, 3)$.
 - Ta được thêm **4 bộ nghiệm** thỏa mãn.
- **Trường hợp 4:** $z = 0$. Khi đó $x + y = 10$ với x lẻ, y chẵn.
 - Vì tổng của một số lẻ (x) và một số chẵn (y) luôn luôn là một số lẻ, mà 10 lại là số chẵn.
 - Do đó phương trình $x + y = 10$ vô nghiệm trong trường hợp này $\rightarrow$ Có **0 cách**.

Tổng số cách chọn thỏa mãn là: $1 + 0 + 4 + 0 = 5$ cách.

Gồm các bộ nghiệm cụ thể: $(1, 0, 9), (1, 6, 3), (3, 4, 3), (5, 2, 3), (7, 0, 3)$.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng phương pháp hàm sinh: Thiết lập hàm sinh cho từng loại sách:

- Sách Toán (x lẻ): $G_1(t) = t^1 + t^3 + t^5 + \dots = \frac{t}{1-t^2}$.
- Sách Văn (y chẵn): $G_2(t) = 1 + t^2 + t^4 + \dots = \frac{1}{1-t^2}$.
- Sách Anh (z chia hết cho 3): $G_3(t) = 1 + t^3 + t^6 + \dots = \frac{1}{1-t^3}$.

Hàm sinh tổng thể là tích các hàm sinh thành phần:

$$G(t) = G_1(t) \cdot G_2(t) \cdot G_3(t) = \frac{t}{(1-t^2)^2(1-t^3)}$$

Ta cần tìm hệ số của t^{10} trong khai triển của $G(t)$, tương đương với hệ số của t^9 trong:

$$H(t) = \frac{1}{(1-t^2)^2(1-t^3)} = \frac{1}{(1-t^2)^2} \cdot \frac{1}{1-t^3}$$

💡 Giải nghĩa Sự phạm: Khai triển Mẫu số qua Đổi biến

Để khai triển các nhân tử phức tạp ở mẫu số, ta quy chúng về các dạng nhị thức âm cơ bản bằng phép đổi biến số:

- Với nhân tử $\frac{1}{(1-t^2)^2}$: Đặt $u = t^2$, ta có phân thức quen thuộc $\frac{1}{(1-u)^2}$. Theo định lý nhị thức âm bậc 2: $\frac{1}{(1-u)^2} = \sum_{k=0}^{+\infty} (k+1)u^k = 1 + 2u + 3u^2 + \dots$ Thế ngược $u = t^2$ ta thu được: $\frac{1}{(1-t^2)^2} = 1 + 2t^2 + 3t^4 + 4t^6 + \dots$
- Với nhân tử $\frac{1}{1-t^3}$: Đặt $v = t^3$, ta có cấp số nhân lùi vô hạn $\frac{1}{1-v} = 1 + v + v^2 + \dots$ Thế ngược $v = t^3$ ta được: $\frac{1}{1-t^3} = 1 + t^3 + t^6 + t^9 + \dots$

Ta có khai triển các nhân tử:

- $\frac{1}{(1-t^2)^2} = \sum_{k=0}^{+\infty} (k+1)t^{2k} = 1 + 2t^2 + 3t^4 + 4t^6 + 5t^8 + 6t^{10} + \dots$
- $\frac{1}{1-t^3} = 1 + t^3 + t^6 + t^9 + \dots$


Để tìm hệ số của t^9 trong tích hai chuỗi trên, ta nhân các số hạng có tổng số mũ bằng 9:

- Số hạng t^0 ở chuỗi thứ nhất nhân với t^9 ở chuỗi thứ hai: $1 \cdot 1 = 1$.
- Số hạng t^6 ở chuỗi thứ nhất nhân với t^3 ở chuỗi thứ hai: $4t^6 \cdot t^3 = 4t^9 \rightarrow 4$.

(Các cặp số mũ chẵn $2a$ và bội của 3 là $3b$ thỏa mãn $2a + 3b = 9$ chỉ có thể là $(0, 9)$ và $(6, 3)$). Vậy hệ số của t^9 trong $H(t)$ là: $1 + 4 = 5$. Do đó hệ số của t^{10} trong $G(t)$ là **5 cách**.

✅ Kết Luận

Có tất cả **5 cách** chọn sách thỏa mãn các ràng buộc.



♦ Bài 5 ★★★★★ — Chọn Bi Màu Nhiều Ràng Buộc Hỗn Hợp (Sức Mạnh Hàm Sinh)

Câu 35. Một túi quà chứa rất nhiều viên bi có 3 màu: đỏ, xanh, vàng. Một học sinh muốn chọn ra đúng 15 viên bi từ túi quà đó. Hỏi có bao nhiêu cách chọn số lượng bi mỗi loại thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

- Số bi đỏ được chọn phải là một số chẵn và không vượt quá 8 viên.
- Số bi xanh được chọn phải là một số chia hết cho 3 và không vượt quá 9 viên.
- Số bi vàng được chọn phải là một số lẻ.

Đáp số: 10 cách

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Bài toán này chứa cả điều kiện chẵn/lẻ/bội (chặn dưới) kết hợp điều kiện giới hạn trên (chặn trên chẵn lẻ khác nhau). Nếu giải bằng phương pháp liệt kê thủ công sẽ rất phức tạp vì có nhiều ràng buộc xen kẽ. Hàm sinh đại số sẽ giải quyết cực kỳ cơ học và chính xác.

● **Cách 1 — Tổ Hợp Thuần T túy**

Lập luận trực tiếp và phân tích điều kiện: Gọi số bi đỏ, xanh, vàng chọn ra lần lượt là x, y, z (với $x, y, z \geq 0$ nguyên). Ta cần tìm số nghiệm nguyên của phương trình $x + y + z = 15$ thỏa mãn:

- $x \in \{0, 2, 4, 6, 8\}$ (5 khả năng).
- $y \in \{0, 3, 6, 9\}$ (4 khả năng).
- $z \in \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15\}$ (số lẻ).

Vì số khả năng của x và y là hữu hạn và khá nhỏ, ta có thể chia các trường hợp theo cặp (x, y) :

- Tổng $x + y$ phải là số sao cho $z = 15 - (x + y)$ là một số lẻ và $z \geq 1$.
- Vì 15 lẻ, nên để z lẻ thì tổng $x + y$ phải là một số chẵn.
- Do x chẵn (luôn chẵn), nên để $x + y$ chẵn thì y bắt buộc phải là số chẵn. Trong tập hợp các giá trị của y , chỉ có $y \in \{0, 6\}$ là chẵn. Ta xét các trường hợp:

▸ **Trường hợp 1:** $y = 0$. Khi đó $x + z = 15 \rightarrow z = 15 - x$.

- Với $x = 0 \rightarrow z = 15$ (thỏa mãn lẻ).
- Với $x = 2 \rightarrow z = 13$ (thỏa mãn lẻ).
- Với $x = 4 \rightarrow z = 11$ (thỏa mãn lẻ).
- Với $x = 6 \rightarrow z = 9$ (thỏa mãn lẻ).
- Với $x = 8 \rightarrow z = 7$ (thỏa mãn lẻ).

→

Có **5 cách** chọn.

► **Trường hợp 2:** $y = 6$. Khi đó $x + z = 9 \rightarrow z = 9 - x$.

- Với $x = 0 \rightarrow z = 9$ (thỏa mãn lẽ).
- Với $x = 2 \rightarrow z = 7$ (thỏa mãn lẽ).
- Với $x = 4 \rightarrow z = 5$ (thỏa mãn lẽ).
- Với $x = 6 \rightarrow z = 3$ (thỏa mãn lẽ).
- Với $x = 8 \rightarrow z = 1$ (thỏa mãn lẽ).

$\rightarrow$

Có 5 cách chọn.

Tổng số cách chọn thỏa mãn là: $5 + 5 = 10$ cách chọn.

(Lưu ý: Nếu số lượng bi cần chọn tăng lên lớn, ví dụ 150 viên, phương pháp chia trường hợp thủ công này lập tức thất bại. Khi đó, Hàm sinh là con đường duy nhất).

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng phương pháp hàm sinh: Thiết lập hàm sinh cho từng biến số:

- Bi màu Đỏ (x chẵn và ≤ 8):

$$G_1(t) = 1 + t^2 + t^4 + t^6 + t^8 = \frac{1 - t^{10}}{1 - t^2}$$

- Bi màu Xanh (y chia hết cho 3 và ≤ 9):

$$G_2(t) = 1 + t^3 + t^6 + t^9 = \frac{1 - t^{12}}{1 - t^3}$$

- Bi màu Vàng (z lẻ):

$$G_3(t) = t^1 + t^3 + t^5 + \dots = \frac{t}{1 - t^2}$$

Hàm sinh tổng thể cho cách chọn bi là tích các hàm sinh trên:

$$G(t) = G_1(t) \cdot G_2(t) \cdot G_3(t) = \frac{1 - t^{10}}{1 - t^2} \cdot \frac{1 - t^{12}}{1 - t^3} \cdot \frac{t}{1 - t^2}$$

Rút gọn biểu thức $G(t)$:

$$G(t) = t(1 - t^{10})(1 - t^{12}) \cdot \frac{1}{(1 - t^2)^2(1 - t^3)} = (t - t^{11} - t^{13} + t^{25}) \cdot \frac{1}{(1 - t^2)^2(1 - t^3)}$$

Ta cần tìm hệ số của t^{15} trong khai triển $G(t)$, tương đương với:

$$[t^{15}]G(t) = [t^{15}] \left[(t - t^{11} - t^{13}) \cdot \frac{1}{(1 - t^2)^2(1 - t^3)} \right]$$

(Ta bỏ qua số hạng t^{25} vì số mũ của nó đã vượt quá 15). Áp dụng quy tắc dịch chuyển số mũ (Shift Rule) cho từng số hạng của tử số:

$$[t^{15}]G(t) = [t^{14}] \frac{1}{(1 - t^2)^2(1 - t^3)} - [t^4] \frac{1}{(1 - t^2)^2(1 - t^3)} - [t^2] \frac{1}{(1 - t^2)^2(1 - t^3)}$$

Đặt $H(t) = \frac{1}{(1-t^2)^2(1-t^3)}$. Ta đi tìm hệ số $[t^k]H(t)$ với $k \in \{2, 4, 14\}$:

💡 Giải nghĩa Sư phạm: Cơ chế khai triển nhân tử mẫu số

Ta thực hiện đổi biến đại số để khai triển các phân thức phức tạp về dạng quen thuộc:

- Nhân tử $A(t) = \frac{1}{(1-t^2)^2}$: Đặt $u = t^2$, ta áp dụng khai triển nhị thức âm bậc 2:

$$\frac{1}{(1-u)^2} = \sum_{i=0}^{+\infty} (i+1)u^i = 1 + 2u + 3u^2 + 4u^3 + \dots$$
 Thay lại $u = t^2$ thu được chuỗi: $1 + 2t^2 + 3t^4 + 4t^6 + 5t^8 + \dots$
- Nhân tử $B(t) = \frac{1}{1-t^3}$: Đặt $v = t^3$, áp dụng khai triển cấp số nhân lùi vô hạn: $\frac{1}{1-v} = 1 + v + v^2 + v^3 + \dots$ Thay lại $v = t^3$ thu được chuỗi: $1 + t^3 + t^6 + t^9 + \dots$

Tích chập $H(t) = A(t) \cdot B(t)$ là kết quả nhân phân phối hai chuỗi này để tìm hệ số đứng trước các lũy thừa của t .

- Khai triển các nhân tử ở mẫu:

$$\begin{aligned} \blacktriangleright A(t) &= \frac{1}{(1-t^2)^2} = \sum_{i=0}^{+\infty} (i+1)t^{2i} = 1 + 2t^2 + 3t^4 + 4t^6 + 5t^8 + 6t^{10} + 7t^{12} + 8t^{14} + \dots \\ \blacktriangleright B(t) &= \frac{1}{1-t^3} = \sum_{j=0}^{+\infty} t^{3j} = 1 + t^3 + t^6 + t^9 + t^{12} + \dots \end{aligned}$$

- Tính các hệ số thành phần của $H(t) = A(t) \cdot B(t)$:

- Tìm $[t^2]H(t)$: Cách duy nhất tạo ra số mũ 2 là lấy số hạng $2t^2$ ở $A(t)$ nhân 1 ở $B(t) \rightarrow [t^2]H(t) = 2 \cdot 1 = 2$.
- Tìm $[t^4]H(t)$: Cách duy nhất tạo ra số mũ 4 là lấy số hạng $3t^4$ ở $A(t)$ nhân 1 ở $B(t) \rightarrow [t^4]H(t) = 3 \cdot 1 = 3$.
- Tìm $[t^{14}]H(t)$: Ta tìm các cặp chỉ số (i, j) sao cho $2i + 3j = 14$ với $i, j \geq 0$. Vì $2i$ chẵn và 14 chẵn nên $3j$ phải chẵn $\rightarrow j$ chẵn $\rightarrow j \in \{0, 2, 4\}$.
 - Với $j = 0 \rightarrow 2i = 14 \rightarrow i = 7$. Hệ số tương ứng là: $(7+1) \cdot 1 = 8$.
 - Với $j = 2 \rightarrow 3j = 6 \rightarrow 2i = 8 \rightarrow i = 4$. Hệ số tương ứng là: $(4+1) \cdot 1 = 5$.
 - Với $j = 4 \rightarrow 3j = 12 \rightarrow 2i = 2 \rightarrow i = 1$. Hệ số tương ứng là: $(1+1) \cdot 1 = 2$.

Do đó, $[t^{14}]H(t) = 8 + 5 + 2 = 15$.

Thay các kết quả thành phần vào công thức hiệu ban đầu, ta có:

$$[t^{15}]G(t) = 15 - 3 - 2 = 10 \text{ cách.}$$

Kết quả hoàn toàn khớp với phương pháp liệt kê trường hợp, chứng minh tính đúng đắn và sự kỳ diệu của Hàm sinh!

✅ Kết Luận

Có tất cả **10 cách** chọn bộ bi thỏa mãn điều kiện.

Túi Đỏ
Chẵn, ≤ 8

+

Túi Xanh
Bội 3, ≤ 9

+

Túi Vàng
Số Lẻ ≥ 1

Dạng III — Bài Toán Đổi Tiền và Phân Hoạch Số 💰

3.1 — Lý Thuyết Phân Hoạch Số và Định Lý Euler

💰 **Khái niệm Phân Hoạch Số (Integer Partition)**

Phân hoạch một số nguyên dương n là cách viết n dưới dạng tổng các số nguyên dương không quan tâm đến thứ tự.

Ký hiệu $p(n)$ là số cách phân hoạch số n . Hàm sinh của dãy $p(n)$ là tích vô hạn Euler:

$$P(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} p(n)x^n = \prod_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{1-x^k} = \frac{1}{(1-x)(1-x^2)(1-x^3)\dots}$$

Biểu diễn trực quan bằng biểu đồ Ferrers (Young Diagram): Mỗi phân hoạch có thể biểu diễn bằng các hàng ô vuông xếp thẳng lề trái. Ví dụ phân hoạch $5 = 3 + 2$:

Hàng 1: 3 ô
Hàng 2: 2 ô

3.2 — Các Bài Tập Ví Dụ Chi Tiết

♦ **Bài 1A ★ — Đổi Tiền Xu Mệnh Giá Nhỏ (Siêu Dễ)**

Câu 36. Có bao nhiêu cách đổi một mệnh giá xu 4 đồng thành các đồng tiền xu có mệnh giá 1 đồng và 2 đồng?

Đáp số: 3 cách

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán đếm số nghiệm nguyên không âm của phương trình $a + 2b = 4$.

🔵 Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Lập luận trực tiếp: Gọi b là số đồng tiền xu mệnh giá 2 đồng ($b \geq 0$, nguyên). Do $2b \leq 4$ nên b chỉ có thể nhận các giá trị: $b \in \{0, 1, 2\}$.

- Với mỗi cách chọn b , ta có duy nhất một cách chọn số đồng xu 1 đồng tương ứng là $a = 4 - 2b$.
- Cụ thể các cặp nghiệm (a, b) là: $(4, 0)$, $(2, 1)$, $(0, 2)$.

Vậy có đúng **3 cách** đổi tiền.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh: Hàm sinh cho loại xu 1 đồng là $\frac{1}{1-x} = 1 + x^1 + x^2 + x^3 + x^4 + \dots$ Hàm sinh cho loại xu 2 đồng là $\frac{1}{1-x^2} = 1 + x^2 + x^4 + x^6 + \dots$ Hàm sinh tổng quát là:

$$G(x) = \frac{1}{(1-x)(1-x^2)}$$

Ta tìm hệ số $[x^4]G(x)$ bằng cách nhân trực tiếp hai chuỗi:

$$[x^4](1 + x + x^2 + x^3 + x^4)(1 + x^2 + x^4)$$

Các số hạng tạo ra x^4 là:

$$1 \cdot x^4 + x^2 \cdot x^2 + x^4 \cdot 1 = 3x^4$$

Hệ số của x^4 là 3.

✓ Kết Luận

Có tất cả **3 cách** đổi mệnh giá 4 đồng.

♦ Bài 1 ★ — Bài Toán Đổi Tiền Xu Cơ Bản (Dễ)

Câu 37. Có bao nhiêu cách đổi một tờ tiền có mệnh giá 10 đồng thành các đồng tiền xu có mệnh giá 1 đồng và 2 đồng?

Đáp số: 6 cách

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Số cách đổi tiền tương đương với số nghiệm nguyên không âm của phương trình $1a + 2b = 10$.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuận Túc

Đếm trực tiếp theo số lượng đồng xu 2đ: Gọi b là số tờ xu 2đ ($b \geq 0$, nguyên). Do $2b \leq 10$ nên b có thể nhận các giá trị trong tập $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$. Với mỗi cách chọn số tờ 2đ là b , ta có duy nhất một cách chọn số tờ 1đ tương ứng là $a = 10 - 2b$. Số lựa chọn cho b là $5 - 0 + 1 = 6$ cách.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh: Hàm sinh cho đồng xu 1đ là $\frac{1}{1-x}$, hàm sinh cho đồng xu 2đ là $\frac{1}{1-x^2}$. Hàm sinh tổng thể là:

$$G(x) = \frac{1}{(1-x)(1-x^2)}$$

Ta cần tìm hệ số $[x^{10}]G(x)$. Biến đổi:

$$G(x) = \frac{1}{(1-x)^2(1+x)}$$

Thực hiện chia đa thức hoặc dùng khai triển:

$$\frac{1}{(1-x)(1-x^2)} = (1+x+x^2+x^3+\dots)(1+x^2+x^4+x^6+\dots)$$

Hệ số $[x^{10}]$ bằng số cách viết $10 = i + 2j$ với $i, j \geq 0$. Rõ ràng có 6 cặp thỏa mãn.

✓ Kết Luận

Có tất cả **6 cách** đổi tiền.

♦ Bài 1B ★ — Công Thức Đổi Tiền Tổng Quát (Phân tích phân thức mẫu chập)

Câu 38. Tìm công thức tổng quát tính số cách đổi một số tiền n đồng ($n \geq 0$ nguyên) thành các đồng tiền xu có mệnh giá 1 đồng và 2 đồng bằng phương pháp hàm sinh.

Đáp số: $a_n = \frac{2n+3+(-1)^n}{4}$

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Bài toán đổi tiền xu mệnh giá 1đ và 2đ dẫn đến hàm sinh có mẫu số dạng tích chập lệch bậc $(1-x)(1-x^2)$. Để tìm số hạng tổng quát cho mọi n , ta sẽ sử dụng kỹ thuật phân tích phân thức hữu tỉ đơn giản để đưa mẫu số phức tạp về các nhị thức âm cơ bản.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Lập luận tổ hợp trực tiếp và chia trường hợp: Gọi số tờ tiền xu 2 đồng được chọn là y ($y \geq 0$, nguyên). Số tiền còn lại được trả bằng các đồng xu 1 đồng, tương ứng là $x = n - 2y \geq 0$ đồng xu. Như vậy, số cách đổi tiền chính là số giá trị nguyên không âm y thỏa mãn điều kiện:

$$2y \leq n \rightarrow 0 \leq y \leq \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$$

Số lượng giá trị nguyên của y thỏa mãn bất đẳng thức trên là $N = \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + 1$.

- Nếu n là số chẵn ($n = 2k$):

$$N = \left\lfloor \frac{2k}{2} \right\rfloor + 1 = k + 1 = \frac{n}{2} + 1 = \frac{2n + 4}{4}$$

- Nếu n là số lẻ ($n = 2k + 1$):

$$N = \left\lfloor \frac{2k + 1}{2} \right\rfloor + 1 = k + 1 = \frac{n - 1}{2} + 1 = \frac{2n + 2}{4}$$

Ta có thể gộp hai kết quả trên thành một biểu thức toán học duy nhất sử dụng số hạng xen kẽ dấu $(-1)^n$:

$$a_n = \frac{2n + 3 + (-1)^n}{4}$$

- Thử lại: Khi $n = 10$, ta có $a_{10} = \frac{2(10) + 3 + (-1)^{10}}{4} = \frac{20 + 3 + 1}{4} = 6$ cách (khớp hoàn toàn với Bài 1).

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh và Phân tích phân thức đơn giản: Hàm sinh cho đồng xu 1 đồng là $\frac{1}{1-x}$, cho đồng xu 2 đồng là $\frac{1}{1-x^2}$. Hàm sinh tổng thể cho cách đổi số tiền n là:

$$G(x) = \frac{1}{1-x} \cdot \frac{1}{1-x^2} = \frac{1}{(1-x)^2(1+x)}$$

Ta thực hiện phân tích phân thức hữu tỉ này thành tổng các phân thức tối giản:

$$\frac{1}{(1-x)^2(1+x)} = \frac{A}{1-x} + \frac{B}{(1-x)^2} + \frac{C}{1+x}$$

Quy đồng mẫu số chung là $(1-x)^2(1+x)$ và đồng nhất hệ số ở tử:

$$1 = A(1-x)(1+x) + B(1+x) + C(1-x)^2$$

Ta tìm các hệ số A, B, C bằng phương pháp chọn điểm đặc trưng:

- Cho $x = 1$: Vế trái là 1, vế phải là $B(1+1) = 2B$. Suy ra $B = \frac{1}{2}$.
- Cho $x = -1$: Vế phải là $C(1-(-1))^2 = 4C$. Suy ra $C = \frac{1}{4}$.
- Cho $x = 0$: Ta có $1 = A + B + C \rightarrow A = 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$.

Thay ngược các hệ số vào phân thức, ta được biểu thức hàm sinh rút gọn:

$$G(x) = \frac{1}{4(1-x)} + \frac{1}{2(1-x)^2} + \frac{1}{4(1+x)}$$

Để tìm số hạng tổng quát a_n , ta trích hệ số của x^n từ từng phân thức thành phần:

$$a_n = [x^n]G(x) = \frac{1}{4}[x^n]\frac{1}{1-x} + \frac{1}{2}[x^n]\frac{1}{(1-x)^2} + \frac{1}{4}[x^n]\frac{1}{1-(-x)}$$

Áp dụng công thức trích hệ số nhị thức âm cơ bản:

- $[x^n]\frac{1}{1-x} = 1^n = 1$
- $[x^n]\frac{1}{(1-x)^2} = C_{n+2-1}^{2-1} = n+1$
- $[x^n]\frac{1}{1-(-x)} = (-1)^n$

Suy ra công thức tổng quát của số cách đổi tiền là:

$$a_n = \frac{1}{4} \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot (n+1) + \frac{1}{4} \cdot (-1)^n = \frac{2n+3+(-1)^n}{4}$$

✓ Kết Luận

Số cách đổi tiền tổng quát là $a_n = \frac{2n+3+(-1)^n}{4}$.

♦ Bài 2 ★ — Đổi Tiền Xu Nâng Cao (Trung Bình)

Câu 39. Có bao nhiêu cách đổi một mệnh giá 20 đồng thành các đồng tiền xu có mệnh giá 1 đồng, 5 đồng và 10 đồng?

Đáp số: 9 cách

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đồng tiền xu mệnh giá lớn giúp thu hẹp phạm vi liệt kê phân tích.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Phân tích theo đồng xu mệnh giá lớn: Gọi phương trình đếm là $a + 5b + 10c = 20$ với $a, b, c \geq 0$.

0. Liệt kê theo số xu 10đ là $c \in \{0, 1, 2\}$:

- $c = 2$: $a + 5b = 0 \rightarrow$ chỉ có 1 cách duy nhất $(0, 0, 2)$.
- $c = 1$: $a + 5b = 10 \rightarrow b$ nhận giá trị trong $\{0, 1, 2\} \rightarrow$ có 3 cách.
- $c = 0$: $a + 5b = 20 \rightarrow b$ nhận giá trị trong $\{0, 1, 2, 3, 4\} \rightarrow$ có 5 cách.

Tổng số cách đổi là: $N = 1 + 3 + 5 = 9$ cách.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh: Hàm sinh của bài toán đổi tiền là:

$$G(x) = \frac{1}{(1-x)(1-x^5)(1-x^{10})}$$

Ta tìm hệ số $[x^{20}]G(x)$:

$$G(x) = (1+x+x^2+\dots)(1+x^5+x^{10}+\dots)(1+x^{10}+x^{20}+\dots)$$

Đồng nhất hệ số của x^{20} cho thấy kết quả bằng đúng tổng các lựa chọn ở Cách 1, bằng **9**.

✓ Kết Luận

Có tất cả **9 cách** đổi tiền.

♦ **Bài 3 ★★★ — Phân Hoạch Số Giới Hạn Cờ Phần Tử (Khó - Mới)**

Câu 40. Có bao nhiêu cách phân hoạch số 8 thành tổng các số nguyên dương mà mỗi số hạng trong tổng chỉ được phép nhận giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 3?

Đáp số: **10 cách**

Lời giải.

 Phương pháp giải

Bài toán tương đương đếm số cách đổi tiền mệnh giá 8 đồng chỉ sử dụng các đồng tiền xu mệnh giá 1, 2, 3.

● **Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy**

Liệt kê có thứ tự giảm dần: Ta liệt kê các bộ phân hoạch của 8 thành các số hạng ≤ 3 :

1. $3 + 3 + 2$
2. $3 + 3 + 1 + 1$
3. $3 + 2 + 2 + 1$
4. $3 + 2 + 1 + 1 + 1$
5. $3 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1$
6. $2 + 2 + 2 + 2$
7. $2 + 2 + 2 + 1 + 1$
8. $2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1$
9. $2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1$
10. $1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1$

Tổng cộng có 10 cách phân hoạch.

● **Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)**

Sử dụng hàm sinh: Các số hạng chỉ có thể là 1, 2, 3 nên hàm sinh là:

$$G(x) = \frac{1}{(1-x)(1-x^2)(1-x^3)}$$

Ta nhân và tính hệ số $[x^8]G(x)$: Khai triển tích:

$$G(x) = (1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6 + x^7 + x^8)(1 + x^2 + x^4 + x^6 + x^8)(1 + x^3 + x^6) + \dots$$

Thực hiện nhân chập hoặc chia đa thức cho ra hệ số $[x^8] = 10$.

 **Kết Luận**

Có tất cả **10 cách** phân hoạch số 8 thỏa mãn.

♦ Bài 4 ★★★ — Định Lý Phân Hoạch Euler Đặc Sắc (Khó)

Câu 41. Chứng minh định lý Euler nổi tiếng: “Với mọi số nguyên dương n , số cách phân hoạch số n thành các số hạng phân biệt luôn bằng số cách phân hoạch số n thành các số hạng lẻ”. Hãy kiểm chứng với $n = 6$.

Đáp số: **Chứng minh bằng biến đổi đại số tích vô hạn**

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Định lý này cực kỳ khó nếu chứng minh bằng tổ hợp thuần túy, nhưng với hàm sinh, ta chỉ cần vài bước biến đổi đại số.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Kiểm nghiệm với $n = 6$:

- Tập hợp các phân hoạch thành các số phân biệt (không trùng nhau):

1. 6
2. $5 + 1$
3. $4 + 2$
4. $3 + 2 + 1$

→ Có 4 cách.

- Tập hợp các phân hoạch thành các số lẻ:

1. $5 + 1$
2. $3 + 3$
3. $3 + 1 + 1 + 1$
4. $1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1$

→ Có 4 cách.

Hai đại lượng hoàn toàn bằng nhau.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Chứng minh đại số tổng quát:

- Gọi $D(x)$ là hàm sinh phân hoạch thành các phần tử phân biệt (mỗi phần tử chỉ xuất hiện 0 hoặc 1 lần):

$$D(x) = \prod_{k=1}^{+\infty} (1 + x^k) = (1 + x)(1 + x^2)(1 + x^3) \dots$$

- Gọi $O(x)$ là hàm sinh phân hoạch thành các phần tử lẻ (được lặp lại thoải mái):

$$O(x) = \prod_{k=1, k \text{ lẻ}}^{+\infty} \frac{1}{1-x^k} = \frac{1}{(1-x)(1-x^3)(1-x^5)\dots}$$

Ta thực hiện biến đổi đại số chuỗi $D(x)$:

$$D(x) = \prod_{k=1}^{+\infty} (1+x^k) = \prod_{k=1}^{+\infty} \frac{1-x^{2k}}{1-x^k} = \frac{1-x^2}{1-x} \cdot \frac{1-x^4}{1-x^2} \cdot \frac{1-x^6}{1-x^3} \cdot \frac{1-x^8}{1-x^4} \dots$$

Để ý rằng các nhân tử dạng $1-x^{2k}$ ở trên tử sẽ triệt tiêu hoàn toàn với các nhân tử dạng $1-x^j$ (với j chẵn) ở dưới mẫu:

$$D(x) = \frac{\cancel{1-x^2} \cancel{1-x^4} \cancel{1-x^6} \dots}{(1-x)(\cancel{1-x^2})(1-x^3)(\cancel{1-x^4})(1-x^5)(\cancel{1-x^6})\dots} = \prod_{k=1, k \text{ lẻ}}^{+\infty} \frac{1}{1-x^k} = O(x)$$

Vì hai chuỗi hàm sinh giống hệt nhau $D(x) = O(x)$ nên hệ số của mọi x^n trong cả hai chuỗi là bằng nhau.

✅ Kết Luận

Ta có điều phải chứng minh.

Dạng IV — Dãy Số, Hệ Thức Truy Hồi và Số Catalan

4.1 — Quy Trình Giải Truy Hồi Bằng Hàm Sinh

🔗 Biến Đổi Hệ Thức Truy Hồi Sang Phân Thức Hàm Sinh

Phương pháp tìm công thức tổng quát của dãy số (a_n) thỏa mãn hệ thức truy hồi tuyến tính:

1. Đặt $G(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$.
2. Nhân hai vế của hệ thức truy hồi với x^n và lấy tổng từ điểm bắt đầu hợp lệ.
3. Biến đổi biểu thức để đưa về phương trình đại số chứa $G(x)$, sau đó giải tìm $G(x)$ dưới dạng phân thức hữu tỉ $\frac{P(x)}{Q(x)}$.
4. Phân tích phân thức thành tổng các phân thức đơn giản để tìm hệ số $[x^n]$.

4.2 — Các Bài Tập Ví Dụ Chi Tiết

♦ Bài 1A ★ — Hệ Thức Truy Hồi Cấp Một Kinh Điển (Siêu Dễ)

Câu 42. Cho dãy số (a_n) được xác định bởi công thức truy hồi: $a_0 = 1$ và $a_n = 2a_{n-1}$ với mọi $n \geq 1$. Tìm công thức tổng quát của dãy số (a_n) bằng phương pháp hàm sinh.

Đáp số: $a_n = 2^n$

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là dãy cấp số nhân cơ bản. Ta sẽ dùng phương pháp quy nạp trực tiếp và hàm sinh để giải quyết.

🔵 Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Phương pháp lập luận quy nạp trực tiếp: Tính một vài số hạng đầu tiên của dãy số:

- $a_0 = 1$.
- $a_1 = 2a_0 = 2 = 2^1$.
- $a_2 = 2a_1 = 4 = 2^2$.
- $a_3 = 2a_2 = 8 = 2^3$.

Nhận xét quy luật: $a_n = 2^n$. Ta chứng minh bằng quy nạp:

- Với $n = 0$: $a_0 = 2^0 = 1$ (đúng).
- Giả sử $a_k = 2^k$ đúng với $n = k \geq 0$.
- Với $n = k + 1$, ta có $a_{k+1} = 2a_k = 2 \cdot 2^k = 2^{k+1}$ (đúng).

Vậy công thức tổng quát là $a_n = 2^n$ với mọi $n \geq 0$.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh: Đặt hàm sinh của dãy số là $G(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$. Ta nhân hai vế của phương trình truy hồi $a_n = 2a_{n-1}$ với x^n và lấy tổng từ $n = 1$ đến $+\infty$:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^n = 2 \sum_{n=1}^{+\infty} a_{n-1} x^n$$

Biến đổi vế trái và vế phải:

$$G(x) - a_0 = 2x \sum_{n=1}^{+\infty} a_{n-1} x^{n-1} \rightarrow G(x) - 1 = 2xG(x)$$

Giải phương trình đại số để tìm $G(x)$:

$$G(x)(1 - 2x) = 1 \rightarrow G(x) = \frac{1}{1 - 2x}$$

Áp dụng khai triển chuỗi lũy thừa cơ bản:

$$G(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (2x)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} 2^n x^n$$

Trích hệ số để tìm số hạng tổng quát của dãy:

$$a_n = [x^n]G(x) = 2^n$$

✓ Kết Luận

Công thức tổng quát của dãy là $a_n = 2^n$.

♦ Bài 1B ★★ — Hệ thức truy hồi tuyến tính không thuần nhất (Mẫu tích chập hệ số nhân)

Câu 43. Cho dãy số (a_n) được xác định bởi công thức truy hồi: $a_0 = 1$ và $a_n = 2a_{n-1} + 3$ với mọi $n \geq 1$. Tìm số hạng tổng quát của dãy số (a_n) bằng phương pháp hàm sinh.

Đáp số: $a_n = 2^{n+2} - 3$

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Hệ thức truy hồi chứa hằng số không thuần nhất (ở đây là $+3$). Khi giải bằng hàm sinh, hằng số này sẽ đóng góp một nhân tử $1 - x$ ở mẫu số bên cạnh nhân tử hệ số nhân $1 - 2x$. Ta sẽ quy đồng và phân tích phân thức hữu tỉ để trích hệ số.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Phương pháp đặt dãy phụ (Cổ điển): Ta tìm hằng số tự do c sao cho hệ thức truy hồi có thể viết dưới dạng:

$$a_n + c = 2(a_{n-1} + c)$$

Khai triển biểu thức trên ta được $a_n = 2a_{n-1} + c$. Đồng nhất với hệ thức truy hồi ban đầu $a_n = 2a_{n-1} + 3$, ta có $c = 3$. Đặt dãy số phụ $b_n = a_n + 3$, ta thu được hệ thức truy hồi của dãy (b_n) :

$$b_n = 2b_{n-1} \text{ (với } n \geq 1)$$

Giá trị đầu tiên của dãy phụ: $b_0 = a_0 + 3 = 1 + 3 = 4$. Nhận thấy dãy (b_n) là một cấp số nhân có số hạng đầu $b_0 = 4$ và công bội $q = 2$. Công thức tổng quát của dãy (b_n) là:

$$b_n = b_0 \cdot 2^n = 4 \cdot 2^n = 2^2 \cdot 2^n = 2^{n+2}$$

Từ đó, số hạng tổng quát của dãy (a_n) ban đầu là:

$$a_n = b_n - 3 = 2^{n+2} - 3$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh: Đặt hàm sinh tương ứng của dãy số là $G(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$. Nhân cả hai vế của hệ thức truy hồi $a_n = 2a_{n-1} + 3$ với x^n và lấy tổng từ $n = 1$ đến $+\infty$:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^n = 2 \sum_{n=1}^{+\infty} a_{n-1} x^n + 3 \sum_{n=1}^{+\infty} x^n$$

Biểu diễn các tổng này qua hàm sinh $G(x)$:

- Vế trái: $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^n = G(x) - a_0 = G(x) - 1$
- Tổng thứ nhất bên vế phải: $2 \sum_{n=1}^{+\infty} a_{n-1} x^n = 2xG(x)$
- Tổng thứ hai bên vế phải: $3 \sum_{n=1}^{+\infty} x^n = 3 \cdot \frac{x}{1-x}$

Thay vào phương trình ta được:

$$\begin{aligned} G(x) - 1 &= 2xG(x) + \frac{3x}{1-x} \\ \rightarrow G(x)(1 - 2x) &= 1 + \frac{3x}{1-x} = \frac{1+2x}{1-x} \\ \rightarrow G(x) &= \frac{1+2x}{(1-2x)(1-x)} \end{aligned}$$

Mẫu số của $G(x)$ là tích của hai nhân tử hệ số nhân bậc nhất. Ta phân tích thành phân thức đơn giản:

$$\frac{1+2x}{(1-2x)(1-x)} = \frac{A}{1-2x} + \frac{B}{1-x}$$

Quy đồng mẫu số và đồng nhất tử số:

$$1+2x = A(1-x) + B(1-2x)$$

Chọn các giá trị đặc trưng để giải hệ số:

- Cho $x = 1$: $1 + 2(1) = B(1 - 2) \rightarrow 3 = -B \rightarrow B = -3$.
- Cho $x = \frac{1}{2}$: $1 + 2\left(\frac{1}{2}\right) = A\left(1 - \frac{1}{2}\right) \rightarrow 2 = \frac{A}{2} \rightarrow A = 4$.

Do đó:

$$G(x) = \frac{4}{1-2x} - \frac{3}{1-x}$$

Khai triển chuỗi lũy thừa và tìm số hạng tổng quát a_n bằng cách trích hệ số của x^n :

$$\begin{aligned} a_n &= [x^n]G(x) = 4[x^n]\frac{1}{1-2x} - 3[x^n]\frac{1}{1-x} \\ &\rightarrow a_n = 4 \cdot 2^n - 3 \cdot 1^n = 2^2 \cdot 2^n - 3 = 2^{n+2} - 3 \end{aligned}$$

Hai cách làm cho cùng một kết quả đồng nhất và rất ngắn gọn.

✓ Kết Luận

Số hạng tổng quát của dãy số là $a_n = 2^{n+2} - 3$.

♦ Bài 1C ★★★ — Công thức tổng quát Fibonacci (Mẫu bậc hai nghiệm căn thức)

Câu 44. Tìm số hạng tổng quát của dãy số Fibonacci (F_n) xác định bởi: $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ và $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ với mọi $n \geq 2$ bằng phương pháp hàm sinh.

Đáp số:
$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right)$$

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Dãy Fibonacci là biểu tượng của toán học tổ hợp. Khi giải bằng hàm sinh, ta thu được mẫu số bậc hai $1 - x - x^2$. Ta sẽ phân tích đa thức mẫu này dựa trên các nghiệm thực vô tỉ (liên quan đến Tỷ lệ vàng) để trích hệ số.

🔵 Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Sử dụng phương trình đặc trưng: Hệ thức truy hồi tuyến tính thuần nhất bậc hai là $F_n - F_{n-1} - F_{n-2} = 0$. Phương trình đặc trưng tương ứng:

$$\lambda^2 - \lambda - 1 = 0$$

Phương trình này có hai nghiệm thực phân biệt:

$$\lambda_1 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} (\text{Tỷ lệ vàng } \varphi)$$

$$\lambda_2 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2} (\text{Nghịch đảo tỷ lệ vàng } \psi)$$

Số hạng tổng quát của dãy số có dạng:

$$F_n = C_1 \lambda_1^n + C_2 \lambda_2^n$$

Xác định hằng số C_1, C_2 dựa vào hai số hạng đầu tiên $F_0 = 0$ và $F_1 = 1$:

- Với $n = 0$: $C_1 + C_2 = 0 \rightarrow C_2 = -C_1$.
- With $n = 1$: $C_1 \lambda_1 + C_2 \lambda_2 = 1 \rightarrow C_1 (\lambda_1 - \lambda_2) = 1$.

Ta có $\lambda_1 - \lambda_2 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} - \frac{1 - \sqrt{5}}{2} = \sqrt{5}$. Từ đó tìm được:

$$C_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}, C_2 = -\frac{1}{\sqrt{5}}$$

Thay ngược vào, ta được công thức Binet kinh điển:

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right)$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh: Đặt hàm sinh cho dãy số Fibonacci là $G(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} F_n x^n$. Nhân cả hai vế của truy hồi $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ với x^n và lấy tổng từ $n = 2$ đến $+\infty$:

$$\sum_{n=2}^{+\infty} F_n x^n = \sum_{n=2}^{+\infty} F_{n-1} x^n + \sum_{n=2}^{+\infty} F_{n-2} x^n$$

Biến đổi các tổng lũy thừa đưa về hàm sinh $G(x)$:

$$G(x) - F_0 - F_1 x = x(G(x) - F_0) + x^2 G(x)$$

Thay $F_0 = 0$ và $F_1 = 1$ ta được phương trình:

$$G(x) - x = xG(x) + x^2 G(x) \rightarrow G(x)(1 - x - x^2) = x$$

Do đó hàm sinh Fibonacci là:

$$G(x) = \frac{x}{1 - x - x^2}$$

Mẫu số $1 - x - x^2$ có hai nghiệm là $-\lambda_1$ và $-\lambda_2$ của phương trình đặc trưng. Ta phân tích đa thức mẫu thành:

$$1 - x - x^2 = (1 - \alpha x)(1 - \beta x) \left(\text{với } \alpha = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \beta = \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)$$

Thực hiện phân tích phân thức hữu tỉ đơn giản:

$$\frac{x}{(1-\alpha x)(1-\beta x)} = \frac{A}{1-\alpha x} + \frac{B}{1-\beta x}$$

Quy đồng mẫu số và đồng nhất tử số:

$$x = A(1-\beta x) + B(1-\alpha x) = (A+B) - (A\beta + B\alpha)x$$

Đồng nhất hệ số ở hai vế, ta thu được hệ phương trình:

- $A+B=0 \rightarrow B=-A$
- $A\beta+B\alpha=-1 \rightarrow A\beta-A\alpha=-1 \rightarrow A(\alpha-\beta)=1$

Vì $\alpha-\beta=\sqrt{5}$, ta tính được:

$$A=\frac{1}{\sqrt{5}}, B=-\frac{1}{\sqrt{5}}$$

Thế ngược các giá trị này vào biểu thức của $G(x)$:

$$G(x) = \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \frac{1}{1-\alpha x} - \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \frac{1}{1-\beta x}$$

Trích hệ số $[x^n]G(x)$ bằng khai triển cấp số nhân lùi vô hạn:

$$\begin{aligned} F_n &= [x^n]G(x) = \frac{1}{\sqrt{5}}[x^n]\frac{1}{1-\alpha x} - \frac{1}{\sqrt{5}}[x^n]\frac{1}{1-\beta x} \\ &\rightarrow F_n = \frac{1}{\sqrt{5}}\alpha^n - \frac{1}{\sqrt{5}}\beta^n = \frac{1}{\sqrt{5}}(\alpha^n - \beta^n) \end{aligned}$$

Thay lại α, β , ta được số hạng tổng quát của dãy Fibonacci:

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right)$$

✓ Kết Luận

Số hạng tổng quát của dãy Fibonacci là $F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right)$.

♦ Bài 1 ★★ — Bài Toán Lát Gạch Chữ Nhật Bằng Domino (Trung Bình)

Câu 45. Có bao nhiêu cách lát kín một hình chữ nhật kích thước 2×8 bằng các viên gạch domino có kích thước 2×1 (các viên gạch có thể đặt nằm ngang hoặc nằm dọc)?

Đáp số: 34 cách

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Bài toán lát gạch này dẫn đến dãy số Fibonacci kinh điển.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Thiết lập hệ thức quy hoạch động: Gọi a_n là số cách lát hình chữ nhật $2 \times n$. Xét cách đặt viên gạch cuối cùng bên phải của ô cờ $2 \times n$:

- Nếu viên gạch cuối cùng đặt **đọc**, phần còn lại cần lát là hình $2 \times (n - 1) \rightarrow$ có a_{n-1} cách.
- Nếu viên gạch cuối cùng đặt **ngang**, ta bắt buộc phải đặt hai viên gạch ngang đè lên nhau ở cuối hàng, phần còn lại cần lát là hình $2 \times (n - 2) \rightarrow$ có a_{n-2} cách.

Từ đó ta có hệ thức truy hồi:

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2} \text{ (với } n \geq 2)$$

Các giá trị cơ sở ban đầu: $a_0 = 1$ (cách lát rỗng), $a_1 = 1$ (chỉ 1 viên đặt dọc). Tính toán dãy số: $a_2 = 2, a_3 = 3, a_4 = 5, a_5 = 8, a_6 = 13, a_7 = 21, a_8 = 34$.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Tìm công thức bằng hàm sinh: Đặt $G(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$. Ta nhân x^n vào truy hồi và lấy tổng:

$$\begin{aligned} \sum_{n=2}^{+\infty} a_n x^n &= \sum_{n=2}^{+\infty} a_{n-1} x^n + \sum_{n=2}^{+\infty} a_{n-2} x^n \\ \rightarrow G(x) - a_0 - a_1 x &= x(G(x) - a_0) + x^2 G(x) \end{aligned}$$

Thay $a_0 = 1, a_1 = 1$ vào ta có phương trình:

$$G(x) - 1 - x = xG(x) - x + x^2 G(x) \rightarrow G(x)(1 - x - x^2) = 1$$

Do đó hàm sinh của dãy cách lát là:

$$G(x) = \frac{1}{1 - x - x^2}$$

Khai triển chuỗi lũy thừa của $\frac{1}{1 - x - x^2}$ cho ra đúng các số hạng $1 + x + 2x^2 + 3x^3 + 5x^4 + \dots + 34x^8 + \dots$. Hệ số $[x^8]G(x) = 34$.

✓ Kết Luận

Có tất cả **34 cách** lát hình chữ nhật.

♦ Bài 2 ★★★ — Dãy Số Jacobsthal Lát Gạch Nhiều Cỡ (Khó - Mới)

Câu 46. Có bao nhiêu cách lát kín hình chữ nhật $2 \times n$ bằng 3 loại gạch: gạch dọc 2×1 , gạch ngang 1×2 và gạch vuông 2×2 ? Tìm công thức tổng quát của dãy cách lát này bằng hàm sinh.

Đáp số: $a_n = \frac{2^{n+1} + (-1)^n}{3}$

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Bài toán lát gạch này có nhiều lựa chọn mảnh ghép hơn, dẫn đến hệ thức truy hồi bậc hai có hệ số.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Thiết lập hệ thức truy hồi: Gọi a_n là số cách lát hình chữ nhật $2 \times n$. Phân tích khối cuối cùng bên phải:

- Có 1 viên gạch dọc 2×1 đặt ở cuối: phần còn lại dài $n - 1 \rightarrow a_{n-1}$ cách.
- Có 2 viên gạch ngang 1×2 xếp chồng: phần còn lại dài $n - 2 \rightarrow a_{n-2}$ cách.
- Có 1 viên gạch vuông 2×2 đặt ở cuối: phần còn lại dài $n - 2 \rightarrow a_{n-2}$ cách.

Hệ thức truy hồi thu được:

$$a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2} \text{ (với } n \geq 2 \text{)}$$

Các giá trị cơ sở ban đầu: $a_0 = 1, a_1 = 1$. Tính vài số hạng đầu: $a_2 = 3, a_3 = 5, a_4 = 11, a_5 = 21$.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Giải bằng hàm sinh tìm công thức tổng quát: Đặt $G(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$.

$$\begin{aligned} \sum_{n=2}^{+\infty} a_n x^n &= \sum_{n=2}^{+\infty} a_{n-1} x^n + 2 \sum_{n=2}^{+\infty} a_{n-2} x^n \\ \rightarrow G(x) - 1 - x &= x(G(x) - 1) + 2x^2 G(x) \\ \rightarrow G(x)(1 - x - 2x^2) &= 1 \end{aligned}$$

Vậy hàm sinh của dãy là:

$$G(x) = \frac{1}{1 - x - 2x^2} = \frac{1}{(1 - 2x)(1 + x)}$$

Ta phân tích phân thức hữu tỉ thành các phân thức tối giản:

$$\frac{1}{(1 - 2x)(1 + x)} = \frac{A}{1 - 2x} + \frac{B}{1 + x}$$

Quy đồng hệ số tìm được $A = \frac{2}{3}$ và $B = \frac{1}{3}$. Khi đó:

$$G(x) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{1 - 2x} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1 + x}$$

Khai triển từng chuỗi lũy thừa hình thức:

$$G(x) = \frac{2}{3} \sum_{n=0}^{+\infty} 2^n x^n + \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{2^{n+1} + (-1)^n}{3} \right) x^n$$

Do đó công thức tổng quát là:

$$a_n = \frac{2^{n+1} + (-1)^n}{3}$$

✓ Kết Luận

Công thức tổng quát của số cách lát gạch là $a_n = \frac{2^{n+1} + (-1)^n}{3}$.

♦ Bài 3 ★★★ — Chuỗi Nhị Phân Không Chứa Ký Tự Trùng (Khó)

Câu 47. Đếm số lượng chuỗi nhị phân độ dài n không chứa 3 số 0 liên tiếp (tức là không chứa chuỗi con “000”). Áp dụng tính với $n = 6$.

Đáp số: $f(6) = 44$ chuỗi

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Ta xây dựng hệ thức bằng cách phân loại trạng thái ký tự cuối cùng của chuỗi con hợp lệ.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Xây dựng truy hồi dựa trên ký tự cuối cùng: Gọi $f(n)$ là số chuỗi nhị phân độ dài n hợp lệ. Xét ký tự cuối:

- Kết thúc bằng 1: Phần trước là chuỗi hợp lệ dài $n - 1 \rightarrow f(n - 1)$ cách.
- Kết thúc bằng 10: Phần trước là chuỗi hợp lệ dài $n - 2 \rightarrow f(n - 2)$ cách.
- Kết thúc bằng 100: Phần trước là chuỗi hợp lệ dài $n - 3 \rightarrow f(n - 3)$ cách.

Mọi trường hợp khác đều chứa “000” ở cuối nên bị loại bỏ. Ta có hệ thức truy hồi:

$$f(n) = f(n - 1) + f(n - 2) + f(n - 3)$$

Các giá trị cơ sở ban đầu:

- $f(0) = 1$
- $f(1) = 2$ (gồm “0”, “1”)
- $f(2) = 4$ (gồm “00”, “01”, “10”, “11”)
- $f(3) = 7$ (loại “000” từ 8 chuỗi)

Tính toán: $f(4) = 13$, $f(5) = 24$, $f(6) = 44$.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh: Nhân x^n vào truy hồi và lấy tổng từ $n = 3$:

$$G(x)(1 - x - x^2 - x^3) = f(0) + (f(1) - f(0))x + (f(2) - f(1) - f(0))x^2 = 1 + x + x^2$$

Do đó hàm sinh là:

$$G(x) = \frac{1 + x + x^2}{1 - x - x^2 - x^3}$$

Thực hiện chia đa thức ta được chuỗi: $G(x) = 1 + 2x + 4x^2 + 7x^3 + 13x^4 + 24x^5 + 44x^6 + \dots$ Hệ số $[x^6]G(x) = 44$.

✓ Kết Luận

Có tất cả **44 chuỗi** nhị phân thỏa mãn.

♦ Bài 4 ★★★★★ — Số Catalan và Bài Toán Ngoặc Hợp Lệ (Rất Khó - Mới)

Câu 48. Một dãy ngoặc hợp lệ gồm n dấu mở ngoặc “(” và n dấu đóng ngoặc “)”. Hãy xây dựng hàm sinh phi tuyến tính để tìm số lượng dãy ngoặc hợp lệ (số Catalan C_n).

Đáp số: $C_n = \frac{1}{n+1} C_2 n^n$

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là lớp bài toán có cấu trúc phân nhánh tựa cây, dẫn đến phương trình hàm sinh phi tuyến cực kỳ đặc sắc.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Biểu diễn cấu trúc đệ quy: Mọi dãy ngoặc hợp lệ phi rỗng A đều có thể phân tích một cách duy nhất thành dạng:

$$A = (B) C$$

trong đó B và C cũng là các dãy ngoặc hợp lệ (có thể rỗng). Giả sử dãy A có n cặp ngoặc. Nếu dãy B có k cặp ngoặc ($0 \leq k \leq n-1$), thì dãy C bắt buộc phải có $n-1-k$ cặp ngoặc. Do đó số dãy ngoặc hợp lệ C_n thỏa mãn hệ thức truy hồi tích chập phi tuyến:

$$C_n = \sum_{k=0}^{n-1} C_k C_{n-1-k} \text{ (với } C_0 = 1)$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Giải phương trình hàm sinh phi tuyến: Đặt $C(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} C_n x^n$. Lấy tổng hai vế hệ thức truy hồi ta được phương trình đại số:

$$C(x) = 1 + xC(x)^2 \rightarrow xC(x)^2 - C(x) + 1 = 0$$

Giải phương trình bậc hai đối với $C(x)$:

$$C(x) = \frac{1 - \sqrt{1 - 4x}}{2x}$$

(Ta chọn nghiệm dấu trừ vì khi $x \rightarrow 0$ thì $C(0) = C_0 = 1$). Áp dụng khai triển Newton cho căn thức $\sqrt{1-4x}$:

$$(1-4x)^{\frac{1}{2}} = 1 - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2n-1} C_2 n^n x^n$$

Thế vào biểu thức của $C(x)$ ta được:

$$C(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{n+1} C_2 n^n \right) x^n$$

Do đó số Catalan cần tìm là:

$$C_n = \frac{1}{n+1} C_2 n^n$$

✓ Kết Luận

Số dãy ngoặc hợp lệ là số Catalan $C_n = \frac{1}{n+1} C_2 n^n$.

Dạng V — Tuyển Chọn Các Bài Toán Hay & Olympic 🚀

♦ Bài 1 ★★★ — Chia Quà Điều Kiện Kết Hợp Phức Tạp (Khó)

Câu 49. Chia 18 món quà giống nhau cho 5 em học sinh phân biệt A, B, C, D, E sao cho:

- A nhận được trong khoảng từ 2 đến 5 món quà.
- B nhận được số chẵn món quà và nhận ít nhất 2 món.
- C, D, E mỗi em nhận được ít nhất 1 món quà.

Tính số cách phân phối thỏa mãn.

Đáp số: 584 cách

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Bài toán này chứa nhiều điều kiện kết hợp, giải bằng hàm sinh sẽ giúp tránh việc chia quá nhiều trường hợp nhỏ lẻ.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Đặt ẩn phụ dịch chuyển biến: Đặt a là số quà của A, b số quà của B, và c, d, e cho C, D, E. Ta có $a + b + c + d + e = 18$ với $2 \leq a \leq 5$, $b \in \{2, 4, 6, \dots\}$, và $c, d, e \geq 1$. Dịch chuyển biến để quy về không âm:

- Đặt $a' = a - 2 \in \{0, 1, 2, 3\}$.
- Đặt $b' = \frac{b-2}{2} \geq 0 \Rightarrow b = 2b' + 2$.
- Đặt $c' = c - 1 \geq 0$, $d' = d - 1 \geq 0$, $e' = e - 1 \geq 0$.

Thế vào phương trình tổng:

$$(a' + 2) + (2b' + 2) + (c' + 1) + (d' + 1) + (e' + 1) = 18$$

$$\rightarrow a' + 2b' + c' + d' + e' = 11$$

Ta phân loại tính toán theo giá trị của $a' \in \{0, 1, 2, 3\}$:

•

Gọi $S(m)$ là số nghiệm nguyên không âm của $c' + d' + e' = m - 2b'$. $S(m) = \sum_{b'=0}^{\left\lfloor \frac{m}{2} \right\rfloor} C_{m-2b'+2}^2$.

- Tính cụ thể cho từng trường hợp a' :

- Với $a' = 0$: $m = 11 \Rightarrow N_0 = C_{13}^2 + C_{11}^2 + C_9^2 + C_7^2 + C_5^2 + C_3^2 = 78 + 55 + 36 + 21 + 10 + 3 = 203$.
- Với $a' = 1$: $m = 10 \Rightarrow N_1 = C_{12}^2 + C_{10}^2 + C_8^2 + C_6^2 + C_4^2 + C_2^2 = 66 + 45 + 28 + 15 + 6 + 1 = 161$.
- Với $a' = 2$: $m = 9 \Rightarrow N_2 = C_{11}^2 + C_9^2 + C_7^2 + C_5^2 + C_3^2 = 55 + 36 + 21 + 10 + 3 = 125$.
- Với $a' = 3$: $m = 8 \Rightarrow N_3 = C_{10}^2 + C_8^2 + C_6^2 + C_4^2 + C_2^2 = 45 + 28 + 15 + 6 + 1 = 95$.

Tổng số cách chia: $N = 203 + 161 + 125 + 95 = 584$ cách.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh thường OGF: Thiết lập chuỗi hàm sinh cho từng học sinh:

- Học sinh A: $G_{A(x)} = x^2 + x^3 + x^4 + x^5 = x^2 \frac{1-x^4}{1-x}$
- Học sinh B: $G_{B(x)} = x^2 + x^4 + x^6 + \dots = \frac{x^2}{1-x^2}$
- Học sinh C, D, E: $G_{C(x)} = G_{D(x)} = G_{E(x)} = x + x^2 + x^3 + \dots = \frac{x}{1-x}$

Hàm sinh tổng thể tích chập:

$$G(x) = x^2 \frac{1-x^4}{1-x} \cdot \frac{x^2}{1-x^2} \cdot \left(\frac{x}{1-x} \right)^3 = \frac{x^7(1-x^4)}{(1-x)^4(1-x^2)}$$

Cần trích hệ số của x^{18} trong $G(x)$:

$$[x^{18}]G(x) = [x^{11}] \frac{1-x^4}{(1-x)^4(1-x^2)} = [x^{11}] \frac{1}{(1-x)^5(1+x)} - [x^7] \frac{1}{(1-x)^5(1+x)}$$

Khai triển đại số trên cho kết quả chính xác bằng **584**.

✓ Kết Luận

Có tất cả **584 cách** chia quà thỏa mãn.

♦ Bài 2 ★★★ — Đếm Số Tự Nhiên Có Tổng Các Chữ Số Bằng 12 (Khó)

Câu 50. Có bao nhiêu số tự nhiên có đúng 4 chữ số (trong khoảng từ 1000 đến 9999) sao cho tổng các chữ số của nó bằng 12?

Đáp số: 342 số

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Số cần đếm có dạng $abcd$ với chữ số hàng nghìn $a \in \{1, \dots, 9\}$ và các chữ số còn lại $b, c, d \in \{0, \dots, 9\}$. Tổng các chữ số là $a + b + c + d = 12$.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Đặt ẩn phụ dịch chuyển và dùng nguyên lý bù trừ: Đặt $a' = a - 1 \in \{0, \dots, 8\}$ để quy về không âm. Phương trình trở thành:

$$a' + b + c + d = 11 \text{ (với } a' \leq 8; b, c, d \leq 9)$$

- Số nghiệm không giới hạn trên: $S = C_{11+4-1}^{4-1} = C_{14}^3 = 364$.
- Tính vi phạm giới hạn trên:
 - A (Vi phạm $a' \geq 9$): đặt $a'' = a' - 9 \geq 0 \rightarrow a'' + b + c + d = 2 \rightarrow$ có $C_{2+4-1}^{4-1} = C_5^3 = 10$ nghiệm.

- B_i (Vi phạm b, c hoặc $d \geq 10$): Giả sử $b \geq 10$, đặt $b' = b - 10 \geq 0 \rightarrow a' + b' + c + d = 1 \rightarrow$ có $C_{1+4-1}^{4-1} = C_4^3 = 4$ nghiệm. Có 3 chữ số có thể vi phạm nên số vi phạm là $3 \cdot 4 = 12$.
- Giao các sự kiện vi phạm: Vì tổng kẹo chỉ bằng 11 nên không thể xảy ra đồng thời 2 vi phạm trở lên.
- Số lượng số thỏa mãn là:

$$N = |S| - |A| - 3|B_i| = 364 - 10 - 12 = 342 \text{ số.}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh: Hàm sinh chữ số hàng nghìn a : $G_{a(x)} = x + x^2 + \dots + x^9 = x \frac{1-x^9}{1-x}$. Hàm sinh cho các chữ số khác: $G_{i(x)} = 1 + x + \dots + x^9 = \frac{1-x^{10}}{1-x}$ (với $i = b, c, d$). Hàm sinh tích chập:

$$G(x) = x \frac{1-x^9}{1-x} \cdot \left(\frac{1-x^{10}}{1-x} \right)^3 = \frac{x(1-x^9)(1-x^{10})^3}{(1-x)^4}$$

Cần tìm hệ số $[x^{12}]G(x)$, tương đương $[x^{11}] \frac{1-x^9-3x^{10}+\dots}{(1-x)^4}$. Tính toán:

$$\begin{aligned} [x^{11}]G(x) &= [x^{11}] \frac{1}{(1-x)^4} - [x^2] \frac{1}{(1-x)^4} - 3[x^1] \frac{1}{(1-x)^4} \\ &= C_{14}^3 - C_5^3 - 3C_4^3 = 364 - 10 - 12 = 342 \text{ số.} \end{aligned}$$

✓ Kết Luận

Có tất cả **342 số** thỏa mãn yêu cầu.

♦ Bài 3 ★★★★★ — Tập Con Không Chứa Hai Phần Tử Liên Tiếp (Olympic - Mới)

Câu 51. Cho tập hợp $X = \{1, 2, \dots, n\}$. Chứng minh rằng số tập con của X không chứa bất kỳ hai số nguyên liên tiếp nào bằng số Fibonacci F_{n+2} . Hãy xây dựng và giải bài toán bằng phương pháp hàm sinh.

Đáp số: **Chứng minh bằng hệ thức truy hồi bậc hai và hàm sinh**

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán tổ hợp Olympic kinh điển. Chúng ta sẽ giải quyết triệt để bằng cách thiết lập phương trình hàm sinh thường.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Lập luận quy nạp xây dựng truy hồi: Gọi s_n là số tập con của $\{1, 2, \dots, n\}$ không chứa hai phần tử liên tiếp. Xét phần tử cuối cùng n :

- Nếu tập con **không chứa** n : các phần tử chỉ được chọn từ $\{1, 2, \dots, n-1\} \rightarrow$ có s_{n-1} cách chọn.
- Nếu tập con **chứa** n : tập con đó bắt buộc không được phép chứa $n-1$, do đó các phần tử còn lại chỉ được chọn từ $\{1, 2, \dots, n-2\} \rightarrow$ có s_{n-2} cách chọn.

Từ đó ta thu được hệ thức truy hồi:

$$s_n = s_{n-1} + s_{n-2} \text{ (với } n \geq 3)$$

Xét các trường hợp cơ sở:

- Với $n = 1$: tập con của $\{1\}$ là $\emptyset, \{1\} \rightarrow s_1 = 2 = F_3$.
- Với $n = 2$: tập con của $\{1, 2\}$ là $\emptyset, \{1\}, \{2\} \rightarrow s_2 = 3 = F_4$.

Dễ thấy bằng quy nạp $s_n = F_{n+2}$.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Giải hệ thức bằng hàm sinh thường: Quy ước $s_0 = 1$ (tập con của tập rỗng). Đặt $G(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} s_n x^n$. Lấy tổng từ $n = 2$:

$$\begin{aligned} \sum_{n=2}^{+\infty} s_n x^n &= \sum_{n=2}^{+\infty} s_{n-1} x^n + \sum_{n=2}^{+\infty} s_{n-2} x^n \\ \rightarrow G(x) - 1 - 2x &= x(G(x) - 1) + x^2 G(x) \\ \rightarrow G(x)(1 - x - x^2) &= 1 + x \end{aligned}$$

Do đó hàm sinh của dãy là:

$$G(x) = \frac{1+x}{1-x-x^2}$$

Ta biết hàm sinh của Fibonacci là $F(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} F_n x^n = \frac{x}{1-x-x^2}$. Biến đổi $G(x)$:

$$G(x) = \frac{1}{1-x-x^2} + \frac{x}{1-x-x^2}$$

Đồng nhất hệ số cho ra công thức số hạng tổng quát của s_n trùng khớp với số hạng của dãy Fibonacci lệch pha: $s_n = F_{n+2}$.

✓ Kết Luận

Số tập con không chứa hai số liên tiếp của $\{1, \dots, n\}$ là số Fibonacci F_{n+2} .

📦 Nhóm Bài — Phân Phôi Phân Biệt Vào Phòng (EGF + PIE)

Nếu thấy cụm bài này khó, hãy tạm quên chữ **EGF** trong 2 phút. Lỗi tư duy thật ra chỉ có một khung lặp lại:

- Trước hết đếm số cách xếp vào đúng k phòng đã chỉ định.
- Sau đó dùng **bao hàm – loại trừ** để ép điều kiện **không phòng nào trống**.

- Nếu đề thêm điều kiện lớp, ta gom điều kiện ấy vào một hàm $f(k)$, rồi vẫn PIE như cũ.

Bài	Gốc tư duy	Điểm mới
3.1 ★★	Đếm số cách xếp n HS vào k phòng, không phòng nào trống	Bài gốc
3.2 ★★★	Cùng lời như Bài 3.1 nhưng chuyển sang hỏi xác suất	Tách $ \Omega $ và $ A $
3.3 ★★★	Thêm điều kiện lớp ở bản thu nhỏ	Dựng $f(k)$
3.4 ★★★★★	Bài tổng hợp đầy đủ	Cùng khung, chỉ lớn hơn

Gốc Lý Thuyết Tối Thiểu Cần Nhớ

Khung 1 – Chưa có điều kiện lớp:

- Nếu bỏ điều kiện “không phòng nào trống”, mỗi học sinh chỉ đơn giản là chọn một phòng.
- Điều kiện “mọi phòng đều có người” được xử lý bằng **PIE**.

Khung 2 – Có thêm điều kiện lớp:

- Trước tiên, ta xét k phòng đã chỉ định và chỉ lo điều kiện lớp.
- Gọi $f(k)$ là số cách xếp thỏa điều kiện lớp vào đúng k phòng đó.
- Cuối cùng mới dùng PIE với $f(5), f(4), f(3), \dots$ để ép không phòng nào trống.

Quy Trình — Hàm Sinh

Quy trình 3 bước nên lặp đi lặp lại cho cả nhóm này:

- Bước 1: Tính số cách xếp trên đúng k phòng đã chỉ định.
- Bước 2: Nếu có điều kiện lớp, dựng $f(k)$.
- Bước 3: Dùng PIE để chuyển từ “đúng k phòng đã chỉ định” sang “mọi phòng đều có người”.

Cách Đọc $(e^x - 1)^k$ Và $f(k)$ Không Cần Sợ

- $e^x - 1$: một phòng **không trống**, vì phòng đó có thể nhận $1, 2, 3, \dots$ học sinh phân biệt.
- $(e^x - 1)^k$: có k phòng phân biệt, và phòng nào cũng không trống.
- $f(k)$: số cách xếp vào **đúng k phòng đã chỉ định** khi đề còn thêm luật kiểu “không có hai bạn cùng lớp chung phòng”.

Ví Dụ Siêu Nhỏ 1 — Toàn Ảnh Chỉ Là PIE Ở Cỡ Nhỏ

Xếp 3 học sinh phân biệt vào 2 phòng phân biệt, yêu cầu **mọi phòng có ít nhất một học sinh**.

Nhìn bằng PIE:

- Tổng số cách xếp tùy ý: $2^3 = 8$.
- Trừ 2 trường hợp xấu: cả 3 học sinh đều vào phòng 1 hoặc đều vào phòng 2.
- Vậy số cách tốt là $8 - 2 = 6$.

Nhìn bằng EGF:

- Một phòng không trống có EGF là $e^x - 1$.
- Hai phòng không trống có EGF là $(e^x - 1)^2$.
- Số cách xếp là:

$$3! \cdot [x^3](e^x - 1)^2 = 3! \cdot [x^3](e^{2x} - 2e^x + 1) = 2^3 - 2 \cdot 1^3 = 6$$

Bài học rút ra: **EGF không thay thế PIE**; nó là cách viết PIE bằng ngôn ngữ hệ số.

Ví Dụ Siêu Nhỏ 2 — $f(k)$ Xuất Hiện Tự Nhiên Như Thế Nào?

Xét 2 bạn lớp A và 2 bạn lớp B vào 3 phòng phân biệt, với luật: **không có hai bạn cùng lớp ở cùng một phòng**. Trước tiên ta **chưa ép mọi phòng đều có người**.

Gọi $f(3)$ là số cách xếp thỏa luật lớp vào đúng 3 phòng đã chỉ định.

- Hai bạn lớp A phải rơi vào hai phòng khác nhau, nên có $A_3^2 = 3 \cdot 2 = 6$ cách.
- Hai bạn lớp B cũng vậy, độc lập với lớp A , nên cũng có $A_3^2 = 6$ cách.
- Vậy:

$$f(3) = A_3^2 \cdot A_3^2 = 36$$

Nếu bây giờ mới thêm yêu cầu “không phòng nào trống”, ta mới dùng PIE:

- Trừ các cách có đúng một phòng bị bỏ trống: chọn phòng trống có C_3^1 cách.
- Khi đó chỉ còn 2 phòng hoạt động, và số cách thỏa luật lớp là $f(2) = A_2^2 \cdot A_2^2 = 4$.

Suy ra số cách hợp lệ là:

$$f(3) - C_3^1 f(2) + C_3^2 f(1) = 36 - 3 \cdot 4 + 0 = 24$$

Đây là lý do trong các bài lớn ta luôn làm theo đúng thứ tự:

- xây $f(k)$ trước,
- rồi mới PIE sau.

Ba Con Số Rất Hay Bị Trộn Lẫn

- k^n : xếp n học sinh vào k phòng, **cho phép phòng trống**, không có luật phụ.
- $k!S(n, k)$: xếp n học sinh vào k phòng, **không phòng nào trống**, không có luật phụ.
- $f(k)$: xếp vào đúng k phòng đã chỉ định, **có thể có luật phụ**, còn điều kiện phòng trống hay không sẽ xử lý sau bằng PIE.

Khi tách ba khái niệm này ra, cụm bài ảnh xạ sẽ bớt rối đi rất nhiều.

♦ Bài 3.1 ★★ — Đếm Ảnh Xạ Toàn: Phân Phối Phân Biệt Vào Phòng

Câu 52. Có bao nhiêu cách xếp 5 học sinh **phân biệt** vào 3 phòng học **phân biệt**, sao cho **mỗi phòng có ít nhất một học sinh**?

Đáp số: 150 cách

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài gốc của cả nhóm. Hiểu chắc bài này thì các bài sau chỉ là thêm một lớp điều kiện hoặc đổi sang bài xác suất.

🔵 Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Nhìn theo bao hàm – loại trừ:

- Nếu chưa bắt buộc mọi phòng đều có người, mỗi học sinh có 3 cách chọn phòng, nên có 3^5 cách.
- Trừ các cách có **ít nhất 1 phòng trống**: chọn phòng trống có C_3^1 cách, rồi 5 học sinh chỉ được vào 2 phòng còn lại nên có 2^5 cách.
- Nhưng khi **2 phòng cùng trống**, ta đã trừ hai lần, nên phải cộng bù lại: chọn 2 phòng trống có C_3^2 cách, tất cả học sinh dồn vào phòng còn lại nên có 1^5 cách.

Vậy:

$$N = 3^5 - C_3^1 \cdot 2^5 + C_3^2 \cdot 1^5 = 243 - 96 + 3 = 150$$

🟣 Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Đọc bằng EGF: Một phòng **không trống** có thể nhận 1, 2, 3, ... học sinh phân biệt, nên EGF của một phòng là:

$$g(x) = e^x - 1$$

Có 3 phòng phân biệt, nên hàm sinh tổng là:

$$F(x) = (e^x - 1)^3$$

Số cách xếp 5 học sinh là:

$$N = 5! \cdot [x^5](e^x - 1)^3$$

Khai triển:

$$(e^x - 1)^3 = e^{3x} - 3e^{2x} + 3e^x - 1$$

nên:

$$N = 5! \cdot [x^5](e^{3x} - 3e^{2x} + 3e^x - 1) = 3^5 - 3 \cdot 2^5 + 3 \cdot 1^5 = 150$$

✅ Kết Luận

Số cách xếp 5 HS phân biệt vào 3 phòng, mỗi phòng ≥ 1 : **150** cách.

♦ Bài 3.2 ★★★ — Xác Suất Cơ Bản: Tất Cả Phòng Không Trống

Câu 53. Xếp ngẫu nhiên 6 học sinh **phân biệt** vào 4 phòng học **phân biệt** (mỗi học sinh được xếp vào đúng một phòng). Tính xác suất p để **mỗi phòng có ít nhất một học sinh**.

Đáp số: $p = \frac{195}{512}$

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đề hỏi xác suất, nên ta tách đúng hai việc: đếm tất cả các cách xếp, rồi đếm các cách xếp thuận lợi.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuận Túy

Bước 1 – Không gian mẫu Ω : Mỗi học sinh chọn độc lập một trong 4 phòng. Vì có 6 học sinh nên:

$$|\Omega| = 4^6 = 4096$$

Bước 2 – Biến cố thuận lợi A : Điều kiện “mỗi phòng có ít nhất một học sinh” chính là bài toàn ánh từ 6 học sinh vào 4 phòng. Đây vẫn là cùng khung như Bài 3.1, chỉ khác số liệu:

$$\begin{aligned} |A| &= C_4^0 \cdot 4^6 - C_4^1 \cdot 3^6 + C_4^2 \cdot 2^6 - C_4^3 \cdot 1^6 + C_4^4 \cdot 0^6 \\ &= 4096 - 2916 + 384 - 4 = 1560 \end{aligned}$$

j	$(-1)^j C_4^j$	$(4-j)^6$	Tích	Tổng tích lũy
0	+1	$4^6 = 4096$	+4096	4096
1	-4	$3^6 = 729$	-2916	1180
2	+6	$2^6 = 64$	+384	1564
3	-4	$1^6 = 1$	-4	1560
4	+1	$0^6 = 0$	0	1560

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Bước 3 – Tính xác suất:

$$p = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{1560}{4096} = \frac{195}{512}$$

Liên hệ với EGF: phần đếm thuận lợi này cũng chính là

$$6! \cdot [x^6](e^x - 1)^4$$

nên bài xác suất này không phải là bài mới; nó chỉ là bài đếm toàn ánh rồi chia cho không gian mẫu.

✅ Kết Luận

$p = \frac{195}{512} \approx 38.09\%$. Phần lớn cách xếp sẽ có ít nhất một phòng trống.

♦ Bài 3.3 ★★★ — Kết Hợp Điều Kiện Lớp: EGF + PIE Hai Lớp

Câu 54. Có 2 học sinh lớp A (A_1, A_2), 2 học sinh lớp B (B_1, B_2), 2 học sinh lớp C (C_1, C_2) — tổng 6 học sinh phân biệt. Xếp ngẫu nhiên vào 3 phòng học phân biệt sao cho **mỗi phòng có ít nhất một học sinh**. Tính xác suất p để **không có phòng nào chứa hai học sinh cùng lớp**.

Đáp số: $p = \frac{16}{45}$

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bản thu nhỏ của Bài 3.4. Khung tư duy không đổi: trước tính $|\Omega|$, sau tính $|X|$ bằng cách dựng hàm $f(k)$.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Bước 1 – Tính $|\Omega|$: Nếu tạm bỏ điều kiện lớp, ta chỉ còn bài xếp 6 học sinh vào 3 phòng sao cho phòng nào cũng không trống. Vì vậy:

$$|\Omega| = C_3^0 \cdot 3^6 - C_3^1 \cdot 2^6 + C_3^2 \cdot 1^6 = 729 - 192 + 3 = 540$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Bước 2 – Dựng $f(k)$: gọi $f(k)$ là số cách xếp thỏa điều kiện lớp vào đúng k phòng đã chỉ định, **chưa cần quan tâm phòng trống**.

Nếu chỉ nhìn riêng lớp A , để A_1, A_2 không ở cùng phòng thì hai bạn này phải chọn **hai phòng khác nhau** trong k phòng. Số cách là:

$$A_k^2 = k(k-1)$$

Tương tự cho lớp B và lớp C . Do ba lớp độc lập nên:

$$f(k) = A_k^2 \cdot A_k^2 \cdot A_k^2 = [k(k-1)]^3$$

k	$A_k^2 = k(k-1)$	$f(k)$	Ghi chú
3	6	216	
2	2	8	
1	0	0	Không thể xếp 2 HS cùng lớp vào 1 phòng

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Bước 3 – Dùng PIE để ép cả 3 phòng đều có người:

$$|X| = C_3^0 f(3) - C_3^1 f(2) + C_3^2 f(1) = 216 - 3 \times 8 + 0 = 192$$

Bước 4 – Tính xác suất:

$$p = \frac{|X|}{|\Omega|} = \frac{192}{540} = \frac{16}{45}$$

So Sánh Với Bài 3.4

Bài 3.3 và Bài 3.4 cùng cấu trúc, chỉ khác về quy mô:

Bài	Phòng	Lớp	HS/lớp	$ \Omega $	p
3.3	3	A, B, C	2, 2, 2	540	$\frac{16}{45}$
3.4	5	A, B, C	3, 3, 2	126000	$\frac{11}{35}$

Kết Luận

$p = \frac{16}{45}$. Framework: $\text{EGF} \rightarrow |\Omega|$; $f(k) = [A_k^2]^3$; $\text{PIE} \rightarrow |X|$.

♦ Bài 3.4 ★★★★★ — Xếp Học Sinh Vào Phòng Không Cùng Lớp (Tổng Hợp)

Câu 55. Xếp ngẫu nhiên 3 học sinh lớp A , 3 học sinh lớp B , 2 học sinh lớp C vào 5 phòng học (học sinh phân biệt, phòng phân biệt). Gọi p là xác suất để **không có hai học sinh cùng lớp ở cùng phòng**, biết rằng **mỗi phòng có ít nhất một học sinh**. Tính $10^4 p$ (làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị).

Đáp số: 3143

Lời giải.

Phương pháp giải

Đây không phải bài mới về bản chất so với Bài 3.3. Nó chỉ là bản phóng to: số phòng tăng từ 3 lên 5, và sĩ số mỗi lớp đổi từ (2, 2, 2) thành (3, 3, 2).

Khung Tư Duy Giữ Nguyên

- $|\Omega|$: số cách xếp 8 học sinh vào 5 phòng sao cho không phòng nào trống.
- $|X|$: số cách xếp vừa không phòng nào trống, vừa không có hai học sinh cùng lớp ở cùng phòng.
- Điều kiện lớp được gom vào một hàm $f(k)$, rồi PIE lại được dùng thêm một lần để ép đủ 5 phòng đều có người.

Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Bước 1 — Tính $|\Omega|$:

Một phòng **không trống** có EGF là:

$$g(x) = e^x - 1$$

Có 5 phòng phân biệt nên hàm sinh tổng là:

$$F(x) = (e^x - 1)^5$$

Số cách xếp 8 học sinh vào 5 phòng, không phòng nào trống, là:

$$|\Omega| = 8! \cdot [x^8](e^x - 1)^5$$

Hay viết theo PIE:

$$\begin{aligned} |\Omega| &= 5^8 - C_5^1 \cdot 4^8 + C_5^2 \cdot 3^8 - C_5^3 \cdot 2^8 + C_5^4 \cdot 1^8 \\ &= 390625 - 327680 + 65610 - 2560 + 5 = \mathbf{126000} \end{aligned}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Bước 2 — Tính $|X|$ qua hàm $f(k)$:

Gọi $f(k)$ là số cách xếp thỏa điều kiện lớp vào đúng k phòng đã chỉ định, **chưa cần quan tâm phòng trống**.

- Với lớp A : có 3 học sinh, mỗi phòng chứa tối đa 1 học sinh lớp A , nên các em phải vào 3 phòng khác nhau. Số cách là A_k^3 .
- Với lớp B : hoàn toàn tương tự, có A_k^3 cách.
- Với lớp C : có 2 học sinh, nên có A_k^2 cách.

Do đó:

$$f(k) = A_k^3 \cdot A_k^3 \cdot A_k^2$$

k	A_k^3	A_k^3	A_k^2	$f(k)$
5	60	60	20	72000
4	24	24	12	6912
3	6	6	6	216
$k \leq 2$	—	—	—	0

Ghi chú: $f(k) = 0$ với $k \leq 2$ vì riêng lớp A đã có 3 học sinh, mà mỗi phòng chỉ được chứa tối đa 1 học sinh lớp A .

Dùng PIE để ép đủ 5 phòng đều có người:


$$\begin{aligned} |X| &= C_5^0 f(5) - C_5^1 f(4) + C_5^2 f(3) \\ &= 72000 - 5 \times 6912 + 10 \times 216 = 72000 - 34560 + 2160 = \mathbf{39600} \end{aligned}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Bước 3 — Tính xác suất:

$$p = \frac{|X|}{|\Omega|} = \frac{39600}{126000} = \frac{11}{35}$$
$$10^4 p = 10000 \times \frac{11}{35} = \frac{110000}{35} = \frac{22000}{7} \approx 3142.857...$$

Làm tròn đến hàng đơn vị: $10^4 p = \mathbf{3143}$.



✔ Kết Luận

$|\Omega| = 126000, |X| = 39600, p = \frac{11}{35}, 10^4 p = \mathbf{3143}.$

○ Ý Tưởng Chia Khóa Trước Khi Làm Bài Bàn Tròn

Nếu cứ nhìn trực tiếp vào các ghế trên vòng tròn, ta rất dễ rối vì ghế đầu và ghế cuối cũng kề nhau. Cách nhìn ổn định hơn là:

- Chọn các ghế ngồi làm các **mốc**.
- Đếm số ghế trống nằm giữa hai mốc liên tiếp theo chiều kim đồng hồ.

Ví dụ chọn 3 ghế trên vòng tròn thì luôn sinh ra đúng 3 khoảng trống x_1, x_2, x_3 . Tổng của chúng luôn bằng số ghế trống toàn bàn. Vì thế bài bàn tròn lại quay về bài:

$$x_1 + x_2 + x_3 = \text{số ghế trống},$$

kèm các chặn dưới như $x_i \geq 1$ hoặc $x_i \geq 2$.

Nói ngắn gọn: **bài bàn tròn khó ở hình vẽ, nhưng lõi đại số vẫn là vách ngăn + hàm sinh.**

♦ Bài 4 ★★★★★ — Chọn Ghế Bàn Tròn Không Kề Nhau (Nâng Cao)

Câu 56. Một bàn tròn có 8 chiếc ghế được đánh số thứ tự từ 1 đến 8 quanh bàn. Người ta muốn chọn ra 3 chiếc ghế sao cho không có bất kỳ hai chiếc ghế nào được chọn cạnh nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chọn thỏa mãn?

Đáp số: 16 cách

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài mở đầu cho cụm bàn tròn. Ta sẽ giải theo hai góc nhìn: đường thẳng hóa để kiểm tra trực giác, và hàm sinh khoảng cách để thấy bài thật ra chỉ là bài chia 5 ghế trống vào 3 khoảng trống có chặn dưới 1.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Phương pháp tổ hợp đường thẳng hóa: Ta chia làm hai trường hợp dựa trên trạng thái của ghế số 1:

- **Trường hợp 1: Ghế số 1 được chọn.** Do không có hai ghế kề nhau được chọn, ghế số 2 và ghế số 8 chắc chắn không được chọn. Ta còn lại 5 ghế liên tiếp $\{3, 4, 5, 6, 7\}$, cần chọn ra 2 ghế không kề nhau từ nhóm này. Bài toán chọn 2 vật không kề nhau từ 5 vật thẳng hàng tương đương xếp 3 vật không chọn và 2 vật chọn vào vách ngăn. Số cách chọn là:

$$N_1 = C_{3+1}^2 = C_4^2 = 6 \text{ cách.}$$

- **Trường hợp 2: Ghế số 1 không được chọn.** Ta cần chọn 3 ghế không kề nhau từ 7 ghế liên tiếp $\{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ thẳng hàng. Tương tự, số cách chọn 3 vật không kề nhau từ 7 vật thẳng hàng là:

$$N_2 = C_{4+1}^3 = C_5^3 = 10 \text{ cách.}$$

Tổng số cách chọn thỏa mãn là:

$$N = N_1 + N_2 = 6 + 10 = 16 \text{ cách.}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh khoảng cách ghế trống: Gọi 3 ghế được chọn theo thứ tự vòng tròn là A, B, C . Gọi số lượng ghế trống ở giữa A và B là x_1 , giữa B và C là x_2 , giữa C và A là x_3 .

- Vì không có hai ghế nào được chọn kề nhau nên giữa mỗi cặp ghế chọn phải có ít nhất 1 ghế trống: $x_1, x_2, x_3 \geq 1$.
- Tổng số ghế trống trên vòng tròn là $8 - 3 = 5$ ghế. Do đó ta có phương trình:

$$x_1 + x_2 + x_3 = 5 \text{ (với } x_i \geq 1)$$

Hàm sinh cho mỗi biến khoảng cách $x_i \geq 1$ là $G_{i(x)} = x^1 + x^2 + \dots = \frac{x}{1-x}$. Hàm sinh cho tổng số ghế trống là:

$$G_{S(x)} = \left(\frac{x}{1-x} \right)^3 = \frac{x^3}{(1-x)^3}$$

Số bộ nghiệm (x_1, x_2, x_3) là hệ số của x^5 trong $G_{S(x)}$:

$$N_{\text{bộ}} = [x^5] \frac{x^3}{(1-x)^3} = [x^2] \frac{1}{(1-x)^3} = C_{2+3-1}^{3-1} = C_4^2 = 6 \text{ bộ nghiệm.}$$

Mỗi bộ nghiệm (x_1, x_2, x_3) (ví dụ bộ $(1, 2, 2)$) cho biết khoảng cách ghế trống giữa 3 chiếc ghế được chọn.


- Để xác định vị trí thực tế trên bàn tròn, ta chọn vị trí cho ghế đầu tiên A trong số 8 ghế $\rightarrow$ có 8 cách chọn. Sau đó vị trí của B và C sẽ được xác định duy nhất theo khoảng cách đã chọn.
- Tuy nhiên, vì tập hợp 3 ghế chọn $\{A, B, C\}$ không phân biệt thứ tự, nên mỗi tập hợp ghế sẽ bị đếm lặp lại đúng 3 lần (do hoán vị vai trò của 3 ghế).
- Do đó, số cách chọn thực tế là:

$$N = \frac{8}{3} \cdot N_{\text{bộ}} = \frac{8}{3} \cdot 6 = 16 \text{ cách.}$$

✓ Kết Luận

Có tất cả **16 cách** chọn 3 chiếc ghế thỏa mãn.

 **Trực Quan Hóa Bài Toán Bàn Tròn (Xoay Vòng)**



○ Gỡ Rối Bài Bàn Tròn: Đừng Đếm Ghế Trực Tiếp, Hãy Đếm Các Khoảng Trống

Với bài bàn tròn, cảm giác khó thường đến từ việc đầu và cuối dính vào nhau. Cách gỡ là:

- Đánh dấu các ghế đã chọn là các “mốc”.
- Đi theo chiều kim đồng hồ và đếm số ghế trống nằm **giữa hai mốc liên tiếp**.
- Khi chọn r ghế trên vòng tròn n ghế, ta luôn tạo ra đúng r khoảng trống $x_1, x_2, \dots, x_r$ và:

$$x_1 + x_2 + \dots + x_r = n - r$$

Lúc ấy bài bàn tròn không còn là bài “hình tròn” nữa mà quay về bài **chia tổng $n - r$ vào r biến có chặn dưới**, tức là quay về gốc **vách ngăn + hàm sinh**.

🔄 Vì Sao Luôn Có Nhân $\frac{n}{r}$?

Sau khi tìm được một bộ khoảng trống $(x_1, x_2, \dots, x_r)$:

- Chọn vị trí cho một ghế được chọn làm mốc bắt đầu: có n cách.
- Từ mốc đó, bộ khoảng trống sẽ xác định duy nhất toàn bộ cấu hình.
- Nhưng một tập ghế thực tế có đúng r cách chọn mốc bắt đầu, vì có đúng r ghế được chọn.

Vì vậy:

$$\text{số cấu hình thực} = \frac{n}{r} \cdot \text{số bộ khoảng trống}$$

Bài 4 phía dưới là trường hợp $x_i \geq 1$. Bài 5 chỉ khác một điểm: đổi thành $x_i \geq 2$.

♦ Bài 5 ★★★★★ — Chọn Ghế Bàn Tròn Cách Nhau Ít Nhất m Ghế Trống (Bản Lĩnh Hàm Sinh)

Câu 57. Có 12 chiếc ghế được xếp thành một vòng tròn quanh một bàn tiệc lớn. Một nhóm gồm 3 người muốn chọn ra 3 chiếc ghế để ngồi sao cho giữa hai người được chọn bất kỳ luôn có ít nhất 2 chiếc ghế trống phân cách ở giữa. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 3 chiếc ghế như vậy?

Đáp số: 40 cách

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Bài này không phải một mẹo mới tách rời khỏi Bài 4. Nó là **đúng cùng khuôn giải**, chỉ thay điều kiện khoảng trống từ $x_i \geq 1$ thành $x_i \geq 2$. Nói gọn: ta vẫn đổi bài chọn ghế trên vòng tròn thành bài chia 9 ghế trống vào 3 khoảng trống có chặn dưới.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Đặt thẳng hàng và chia trường hợp: Đánh số các ghế từ 1 đến 12 theo chiều kim đồng hồ. Ta chia thành hai trường hợp dựa trên trạng thái của chiếc ghế số 1:

- **Trường hợp 1: Ghế số 1 được chọn.** Do ghế số 1 được chọn, nên các ghế kề bên của nó theo vòng tròn phải trống:
 - Phía bên phải: Ghế 2, Ghế 3 phải trống.
 - Phía bên trái: Ghế 11, Ghế 12 phải trống.

Như vậy, 2 chiếc ghế còn lại chỉ có thể được chọn trong các ghế từ 4 đến 10 (tập gồm 7 chiếc ghế liên tiếp thẳng hàng). Đồng thời, giữa hai chiếc ghế được chọn trong đoạn này cũng phải cách nhau ít nhất 2 ghế trống. Gọi khoảng cách trống trước ghế chọn đầu tiên, giữa 2 ghế chọn, và sau ghế chọn thứ hai lần lượt là a, b, c (trong phạm vi đoạn 7 ghế từ 4 đến 10). Tổng số ghế trống của đoạn 7 ghế là $7 - 2 = 5$ ghế. Ta có phương trình:

$$a + b + c = 5 \text{ (với } b \geq 2 \text{ và } a, c \geq 0)$$

Đặt $b' = b - 2 \geq 0 \rightarrow a + b' + c = 3$. Số cách chọn là: $C_{3+3-1}^{3-1} = C_5^2 = 10$ cách.

- **Trường hợp 2: Ghế số 1 không được chọn.** Ta chọn 3 ghế từ 11 ghế liên tiếp $\{2, 3, \dots, 12\}$ thẳng hàng sao cho khoảng cách giữa hai ghế chọn bất kỳ ít nhất là 2 ghế trống. Gọi số ghế trống trước ghế chọn thứ nhất là a , giữa ghế thứ nhất và hai là b , giữa ghế thứ hai và ba là c , và sau ghế thứ ba là d . Tổng số ghế trống trong đoạn 11 ghế là $11 - 3 = 8$ ghế. Do đó ta có:

$$a + b + c + d = 8 \text{ (với } b, c \geq 2 \text{ và } a, d \geq 0)$$

Đồng thời, do ghế số 1 trống và vòng tròn khép kín, khoảng cách từ ghế cuối (trong đoạn 11 ghế) vòng quanh ghế 1 đến ghế đầu phải ít nhất là 2 ghế trống. Vì ghế 1 trống nằm ở giữa nên khoảng cách thực tế là $a + d + 1 \geq 2 \rightarrow a + d \geq 1$. Ta đi tìm số nghiệm của hệ:

$$a + b + c + d = 8 \text{ (với } b, c \geq 2, a + d \geq 1)$$

- Số nghiệm nếu không có điều kiện $a + d \geq 1$: Đặt $b' = b - 2 \geq 0, c' = c - 2 \geq 0 \rightarrow a + b' + c' + d = 4$. Số nghiệm là $C_{4+4-1}^{4-1} = C_7^3 = 35$ nghiệm.
- Trừ đi các trường hợp vi phạm $a + d = 0 \rightarrow a = 0$ và $d = 0$: Khi đó $b' + c' = 4$. Số nghiệm là $C_{4+2-1}^{2-1} = C_5^1 = 5$ nghiệm.
- Vậy số cách ở trường hợp này là: $35 - 5 = 30$ cách.

Tổng số cách chọn thỏa mãn là: $10 + 30 = 40$ cách.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh khoảng cách ghế trống: Gọi 3 ghế được chọn theo thứ tự vòng tròn là A, B, C . Gọi số lượng ghế trống ở giữa A và B là x_1 , giữa B và C là x_2 , giữa C và A là x_3 .

- Hãy xem A, B, C như 3 “cọc mốc” trên vòng tròn. Ba mốc này cắt vòng tròn thành đúng 3 đoạn ghế trống, nên việc chọn ghế thực ra tương đương với việc chọn bộ (x_1, x_2, x_3) .
- Vì giữa hai ghế được chọn bất kỳ phải có ít nhất 2 ghế trống phân cách nên: $x_1, x_2, x_3 \geq 2$.
- Tổng số ghế trống trên vòng tròn là $12 - 3 = 9$ ghế. Do đó ta lập được phương trình khoảng cách ghế trống:

$$x_1 + x_2 + x_3 = 9 \text{ (với } x_i \geq 2 \text{)}$$

- Hàm sinh cho mỗi biến khoảng cách $x_i \geq 2$ (bước nhảy $d = 1$, bắt đầu từ số mũ 2) là:

$$G_{i(x)} = x^2 + x^3 + x^4 + \dots = \frac{x^2}{1-x}$$

- Hàm sinh cho tổng số ghế trống (tích các hàm sinh thành phần):

$$G_{S(x)} = \left(\frac{x^2}{1-x} \right)^3 = \frac{x^6}{(1-x)^3}$$

- Số bộ nghiệm (x_1, x_2, x_3) chính là hệ số của x^9 trong $G_{S(x)}$:

$$N_{\text{bộ}} = [x^9] \frac{x^6}{(1-x)^3} = [x^3] \frac{1}{(1-x)^3}$$

Áp dụng công thức nhị thức âm với $n = 3, k = 3$:

$$N_{\text{bộ}} = C_{3+3-1}^{3-1} = C_5^2 = 10 \text{ bộ nghiệm.}$$

- Để xác định vị trí thực tế trên vòng tròn 12 ghế: ta chọn vị trí ghế đầu tiên A trong số 12 ghế

→

có 12 cách chọn. Vị trí của B và C sẽ được xác định duy nhất dựa trên bộ khoảng cách trống (x_1, x_2, x_3) .


- Tuy nhiên, do 3 ghế chọn $\{A, B, C\}$ không phân biệt thứ tự chọn nên mỗi tập hợp ghế sẽ bị đếm lặp lại đúng 3 lần (hoán vị xoay vòng của 3 ghế).
- Do đó, số cách chọn thực tế là:

$$N = \frac{12}{3} \cdot N_{\text{bộ}} = 4 \cdot 10 = 40 \text{ cách.}$$

✓ Kết Luận

Có tất cả **40 cách** chọn 3 chiếc ghế thỏa mãn.

 **Trực Quan Hóa Bàn Tròn 12 Ghế (Khoảng cách tối thiểu $m = 2$)**



♦ Bài 6 ★★★★★ — Chọn Tập Con Có Tổng Các Phần Tử Cho Trước (Đại Số Hóa Tập Con)

Câu 58. Cho tập hợp $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$. Hỏi có bao nhiêu tập con của S sao cho tổng các phần tử của tập con đó bằng đúng 12?

Đáp số: 10 tập con

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán đếm tập con có tổng cho trước (Subset Sum Problem) trong lý thuyết tập hợp phổ thông. Nếu giải bằng phương pháp liệt kê trực tiếp sẽ dễ dẫn đến sai sót vì có nhiều tập con với kích thước khác nhau (từ 2 đến 4 phần tử) cùng tạo nên tổng 12. Phương pháp hàm sinh sẽ biến quá trình liệt kê thủ công thành các phép nhân đại số chuẩn xác.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Lập luận trực tiếp và phân tích theo kích thước tập con: Gọi A là tập con của $S = \{1, 2, \dots, 8\}$ sao cho tổng các phần tử của A bằng 12. Ta phân tích số 12 thành tổng các số nguyên dương phân biệt trong S :

- **Trường hợp 1: Tập con có 1 phần tử.** Không thể xảy ra vì phần tử lớn nhất của S chỉ là 8.
- **Trường hợp 2: Tập con có 2 phần tử $\{a, b\} \subset S$ với $a < b$.** Ta tìm các cặp số có tổng bằng 12: $a + b = 12 \rightarrow \{4, 8\}, \{5, 7\}$. $\rightarrow$ Có 2 tập con.
- **Trường hợp 3: Tập con có 3 phần tử $\{a, b, c\} \subset S$ với $a < b < c$.** Ta tìm các bộ ba số có tổng bằng 12:
 - Nếu $a = 1$: $b + c = 11 \rightarrow \{1, 3, 8\}, \{1, 4, 7\}, \{1, 5, 6\}$.
 - Nếu $a = 2$: $b + c = 10 \rightarrow \{2, 3, 7\}, \{2, 4, 6\}$.
 - Nếu $a = 3$: $b + c = 9 \rightarrow \{3, 4, 5\}$.

$\rightarrow$ Có 6 tập con.

- **Trường hợp 4: Tập con có 4 phần tử $\{a, b, c, d\} \subset S$ với $a < b < c < d$.** Ta tìm các bộ bốn số có tổng bằng 12. Nhận xét bộ bốn nhỏ nhất là $\{1, 2, 3, 4\}$ có tổng bằng 10.

▸ Nếu ta tăng các phần tử lên để có tổng bằng 12:

- $\{1, 2, 3, 6\}$ (tổng $1 + 2 + 3 + 6 = 12$, thỏa mãn).
- $\{1, 2, 4, 5\}$ (tổng $1 + 2 + 4 + 5 = 12$, thỏa mãn).

→ Có 2 tập con.

- **Trường hợp 5: Tập con có từ 5 phần tử trở lên.** Tập con 5 phần tử nhỏ nhất của S là $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ đã có tổng bằng $15 > 12$. Do đó không tồn tại tập con nào có 5 phần tử trở lên thỏa mãn.

Tổng số tập con thỏa mãn là: $2 + 6 + 2 = 10$ tập con.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng phương pháp hàm sinh: Mỗi số nguyên $k \in S = \{1, 2, \dots, 8\}$ được quyền xuất hiện đúng 0 hoặc 1 lần trong tập con được chọn.

- Sự lựa chọn của số k được đại số hóa bằng hàm sinh thành phần:

$$G_{k(x)} = x^0 + x^k = 1 + x^k$$

Trong đó, $x^0 = 1$ tương ứng với không chọn số k , còn x^k tương ứng với việc đưa số k vào tập con.

- Hàm sinh tổng thể cho tổng các phần tử của tập con là tích của 8 hàm sinh thành phần:

$$G(x) = (1 + x)(1 + x^2)(1 + x^3)(1 + x^4)(1 + x^5)(1 + x^6)(1 + x^7)(1 + x^8)$$

- Số tập con có tổng phần tử bằng 12 chính là hệ số đứng trước $x^{\{12\}}$ trong khai triển của $G(x)$. Ta tìm $[x^{\{12\}}]G(x)$ bằng cách nhân phân phối thông minh qua hai nhóm đa thức:

$$A(x) = (1 + x)(1 + x^2)(1 + x^3)(1 + x^4)$$

$$B(x) = (1 + x^5)(1 + x^6)(1 + x^7)(1 + x^8)$$

Khai triển đa thức $A(x)$:

- Nhân 2 nhân tử đầu: $(1 + x)(1 + x^2) = 1 + x + x^2 + x^3$.
- Nhân tiếp với $(1 + x^3)$: $(1 + x + x^2 + x^3)(1 + x^3) = 1 + x + x^2 + 2x^3 + x^4 + x^5 + x^6$.
- Nhân tiếp với $(1 + x^4)$:

$$A(x) = (1 + x + x^2 + 2x^3 + x^4 + x^5 + x^6)(1 + x^4)$$

$$A(x) = 1 + x + x^2 + 2x^3 + 2x^4 + 2x^5 + 2x^6 + 2x^7 + x^8 + x^9 + x^{\{10\}}$$

Khai triển đa thức $B(x)$, ta chỉ giữ lại các lũy thừa có số mũ không vượt quá 12:

$$B(x) = 1 + x^5 + x^6 + x^7 + x^8 + x^{11} + x^{12} + o(x^{12})$$

Tìm hệ số $[x^{\{12\}}]G(x) = [x^{\{12\}}](A(x) \cdot B(x))$ bằng cách lấy tổng các tích $[x^m]A(x) \cdot [x^{\{12-m\}}]B(x)$ với các số mũ $12 - m$ có mặt trong $B(x)$:

- Với $12 - m = 12R \rightarrow m = 0R \rightarrow [x^0]A(x) \cdot [x^{\{12\}}]B(x) = 1 \cdot 1 = 1$.
- Với $12 - m = 11R \rightarrow m = 1R \rightarrow [x^1]A(x) \cdot [x^{\{11\}}]B(x) = 1 \cdot 1 = 1$.

- Với $12 - m = 8R \rightarrow m = 4R \rightarrow [x^4]A(x) \cdot [x^8]B(x) = 2 \cdot 1 = 2$.
- Với $12 - m = 7R \rightarrow m = 5R \rightarrow [x^5]A(x) \cdot [x^7]B(x) = 2 \cdot 1 = 2$.
- Với $12 - m = 6R \rightarrow m = 6R \rightarrow [x^6]A(x) \cdot [x^6]B(x) = 2 \cdot 1 = 2$.
- Với $12 - m = 5R \rightarrow m = 7R \rightarrow [x^7]A(x) \cdot [x^5]B(x) = 2 \cdot 1 = 2$.

Các trường hợp khác đều có hệ số bằng 0.

Cộng các tích thành phần:

$$[x^{12}]G(x) = 1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 \text{ tập con.}$$

Hàm sinh biến bài toán chọn phần tử có điều kiện phức tạp thành phép cộng nhân đại số vô cùng mạch lạc và không thể nhầm lẫn.

✓ Kết Luận

Có tất cả **10 tập con** thỏa mãn.

♦ Bài 7 ★★★★★ — Xác Suất Bi Phát Sáng và Hàm Sinh Smirnov (Olympic/HSG Quốc Gia)

Câu 59. Có 8 viên bi màu đỏ được đánh số từ 1 đến 8, 5 viên bi màu xanh được đánh số từ 1 đến 5, và 3 viên bi màu đen được đánh số từ 1 đến 3. Tiến hành xếp ngẫu nhiên 16 viên bi này thành một hàng ngang. Biết rằng mỗi viên bi mà được xếp cạnh viên bi cùng màu thì nó sẽ được phát sáng. Gọi p là xác suất để có đúng 2 viên bi được phát sáng. Tính giá trị của $10^6 p$ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Đáp số: 8081

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán đếm số cách sắp xếp chuỗi có ràng buộc kề nhau cực kỳ kinh điển trong các đề thi học sinh giỏi và Olympic. Ta có tổng cộng $N = 16$ viên bi có đánh số phân biệt, do đó số phần tử của không gian mẫu là $|\Omega| = 16!$. Ràng buộc phát sáng: “một viên bi phát sáng khi và chỉ khi nó nằm cạnh ít nhất một viên bi cùng màu”. Như vậy, một khối các viên bi cùng màu có độ dài L :

- Nếu $L = 1$: Viên bi đứng cô lập, có 0 viên phát sáng.
- Nếu $L \geq 2$: Cả L viên bi trong khối đều đứng cạnh ít nhất một viên cùng màu, có đúng L viên phát sáng.

Do đó, để có **đúng 2 viên bi phát sáng**, điều kiện bắt buộc là phải có **đúng 1 khối cùng màu có độ dài bằng 2**, còn tất cả các viên bi khác của mọi màu đều đứng cô lập (khối độ dài 1). Ta sẽ giải bài toán đếm số cách xếp vị trí màu thỏa mãn, rồi nhân với hoán vị các viên bi cùng màu $8! \cdot 5! \cdot 3!$.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Tủy

Lập luận tổ hợp và áp dụng nguyên lý Bao hàm - Loại trừ (PIE): Giả sử ta xếp 8 chữ D (Đỏ), 5 chữ X (Xanh) và 3 chữ "Den" (Đen). Ta cần tìm số cách xếp có đúng 1 cặp chữ cái cùng màu đứng cạnh nhau (1 liên kết cùng màu). Tổng số vị trí liên kết cùng màu tối đa có thể chọn là: $(8 - 1) + (5 - 1) + (3 - 1) = 13$ liên kết. Gọi W_s là số cách chọn ra s liên kết cùng màu bất kỳ, gộp các chữ cái bị liên kết lại thành các khối lớn, rồi sắp xếp các khối này. Giả sử trong s liên kết được chọn có i liên kết màu Đỏ, j liên kết màu Xanh, và k liên kết màu Đen ($i + j + k = s$):

- Số cách chọn các liên kết là: $C_7^i \cdot C_4^j \cdot C_2^k$.
- Khi đã gộp các liên kết, số khối còn lại là: Đỏ có $8 - i$ khối, Xanh có $5 - j$ khối, Đen có $3 - k$ khối. Tổng số khối là $16 - s$.
- Số cách xếp các khối là: $\frac{(16 - s)!}{(8 - i)!(5 - j)!(3 - k)!}$.

Do đó:

$$W_s = \sum_{i+j+k=s} C_7^i \cdot C_4^j \cdot C_2^k \cdot \frac{(16 - s)!}{(8 - i)!(5 - j)!(3 - k)!}$$

Theo Nguyên lý bao hàm - loại trừ mở rộng, số cách xếp có **đúng 1 liên kết cùng màu** là:

$$P(1) = \sum_{s=1}^{13} (-1)^{s-1} C_s^1 W_s = \sum_{s=1}^{13} (-1)^{s-1} s W_s$$

Tính toán cụ thể các giá trị W_s :

- $W_1 = 3693690$, $W_2 = 8642634$, $W_3 = 12267684$, $W_4 = 11824164$, ...

Thay vào công thức ta thu được kết quả:

$$P(1) = 5824 \text{ cách xếp vị trí màu.}$$

Do các viên bi cùng màu được đánh số phân biệt, ta nhân với hoán vị các viên bi cùng màu:

$$N = P(1) \cdot 8! \cdot 5! \cdot 3! = 5824 \cdot 40320 \cdot 120 \cdot 6 = 1690629734400 \text{ cách.}$$

Xác suất để có đúng 2 viên bi phát sáng là:

$$p = \frac{N}{16!} = \frac{5824 \cdot 8! \cdot 5! \cdot 3!}{16!} = \frac{4}{495} \approx 0.0080808$$

Giá trị cần tính là:

$$10^6 p = 10^6 \cdot \frac{4}{495} \approx 8080.808$$

Làm tròn đến hàng đơn vị, ta được **8081**.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng phương pháp Hàm sinh Smirnov nâng cao (Vũ khí tối thượng): Theo lý thuyết đếm chuỗi, hàm sinh cho các từ Smirnov (từ không có hai chữ cái kề nhau nào cùng màu) trên các biến x, y, z đại diện cho Đỏ, Xanh, Đen là:

$$\Phi(x, y, z) = \frac{1}{1 - \left(\frac{x}{1+x} + \frac{y}{1+y} + \frac{z}{1+z} \right)}$$

Để đếm số cách xếp sao cho có đúng 1 khối cùng màu độ dài 2, còn tất cả các khối khác có độ dài 1, ta đưa vào biến đánh dấu t kiểm soát khối độ dài 2. Ta thay thế (substitution) mỗi biến bằng hàm sinh thành phần của khối:

- Khối màu Đỏ (hoặc Xanh, Đen) có thể có độ dài 1 (trọng số x) hoặc độ dài 2 (trọng số tx^2):

$$x \rightarrow x + tx^2, \quad y \rightarrow y + ty^2, \quad z \rightarrow z + tz^2$$

Thế các biểu thức trên vào hàm sinh Smirnov, ta thu được hàm sinh tổng thể cho các từ có cấu trúc khối:

$$G(x, y, z, t) = \frac{1}{1 - \left(\frac{x + tx^2}{1 + x + tx^2} + \frac{y + ty^2}{1 + y + ty^2} + \frac{z + tz^2}{1 + z + tz^2} \right)}$$

Số cách xếp các vị trí màu thỏa mãn chính là hệ số đứng trước số hạng $x^8 y^5 z^3 t^1$ trong khai triển của $G(x, y, z, t)$:

$$P(1) = [x^8 y^5 z^3 t^1] G(x, y, z, t)$$

Khai triển đa thức $G(x, y, z, t)$ theo biến t đến bậc 1:

$$G(x, y, z, t) = G(x, y, z, 0) + t \cdot \left(\frac{dG}{dt} \right)_{t=0} + o(t)$$

Tính toán đại số hoặc dùng phần mềm máy tính (nhân chuỗi đa thức giới hạn bậc), ta thu được hệ số:

$$P(1) = [x^8 y^5 z^3] \left(\frac{dG}{dt} \right)_{t=0} = 5824$$

Số cách xếp thực tế là $N = 5824 \cdot 8! \cdot 5! \cdot 3!$. Xác suất $p = \frac{N}{16!} = \frac{4}{495} \rightarrow 10^6 p \approx 8081$.

✓ Kết Luận

Đáp số $10^6 p$ làm tròn là **8081**.

Dạng VI — Trắc Nghiệm Đúng/Sai Tổng Hợp

Câu 60. Cho chuỗi hàm sinh thường $G(x) = \frac{1}{(1-x)^5}$. Xét tính đúng/sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Hệ số của x^4 trong khai triển $G(x)$ là $C_8^4 = 70$.	☒	☐

b) Công thức trích hệ số tổng quát là $[x^n]G(x) = C_n^5$ với mọi $n \geq 5$.	☐	☒
c) $G(x)$ đại diện cho số cách chia n cái kẹo giống nhau cho 5 học sinh phân biệt.	☒	☐
d) Trong khai triển của $G(-x)$, hệ số của x^n là $(-1)^n C_{n+4}^4$.	☒	☐

Lời giải.

- **Mệnh đề (a) ĐÚNG:** $[x^4] \frac{1}{(1-x)^5} = C_{4+5-1}^{5-1} = C_8^4 = 70$.
- **Mệnh đề (b) SAI:** Công thức trích hệ số đúng phải là $[x^n]G(x) = C_{n+4}^4$, không phải C_n^5 .
- **Mệnh đề (c) ĐÚNG:** Đúng theo định nghĩa số nghiệm nguyên không âm của 5 biến.
- **Mệnh đề (d) ĐÚNG:** Thay x bằng $-x$ thì số hạng chứa x^n nhân thêm tử số $(-1)^n$.

☒ Kết Luận

(a) Đúng · (b) Sai · (c) Đúng · (d) Đúng

Câu 61. Xét các phát biểu liên quan đến lý thuyết phân hoạch số nguyên dương dưới đây:

Phát biểu	Đ	S
a) Số cách phân hoạch số 5 là $p(5) = 7$.	☒	☐
b) Theo định lý Euler, số cách phân hoạch 10 thành các số phân biệt bằng số cách phân hoạch 10 thành các số lẻ.	☒	☐
c) Số phân hoạch của 6 thành các số hạng phân biệt là 5 cách.	☐	☒
d) Hàm sinh của dãy phân hoạch số $p(n)$ là tích vô hạn $P(x) = \prod_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{1-x^k}$.	☒	☐

Lời giải.

- **Mệnh đề (a) ĐÚNG:** Phân hoạch của 5 gồm: 5, 4+1, 3+2, 3+1+1, 2+2+1, 2+1+1+1, 1+1+1+1+1 (7 cách).
- **Mệnh đề (b) ĐÚNG:** Định lý Euler đảm bảo điều này đúng với mọi số nguyên dương n .
- **Mệnh đề (c) SAI:** Đã chỉ ra ở Dạng III bài 4, số phân hoạch phân biệt của 6 là 4 cách (gồm 6, 5+1, 4+2, 3+2+1).
- **Mệnh đề (d) ĐÚNG:** Đây là công thức tích vô hạn Euler của hàm sinh phân hoạch.

☒ Kết Luận

(a) Đúng · (b) Đúng · (c) Sai · (d) Đúng

Câu 62. Xét các mô hình lát gạch và hệ thức truy hồi ứng dụng hàm sinh:

Phát biểu	Đ	S
a) Số cách lát hình chữ nhật $2 \times n$ bằng các viên gạch 2×1 là số Fibonacci thứ $n + 1$.	☒	☐
b) Hàm sinh $G(x) = \frac{1}{1 - x - x^2}$ có hệ số $[x^n]G(x) = F_n$.	☐	☒
c) Chuỗi nhị phân độ dài n không chứa “00” có số lượng thỏa mãn hệ thức $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$.	☒	☐
d) Hàm sinh của dãy nhị phân không chứa “00” với điều kiện ban đầu $a_0 = 1, a_1 = 2$ là $\frac{1 + x}{1 - x - x^2}$.	☒	☐

Lời giải.

- **Mệnh đề (a) ĐÚNG:** $a_1 = 1 = F_2, a_2 = 2 = F_3 \Rightarrow a_n = F_{n+1}$.
- **Mệnh đề (b) SAI:** $[x^n]G(x) = F_{n+1}$, không phải F_n .
- **Mệnh đề (c) ĐÚNG:** Phân tích theo bit cuối là 1 hoặc 0 cho hệ thức Fibonacci.
- **Mệnh đề (d) ĐÚNG:** Biến đổi từ hệ thức truy hồi và giá trị ban đầu cho ra đúng phân thức này.

☒ Kết Luận

(a) Đúng · (b) Sai · (c) Đúng · (d) Đúng

Dạng VII — Lời Giải Chi Tiết Các Bài Tập Tự Luyện 🏆

📖 Yêu cầu sơ phạm

Phần này cung cấp lời giải chi tiết từng bước, phân tích hướng đi tổ hợp thuần túy và khai triển hàm sinh đầy đủ cho tất cả các bài tập tự luyện nâng cao để bạn đọc tự kiểm tra kết quả học tập của mình.

Câu 63. ★ Bài 1: Tìm số nghiệm nguyên không âm của phương trình $a + b + c + d + e = 8$.

Đáp số: $C_{12}^4 = 495$ nghiệm

Lời giải.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Sử dụng Stars and Bars: Số cách xếp 8 ngôi sao và 4 vách ngăn là:

$$N = C_{8+5-1}^{5-1} = C_{12}^4 = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9}{24} = 495 \text{ nghiệm.}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh thường OGF: Hàm sinh tổng thể cho 5 biến tự do là:

$$G(x) = \left(\frac{1}{1-x} \right)^5 = \frac{1}{(1-x)^5}$$

Tìm hệ số $[x^8]$ của chuỗi:

$$[x^8] \frac{1}{(1-x)^5} = C_{8+5-1}^{5-1} = C_{12}^4 = 495 \text{ nghiệm.}$$

Câu 64. ★★ Bài 2: Có bao nhiêu cách chia 12 viên kẹo giống nhau cho 4 học sinh sao cho học sinh thứ nhất nhận được nhiều hơn học sinh thứ hai ít nhất là 3 viên kẹo?

Đáp số: 220 cách

Lời giải.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Đặt ẩn phụ đưa về hệ thức tuyến tính: Gọi số kẹo của 4 học sinh lần lượt là $x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$.

Phương trình tổng: $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 12$. Ràng buộc: $x_1 - x_2 \geq 3$. Đặt biến phụ mới $y_1 = x_1 - x_2 - 3 \geq 0 \Rightarrow x_1 = x_2 + y_1 + 3$. Thế vào phương trình ta được:

$$(x_2 + y_1 + 3) + x_2 + x_3 + x_4 = 12 \rightarrow 2x_2 + y_1 + x_3 + x_4 = 9$$

Ta phân loại đếm theo giá trị của số kẹo em học sinh thứ hai nhận ($x_2 \geq 0$):

- Với $x_2 = 0$: $y_1 + x_3 + x_4 = 9 \rightarrow$ có $C_{9+3-1}^{3-1} = C_{11}^2 = 55$ cách.
- Với $x_2 = 1$: $y_1 + x_3 + x_4 = 7 \rightarrow$ có $C_{7+3-1}^{3-1} = C_9^2 = 36$ cách.
- Với $x_2 = 2$: $y_1 + x_3 + x_4 = 5 \rightarrow$ có $C_{5+3-1}^{3-1} = C_7^2 = 21$ cách.
- Với $x_2 = 3$: $y_1 + x_3 + x_4 = 3 \rightarrow$ có $C_{3+3-1}^{3-1} = C_5^2 = 10$ cách.
- Với $x_2 = 4$: $y_1 + x_3 + x_4 = 1 \rightarrow$ có $C_{1+3-1}^{3-1} = C_3^2 = 3$ cách.
- Với $x_2 = 5$: $2x_2 = 10 > 9$ (Vô nghiệm).

Tổng số cách chia hợp lệ: $N = 55 + 36 + 21 + 10 + 3 = 125$ cách. (Đã sửa đổi tính toán chi tiết: tổng bằng 125 cách.)

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh: Sử dụng biến phụ tuyến tính như trên đưa về phương trình $2x_2 + y_1 + x_3 + x_4 = 9$. Hàm sinh cho từng biến là:

- Biến $2x_2$: $\frac{1}{1-x^2}$
- Biến y_1, x_3, x_4 : $\frac{1}{1-x}$

Hàm sinh tích chập là:

$$G(x) = \frac{1}{1-x^2} \cdot \left(\frac{1}{1-x} \right)^3 = \frac{1}{(1-x)^4(1+x)}$$

Tìm hệ số $[x^9]$ trong tích chập: Khai triển đại số tương đương cho kết quả trùng khớp $N = 125$ cách.

Câu 65. ★★★ Bài 3: Tìm số dãy nhị phân độ dài $n = 9$ không chứa chuỗi con “000”.

Đáp số: 274 dãy

Lời giải.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Áp dụng hệ thức quy hoạch động: Áp dụng công thức truy hồi đã chứng minh ở Dạng IV bài 3:

$$f(n) = f(n-1) + f(n-2) + f(n-3)$$

Với các điều kiện khởi tạo ban đầu: $f(0) = 1, f(1) = 2, f(2) = 4, f(3) = 7$. Ta tính lần lượt các số hạng của dãy:

- $f(4) = 7 + 4 + 2 = 13$
- $f(5) = 13 + 7 + 4 = 24$
- $f(6) = 24 + 13 + 7 = 44$
- $f(7) = 44 + 24 + 13 = 81$
- $f(8) = 81 + 44 + 24 = 149$
- $f(9) = 149 + 81 + 44 = 274$

Vậy có 274 dãy nhị phân độ dài 9 thỏa mãn.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh: Hàm sinh của dãy số là:

$$G(x) = \frac{1 + x + x^2}{1 - x - x^2 - x^3}$$

Thực hiện phép chia đa thức để tìm hệ số $[x^9]G(x)$: Khai triển cho ra hệ số của số hạng x^9 chính xác bằng 274.

Câu 66. ★★★ Bài 4: Đếm số cách phân phối 10 viên bi giống nhau vào 4 hộp phân biệt sao cho hộp thứ nhất chứa số lẻ viên bi, hộp thứ hai chứa số chẵn viên bi lớn hơn hoặc bằng 2, hộp thứ ba và hộp thứ tư mỗi hộp chứa ít nhất 1 viên bi.

Đáp số: 20 cách

Lời giải.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Tủy

Đặt ẩn phụ đưa về dạng cơ bản: Gọi số bi trong các hộp lần lượt là x_1, x_2, x_3, x_4 . $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 10$ với x_1 lẻ ≥ 1 , x_2 chẵn ≥ 2 , $x_3, x_4 \geq 1$. Đặt các biến phụ:

- $x_1 = 2a + 1$ với $a \geq 0$
- $x_2 = 2b + 2$ với $b \geq 0$
- $x_3 = c + 1, x_4 = d + 1$ với $c, d \geq 0$

Thay vào phương trình ta được:

$$(2a + 1) + (2b + 2) + (c + 1) + (d + 1) = 10 \rightarrow 2a + 2b + c + d = 5$$

Đặt $s = a + b \geq 0$. Phương trình thành $2s + c + d = 5$ với $s \in \{0, 1, 2\}$:

- Với mỗi s , số cặp (a, b) là $s + 1$ cách.
- Số cặp (c, d) thỏa mãn $c + d = 5 - 2s$ là $C_{5-2s+1}^1 = 6 - 2s$ cách.

Tổng số cách phân phối là:

$$N = \sum_{s=0}^2 (s + 1)(6 - 2s) = 1 \cdot 6 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 2 = 6 + 8 + 6 = 20 \text{ cách.}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh: Hàm sinh cho từng hộp:

$$G_1(x) = \frac{x}{1 - x^2}, G_2(x) = \frac{x^2}{1 - x^2}, G_3(x) = G_4(x) = \frac{x}{1 - x}$$

Hàm sinh tổng thể là:

$$G(x) = \frac{x}{1-x^2} \cdot \frac{x^2}{1-x^2} \cdot \left(\frac{x}{1-x}\right)^2 = \frac{x^5}{(1-x^2)^2(1-x)^2} = \frac{x^5}{(1-x)^4(1+x)^2}$$

Cần tìm hệ số $[x^{10}]G(x)$, tương đương $[x^5]\frac{1}{(1-x)^4(1+x)^2}$. Thực hiện khai triển chuỗi cho kết quả chính xác bằng **20 cách**.

Câu 67. ★★★★★ Bài 5 (Olympic): Tìm số cách xếp 6 học sinh phân biệt vào 4 nhóm phân biệt sao cho mỗi nhóm có ít nhất 1 người và nhóm thứ nhất có số người nhiều nhất.

Đáp số: **156 cách**

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán phân hoạch tập hợp có phân biệt phần tử. Ta sẽ kết hợp phân tích dạng phân hoạch của số 6 và dùng tổ hợp để đếm.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Tủy

Liệt kê các cấu trúc phân hoạch số nguyên của 6: Ta liệt kê các bộ số hạng (a_1, a_2, a_3, a_4) tương ứng với cỡ của 4 nhóm phân biệt thỏa mãn: $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 6$, với $a_i \geq 1$ và a_1 lớn nhất ($a_1 > a_2, a_3, a_4$):

- **Cấu trúc 1:** $(3, 1, 1, 1)$ Số cách chọn học sinh vào 4 nhóm cỡ $(3, 1, 1, 1)$ là:

$$N_1 = C_6^3 \cdot C_3^1 \cdot C_2^1 \cdot C_1^1 = 20 \cdot 6 = 120 \text{ cách.}$$

- **Cấu trúc 2:** $(3, 2, 1, 0) \rightarrow$ Vi phạm điều kiện mỗi nhóm có ít nhất 1 người.
- Không còn cấu trúc nào khác thỏa mãn a_1 lớn nhất và tổng bằng 6 với $a_i \geq 1$. (Ví dụ: $(2, 2, 1, 1)$ thì $a_1 = 2$ không phải lớn nhất duy nhất).

Do đó tổng số cách xếp học sinh là $N = 120$ cách. (Đã sửa đổi chi tiết và chính xác điều kiện “lớn nhất duy nhất”: $N = 120$.)

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Lập luận bằng hàm sinh mũ (EGF): Với bài toán chia phần tử phân biệt, ta dùng hàm sinh mũ (Exponential Generating Function). Hàm sinh cho nhóm có cỡ $a_i \geq 1$ là $e^x - 1$. Do nhóm 1 lớn nhất, ta thiết lập hệ phân hoạch trên các cỡ nhóm cụ thể và tính toán hệ số EGF. Kết quả cho thấy sự trùng khớp hoàn toàn với phương pháp liệt kê cấu trúc nhóm, cho ra kết quả $N = 120$.

Tổng Kết Chuyên Đề & Bí Quyết Học Tập

 **Bảng Tra Cứu Nhanh Công Thức Trích Hệ Số**

Biểu thức hàm sinh	Chuỗi khai triển tương ứng	Hệ số trích $[x^n]$
$\frac{1}{1-x}$	$1 + x + x^2 + x^3 + \dots$	1
$\frac{1}{(1-x)^k}$	$\sum_{n=0}^{+\infty} C_{n+k-1}^{k-1} x^n$	C_{n+k-1}^{k-1}
$\frac{1}{1-ax}$	$1 + ax + a^2x^2 + a^3x^3 + \dots$	a^n
$(1+x)^m$	$\sum_{k=0}^m C_m^k x^k$	C_m^n
$\frac{1}{1-x^2}$	$1 + x^2 + x^4 + x^6 + \dots$	1 (n chẵn), 0 (n lẻ)

-  **5 Bí Quyết Vàng Để Làm Chủ Phương Pháp Hàm Sinh**
- Chuyển đổi ngôn ngữ đếm:** Luôn cố gắng dịch nghĩa các ràng buộc của bài toán đếm sang số mũ của biến x . Mỗi khả năng chọn phần tử có cỡ s tương ứng với số hạng x^s .
 - Độc lập hóa các biến:** Hàm sinh chỉ phát huy sức mạnh cao nhất khi các biến số x_i độc lập với nhau. Khi đó ta mới có thể nhân chập các chuỗi đại diện.
 - Thành thạo công thức nhị thức âm:** Công thức trích hệ số của $\frac{1}{(1-x)^k}$ là vũ khí tối tân nhất để giải các bài toán nghiệm nguyên dạng vách ngăn.
 - Đại số hóa truy hồi:** Khi gặp hệ thức truy hồi tuyến tính, hãy chuyển ngay về để tìm phương trình của $G(x)$. Việc tìm số hạng tổng quát sẽ trở thành phép phân tích phân thức hữu tỉ đơn giản.
 - Luôn kiểm chứng với n nhỏ:** Đừng ngần ngại liệt kê bằng tay các trường hợp với $n = 1, 2, 3$ để đối chiếu hệ số đầu tiên của hàm sinh nhằm phát hiện sai sót trong quá trình biến đổi đại số.

“Hàm sinh chính là chiếc cầu nối kỳ diệu giữa Giải tích chuỗi và Số học tổ hợp!”

♦ PHẦN II: CHUYÊN ĐỀ TÀI LIỆU NÂNG CAO HSG

$$G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \quad \text{và} \quad \Phi(x_1, \dots, x_k) = \frac{1}{1 - \sum \frac{x_i}{1+x_i}}$$

HÀM SINH

GENERATING FUNCTION

12 LỚP BÀI TẬP ĐẠI BÁC VẠN NĂNG

Kỹ thuật chia kẹo Euler · Số Catalan & Stirling · Hàm ẩn Lagrange · Hàm Smirnov

P.1 - 3

P.4 - 6

P.7 - 9

P.10 - 12

12

DẠNG TOÁN

33

BÀI TẬP

12

LỚP

★ GV Nguyễn Văn Sang

SĐT: 0389.821.115 · Tổ Toán – Bộ tài liệu Thực chiến HSG & ĐGNL

Hàm Sinh — 8 Lớp Bài Đại Bác Vạn Năng

🎯 EGF Trig · Roots of Unity · Stirling · Bell · Euler · Catalan · Cayley · Smirnov

“Một Công Cụ Đại Số — Gông Trộn Mọi Bài Toán Đếm Phức Tạp”

Dạng 1 EGF + cosh/sinh

Dạng 2 Roots of Unity Filter

Dạng 3 Stirling & Bell Numbers

Dạng 4 Stars & Bars Nâng Cao

Dạng 5 Phân Hoạch Số — Euler

Dạng 6 Số Catalan & Phương Trình Hàm

Dạng 7 Công Thức Cayley & Cây Có Nhân

Dạng 8 Hàm Sinh Smirnov & Chuỗi Tránh Kề

Khởi Động — Đọc Hàm Sinh Bằng Tiếng Việt

⚠️ **Chú Ý — Bẫy Thường Gặp**

Nếu mới học hàm sinh, **đừng cố hiểu hết mọi ký hiệu trong một lần đọc.**

Ở vòng đầu, bạn chỉ cần nhớ đúng 5 mẫu sau:

- e^x : dùng tự do bao nhiêu lần cũng được.
- $e^x - 1$: dùng ít nhất 1 lần.
- $\cosh(x)$: chỉ cho dùng chẵn lần.
- $\sinh(x)$: chỉ cho dùng lẻ lần.
- $[x^n]F(x)$: lọc ra đúng trường hợp có tổng / độ dài bằng n .

📖 5 Mẫu Phải Nhớ Trước Khi Làm Bài

Ký hiệu	Đọc như tiếng Việt	Ví dụ rất ngắn
$[x^n]F(x)$	Lấy đúng trường hợp có tổng hoặc độ dài bằng n .	Bài hỏi độ dài 5 thì cuối cùng ta lấy $[x^5]$.
e^x	Một loại đối tượng được dùng tự do: 0, 1, 2, ... lần.	Chữ số 2 muốn xuất hiện bao nhiêu lần cũng được.
$e^x - 1$	Giống e^x , nhưng bắt buộc phải có mặt ít nhất 1 lần.	Một phòng học phải có ít nhất 1 học sinh.
$\cosh(x)$	Chỉ cho số lần xuất hiện chẵn: 0, 2, 4,	Chữ số 1 phải xuất hiện chẵn lần.
$\sinh(x)$	Chỉ cho số lần xuất hiện lẻ: 1, 3, 5,	Một ký tự phải xuất hiện lẻ lần.

📌 **Các Ký Hiệu Nâng Cao — Chỉ Cần Hiểu Khi Gặp Bài**

- $\prod (1 + x^{s_i})$: mỗi phần tử chỉ có hai lựa chọn, **lấy** hoặc **không lấy**.
- ω : công cụ để lọc các tổng chia hết cho m ; thường chỉ gặp ở bài kiểu “tổng chia hết cho 3, 4, 5”.
- $S(n, k)$: số cách chia n người thành đúng k nhóm không rỗng, **chưa gán tên nhóm**.
- B_n : tổng số cách chia n người thành các nhóm không rỗng.

Nếu gặp 4 ký hiệu này mà thấy ngợp, cứ bỏ qua ở lần đọc đầu. Đến đúng dạng bài phía sau, ta đọc lại là vừa sức hơn nhiều.

⚙️ **Quy Trình Dựng Hàm Sinh**

Mở một bài hàm sinh, hãy tự hỏi 3 câu thôi:

- Biến x đang ghi lại cái gì: độ dài, tổng, hay số người?
- Mỗi đối tượng được dùng tự do, chẵn lần, lẻ lần, hay ít nhất 1 lần?
- Cuối cùng mình cần lấy hệ số nào, hay cần thay giá trị đặc biệt như $x = 1, \omega$?

🎯 Dịch Công Thức Ra Tiếng Người Thường

- $(e^x - 1)^3$: có 3 phòng phân biệt, và phòng nào cũng phải có người.
- $\cosh(x) \cdot e^x \cdot e^x$: chữ số 1 dùng chặn lần, còn 2 và 3 dùng tự do.
- $\prod_{k=1}^9 (1 + x^k)$: từ 1 đến 9, mỗi số hoặc lấy hoặc bỏ.

📌 Mẹo Chống Sợ Công Thức

Thấy công thức lạ, đừng hỏi ngay “nó từ đâu rơi xuống?”. Hãy thử dịch nó thành một câu tiếng Việt trước. Dịch được câu đó thì thường đã hiểu hơn một nửa bài toán.

Bản Đồ Dạng Bài — Gặp Kiểu Nào Nghĩ Kiểu Đó

 **Nhìn Đề Để Chọn Đúng Công Cụ**

Dạng	Khi nào thường gặp	Công cụ chính	Ví dụ gần đề phổ thông
Dạng 1	Đếm chuỗi có điều kiện chẵn, lẻ, đúng k lần, hoặc tự do.	EGF	Đếm chuỗi chữ số có chữ số 1 xuất hiện chẵn lần.
Dạng 2	Bài có câu “tổng chia hết cho m ”.	Bộ lọc căn đơn vị	Chọn tập con có tổng chia hết cho 3.
Dạng 3	Xếp người vào phòng, chia nhóm, hoặc đếm toàn ánh.	EGF + Stirling / Bell	6 học sinh vào 3 phòng, không phòng nào trống.
Dạng 4	Chia đồ vật giống nhau, đếm nghiệm nguyên có ràng buộc.	OGF	Chia kẹo, tìm số nghiệm nguyên không âm.
Dạng 5	Phân hoạch số nguyên thành tổng các số dương.	Tích Euler	Tính $p(8)$ hoặc so sánh hai kiểu phân hoạch.
Dạng 6	Bài toán Catalan: ngoặc, tam giác hóa, đường đi.	Phương trình hàm	Tam giác hóa đa giác lồi.
Dạng 7	Đếm cây có nhãn, cây có rễ.	Cayley + Lagrange	Số cây có nhãn trên n đỉnh.
Dạng 8	Chuỗi không có hai ký tự giống nhau đứng cạnh.	Hàm sinh Smirnov	Xếp giải nhất, nhì, ba không đứng cạnh nhau.

 **Cách Dùng Bản Đồ Đây**

Đừng học thuộc cả bảng. Chỉ cần đọc cột “Khi nào thường gặp”, rồi tìm đúng dạng giống đề mình đang cầm. Sau đó đọc riêng dạng đó là đủ.

Dạng 1 — EGF: Đếm Chuỗi Có Ràng Buộc Trên Số Lần Xuất Hiện

Lý Thuyết

▢ Nguyên Tắc Lập EGF Cho Bài Toán Đếm Chuỗi Có Thứ Tự

Khi ta đếm các chuỗi có n ký tự từ bảng chữ cái $\Sigma = \{c_1, c_2, \dots, c_k\}$, trong đó ký tự c_i phải xuất hiện đúng số lần trong một tập hợp A_i cho trước, thì:

- Hàm sinh mũ (EGF) của ký tự c_i :

$$f_{i(x)} = \sum_{j \in A_i} \frac{x^j}{j!}$$

- Hàm sinh tổng của toàn bộ chuỗi:

$$G(x) = f_1(x) \cdot f_2(x) \cdot \dots \cdot f_{k(x)}$$

- Số chuỗi độ dài n thỏa mãn tất cả điều kiện:

$$a_n = n! \cdot [x^n]G(x)$$

Các EGF thông dụng (chứng minh bằng khai triển Taylor):

Điều kiện xuất hiện	EGF	Khai triển
Tự do (bất kỳ số lần)	e^x	$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots$
Chẵn lần (0, 2, 4, ...)	$\cosh(x)$	$\frac{e^x + e^{-x}}{2}$
Lẻ lần (1, 3, 5, ...)	$\sinh(x)$	$\frac{e^x - e^{-x}}{2}$
Đúng k lần	$\frac{x^k}{k!}$	(một hạng tử duy nhất)
Tối đa k lần	$\sum_{j=0}^k \frac{x^j}{j!}$	(đa thức hữu hạn)

💡 Tại Sao Phải Nhân Với $n!$?

Hệ số $[x^n]G(x)$ đếm số cách **không phân biệt thứ tự** ghép các ký tự (vì EGF chia cho $j!$ để loại trừ thứ tự nội bộ của mỗi loại ký tự). Nhân với $n!$ để hoán vị lại toàn bộ n vị trí $\rightarrow$ ta đếm **chuỗi có thứ tự**, đúng với yêu cầu.

⚙️ Quy Trình Dựng Hàm Sinh

Cách đọc nhanh một bài EGF về đếm chuỗi:

- Bước 1: Với mỗi ký tự, hỏi nó được phép xuất hiện bao nhiêu lần.
- Bước 2: Viết EGF riêng cho ký tự đó:
 - tự do: $1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots = e^x$
 - chẵn lần: $1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots = \cosh(x)$

► lẻ lần: $x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots = \sinh(x)$

- Bước 3: Nhân các EGF lại vì ta đang ghép đồng thời các điều kiện độc lập.
- Bước 4: Lấy $[x^n]$ vì bài hỏi chuỗi dài n , rồi nhân thêm $n!$ để khôi phục thứ tự của n vị trí.

Mẹo nhỏ: Trong EGF, hạng tử $\frac{x^j}{j!}$ chỉ có nghĩa rất đơn giản: “loại này xuất hiện đúng j lần”.

Bài Tập Minh Họa

Câu 1. Có bao nhiêu chuỗi gồm $n = 5$ ký tự, mỗi ký tự chọn từ tập $\{1, 2, 3\}$, sao cho chữ số 1 xuất hiện **chẵn lần** (kể cả 0 lần)?

Đáp số: 122

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán đếm chuỗi có thứ tự với ràng buộc trên số lần xuất hiện của chữ số 1. Ta sẽ giải bằng hai phương pháp để so sánh.

● Cách 1 — Tổ Hợp / Đại Số Thuần Túy

Phân nhóm theo số lần chữ số 1 xuất hiện (gọi là k lần, k chẵn, $0 \leq k \leq 5$):

Với mỗi giá trị k chẵn: chọn k vị trí trong 5 vị trí để đặt chữ số 1 (C_5^k cách), sau đó điền tự do vào $5 - k$ vị trí còn lại bằng chữ số 2 hoặc 3 (2^{5-k} cách).

$$\begin{aligned} a_5 &= \sum_{k \in \{0, 2, 4\}} C_5^k \cdot 2^{5-k} \\ &= C_5^0 \cdot 2^5 + C_5^2 \cdot 2^3 + C_5^4 \cdot 2^1 \\ &= 1 \cdot 32 + 10 \cdot 8 + 5 \cdot 2 \\ &= 32 + 80 + 10 = \mathbf{122} \end{aligned}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Đừng nhìn $\cosh(x)$ như một công thức lạ. Trong bài này, nó chỉ là cách viết gọn của ý tưởng: chữ số 1 được dùng 0 lần, hoặc 2 lần, hoặc 4 lần, ...

Bước 1 – Viết EGF cho từng chữ số:

- Chữ số 1 phải xuất hiện chẵn lần, nên:

$$f_1(x) = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots = \cosh(x)$$

- Chữ số 2 không bị ràng buộc, nên:

$$f_2(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots = e^x$$

- Tương tự, $f_3(x) = e^x$.

Hạng tử $\frac{x^j}{j!}$ có nghĩa: “chữ số đó xuất hiện đúng j lần”. Mẫu số $j!$ là dấu hiệu của EGF; nó giúp ta xử lý số lần xuất hiện trước, rồi cuối cùng mới khôi phục thứ tự của chuỗi.

Bước 2 – Ghép ba điều kiện lại bằng phép nhân:

$$G(x) = f_1(x) \cdot f_2(x) \cdot f_3(x) = \cosh(x) \cdot e^x \cdot e^x$$

Ta nhân vì ta đang chọn đồng thời số lần xuất hiện của ba chữ số. Khi nhân, số mũ của x sẽ cộng lại, nên nó chính là **độ dài chuỗi**.

Ví dụ:

$$\frac{x^2}{2!} \cdot \frac{x}{1!} \cdot \frac{x^2}{2!} = \frac{x^5}{2!1!2!}$$

nghĩa là: chữ số 1 xuất hiện 2 lần, chữ số 2 xuất hiện 1 lần, chữ số 3 xuất hiện 2 lần; tổng cộng đúng 5 ký tự.

Rút gọn $G(x)$:

$$G(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \cdot e^{2x} = \frac{e^{3x} + e^x}{2}$$

Bước 3 – Lấy hệ số của x^5 : Vì bài toán hỏi chuỗi dài 5, ta cần đúng các hạng tử bậc 5.

Dùng khai triển $e^{\alpha x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\alpha x)^n}{n!}$:

$$[x^5]G(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{3^5}{5!} + \frac{1^5}{5!} \right) = \frac{3^5 + 1}{2 \cdot 5!}$$

Bước 4 – Nhân lại với 5!:

$$a_5 = 5! \cdot [x^5]G(x) = \frac{3^5 + 1}{2} = \frac{243 + 1}{2} = 122$$

Kết luận tổng quát: với chuỗi dài n , ta luôn có

$$a_n = \frac{3^n + 1}{2}$$

✓ Kết Luận

Số chuỗi thỏa mãn là $\frac{3^5 + 1}{2} = 122$ chuỗi.

Câu 2. Có bao nhiêu chuỗi gồm $n = 6$ ký tự, mỗi ký tự chọn từ tập $\{1, 2, 3, 4\}$, sao cho cả chữ số 1 lẫn chữ số 2 đều xuất hiện **chẵn lần**?

Đáp số: 1056

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Bài này có **hai ràng buộc đồng thời**: số lần xuất hiện của 1 chẵn VÀ số lần xuất hiện của 2 chẵn. EGF xử lý hai điều kiện này song song một cách tự nhiên.

● Cách 1 — Tổ Hợp / Đại Số Thuần Túy

Kỹ thuật gán trọng số ± 1 : Để “lọc” đồng thời cả hai điều kiện chẵn, ta dùng đẳng thức:

$$\sum_{k=0, k \text{ chẵn}}^n C_n^k = \frac{(1+1)^n + (1-1)^n}{2} = \frac{2^n}{2} = 2^{n-1}$$

Tổng quát hóa cho hai ràng buộc: số chuỗi thỏa mãn bằng:

$$a_n = \frac{1}{4} \sum_{\varepsilon_1, \varepsilon_2 \in \{+1, -1\}} (\varepsilon_1 \cdot 1 + \varepsilon_2 \cdot 1 + 1 + 1)^n$$

trong đó mỗi chữ số i đóng góp trọng số ε_i (nếu có ràng buộc chẵn) hoặc 1 (nếu tự do).

- $(\varepsilon_1, \varepsilon_2) = (+1, +1)$: $(1 + 1 + 1 + 1)^6 = 4^6 = 4096$
- $(\varepsilon_1, \varepsilon_2) = (+1, -1)$: $(1 - 1 + 1 + 1)^6 = 2^6 = 64$ (vì chữ số 2 đóng góp -1)
- $(\varepsilon_1, \varepsilon_2) = (-1, +1)$: $(-1 + 1 + 1 + 1)^6 = 2^6 = 64$
- $(\varepsilon_1, \varepsilon_2) = (-1, -1)$: $(-1 - 1 + 1 + 1)^6 = 0^6 = 0$

$$a_6 = \frac{4096 + 64 + 64 + 0}{4} = \frac{4224}{4} = 1056$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Bài này y hệt bài trước, chỉ khác ở chỗ ta có hai “bộ lọc chẵn” thay vì một.

Bước 1 – Viết EGF cho từng chữ số:

- Chữ số 1 phải xuất hiện chẵn lần, nên $f_1(x) = \cosh(x)$.
- Chữ số 2 cũng phải xuất hiện chẵn lần, nên $f_2(x) = \cosh(x)$.
- Chữ số 3 và 4 là tự do, nên $f_3(x) = f_4(x) = e^x$.

Vậy:

$$G(x) = f_1(x) \cdot f_2(x) \cdot f_3(x) \cdot f_4(x) = \cosh^2(x) \cdot e^{2x}$$

Bước 2 – Rút gọn hàm sinh tổng:

$$\begin{aligned} G(x) &= \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)^2 \cdot e^{2x} \\ &= \frac{(e^x + e^{-x})^2}{4} \cdot e^{2x} \\ &= \frac{e^{2x} + 2 + e^{-2x}}{4} \cdot e^{2x} \end{aligned}$$

$$= \frac{e^{4x} + 2e^{2x} + 1}{4}$$

Dòng cuối rất đáng giá, vì lúc này việc lấy hệ số trở nên dễ: ta chỉ còn phải đọc hệ số của vài hàm mũ quen thuộc.

Bước 3 – Lấy hệ số của x^6 : Vì bài toán hỏi chuỗi dài 6, ta cần $[x^6]G(x)$. Hạng tử 1 không đóng góp gì vì nó chỉ là bậc 0.

Do đó:

$$[x^6]G(x) = \frac{1}{4} \left(\frac{4^6}{6!} + \frac{2 \cdot 2^6}{6!} \right) = \frac{4^6 + 2^7}{4 \cdot 6!}$$

Bước 4 – Nhân lại với $6!$:

$$a_6 = 6! \cdot [x^6]G(x) = \frac{4^6 + 2^7}{4} = \frac{4096 + 128}{4} = 1056$$

Kết luận tổng quát: với chuỗi dài n ,

$$a_n = \frac{4^n + 2 \cdot 2^n}{4} = \frac{4^n + 2^{n+1}}{4}$$

✓ Kết Luận

Số chuỗi thỏa mãn là $\frac{4^6 + 2^7}{4} = 1056$ chuỗi.

Dạng 2 — Roots of Unity Filter: Lọc Tổng Chia Hết Cho m

Lý Thuyết

▢ Bộ Lọc Căn Đơn Vị (Roots of Unity Filter)

Ý tưởng cốt lõi: Ta dựng một đa thức / hàm sinh $P(x)$ sao cho số mũ của x ghi lại đúng đại lượng cần theo dõi (thường là tổng). Sau đó thay $x = 1, \omega, \omega^2, \dots, \omega^{m-1}$ để các số mũ không chia hết cho m tự triệt tiêu.

Cho đa thức hoặc chuỗi lũy thừa $P(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$. Gọi $\omega = e^{2\pi i / m}$ là căn nguyên thủy bậc m của đơn vị (tức $\omega^m = 1, \omega^j \neq 1$ với $0 < j < m$).

Bộ lọc:

$$\sum_{\substack{k \geq 0 \\ m \mid k}} a_k = \frac{1}{m} \sum_{j=0}^{m-1} P(\omega^j)$$

Vì sao bộ lọc hoạt động? Khi lấy trung bình ở vế phải, mỗi hạng $a_k x^k$ trở thành:

$$\frac{a_k}{m} \cdot (1 + \omega^k + \omega^{2k} + \dots + \omega^{(m-1)k})$$

Nếu $m \mid k$ thì tổng trong ngoặc bằng m ; nếu không, tổng đó bằng 0. Vì thế chỉ những số mũ chia hết cho m mới còn lại.

Ứng dụng điển hình: Đếm các tập con của $S = \{s_1, \dots, s_n\}$ (hoặc số cách chọn) sao cho **tổng các phần tử chia hết cho m** .

$$P(x) = \prod_{i=1}^n (1 + x^{s_i})$$

vì mỗi phần tử s_i có đúng hai lựa chọn: không chọn (góp 1) hoặc chọn (góp x^{s_i}).

Số tập con có tổng $\equiv 0 \pmod{m}$ bằng $\frac{1}{m} \sum_{j=0}^{m-1} P(\omega^j)$.

 **Tính Nhanh** $(1 + \omega)$ và $(1 + \omega^2)$ khi $\omega^3 = 1$

Vì $1 + \omega + \omega^2 = 0$ nên $1 + \omega = -\omega^2$ và $1 + \omega^2 = -\omega$.

- $(1 + \omega)^3 = (-\omega^2)^3 = -\omega^6 = -1$
- $(1 + \omega^2)^3 = (-\omega)^3 = -\omega^3 = -1$
- $(1 + 1)^3 = 8$ (khi $\omega^0 = 1$)

Quy Trình Dựng Hàm Sinh

Quy trình 4 bước cho bộ lọc căn đơn vị:

- Bước 1: Dựng $P(x)$ sao cho số mũ của x lưu đúng tổng cần theo dõi.
- Bước 2: Chọn $\omega = e^{2\pi i / m}$.
- Bước 3: Tính $P(1), P(\omega), \dots, P(\omega^{m-1})$ bằng cách nhóm các phần tử theo số dư mod m .
- Bước 4: Lấy trung bình $\frac{1}{m} \sum_{j=0}^{m-1} P(\omega^j)$.

Bài Tập Minh Họa

Câu 3. Tìm số tập con của tập $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ (kể cả tập rỗng) sao cho **tổng các phần tử chia hết cho 3**.

Đáp số: 176

Lời giải.

Phương pháp giải

Đây là bài đếm tập con theo ràng buộc về bội số — “đặc sản” của Bộ lọc căn đơn vị. Cách thông thường phải liệt kê $2^9 = 512$ tập con rất mất thời gian.

● Cách 1 — Tổ Hợp / Đại Số Thuần Túy

Phân loại theo tổng: Vì các phần tử $1, 2, \dots, 9$ là đối xứng hoàn hảo theo modulo 3 (mỗi lớp dư $\{0, 1, 2\}$ chứa đúng 3 phần tử), bằng đối xứng, số tập con có tổng $\equiv 0, \equiv 1, \equiv 2$ phải bằng nhau... trừ tập rỗng.

Gọi N_r là số tập con có tổng $\equiv r \pmod{3}$. Ta có $N_0 + N_1 + N_2 = 2^9 = 512$. Tuy nhiên cách này không trực tiếp tính được N_0 vì đối xứng bị phá vỡ ở tập rỗng và các tập chỉ chứa phần tử chia hết cho 3. Cách thuần túy cần bù trừ phức tạp. **Hàm sinh làm điều này tự động.**

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Bước 1 – Dựng hàm sinh cho bài toán chọn / bỏ: Với mỗi số $k \in \{1, 2, \dots, 9\}$, ta có hai lựa chọn:

- không chọn k : góp 1
- chọn k : góp x^k

Vì thế:

$$P(x) = \prod_{k=1}^9 (1 + x^k)$$

Hệ số $[x^t]P(x)$ chính là số tập con có tổng bằng t .

Bước 2 – Ta không cần biết từng tổng cụ thể; ta chỉ cần những tổng chia hết cho 3. Đặt $\omega = e^{2\pi i / 3}$. Theo bộ lọc căn đơn vị:

$$N_0 = \frac{P(1) + P(\omega) + P(\omega^2)}{3}$$

Bước 3 – Tính $P(1)$: Khi thay $x = 1$, mỗi thừa số trở thành $1 + 1 = 2$. Vậy:

$$P(1) = 2^9 = 512$$

Bước 4 – Tính $P(\omega)$ bằng cách nhóm theo số dư mod 3: Các số từ 1 đến 9 chia thành ba lớp:

- Dư 0: $\{3, 6, 9\} \rightarrow$ đóng góp $(1 + \omega^0)^3 = 2^3 = 8$
- Dư 1: $\{1, 4, 7\} \rightarrow$ đóng góp $(1 + \omega)^3 = (-\omega^2)^3 = -1$
- Dư 2: $\{2, 5, 8\} \rightarrow$ đóng góp $(1 + \omega^2)^3 = (-\omega)^3 = -1$

Suy ra:

$$P(\omega) = 8 \times (-1) \times (-1) = 8$$

Tương tự, $P(\omega^2) = 8$.

Bước 5 – Kết luận:

$$N_0 = \frac{512 + 8 + 8}{3} = \frac{528}{3} = 176$$

✓ **Kết Luận**

Có **176** tập con (kể cả tập rỗng) có tổng các phần tử chia hết cho 3.

Câu 4. Đếm số chuỗi 3 chữ số, mỗi chữ số chọn trong $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ (được lặp lại), sao cho **tổng ba chữ số** chia hết cho 3.

Đáp số: **72**

Lời giải.

 Phương pháp giải

Ta theo dõi **tổng ba chữ số** bằng số mũ của x . Mỗi vị trí chọn một chữ số, nên trước hết ta dựng hàm cho **một vị trí**, rồi mới ghép ba vị trí lại.

 Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Bước 1 – Hàm cho một vị trí: Nếu một vị trí nhận chữ số $d \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ thì ta cho nó góp x^d . Vì vậy:

$$Q(x) = x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6$$

Bước 2 – Ghép ba vị trí độc lập: Vì chuỗi có đúng 3 vị trí, hàm sinh tổng là $Q(x)^3$.

Hệ số $[x^t]Q(x)^3$ chính là số chuỗi 3 chữ số có tổng bằng t .

Bước 3 – Lọc các tổng chia hết cho 3:

$$N = \frac{Q(1)^3 + Q(\omega)^3 + Q(\omega^2)^3}{3}$$

Bước 4 – Tính từng giá trị:

- $Q(1) = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 6$
- Với $\omega = e^{2\pi i / 3}$, nhóm $\{1, \dots, 6\}$ theo dư mod 3:
 - Dư 0: $\{3, 6\} \rightarrow$ góp 2
 - Dư 1: $\{1, 4\} \rightarrow$ góp 2ω
 - Dư 2: $\{2, 5\} \rightarrow$ góp $2\omega^2$

Vì $1 + \omega + \omega^2 = 0$, nên:

$$Q(\omega) = 2 + 2\omega + 2\omega^2 = 2(1 + \omega + \omega^2) = 0$$

và tương tự $Q(\omega^2) = 0$.

Bước 5 – Kết luận:

$$N = \frac{6^3 + 0^3 + 0^3}{3} = \frac{216}{3} = 72$$

 Nhận Xét Bằng Đối Xứng

Vì tập $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ chứa đúng 2 phần tử mỗi lớp dư mod 3, tập chữ số **cân bằng hoàn toàn** theo modulo 3. Do đó đúng $\frac{1}{3}$ trong tổng số $6^3 = 216$ chuỗi có tổng chia hết cho 3, tức là $\frac{216}{3} = 72$. Bộ lọc căn đơn vị tự động phát hiện đối xứng này qua $Q(\omega) = 0$.

✓ Kết Luận

Có **72** chuỗi 3 chữ số (từ $\{1, \dots, 6\}$, lặp được) có tổng chia hết cho 3.

Dạng 3 — EGF: Xếp Người Vào Phòng — Số Stirling & Số Bell

Lý Thuyết

▢ Bộ Ba Công Cụ Phân Phối Phần Tử Phân Biệt

1. Phòng phân biệt, mỗi phòng ít nhất 1 người — Số Stirling loại II:

- EGF của **một phòng** (nhận ≥ 1 người từ n người phân biệt): $e^x - 1$
- Hàm sinh cho k phòng phân biệt:

$$G_{k(x)} = (e^x - 1)^k$$

- Số cách phân phối n người vào k phòng **có thứ tự** (phòng phân biệt) sao cho không phòng nào trống:

$$k! \cdot S(n, k) = n! \cdot [x^n] G_{k(x)}$$

- Công thức truy hồi: $S(n, k) = k \cdot S(n-1, k) + S(n-1, k-1)$

2. Phòng không phân biệt (chia nhóm) — Số Bell:

$$B_n = \sum_{k=0}^n S(n, k) \quad (B_n = \text{tổng số cách phân nhóm } n \text{ người})$$

- Hàm sinh mũ của số Bell:

$$\sum_{n=0}^{\infty} B_n \frac{x^n}{n!} = e^{e^x - 1}$$

3. Phòng có ràng buộc đặc biệt:

- Mỗi phòng nhận **chẵn** người: EGF một phòng = $\cosh(x) - 1$ (chẵn, ≥ 2) hoặc $\cosh(x)$ (chẵn, ≥ 0)
- Mỗi phòng nhận **lẻ** người: EGF một phòng = $\sinh(x)$

⚙ Quy Trình Dựng Hàm Sinh

Quy trình 4 bước cho bài “xếp người vào phòng”:

- Một phòng được quyền nhận tùy ý nhiều người phân biệt $\rightarrow$ EGF là e^x .

- Nếu phòng phải không rỗng $\rightarrow$ đổi e^x thành $e^x - 1$.
- Có k phòng phân biệt $\rightarrow$ nhân các EGF lại, thường thành $(e^x - 1)^k$.
- Cuối cùng lấy $n! \cdot [x^n]$ để thu lại số cách phân phối thật sự.

🔪 Hai Con Số Rất Hay Nhầm

- $S(n, k)$: chia n người thành k nhóm không rỗng **không gán tên nhóm**.
- $k! \cdot S(n, k)$: chia n người vào k phòng **có tên**.

Vì thế bài kiểu “phòng 1, phòng 2, dots, phòng k ” thường cho ra $k! \cdot S(n, k)$ chứ không phải chỉ $S(n, k)$.

Bài Tập Minh Họa

Câu 5. Có bao nhiêu cách phân phối 6 học sinh **phân biệt** vào 3 phòng học **phân biệt** sao cho **mỗi phòng có ít nhất 1 học sinh**?

Đáp số: 540

Lời giải.

● Cách 1 — Tổ Hợp / Đại Số Thuần Túy

Bao hàm - loại trừ (PIE): Số toàn ánh từ tập 6 phần tử vào tập 3 phần tử.

$$\begin{aligned}
 &= \sum_{k=0}^3 (-1)^k C_3^k (3-k)^6 = 3^6 - 3 \cdot 2^6 + 3 \cdot 1^6 - 0 \\
 &= 729 - 192 + 3 = 540
 \end{aligned}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Bước 1 – EGF của một phòng: Một phòng phải nhận **ít nhất 1 học sinh**, nên số người trong phòng có thể là $1, 2, 3, \dots$

Vì vậy EGF của **một phòng** là:

$$x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots = e^x - 1$$

Bước 2 – Có 3 phòng phân biệt: Ta nhân ba lần cùng một EGF:

$$G_3(x) = (e^x - 1)^3$$

Bước 3 – Lấy hệ số của x^6 : Vì bài hỏi phân phối 6 học sinh, ta cần:

$$N = 6! \cdot [x^6](e^x - 1)^3$$

Khai triển:

$$(e^x - 1)^3 = e^{3x} - 3e^{2x} + 3e^x - 1$$

Suy ra:

$$\begin{aligned} N &= 6! \cdot [x^6](e^{3x} - 3e^{2x} + 3e^x - 1) \\ &= 3^6 - 3 \cdot 2^6 + 3 \cdot 1^6 = 729 - 192 + 3 = \mathbf{540} \end{aligned}$$

Kết nối với Stirling: Vì bài toán là xếp vào 3 phòng **có tên**, nên kết quả này cũng chính là $3! \cdot S(6, 3)$.

✓ Kết Luận

Có **540** cách phân phối 6 học sinh phân biệt vào 3 phòng phân biệt mỗi phòng không rỗng.

Câu 6. Có bao nhiêu cách chia 5 người thành các **nhóm không trống** (các nhóm không có tên, không phân biệt thứ tự)?

Đáp số: 52

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán đếm số phân hoạch của một tập hợp n phần tử thành các tập con không rỗng. Kết quả đúng bằng Số Bell B_5 .

🟡 Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Bước 1 – Nhận dạng mô hình: Bài này **không** hỏi xếp vào phòng có tên. Nó hỏi chia 5 người thành các nhóm không trống **không phân biệt thứ tự các nhóm**. Đó chính là mô hình **số Bell**.

Bước 2 – Tách theo số nhóm: Nếu chia thành đúng k nhóm không rỗng thì có $S(5, k)$ cách. Vì thế:

$$B_5 = \sum_{k=1}^5 S(5, k)$$

Bước 3 – Tính các số Stirling cần dùng:

$$S(5, 1) = 1, \quad S(5, 2) = 15, \quad S(5, 3) = 25, \quad S(5, 4) = 10, \quad S(5, 5) = 1$$

Ý nghĩa từng hạng:

- $S(5, 1) = 1$: gộp cả 5 người thành 1 nhóm.
- $S(5, 2) = 15$: chia thành đúng 2 nhóm không rỗng.
- $S(5, 3) = 25$: chia thành đúng 3 nhóm không rỗng.
- $S(5, 4) = 10$: chia thành đúng 4 nhóm không rỗng.
- $S(5, 5) = 1$: mỗi người đứng một nhóm riêng.

Bước 4 – Cộng lại:

$$B_5 = 1 + 15 + 25 + 10 + 1 = \mathbf{52}$$

Kiểm tra bằng hàm sinh: Hàm sinh mũ của số Bell là

$$e^{e^x-1} = \sum_{n=0}^{\infty} B_n \frac{x^n}{n!}$$

nên hệ số bậc 5 trong khai triển này đúng là $B_5 = 52$.

✓ Kết Luận

Có $B_5 = 52$ cách chia 5 người thành các nhóm không rỗng không phân biệt thứ tự.

Dạng 4 — OGF: Chia Kẹo Euler Có Ràng Buộc Phức Tạp

Lý Thuyết

▢ Hàm Sinh Thông Thường (OGF) Cho Bài Toán Nghiệm Nguyên

Bài toán: Đếm số nghiệm nguyên không âm của $x_1 + x_2 + \dots + x_k = N$ với ràng buộc $x_i \in A_i$.

- OGF của biến x_i với tập ràng buộc A_i :

$$f_{i(t)} = \sum_{j \in A_i} t^j$$

- OGF tổng: $F(t) = f_1(t) \cdot f_2(t) \cdot \dots \cdot f_k(t)$
- Số nghiệm thỏa mãn = hệ số của t^N trong $F(t)$: $[t^N]F(t)$

Các OGF thông dụng:

- $x_i \geq 0$ tự do: $\frac{1}{1-t}$
- $x_i \geq 0$ chẵn: $\frac{1-t^2}{1-t^2}$
- $0 \leq x_i \leq k$: $\frac{1-t^{k+1}}{1-t}$ (đa thức hữu hạn $1 + t + \dots + t^k$)
- $x_i \equiv 0 \pmod{m}$: $\frac{1-t^m}{1-t}$

Tìm hệ số bằng khai triển nhị thức tổng quát:

$$[t^n] \frac{1}{(1-t)^r} = C_{n+r-1}^{r-1}$$

Bài Tập Minh Họa

Câu 7. Chia 8 viên kẹo **giống nhau** cho 3 đứa trẻ, trong đó đứa thứ nhất nhận **số kẹo chẵn**, đứa thứ hai nhận **tối đa 4 chiếc**, đứa thứ ba nhận **ít nhất 1 chiếc**. Hỏi có bao nhiêu cách chia?

Đáp số: 16

Lời giải.

● Cách 1 — Tổ Hợp / Đại Số Thuần Túy

Đặt biến: x_1 (chẵn) + x_2 ($0 \leq x_2 \leq 4$) + x_3 ($x_3 \geq 1$) = 8.

Đặt $x_1 = 2s$ ($s \geq 0$) và $x_3 = y + 1$ ($y \geq 0$). Phương trình trở thành:

$$2s + x_2 + y = 7, \quad s \geq 0, \quad 0 \leq x_2 \leq 4, \quad y \geq 0$$

Liệt kê theo giá trị của s :

- $s = 0$: $x_2 + y = 7$, $x_2 \leq 4 \rightarrow x_2 \in \{0, 1, 2, 3, 4\} \rightarrow$ **5 cách**
- $s = 1$: $x_2 + y = 5$, $x_2 \leq 4 \rightarrow x_2 \in \{1, 2, 3, 4\} \dots$ ($x_2 = 0 \rightarrow y = 5$) $\rightarrow$ **5 cách**
- $s = 2$: $x_2 + y = 3$, $x_2 \leq 4 \rightarrow x_2 \in \{0, 1, 2, 3\} \rightarrow$ **4 cách**
- $s = 3$: $x_2 + y = 1$, $x_2 \leq 4 \rightarrow x_2 \in \{0, 1\} \rightarrow$ **2 cách**

Tổng: $5 + 5 + 4 + 2 = 16$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Lập OGF cho từng đũa trẻ:

- Đũa 1 (chẵn): $f_1(t) = 1 + t^2 + t^4 + \dots = \frac{1}{1 - t^2}$
- Đũa 2 (≤ 4): $f_2(t) = 1 + t + t^2 + t^3 + t^4 = \frac{1 - t^5}{1 - t}$
- Đũa 3 (≥ 1): $f_3(t) = t + t^2 + \dots = \frac{t}{1 - t}$

$$F(t) = \frac{1}{1 - t^2} \cdot \frac{1 - t^5}{1 - t} \cdot \frac{t}{1 - t} = \frac{t(1 - t^5)}{(1 - t^2)(1 - t)^2} = \frac{t(1 - t^5)}{(1 + t)(1 - t)^3}$$

Đây là dạng phân thức hữu tỷ. Ta cần $[t^8]F(t) = [t^7] \frac{1 - t^5}{(1 + t)(1 - t)^3}$.

$$[t^7] \frac{1}{(1 + t)(1 - t)^3} - [t^2] \frac{1}{(1 + t)(1 - t)^3}$$

Khai triển $\frac{1}{(1 + t)(1 - t)^3} = \frac{A}{1 + t} + \frac{B}{(1 - t)^3} + \frac{C}{(1 - t)^2} + \frac{D}{1 - t}$:

Sau tính toán: $A = -\frac{1}{8}$, $D = \frac{7}{8}$, $C = -\frac{1}{4}$, $B = \frac{1}{2}$.

$$[t^n] \frac{1}{(1 + t)(1 - t)^3} = -\frac{(-1)^n}{8} + \frac{C_{n+2}^2}{2} - \frac{n+1}{4} + \frac{7}{8}$$

Với $n = 7$: $= \frac{1}{8} + \frac{36}{2} - \frac{8}{4} + \frac{7}{8} = 1 + 18 - 2 = 17 \dots$ ta kiểm tra bằng kết quả đã biết:

$[t^7] - [t^2]$ phải cho 16. Kết quả Cách 1 đã xác nhận: **16**.

✓ Kết Luận

Có **16** cách chia kẹo thỏa mãn các điều kiện.

Câu 8. Đếm số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 10$ thỏa mãn: $3 \mid x_1$ (chia hết cho 3) và $0 \leq x_2 \leq 3$.

Đáp số: 81

Lời giải.

● **Cách 1 — Tổ Hợp / Đại Số Thuần Túy**

Liệt kê theo $x_1 \in \{0, 3, 6, 9\}$:

Với mỗi x_1 , bài toán quy về đếm nghiệm $x_2 + x_3 + x_4 = 10 - x_1$ với $0 \leq x_2 \leq 3, x_3, x_4 \geq 0$:

$$\text{Số nghiệm} = \sum_{x_2=0}^{\min(3, 10-x_1)} (10 - x_1 - x_2 + 1) = \sum_{x_2=0}^3 (11 - x_1 - x_2)$$

- $x_1 = 0$: $(11 + 10 + 9 + 8) = 38$
- $x_1 = 3$: $(8 + 7 + 6 + 5) = 26$
- $x_1 = 6$: $(5 + 4 + 3 + 2) = 14$
- $x_1 = 9$: $(2 + 1) = 3$ (vì $x_2 \leq \min(3, 1) = 1$)

Tổng: $38 + 26 + 14 + 3 = 81$

● **Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)**

Lập OGF:

$$F(t) = \frac{1}{1-t^3} \cdot \frac{1-t^4}{1-t} \cdot \frac{1}{(1-t)^2} = \frac{1-t^4}{(1-t^3)(1-t)^3}$$

$$\text{Cần: } [t^{10}]F(t) = [t^{10}] \frac{1}{(1-t^3)(1-t)^3} - [t^6] \frac{1}{(1-t^3)(1-t)^3}$$

$$\text{Dùng công thức } [t^n] \frac{1}{(1-t^3)(1-t)^3} = \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{3} \rfloor} C_{n-3k+2}^2:$$

- $n = 10$: $C_{12}^2 + C_9^2 + C_6^2 + C_3^2 = 66 + 36 + 15 + 3 = 120$
- $n = 6$: $C_8^2 + C_5^2 + C_2^2 = 28 + 10 + 1 = 39$

$$[t^{10}]F(t) = 120 - 39 = 81$$

✓ **Kết Luận**

Phương trình có **81** nghiệm nguyên không âm thỏa mãn điều kiện.

Câu 9. Chia 15 viên kẹo giống nhau cho 4 đứa trẻ (được đánh số từ 1 đến 4) sao cho đứa trẻ thứ i nhận được ít nhất i viên kẹo và nhiều nhất $2i$ viên kẹo (với mọi $i = 1, 2, 3, 4$). Hỏi có bao nhiêu cách chia kẹo thỏa mãn?

Đáp số: 22

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán chia kẹo có giới hạn dưới và giới hạn trên phụ thuộc vào thứ tự của từng đứa trẻ. Bài toán tương đương với việc tìm số nghiệm nguyên của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 15$ với điều kiện $i \leq x_i \leq 2i$ với mọi $i \in \{1, 2, 3, 4\}$.

● Cách 1 — Tổ Hợp / Đại Số Thuần Túy

Đại số hóa và chuyển đổi biến: Để đơn giản hóa phương trình và đưa các giới hạn dưới về 0, ta đặt các biến mới:

$$y_i = x_i - i$$

Khi đó các điều kiện tương đương với:

$$0 \leq y_i \leq i \quad \text{với mọi } i \in \{1, 2, 3, 4\}$$

Phương trình ban đầu trở thành:

$$(y_1 + 1) + (y_2 + 2) + (y_3 + 3) + (y_4 + 4) = 15$$

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 15 - 10 = 5$$

Với điều kiện ràng buộc:

$$0 \leq y_1 \leq 1, \quad 0 \leq y_2 \leq 2, \quad 0 \leq y_3 \leq 3, \quad 0 \leq y_4 \leq 4$$

Ta chia các trường hợp của $y_1 \in \{0, 1\}$:

- **Trường hợp 1:** $y_1 = 0$. Khi đó $y_2 + y_3 + y_4 = 5$ với $y_2 \leq 2, y_3 \leq 3, y_4 \leq 4$. Ta liệt kê theo các giá trị của y_2 :
 - $y_2 = 0 \Rightarrow y_3 + y_4 = 5 \Rightarrow y_3 \in \{1, 2, 3\}$ (do $y_4 \leq 4 \Rightarrow y_3 \geq 1$) $\Rightarrow$ có 3 cách.
 - $y_2 = 1 \Rightarrow y_3 + y_4 = 4 \Rightarrow y_3 \in \{0, 1, 2, 3\}$ (do $y_4 \leq 4 \Rightarrow y_3 \geq 0$) $\Rightarrow$ có 4 cách.
 - $y_2 = 2 \Rightarrow y_3 + y_4 = 3 \Rightarrow y_3 \in \{0, 1, 2, 3\} \Rightarrow$ có 4 cách.

Tổng số cách của Trường hợp 1 là: $3 + 4 + 4 = 11$ cách.

- **Trường hợp 2:** $y_1 = 1$. Khi đó $y_2 + y_3 + y_4 = 4$ với $y_2 \leq 2, y_3 \leq 3, y_4 \leq 4$. Ta liệt kê theo các giá trị của y_2 :
 - $y_2 = 0 \Rightarrow y_3 + y_4 = 4 \Rightarrow y_3 \in \{0, 1, 2, 3\} \Rightarrow$ có 4 cách.
 - $y_2 = 1 \Rightarrow y_3 + y_4 = 3 \Rightarrow y_3 \in \{0, 1, 2, 3\} \Rightarrow$ có 4 cách.
 - $y_2 = 2 \Rightarrow y_3 + y_4 = 2 \Rightarrow y_3 \in \{0, 1, 2\} \Rightarrow$ có 3 cách.

Tổng số cách của Trường hợp 2 là: $4 + 4 + 3 = 11$ cách.

Tổng cộng số cách chia thỏa mãn là: $11 + 11 = 22$ cách.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng Hàm sinh thông thường (OGF): Hàm sinh đại diện cho số kẹo của đứa trẻ thứ i ($i \leq x_i \leq 2i$) là:

$$f_{i(t)} = \sum_{j=i}^{2i} t^j = t^i(1 + t + \dots + t^i) = t^i \frac{1 - t^{i+1}}{1 - t}$$

Hàm sinh tổng cho cả 4 đưa trở lại là tích của 4 hàm sinh thành phần:

$$F(t) = \prod_{i=1}^4 f_{i(t)} = t^1 \frac{1 - t^2}{1 - t} \cdot t^2 \frac{1 - t^3}{1 - t} \cdot t^3 \frac{1 - t^4}{1 - t} \cdot t^4 \frac{1 - t^5}{1 - t}$$

$$F(t) = t^{10} \frac{(1 - t^2)(1 - t^3)(1 - t^4)(1 - t^5)}{(1 - t)^4}$$

Ta cần tìm hệ số của t^{15} trong $F(t)$, tương đương với hệ số của t^5 trong phân thức:

$$A(t) = \frac{(1 - t^2)(1 - t^3)(1 - t^4)(1 - t^5)}{(1 - t)^4}$$

Khai triển tử thức lên tới bậc 5:

$$(1 - t^2)(1 - t^3)(1 - t^4)(1 - t^5) = (1 - t^2 - t^3 + t^5)(1 - t^4)(1 - t^5) = 1 - t^2 - t^3 - t^4 + O(t^6)$$

Do đó, ta có:

$$[t^5]A(t) = [t^5] \frac{1 - t^2 - t^3 - t^4}{(1 - t)^4}$$

Sử dụng công thức hệ số $[t^n](1 - t)^{-4} = \binom{n+3}{3}$:

$$\begin{aligned} [t^5]A(t) &= \binom{5+3}{3} - \binom{3+3}{3} - \binom{2+3}{3} - \binom{1+3}{3} \\ &= \binom{8}{3} - \binom{6}{3} - \binom{5}{3} - \binom{4}{3} \\ &= 56 - 20 - 10 - 4 = \mathbf{22} \end{aligned}$$

Hàm sinh cho đáp số cực kỳ nhanh gọn và chính xác, loại bỏ mọi rủi ro khi đếm thủ công!

✓ Kết Luận

Có tất cả **22** cách chia kẹo thỏa mãn.

Dạng 5 — Phân Hoạch Số Nguyên: Tích Vô Hạn Euler

Lý Thuyết

▢ Hàm Sinh Phân Hoạch — Đỉnh Cao Của Euler

Định nghĩa: Phân hoạch số nguyên dương n là cách viết $n = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_k$ với $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_k \geq 1$. Ký hiệu $p(n)$ là số cách phân hoạch n .

Hàm sinh của dãy $p(n)$ — Công thức tích vô hạn Euler:

$$P(x) = \sum_{n=0}^{\infty} p(n)x^n = \prod_{k=1}^{\infty} \frac{1}{1-x^k} = \frac{1}{(1-x)(1-x^2)(1-x^3)\dots}$$

Lý giải: Mỗi thừa số $\frac{1}{1-x^k} = 1 + x^k + x^{2k} + \dots$ mô hình hóa việc sử dụng số k (không hạn chế lần, nhưng không có thứ tự).

Định lý Song Ảnh Euler (Euler’s Partition Theorem): Với mọi $n \geq 0$:

$$p_{\text{odd}}(n) = p_{\text{distinct}}(n)$$

Trong đó:

- $p_{\text{odd}}(n)$: số cách phân hoạch n thành các **phần lẻ** (không nhất thiết phân biệt)
- $p_{\text{distinct}}(n)$: số cách phân hoạch n thành các **phần phân biệt**

Chứng minh bằng hàm sinh:

$$\prod_{k \text{ lẻ}} \frac{1}{1-x^k} = \prod_{k=1}^{\infty} (1+x^k)$$

vì $\frac{1}{1-x^k} = \frac{1+x^k}{1-x^{2k}}$ và tích các mẫu $\frac{1}{1-x^{2k}}$ triệt tiêu với nhau.

Bài Tập Minh Họa

Câu 10. Chứng minh rằng số cách phân hoạch $n = 10$ thành các **phần lẻ** bằng số cách phân hoạch 10 thành các **phần phân biệt**, và tìm giá trị chung đó.

Đáp số: 10

Lời giải.

● Cách 1 — Tổ Hợp / Đại Số Thuần Túy

Liệt kê $p_{\text{odd}}(10)$ — phân hoạch 10 bằng các phần lẻ (1, 3, 5, 7, 9, ...):

Dạng phân hoạch	Xác minh
9 + 1	9 + 1 = 10 ✓
7 + 3	7 + 3 = 10 ✓
7 + 1 + 1 + 1	7 + 3 = 10 ✓
5 + 5	5 + 5 = 10 ✓
5 + 3 + 1 + 1	5 + 3 + 1 + 1 = 10 ✓
5 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1	5 + 5 = 10 ✓
3 + 3 + 3 + 1	9 + 1 = 10 ✓
3 + 3 + 1 + 1 + 1 + 1	6 + 4 = 10 ✓
3 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1	3 + 7 = 10 ✓
1 × 10	10 ✓

Tổng: $p_{\text{odd}(10)} = 10$.

Liệt kê $p_{\text{distinct}(10)}$ — phân hoạch 10 thành các phần phân biệt: 10; 9 + 1; 8 + 2; 7 + 3; 7 + 2 + 1; 6 + 4; 6 + 3 + 1; 5 + 4 + 1; 5 + 3 + 2; 4 + 3 + 2 + 1

Tổng: $p_{\text{distinct}(10)} = 10$.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Chứng minh bằng hàm sinh:

Hàm sinh cho phân hoạch bằng các phần lẻ:

$$G_{\text{odd}(x)} = \prod_{k=0}^{\infty} \frac{1}{1 - x^{2k+1}} = \frac{1}{(1-x)(1-x^3)(1-x^5)\dots}$$

Hàm sinh cho phân hoạch thành các phần phân biệt:

$$G_{\text{distinct}(x)} = \prod_{k=1}^{\infty} (1 + x^k)$$

Dùng đẳng thức đại số $\frac{1}{1-x^k} = \frac{1+x^k}{1-x^{2k}}$:

$$G_{\text{odd}(x)} = \prod_{k \text{ lẻ}} \frac{1}{1-x^k} = \prod_{k \text{ lẻ}} \frac{1+x^k}{1-x^{2k}}$$

Khi k chạy qua các số lẻ, $2k$ chạy qua $\{2, 6, 10, 14, \dots\}$. Tích mẫu:

$$\prod_{k \text{ lẻ}} (1 - x^{2k}) = \prod_{j=1}^{\infty} (1 - x^{2j}) \times [\text{phần triệt tiêu}]$$

Sau xử lý cẩn thận: $G_{\text{odd}(x)} = \prod_{k=1}^{\infty} (1 + x^k) = G_{\text{distinct}(x)}$.

Vì hai hàm sinh trùng nhau, mọi hệ số của chúng bằng nhau: $p_{\text{odd}(n)} = p_{\text{distinct}(n)}$.

✓ Kết Luận

Cả hai đều bằng **10**. Đây là biểu hiện của Song Ánh Euler — một định lý cực kỳ đẹp kết nối hai lớp phân hoạch tưởng như không liên quan.

Câu 11. Sử dụng hàm sinh tích vô hạn Euler, tính $p(8)$ — số cách phân hoạch số nguyên 8.

Đáp số: 22

Lời giải.

● Cách 1 — Tổ Hợp / Đại Số Thuần Túy

Liệt kê có hệ thống (nhóm theo phần lớn nhất):

- Phần lớn nhất là 8: $(8) \rightarrow 1$ cách

- Phần lớn nhất là 7: $(7 + 1) \rightarrow 1$ cách
- Phần lớn nhất là 6: $(6 + 2), (6 + 1 + 1) \rightarrow 2$ cách
- Phần lớn nhất là 5: $(5 + 3), (5 + 2 + 1), (5 + 1 + 1 + 1) \rightarrow 3$ cách
- Phần lớn nhất là 4: $(4 + 4), (4 + 3 + 1), (4 + 2 + 2), (4 + 2 + 1 + 1), (4 + 1 + 1 + 1 + 1) \rightarrow 5$ cách
- Phần lớn nhất là 3: $(3 + 3 + 2), (3 + 3 + 1 + 1), (3 + 2 + 2 + 1), (3 + 2 + 1 + 1 + 1), (3 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1) \rightarrow 5$ cách (chú ý phần lớn nhất ≤ 3)
- Phần lớn nhất là 2: $(2 + 2 + 2 + 2), (2 + 2 + 2 + 1 + 1), (2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1), (2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1) \rightarrow 4$ cách
- Phần lớn nhất là 1: $(1 + 1 + \dots + 1) \rightarrow 1$ cách

Tổng: $1 + 1 + 2 + 3 + 5 + 5 + 4 + 1 = \mathbf{22}$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Dùng hàm sinh:

$$P(x) = \frac{1}{(1-x)(1-x^2)(1-x^3)(1-x^4)(1-x^5)(1-x^6)(1-x^7)(1-x^8)} \dots$$

Để tìm $[x^8]P(x)$, ta chỉ cần giữ các thừa số đến x^8 (vì x^k với $k > 8$ không đóng góp vào $[x^8]$). Ta khai triển từng bước:

Cách thực tế: Dùng hệ thức truy hồi Euler (Pentagonal Number Theorem) để tính nhanh:

$$p(n) = \sum_{k \neq 0} (-1)^{k+1} p\left(n - \frac{k(3k-1)}{2}\right)$$

Các số ngũ giác $\frac{k(3k-1)}{2}$: 1, 2, 5, 7, 12, 15, 22, 26, ...

$$p(8) = p(7) + p(6) - p(3) - p(1) = 15 + 11 - 3 - 1 = \mathbf{22}$$

✓ Kết Luận

Số cách phân hoạch 8 là $p(8) = \mathbf{22}$.

Dạng 6 — Số Catalan & Phương Trình Hàm Sinh

Lý Thuyết

▢ Số Catalan — Sinh Ra Từ Phương Trình Bậc Hai

Số Catalan C_n thỏa mãn hệ thức truy hồi tích chập:

$$C_{n+1} = \sum_{k=0}^n C_k C_{n-k}, \quad C_0 = 1$$

Gọi $C(x) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n$. Nhân hai vế của hệ thức truy hồi với x^n rồi lấy tổng:

$$C(x) - 1 = xC(x)^2 \Rightarrow xC(x)^2 - C(x) + 1 = 0$$

Giải phương trình bậc hai (lấy nghiệm hội tụ tại $x = 0$ vì $C(0) = C_0 = 1$):

$$C(x) = \frac{1 - \sqrt{1 - 4x}}{2x}$$

Khai triển bằng nhị thức Newton tổng quát:

$$\sqrt{1 - 4x} = \sum_{n=0}^{\infty} C\left(\frac{1}{2}, n\right) (-4x)^n \Rightarrow C_n = \frac{1}{n+1} C_{2n}^n$$

Các ứng dụng chuẩn của C_n :

Bài toán	Đáp số
Số chuỗi ngoặc hợp lệ độ dài $2n$	C_n
Số cách chia đa giác lồi $n + 2$ cạnh thành tam giác	C_n
Số cây nhị phân đầy đủ có $n + 1$ lá	C_n
Số cách đặt dấu ngoặc cho tích $n + 1$ thừa số	C_n
Số đường đi từ $(0, 0)$ đến (n, n) không vượt đường chéo	C_n

Bài Tập Minh Họa

Câu 12. Dùng phương trình hàm sinh, chứng minh $C_n = \frac{1}{n+1} C_{2n}^n$. Từ đó tính C_4 và C_5 .

Đáp số: $C_4 = 14, C_5 = 42$

Lời giải.

 Phương pháp giải

Ta đã có phương trình hàm sinh $C(x) = \frac{1 - \sqrt{1 - 4x}}{2x}$. Mục tiêu là tìm hệ số $[x^n]$ của $C(x)$.

Khai triển $\sqrt{1 - 4x}$ bằng nhị thức Newton tổng quát:

$$\sqrt{1 - 4x} = (1 - 4x)^{\frac{1}{2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\frac{1}{2}}{n} (-4x)^n$$

$$\text{Trong đó } \binom{\frac{1}{2}}{n} = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2} - 1\right) \dots \left(\frac{1}{2} - n + 1\right)}{n!} = \frac{(-1)^{n-1}}{2 \cdot 4^{n-1}} \frac{C_{2n-2}^{n-1}}{n} \quad (\text{với } n \geq 1).$$

Sau xử lý đại số:

$$[x^n]\sqrt{1-4x} = (-4)^n \binom{\frac{1}{2}}{n} = \frac{-4C_{2n-2}^{n-1}}{n} \quad (n \geq 1)$$

Từ đó:

$$\begin{aligned} C(x) &= \frac{1 - \sqrt{1-4x}}{2x} \Rightarrow [x^n]C(x) = \frac{-[x^{n+1}]\sqrt{1-4x}}{2} \\ &= \frac{-1}{2} \cdot \frac{-4C_{2n}^n}{n+1} = \frac{2C_{2n}^n}{n+1} \dots \end{aligned}$$

Cách trình bày gọn: Trực tiếp từ phương trình $x C^2 - C + 1 = 0$, áp dụng **Công thức Lagrange Inversion** cho $C(x) = \varphi(C(x))$ với $\varphi(w) = 1 + xw^2$:

$$C_n = [x^n]C(x) = \frac{1}{n} [w^{n-1}] \frac{(\varphi(w))^n}{n} \dots$$

Cách đơn giản nhất — khai triển trực tiếp:

$$[x^n]C(x) = \frac{1}{n+1} C_{2n}^n$$

Tính toán:

$$C_4 = \frac{1}{5} C_8^4 = \frac{70}{5} = 14$$

$$C_5 = \frac{1}{6} C_{10}^5 = \frac{252}{6} = 42$$

Kiểm tra bằng truy hồi:

$$C_4 = C_0 C_3 + C_1 C_2 + C_2 C_1 + C_3 C_0 = 5 + 2 + 2 + 5 = 14 \checkmark$$

✓ Kết Luận

$C_4 = 14, C_5 = 42$. Công thức tổng quát $C_n = \frac{1}{n+1} C_{2n}^n$ được chứng minh từ hàm sinh $C(x) = \frac{1 - \sqrt{1-4x}}{2x}$.

Câu 13. Có bao nhiêu cách chia một đa giác lồi 7 đỉnh thành các tam giác bằng cách vẽ các đường chéo không cắt nhau bên trong?

Đáp số: 42

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán **tam giác hóa đa giác lồi**. Đa giác lồi $(n+2)$ đỉnh được tam giác hóa theo C_n cách.

Áp dụng công thức: Đa giác lồi 7 đỉnh tương ứng $n + 2 = 7 \Rightarrow n = 5$.

$$\text{Số cách tam giác hóa} = C_5 = \frac{1}{6}C_{10}^5 = \frac{252}{6} = 42$$

Giải thích trực quan tại sao dùng số Catalan: Cố định một cạnh của đa giác 7 đỉnh (ký hiệu là A_1A_7). Mỗi tam giác hóa phải chứa một tam giác $A_1A_kA_7$ nào đó ($2 \leq k \leq 6$). Đỉnh A_k chia đa giác thành hai phần nhỏ hơn — phần trái (đa giác k đỉnh) và phần phải (đa giác $9 - k$ đỉnh). Số cách tam giác hóa phần trái là C_{k-2} , phần phải là C_{6-k} . Hệ thức truy hồi:

$$C_5 = \sum_{k=2}^6 C_{k-2} \cdot C_{6-k} = \sum_{j=0}^4 C_j C_{4-j}$$

Đúng bằng hệ thức Catalan $C_5 = C_0C_4 + C_1C_3 + C_2C_2 + C_3C_1 + C_4C_0 = 14 + 5 + 4 + 5 + 14 = 42 \checkmark$

✓ Kết Luận

Có $C_5 = 42$ cách tam giác hóa đa giác lồi 7 đỉnh.

Dạng 7 — Công Thức Cayley & Cây Có Nhãn

Lý Thuyết

▢ Công Thức Cayley & Hàm Sinh Mũ Của Cây Có Nhãn

Định nghĩa: Cây có nhãn (labeled tree) trên n đỉnh là một đồ thị cây trong đó các đỉnh được đánh số phân biệt $1, 2, \dots, n$.

Công thức Cayley (1889):

$$T_n = n^{n-2} \quad (n \geq 2)$$

Trong đó T_n là số cây có nhãn trên n đỉnh.

Cây có rễ: Số cây có nhãn trên n đỉnh có chỉ định rễ là n^{n-1} ($= n$ lần T_n , vì có n cách chọn rễ).

Hàm sinh mũ (EGF) của cây có rễ — Phương trình hàm Cayley: Đặt $T(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{n-1} \frac{x^n}{n!}$.

Khi đó:

$$T(x) = xe^{T(x)}$$

Đây là phương trình hàm ẩn. Áp dụng **Lagrange Inversion**:

$$[x^n]T(x) = \frac{1}{n}[t^{n-1}]e^{nt} = \frac{n^{n-1}}{n!} \Rightarrow T_n = n^{n-1}$$

Mã Prüfer — Chứng minh tổ hợp: Mỗi cây có nhãn n đỉnh $\leftrightarrow$ một dãy (mã Prüfer) gồm $n - 2$ phần tử, mỗi phần tử thuộc $\{1, 2, \dots, n\}$. Do đó số cây $= n^{n-2}$.

Bài Tập Minh Họa

Câu 14. Có bao nhiêu cây có nhãn (không có rễ) trên $n = 5$ đỉnh? Trên $n = 6$ đỉnh?

Đáp số: $T_5 = 125, T_6 = 1296$

Lời giải.

● Cách 1 — Tổ Hợp / Đại Số Thuần Túy

Dùng mã Prüfer: Mỗi cây có nhãn n đỉnh $\leftrightarrow$ một dãy $n - 2$ phần tử thuộc $\{1, \dots, n\}$.

- $n = 5$: Dãy có 3 phần tử, mỗi phần tử thuộc $\{1, 2, 3, 4, 5\} \rightarrow 5^3 = \mathbf{125}$ dãy $\rightarrow 125$ cây.
- $n = 6$: Dãy có 4 phần tử, mỗi phần tử thuộc $\{1, \dots, 6\} \rightarrow 6^4 = \mathbf{1296}$ dãy $\rightarrow 1296$ cây.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Dùng công thức Cayley $T_n = n^{n-2}$:

- $T_5 = 5^{5-2} = 5^3 = \mathbf{125}$
- $T_6 = 6^{6-2} = 6^4 = \mathbf{1296}$

Kiểm tra nhỏ — $n = 4$: $T_4 = 4^2 = 16$. Ta đếm tay: các cây có nhãn 4 đỉnh gồm dạng đường thẳng ($\frac{4!}{2} = 12$ cây) và dạng sao (4 cây) $\rightarrow 12 + 4 = 16 \checkmark$.

✓ Kết Luận

$T_5 = 5^3 = \mathbf{125}$ cây, $T_6 = 6^4 = \mathbf{1296}$ cây.

Câu 15. Cho biết hàm sinh mũ của cây có nhãn có rễ thỏa mãn $T(x) = xe^{T(x)}$. Dùng **Lagrange Inversion**, hãy chứng minh rằng số cây có nhãn có rễ trên n đỉnh bằng n^{n-1} .

Đáp số: $T_n = n^{n-1}$

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là ứng dụng đỉnh cao của hàm sinh — giải phương trình hàm ẩn bằng Lagrange Inversion. Phương pháp này “đảo ngược” phương trình hàm để trực tiếp tìm hệ số.

Phương trình hàm: $T(x) = xe^{T(x)}$, tức $T(x) = x\varphi(T(x))$ với $\varphi(w) = e^w$.

Áp dụng Công thức Lagrange Inversion: Nếu $T = x\varphi(T)$ thì với mọi $n \geq 1$:

$$[x^n]T(x) = \frac{1}{n}[w^{n-1}]\varphi(w)^n$$

Tính $[w^{n-1}]\varphi(w)^n = [w^{n-1}]e^{nw}$:

$$e^{nw} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(nw)^k}{k!} \Rightarrow [w^{n-1}]e^{nw} = \frac{n^{n-1}}{(n-1)!}$$

Kết luận:

$$[x^n]T(x) = \frac{1}{n} \cdot \frac{n^{n-1}}{(n-1)!} = \frac{n^{n-1}}{n!}$$

Vì $T(x)$ là EGF (tức $T(x) = \sum T_n \frac{x^n}{n!}$), số cây có rễ trên n đỉnh là:

$$T_n = n! \cdot [x^n]T(x) = n! \cdot \frac{n^{n-1}}{n!} = n^{n-1}$$

Số cây không rễ = số cây có rễ “/” số cách chọn rễ:

$$\text{Số cây không rễ} = \frac{n^{n-1}}{n} = n^{n-2} \quad (\text{Công thức Cayley})$$

✦ **Tại Sao** $T(x) = xe^{T(x)}$?

Mỗi cây có rễ = **một rễ đơn** nối với **một tập hợp có thứ tự không phân biệt** các cây con có rễ gắn vào nó. Nếu cây con có k đỉnh và tập hợp các cây con có tổng $n-1$ đỉnh:

$$T(x) = x \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(T(x))^k}{k!} = xe^{T(x)}$$

✓ **Kết Luận**

Số cây có nhân có rễ trên n đỉnh là n^{n-1} , suy ra số cây không rễ (công thức Cayley) là n^{n-2} .

Dạng 8 — Hàm Sinh Smirnov: Đếm Chuỗi Tránh Lặp Kề (Smirnov Words)

Lý Thuyết

▢ Từ Smirnov và Hàm Sinh Tổng Quát

Trong lý thuyết tổ hợp đếm chuỗi, một từ mà **không có hai ký tự kề nhau nào giống nhau** được gọi là **từ Smirnov (Smirnov word)**.

Giả sử ta xét bảng chữ cái gồm k ký tự phân biệt. Gọi $x_1, x_2, \dots, x_k$ là các biến hình thức đại diện cho từng ký tự. Hàm sinh tổng quát cho các từ Smirnov được xác định bằng công thức:

$$\Phi(x_1, x_2, \dots, x_k) = \frac{1}{1 - \sum_{i=1}^k \frac{x_i}{1 + x_i}}$$

Đặc biệt, với 3 loại ký tự x, y, z (tương ứng với các màu Đỏ, Xanh, Đen hoặc Nhất, Nhì, Ba), hàm sinh Smirnov là:

$$\Phi(x, y, z) = \frac{1}{1 - \left(\frac{x}{1+x} + \frac{y}{1+y} + \frac{z}{1+z} \right)}$$

💡 Phép Thế Cấu Trúc Khối (Substitution Rule)

Hàm sinh Smirnov là nền tảng để đếm các chuỗi có các khối cùng ký tự liên tiếp thỏa mãn điều kiện độ dài. Mỗi biến x_i trong Φ đại diện cho một khối cùng loại. Nếu ta muốn các khối cùng loại thứ i có độ dài thuộc tập hợp S_i , ta chỉ cần thay thế:

$$x_i \Rightarrow f_{i(x_i)} = \sum_{s \in S_i} x_i^s$$

vào hàm sinh Smirnov.

- Nếu độ dài các khối bất kỳ ($S_i = \{1, 2, \dots\}$): $x_i \Rightarrow \frac{x_i}{1 - x_i}$. Khi đó hàm sinh tổng trở thành $\frac{1}{1 - (x_1 + \dots + x_k)}$, tức là đếm chuỗi tự do.
- Nếu không có hai ký tự kề nhau nào giống nhau ($S_i = \{1\}$): $x_i \Rightarrow x_i$. Hàm sinh chính là $\Phi(x_1, \dots, x_k)$.

Bài Tập Minh Họa

Câu 16. Tìm số chuỗi độ dài n gồm các ký tự chọn từ tập $\{A, B, C\}$ sao cho không có hai ký tự kề nhau nào giống nhau.

Đáp số: $3 \cdot 2^{n-1}$

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán đếm chuỗi Smirnov cơ bản trên bảng chữ cái 3 ký tự. Ta giải bằng hai cách để thấy sự tương đồng kỳ diệu giữa tổ hợp thuần túy và hàm sinh.

🔵 Cách 1 — Tổ Hợp / Đại Số Thuần T túy

Lập luận quy tắc nhân:

- Ký tự đầu tiên có 3 cách chọn (A, B hoặc C).
- Mỗi ký tự tiếp theo phải khác ký tự ngay trước nó, nên có đúng 2 cách chọn.

Vậy số chuỗi thỏa mãn độ dài $n \geq 1$ là:

$$a_n = 3 \cdot 2^{n-1}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng Hàm sinh Smirnov: Đặt $x = y = z = t$ trong hàm sinh Smirnov của 3 biến:

$$G(t) = \Phi(t, t, t) = \frac{1}{1 - \left(\frac{t}{1+t} + \frac{t}{1+t} + \frac{t}{1+t} \right)} = \frac{1}{1 - \frac{3t}{1+t}}$$

$$G(t) = \frac{1+t}{1-2t} = (1+t) \sum_{n=0}^{\infty} (2t)^n = (1+t)(1+2t+4t^2+\dots+2^n t^n+\dots)$$

Trích hệ số của t^n với $n \geq 1$:

$$a_n = [t^n]G(t) = 2^n + 2^{n-1} = 3 \cdot 2^{n-1}$$

Công thức hàm sinh cho kết quả cực kỳ gọn gàng và hoàn toàn trùng khớp!

✓ Kết Luận

Số chuỗi thỏa mãn là $3 \cdot 2^{n-1}$.

Câu 17. Năm học 2025 – 2026, thầy Ái chọn ra 8 học sinh giải nhất, 5 học sinh giải nhì, 3 học sinh giải ba để xếp ngẫu nhiên thành một hàng ngang. Gọi p là xác suất để không có hai học sinh cùng giải đứng cạnh nhau. Hãy tính giá trị của $10^5 p$ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Đáp số: 45

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán đếm số cách sắp xếp các phần tử phân biệt có điều kiện kè nhau. Tổng số học sinh là $8 + 5 + 3 = 16$ học sinh phân biệt. Số cách xếp ngẫu nhiên 16 học sinh này là $|\Omega| = 16!$ cách.

Gọi 3 nhóm học sinh tương ứng với 3 lớp ký tự A (giải nhất - 8 người), B (giải nhì - 5 người), C (giải ba - 3 người). Để không có hai học sinh cùng giải đứng cạnh nhau, chuỗi các giải tương ứng phải là một từ Smirnov độ dài 16 chứa đúng 8 chữ A , 5 chữ B , và 3 chữ C .

Sau khi xếp xong mô hình giải (chuỗi Smirnov), ta nhân với hoán vị học sinh trong từng giải: $8! \cdot 5! \cdot 3!$.

● Cách 1 — Tổ Hợp / Đại Số Thuần Túy

Đếm bằng Phương pháp Truy hồi / Quy hoạch động: Ta cần tính số cách xếp W cho chuỗi các chữ cái A, B, C sao cho không có hai chữ cái giống nhau đứng cạnh nhau. Gọi $W(a, b, c, \text{last})$ là số chuỗi thỏa mãn gồm a chữ A , b chữ B , c chữ C , với ký tự cuối cùng là $\text{last} \in \{A, B, C\}$. Ta có hệ thức truy hồi:

$$W(a, b, c, A) = W(a - 1, b, c, B) + W(a - 1, b, c, C)$$

$$W(a, b, c, B) = W(a, b - 1, c, A) + W(a, b - 1, c, C)$$

$$W(a, b, c, C) = W(a, b, c - 1, A) + W(a, b, c - 1, B)$$

Với các điều kiện biên thích hợp. Tính toán hệ thống (hoặc chạy bằng thuật toán trên máy tính) cho kết quả số lượng chuỗi giải thỏa mãn là:

$$W = 322 \text{ chuỗi}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng Hàm sinh Smirnov: Số cách xếp chuỗi giải thỏa mãn chính là hệ số của $x^8 y^5 z^3$ trong hàm sinh Smirnov:

$$W = [x^8 y^5 z^3] \frac{1}{1 - \left(\frac{x}{1+x} + \frac{y}{1+y} + \frac{z}{1+z} \right)}$$

Khai triển các phân thức dưới dạng chuỗi lũy thừa:

$$\frac{x}{1+x} = x - x^2 + x^3 - x^4 + x^5 - x^6 + x^7 - x^8$$

$$\frac{y}{1+y} = y - y^2 + y^3 - y^4 + y^5$$

$$\frac{z}{1+z} = z - z^2 + z^3$$

Đặt $u = \frac{x}{1+x} + \frac{y}{1+y} + \frac{z}{1+z}$. Hệ số cần tìm là $[x^8 y^5 z^3] \sum_{n=1}^{16} u^n$. Thực hiện nhân đa thức thu được kết quả:

$$W = 322$$

Tính toán Xác suất: Số cách xếp học sinh thỏa mãn điều kiện kè là:

$$N = W \cdot 8! \cdot 5! \cdot 3! = 322 \cdot 8! \cdot 5! \cdot 3!$$

Xác suất p là:

$$p = \frac{N}{16!} = \frac{322 \cdot 8! \cdot 5! \cdot 3!}{16!} = \frac{322 \cdot 120 \cdot 6}{16 \cdot 15 \cdot 14 \cdot 13 \cdot 12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9} = \frac{23}{51480} \approx 0.000446775$$

Giá trị cần tính:

$$10^5 p = 10^5 \cdot \frac{23}{51480} \approx 44.6775$$

Làm tròn đến hàng đơn vị là **45**.

🔥 Các giá trị tương tự

- Nếu tính $5 \cdot 10^5 p \approx 223.39 \Rightarrow$ Làm tròn là **223**.

- Nếu tính $10^6 p \approx 446.78 \Rightarrow$ Làm tròn là **447**.

✓ Kết Luận

Xác suất thỏa mãn là $p = \frac{23}{51480}$. Giá trị $10^5 p$ làm tròn đến hàng đơn vị là **45**.

Dạng 9 — Lát Gạch & Hệ Thức Truy Hồi Liên Kết

Lý Thuyết

📐 Mô Hình Hóa Bài Toán Lát Gạch Bằng Hàm Sinh

Lát gạch là bài toán đếm số cách phủ kín một bảng kích thước $d \times n$ bằng các viên gạch kích thước nhỏ hơn (thường là domino 2×1 hoặc gạch vuông 1×1 , 2×2).

1. Lát bảng $2 \times n$ bằng domino 2×1 (cổ điển):

- Gọi a_n là số cách lát. Xét cột cuối cùng: hoặc dùng 1 gạch đứng (còn bảng $2 \times (n-1)$), hoặc dùng 2 gạch nằm ngang (còn bảng $2 \times (n-2)$).
- Hệ thức truy hồi: $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ với $a_0 = 1, a_1 = 1$.
- Hàm sinh tương ứng:

$$A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \frac{1}{1-x-x^2}$$

2. Hệ thức truy hồi liên kết (Lát bảng $3 \times n$ bằng domino 2×1):

- Do diện tích bảng là $3n$, số ô là lẻ nếu n lẻ $\Rightarrow a_{2m+1} = 0$. Ta chỉ xét bảng kích thước chẵn $3 \times 2m$.
- Để lập hệ thức truy hồi, ta định nghĩa thêm một trạng thái phụ: Gọi b_n là số cách lát bảng $3 \times n$ bị thiếu đúng 1 ô ở góc (trạng thái biên không hoàn chỉnh).
- Bằng cách phân tích các cách đặt gạch ở biên, ta thu được hệ thức liên kết:

$$a_n = a_{n-2} + 2b_{n-1}$$

$$b_n = a_{n-1} + b_{n-2}$$

- Chuyển sang OGF: Gọi $A(x) = \sum a_n x^n$ và $B(x) = \sum b_n x^n$. Từ điều kiện đầu $a_0 = 1, b_0 = 0$, ta có hệ phương trình hàm sinh:

$$A(x) = 1 + x^2 A(x) + 2x B(x)$$

$$B(x) = x A(x) + x^2 B(x) \Rightarrow B(x) = \frac{x}{1-x^2} A(x)$$

- Thay $B(x)$ vào phương trình $A(x)$, ta rút ra hàm sinh đóng tuyệt đẹp:

$$A(x) = \frac{1-x^2}{1-4x^2+x^4}$$

📌 Ý Nghĩa Của Trạng Thái Phụ

Hàm sinh chứng tỏ sức mạnh vượt trội khi giải các hệ thức liên kết. Thay vì phải khử các số hạng phụ b_n bằng đại số phức tạp, ta chỉ cần giải một hệ phương trình tuyến tính gồm các hàm sinh $A(x)$ và $B(x)$. Mỗi trạng thái biên chưa hoàn chỉnh tương ứng với một biến trong hệ phương trình.

Bản Chất Tư Duy: Cách Thiết Lập Hệ Thức Truy Hồi & Giải Mã Hàm Sinh $\frac{1}{1-x-x^2}$

💡 Tư Duy Kiến Tạo: Làm Sao Tự Nghĩ Ra Hệ Thức Truy Hồi?

Nhiều học sinh thường gặp khó khăn: “Nếu đề bài cho sẵn hệ thức truy hồi thì mình có thể tính tiếp, nhưng làm sao từ một bài toán thực tế (như lát gạch, đi cầu thang) ta tự nghĩ ra được hệ thức đó?”

Bí quyết nằm ở “Nguyên lý Trạng thái Cuối cùng” (hoặc bước đi cuối cùng). Để tính số cách hoàn thành công việc ở quy mô n , hãy đặt câu hỏi: **Ngay trước khi đạt tới quy mô n , ta đã ở trạng thái nào và vừa thực hiện hành động cuối cùng gì?**

Ví dụ kinh điển (Leo cầu thang): Bạn muốn leo lên một cầu thang có n bậc. Mỗi bước, bạn chỉ có thể bước lên 1 bậc hoặc 2 bậc. Gọi a_n là số cách leo lên bậc thứ n . Hãy đứng ở bậc thứ n và nhìn ngược lại:

- Nếu bước cuối cùng bạn bước 1 bậc: nghĩa là trước đó bạn đang đứng ở bậc $n-1$. Số cách đi đến bậc $n-1$ là a_{n-1} .
- Nếu bước cuối cùng bạn bước 2 bậc: nghĩa là trước đó bạn đang đứng ở bậc $n-2$. Số cách đi đến bậc $n-2$ là a_{n-2} .

Vì hai khả năng này độc lập (bước cuối cùng chỉ có thể là bước 1 bậc hoặc bước 2 bậc, không thể cùng lúc cả hai) và bao phủ mọi trường hợp có thể xảy ra, ta có ngay:

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$$

Đó chính là cách hệ thức truy hồi được thiết lập một cách hoàn toàn trực giác và logic!

🎯 Ví Dụ Trực Quan & Mịn Hóa Mối Quan Hệ Với Hệ Thức

Hãy cùng liệt kê chi tiết các cách leo cầu thang từ $n=0$ đến $n=4$ để thấy sự tương thích hoàn hảo giữa thực tế và công thức:

- **Với $n=0$:** Không bước bước nào (đứng yên). Có duy nhất 1 cách: $\emptyset$. Vậy $a_0 = 1$.
- **Với $n=1$:** Chỉ có 1 cách là bước 1 bước: (1). Vậy $a_1 = 1$.
- **Với $n=2$:** Có 2 cách:
 - Cách 1: (1 + 1) (hai bước 1 bậc).
 - Cách 2: (2) (một bước 2 bậc).

Vậy $a_2 = 2$ (đúng bằng $a_1 + a_0 = 1 + 1 = 2$).

- **Với $n=3$:** Có 3 cách:
 - Cách 1: (1 + 1 + 1) (ba bước 1 bậc).
 - Cách 2: (1 + 2) (bước 1 bậc rồi bước 2 bậc).

- ▶ Cách 3: $(2 + 1)$ (bước 2 bậc rồi bước 1 bậc).

Vậy $a_3 = 3$ (đúng bằng $a_2 + a_1 = 2 + 1 = 3$).

- **Với $n = 4$:** Có 5 cách:

- ▶ Cách 1: $(1 + 1 + 1 + 1)$.
- ▶ Cách 2: $(1 + 1 + 2)$.
- ▶ Cách 3: $(1 + 2 + 1)$.
- ▶ Cách 4: $(2 + 1 + 1)$.
- ▶ Cách 5: $(2 + 2)$.

Vậy $a_4 = 5$ (đúng bằng $a_3 + a_2 = 3 + 2 = 5$).

🔍 Giải Mã Bản Chất Hàm Sinh $\frac{1}{1-x-x^2}$

Tại sao phân số có vẻ “lạ kỳ” $\frac{1}{1-x-x^2}$ lại liên quan đến số cách leo cầu thang hay lát gạch domino? Chúng ta có hai cách tiếp cận:

♦ 1. Góc nhìn Đại Số: Công cụ “Nén” Dữ Liệu

Hãy tưởng tượng hàm sinh $A(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots$ giống như một chiếc tủ có nhiều ngăn. Ngăn thứ n chứa thông tin là số cách a_n , còn x^n chỉ đóng vai trò là “nhãn địa chỉ” để phân biệt các ngăn.

Ta viết lại hệ thức truy hồi dưới dạng $a_n - a_{n-1} - a_{n-2} = 0$ (với $n \geq 2$) và thực hiện phép nhân:

$$\begin{aligned} A(x) &= a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + \dots \\ -xA(x) &= -a_0x - a_1x^2 - a_2x^3 - a_3x^4 - \dots \\ -x^2A(x) &= -a_0x^2 - a_1x^3 - a_2x^4 - \dots \end{aligned}$$

Cộng ba dòng này lại theo từng cột dọc:

$$A(x)(1-x-x^2) = a_0 + \underbrace{(a_1 - a_0)x}_{=0} + \underbrace{(a_2 - a_1 - a_0)x^2}_{=0} + \underbrace{(a_3 - a_2 - a_1)x^3}_{=0} + \underbrace{(a_4 - a_3 - a_2)x^4}_{=0} + \dots$$

Vì hệ thức truy hồi triệt tiêu toàn bộ các số hạng từ x^2 trở đi, về phải chỉ còn lại hai số hạng đầu tiên:

$$A(x)(1-x-x^2) = a_0 + (a_1 - a_0)x$$

Thế các giá trị ban đầu $a_0 = 1$ và $a_1 = 1$, ta được:

$$A(x)(1-x-x^2) = 1 + (1-1)x = 1 \Rightarrow A(x) = \frac{1}{1-x-x^2}$$

Đây chính là nguồn gốc đại số của hàm sinh!

♦ 2. Góc nhìn Tổ Hợp: Phép nhân đa thức là sự lựa chọn các bước đi

Hãy nhớ lại công thức khai triển chuỗi hình học: $\frac{1}{1-y} = 1 + y + y^2 + y^3 + y^4 + \dots$. Nếu đặt $y = x + x^2$, ta khai triển:

$$A(x) = \frac{1}{1-(x+x^2)} = 1 + (x+x^2) + (x+x^2)^2 + (x+x^2)^3 + (x+x^2)^4 + \dots$$

Ý nghĩa của mỗi số hạng trong tổng này là gì?

- Số hạng 1 (tương ứng $(x + x^2)^0$): Không thực hiện bước nào (đứng yên).
- Số hạng $(x + x^2)^1$: Thực hiện đúng 1 bước. Bước này có thể là bước 1 bậc (nhân x) hoặc bước 2 bậc (nhân x^2).
- Số hạng $(x + x^2)^2 = x^2 + 2x^3 + x^4$: Thực hiện đúng 2 bước.
 - $x^2 = x \cdot x$ (bước 1 rồi bước 1).
 - $2x^3 = x \cdot x^2 + x^2 \cdot x$ (bước 1 rồi bước 2, hoặc ngược lại).
 - $x^4 = x^2 \cdot x^2$ (bước 2 rồi bước 2).
- Số hạng $(x + x^2)^3 = x^3 + 3x^4 + 3x^5 + x^6$: Thực hiện đúng 3 bước.
 - $x^3 = x \cdot x \cdot x$ (1 cách đạt tổng 3 bậc).
 - $3x^4 = x \cdot x \cdot x^2 + x \cdot x^2 \cdot x + x^2 \cdot x \cdot x$ (3 cách đạt tổng 4 bậc từ 3 bước).

Như vậy, khi ta cộng tất cả các trường hợp lại (không giới hạn số bước), hệ số của x^n trong khai triển chính là **tổng số cách ghép các bước đi có độ dài 1 (nhân x) và 2 (nhân x^2) để đạt tổng độ cao là n** .

Khai triển Taylor (hoặc chia đa thức) cho ta:

$$\frac{1}{1 - x - x^2} = 1 + 1x + 2x^2 + 3x^3 + 5x^4 + 8x^5 + 13x^6 + \dots$$

Các hệ số $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, \dots$ chính là dãy số cách lát gạch/leo cầu thang mà ta đã tính thử công ở trên!

Bài Tập Minh Họa

Câu 18. Có bao nhiêu cách lát một bảng kích thước $2 \times n$ bằng các viên gạch domino 2×1 (được xoay tự do) và các viên gạch vuông kích thước 2×2 ?

Đáp số: $\text{frac}(2^{n+1} + (-1)^n, 3)$

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán lát bảng $2 \times n$ bằng gạch kích thước nhỏ. Ta có thể lập hệ thức truy hồi bằng cách xét cấu tạo của cột cuối cùng của bảng.

● Cách 1 — Tổ Hợp / Đại Số Thuần Túy

Gọi a_n là số cách lát bảng kích thước $2 \times n$. Xét các khả năng lát ở cột cuối cùng bên phải:

- Khả năng 1: Lát bằng 1 viên domino 2×1 đặt thẳng đứng. Phần còn lại là bảng $2 \times (n - 1)$, có a_{n-1} cách lát.
- Khả năng 2: Lát bằng 2 viên domino 2×1 nằm ngang đặt song song. Phần còn lại là bảng $2 \times (n - 2)$, có a_{n-2} cách lát.
- Khả năng 3: Lát bằng 1 viên gạch vuông 2×2 . Phần còn lại là bảng $2 \times (n - 2)$, có a_{n-2} cách lát.

Cộng các khả năng độc lập này lại, ta thu được hệ thức truy hồi:

$$a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2}$$

Với điều kiện đầu dễ thấy:

- $a_0 = 1$ (bảng trống có đúng 1 cách lát).
- $a_1 = 1$ (bảng 2×1 chỉ có 1 cách đặt đứng domino).
- $a_2 = 3$ (gồm: 2 đứng, 2 ngang, hoặc 1 vuông 2×2).

Phương trình đặc trưng của hệ thức truy hồi:

$$r^2 - r - 2 = 0 \Rightarrow (r - 2)(r + 1) = 0 \Rightarrow r = 2 \text{ hoặc } r = -1$$

Công thức tổng quát có dạng $a_n = A \cdot 2^n + B \cdot (-1)^n$. Thay $n = 0, n = 1$:

$$A + B = 1$$

$$2A - B = 1 \Rightarrow A = \frac{2}{3}, B = \frac{1}{3}$$

$$\text{Vậy } a_n = \frac{2}{3} \cdot 2^n + \frac{1}{3} \cdot (-1)^n = \frac{2^{n+1} + (-1)^n}{3}.$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Giải bằng Hàm sinh (OGF): Từ hệ thức truy hồi $a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2}$ với $a_0 = 1, a_1 = 1$: Nhân hai vế với x^n và lấy tổng từ $n = 2$ đến ∞ :

$$\sum_{n=2}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=2}^{\infty} a_{n-1} x^n + 2 \sum_{n=2}^{\infty} a_{n-2} x^n$$

Đặt $A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, ta có phương trình:

$$A(x) - a_0 - a_1 x = x(A(x) - a_0) + 2x^2 A(x)$$

Thay $a_0 = 1, a_1 = 1$:

$$A(x) - 1 - x = x(A(x) - 1) + 2x^2 A(x)$$

$$A(x)(1 - x - 2x^2) = 1$$

$$A(x) = \frac{1}{1 - x - 2x^2} = \frac{1}{(1 - 2x)(1 + x)}$$

Dùng phương pháp hệ số bất định tách phân thức:

$$A(x) = \frac{\frac{2}{3}}{1 - 2x} + \frac{\frac{1}{3}}{1 + x}$$

Khai triển thành chuỗi lũy thừa:

$$A(x) = \frac{2}{3} \sum_{n=0}^{\infty} 2^n x^n + \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$$

Suy ra hệ số của x^n :

$$a_n = [x^n]A(x) = \frac{2^{n+1} + (-1)^n}{3}$$

✓ Kết Luận

Số cách lát bảng $2 \times n$ là $a_n = \frac{2^{n+1} + (-1)^n}{3}$ cách.

Câu 19. Lát một bảng kích thước 3×6 bằng các viên gạch domino 2×1 . Hỏi có bao nhiêu cách lát tất cả?

Đáp số: 41

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán lát bảng $3 \times n$ với $n = 6$ chẵn. Ta sử dụng hệ phương trình trạng thái biên liên kết đã dựng ở phần lý thuyết để tìm đáp số.

● Cách 1 — Tổ Hợp / Đại Số Thuần Túy

Phân tích quy hoạch động trạng thái: Gọi a_n là số cách lát bảng hoàn chỉnh $3 \times n$. Gọi b_n là số cách lát bảng $3 \times n$ bị khuyết 1 ô ở góc (ví dụ góc dưới bên phải).

- Để tạo ra bảng hoàn chỉnh $3 \times n$, ta có hai cách đi từ các trạng thái trước:
 - Đặt 1 domino dọc và 1 domino ngang chèn vào góc khuyết của trạng thái b_{n-1} , có 2 hướng đối xứng $\Rightarrow 2b_{n-1}$ cách.
 - Đặt 3 domino dọc (nếu n chẵn) hoặc các cấu hình dọc ngang chiếm trọn 2 cột cuối của trạng thái $a_{n-2} \Rightarrow a_{n-2}$ cách.

Vậy ta có: $a_n = a_{n-2} + 2b_{n-1}$.

- Để tạo ra bảng khuyết b_n , ta có hai cách:
 - Đặt 1 domino nằm ngang vào cột cuối của trạng thái $a_{n-1} \Rightarrow a_{n-1}$ cách.
 - Đặt 1 domino dọc chiếm 2 ô của góc khuyết ở trạng thái $b_{n-2} \Rightarrow b_{n-2}$ cách.

Vậy ta có: $b_n = a_{n-1} + b_{n-2}$.

Tính toán từng bước với điều kiện đầu $a_0 = 1, b_0 = 0$:

- $a_1 = 0, b_1 = a_0 + b_{-1} = 1$
- $a_2 = a_0 + 2b_1 = 1 + 2(1) = 3$
- $b_2 = a_1 + b_0 = 0$
- $a_3 = 0, b_3 = a_2 + b_1 = 3 + 1 = 4$
- $a_4 = a_2 + 2b_3 = 3 + 2(4) = 11$
- $b_4 = a_3 + b_2 = 0$
- $a_5 = 0, b_5 = a_4 + b_3 = 11 + 4 = 15$
- $a_6 = a_4 + 2b_5 = 11 + 2(15) = 41$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng Hàm sinh: Từ hệ phương trình hàm sinh đã giải ở lý thuyết:

$$A(x) = \frac{1 - x^2}{1 - 4x^2 + x^4}$$

Đặt $t = x^2$ đại diện cho cặp cột (vì $a_n = 0$ với mọi n lẻ). Khi đó hàm sinh của số cách lát theo m cặp cột ($n = 2m$) là:

$$F(t) = \sum_{m=0}^{\infty} a_{2m} t^m = \frac{1 - t}{1 - 4t + t^2}$$

Ta cần tìm hệ số của t^3 (tương ứng với $n = 6$). Nhân chéo ta có: $F(t)(1 - 4t + t^2) = 1 - t$. Do đó hệ số thỏa mãn:

$$a_{2m} - 4a_{2m-2} + a_{2m-4} = 0 \Rightarrow a_{2m} = 4a_{2m-2} - a_{2m-4} \\ (m \geq 2)$$

Với các giá trị đầu:

- $a_0 = 1$
- $a_2 = 4a_0 - 1 = 3$ (do số hạng tự do về phải là $-t$, nên hạng tử bậc 1 là $-a_0 t + a_2 t = -t \Rightarrow a_2 = 4a_0 - 1 = 3$).

Áp dụng hệ thức quy hồi:

- Với $m = 2$ ($n = 4$): $a_4 = 4a_2 - a_0 = 4(3) - 1 = 11$.
- With $m = 3$ ($n = 6$): $a_6 = 4a_4 - a_2 = 4(11) - 3 = 41$.

Kết quả hoàn toàn trùng khớp cực kỳ nhanh chóng!

✅ Kết Luận

Số cách lát bằng 3×6 là **41** cách.

Câu 20. Có bao nhiêu cách lát một bảng kích thước $2 \times n$ bằng các viên gạch domino kích thước 2×1 (được xoay tự do) và các viên gạch chữ L (L-tromino) kích thước 3 ô (xoay tự do)?

Đáp số: $A(x) = \frac{1-x}{1-2x-x^3}$

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán lát bảng kích thước $2 \times n$ sử dụng kết hợp hai loại gạch: domino 2×1 và L-tromino 3 ô. Ta định nghĩa các trạng thái biên chưa hoàn thành để thiết lập hệ thức truy hồi liên kết.

● Cách 1 — Tổ Hợp / Đại Số Thuần Túy

Lập hệ thức liên kết và quy hoạch động: Gọi a_n là số cách lát bảng hoàn chỉnh $2 \times n$. Gọi b_n là số cách lát bảng $2 \times n$ bị khuyết đúng 1 ô ở góc (top-right hoặc bottom-right). Do đối xứng, hai trạng thái này có số cách lát bằng nhau và cùng bằng b_n .

Xét cách lấp đầy cột cuối cùng bên phải của bảng hoàn chỉnh $2 \times n$:

- Trường hợp 1: Đặt 1 domino dọc ở cột cuối. Phần còn lại là bảng hoàn chỉnh $2 \times (n-1)$, có a_{n-1} cách.
- Trường hợp 2: Đặt 2 domino nằm ngang ở cuối. Phần còn lại là bảng hoàn chỉnh $2 \times (n-2)$, có a_{n-2} cách.
- Trường hợp 3: Đặt 1 gạch L-tromino chiếm 2 ô ở cột cuối và 1 ô ở cột kề cuối. Có 2 hướng quay của gạch L-tromino (khuyết góc trên hoặc góc dưới của cột kề cuối). Sau khi đặt, phần còn lại chính là trạng thái khuyết 1 ô ở góc của bảng kích thước $2 \times (n-1)$. Số cách lát là $2b_{n-1}$.

Do đó ta có:

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2} + 2b_{n-1}$$

Xét cách lấp đầy ô duy nhất nhô ra của trạng thái khuyết b_n :

- Khả năng 1: Đặt 1 domino nằm ngang. Điều này buộc ô kề bên nó cũng bị chiếm dụng, để lại một trạng thái khuyết 1 ô của bảng $2 \times (n-1)$, có b_{n-1} cách.
- Khả năng 2: Đặt 1 gạch L-tromino che phủ ô nhô ra và 2 ô của cột kề bên. Điều này lấp đầy hoàn chỉnh cột đó và để lại bảng hoàn chỉnh $2 \times (n-2)$, có a_{n-2} cách.

Do đó ta có:

$$b_n = b_{n-1} + a_{n-2}$$

Với điều kiện đầu: $a_0 = 1, a_1 = 1, b_0 = 0, b_1 = 0$. Ta tính được:

- $a_2 = a_1 + a_0 + 2b_1 = 1 + 1 + 2(0) = 2$
- $b_2 = b_1 + a_0 = 0 + 1 = 1$
- $a_3 = a_2 + a_1 + 2b_2 = 2 + 1 + 2(1) = 5$
- $b_3 = b_2 + a_1 = 1 + 1 = 2$
- $a_4 = a_3 + a_2 + 2b_3 = 5 + 2 + 2(2) = 11$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Giải bằng Hàm sinh thông thường (OGF): Gọi $A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ và $B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ là các OGF tương ứng. Từ hệ thức truy hồi và các điều kiện biên:

$$A(x) = 1 + x + \sum_{n=2}^{\infty} (a_{n-1} + a_{n-2} + 2b_{n-1})x^n$$

$$A(x) = 1 + x + x(A(x) - 1) + x^2 A(x) + 2xB(x) = 1 + xA(x) + x^2 A(x) + 2xB(x)$$

$$B(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (b_{n-1} + a_{n-2})x^n = xB(x) + x^2 A(x)$$

Từ phương trình thứ hai, ta có:

$$B(x)(1-x) = x^2 A(x) \Rightarrow B(x) = \frac{x^2}{1-x} A(x)$$

Thế $B(x)$ vào phương trình thứ nhất:

$$A(x) = 1 + xA(x) + x^2 A(x) + \frac{2x^3}{1-x} A(x)$$

$$A(x) \left(1 - x - x^2 - \frac{2x^3}{1-x} \right) = 1$$

$$A(x) \cdot \frac{1-2x-x^3}{1-x} = 1 \Rightarrow A(x) = \frac{1-x}{1-2x-x^3}$$

Khai triển hàm sinh này cho ta dãy số cách lát bảng: 1, 1, 2, 5, 11, 24, 53, 117, ...

✓ Kết Luận

Hàm sinh của số cách lát bảng là $A(x) = \frac{1-x}{1-2x-x^3}$.

Câu 21. Có bao nhiêu cách lát một bảng kích thước $4 \times n$ bằng các viên gạch domino kích thước 2×1 (được xoay tự do)?

Đáp số: $F(x) = \frac{1-x-x^2-x^3-x^4}{1-2x-x^3}$

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán lát bảng kích thước $4 \times n$ bằng gạch domino 2×1 . Số ô của bảng là $4n$, luôn chẵn với mọi $n \geq 1$. Ta có thể lập hệ thức truy hồi bậc cao và chuyển đổi sang hàm sinh để tìm công thức đóng.

● Cách 1 — Tổ Hợp / Đại Số Thuần Túy

Đại số hóa và Hệ thức truy hồi: Gọi $f(n)$ là số cách lát bảng hoàn chỉnh $4 \times n$. Bằng cách sử dụng phương pháp ma trận chuyển trạng thái (Transfer Matrix Method) hoặc phân tích trạng thái biên, ta thu được hệ thức truy hồi cho $f(n)$ như sau:

$$f(n) = f(n-1) + 5f(n-2) + f(n-3) - f(n-4) \quad \text{với mọi } n \geq 4$$

Các điều kiện đầu tiên có thể dễ dàng tính toán trực tiếp:

- $f(0) = 1$ (bảng rỗng).
- $f(1) = 1$ (chỉ có 1 cách xếp là 2 domino dọc song song).
- $f(2) = 5$ (5 cách xếp trên bảng 4×2).
- $f(3) = 11$ (11 cách xếp trên bảng 4×3).

Áp dụng hệ thức truy hồi trên cho các bước tiếp theo:

- $f(4) = f(3) + 5f(2) + f(1) - f(0) = 11 + 5(5) + 1 - 1 = 36$.
- $f(5) = f(4) + 5f(3) + f(2) - f(1) = 36 + 5(11) + 5 - 1 = 95$.
- $f(6) = f(5) + 5f(4) + f(3) - f(2) = 95 + 5(36) + 11 - 5 = 281$.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng Hàm sinh OGF: Gọi $F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} f(n)x^n$ là hàm sinh của dãy $f(n)$. Nhân cả hai vế của hệ thức truy hồi với x^n và lấy tổng từ $n = 4$ đến ∞ :

$$\sum_{n=4}^{\infty} f(n)x^n = \sum_{n=4}^{\infty} f(n-1)x^n + 5 \sum_{n=4}^{\infty} f(n-2)x^n + \sum_{n=4}^{\infty} f(n-3)x^n - \sum_{n=4}^{\infty} f(n-4)x^n$$

Biến đổi các tổng theo $F(x)$:

$$(F(x) - 1 - x - 5x^2 - 11x^3) = x(F(x) - 1 - x - 5x^2) + 5x^2(F(x) - 1 - x) + x^3(F(x) - 1) - x^4F(x)$$

Thu gọn phương trình đại số:

$$F(x)(1 - x - 5x^2 + x^3 + x^4) = 1 - x^2$$

Suy ra hàm sinh dạng phân thức hữu tỷ đóng:

$$F(x) = \frac{1 - x^2}{1 - x - 5x^2 + x^3 + x^4}$$

Hàm sinh này biểu diễn trọn vẹn số cách lát bảng $4 \times n$ cho mọi giá trị của n .

✓ Kết Luận

Hàm sinh của số cách lát bảng là $F(x) = \frac{1 - x^2}{1 - x - 5x^2 + x^3 + x^4}$.

Dạng 10 — Lưới Tọa Độ, Robot Di Chuyển & Số Delannoy, Số Schroeder

Lý Thuyết

▢ Hàm Sinh Hai Biến Cho Các Bài Toán Đi Trên Lưới

Xét robot di chuyển trên lưới tọa độ từ $(0, 0)$ đến (m, n) bằng các bước đi hợp lệ. Ta dùng biến x đại diện cho bước sang phải $(1, 0)$ và y cho bước đi lên $(0, 1)$.

1. Số Delannoy $D(m, n)$: Cho phép 3 loại bước đi:

- Bước sang phải: $H(1, 0) \Rightarrow x$
- Bước đi lên: $V(0, 1) \Rightarrow y$

- Bước đi chéo: $D(1,1) \Rightarrow xy$
- Hàm sinh hai biến tổng quát:

$$G(x, y) = \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} D(m, n) x^m y^n = \frac{1}{1 - x - y - xy}$$

- Số đường đi trên trục đường chéo chính $D(n, n)$ có hàm sinh một biến cực kỳ nổi tiếng (được trích bằng phép trích đường chéo phức):

$$F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} D(n, n) x^n = \frac{1}{\sqrt{1 - 6x + x^2}}$$

2. Số Schroeder lớn S_n : Robot đi từ $(0, 0)$ đến (n, n) dùng các bước $(1, 0), (0, 1), (1, 1)$ nhưng không bao giờ đi vượt lên phía trên đường chéo chính $y = x$.

- Hàm sinh $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} S_n x^n$ thỏa mãn phương trình phi tuyến tính tự tham chiếu:

$$S(x) = 1 + xS(x) + xS(x)^2$$

- Nghiệm của phương trình này là:

$$S(x) = \frac{1 - x - \sqrt{1 - 6x + x^2}}{2x}$$

- Dãy số Schroeder lớn: $S_0 = 1, S_1 = 2, S_2 = 6, S_3 = 22, S_4 = 90, \dots$

📌 Mọi Liên Hệ Giữa Catalan Vòng Và Schroeder

Nếu số Catalan $C(x) = 1 + xC(x)^2$ mô tả các bước đi không có bước chéo, thì số Schroeder cho phép thêm các bước chéo $(1, 1)$ ngay trên đường chéo chính. Mỗi bước chéo này chia đường đi thành các phần độc lập, dẫn đến số hạng tuyến tính $xS(x)$ trong phương trình hàm sinh.

Bài Tập Minh Họa

Câu 22. Một robot di chuyển trên lưới tọa độ từ điểm $(0, 0)$ đến điểm $(3, 3)$. Tại mỗi bước, robot chỉ được phép đi sang phải 1 đơn vị, đi lên trên 1 đơn vị, hoặc đi chéo lên-phải 1 đơn vị. Hỏi có bao nhiêu đường đi khác nhau?

Đáp số: 63

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán đếm số đường đi Delannoy trên lưới kích thước 3×3 , tức là tìm số Delannoy chéo $D(3, 3)$.

🔵 Cách 1 — Tổ Hợp / Đại Số Thuần Túy

Quy hoạch động trên lưới: Gọi $D(i, j)$ là số đường đi từ $(0, 0)$ đến (i, j) . Theo quy tắc bước đi, robot chỉ có thể đến (i, j) từ ba ô ngay trước nó là $(i-1, j)$, $(i, j-1)$ và $(i-1, j-1)$. Hệ thức quy hoạch động:

$$D(i, j) = D(i-1, j) + D(i, j-1) + D(i-1, j-1)$$

Ta tính các giá trị trên lưới kích thước 3×3 :

- Dòng 0: $D(0, 0) = 1$, $D(1, 0) = 1$, $D(2, 0) = 1$, $D(3, 0) = 1$
- Dòng 1:
 - $D(0, 1) = 1$
 - $D(1, 1) = D(0, 1) + D(1, 0) + D(0, 0) = 1 + 1 + 1 = 3$
 - $D(2, 1) = D(1, 1) + D(2, 0) + D(1, 0) = 3 + 1 + 1 = 5$
 - $D(3, 1) = D(2, 1) + D(3, 0) + D(2, 0) = 5 + 1 + 1 = 7$
- Dòng 2:
 - $D(0, 2) = 1$
 - $D(1, 2) = 5$ (do đối xứng $D(1, 2) = D(2, 1)$)
 - $D(2, 2) = D(1, 2) + D(2, 1) + D(1, 1) = 5 + 5 + 3 = 13$
 - $D(3, 2) = D(2, 2) + D(3, 1) + D(2, 1) = 13 + 7 + 5 = 25$
- Dòng 3:
 - $D(0, 3) = 1$
 - $D(1, 3) = 7$
 - $D(2, 3) = 25$
 - $D(3, 3) = D(2, 3) + D(3, 2) + D(2, 2) = 25 + 25 + 13 = \mathbf{63}$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Giải bằng Hàm sinh chéo: Hàm sinh của các số Delannoy chéo $D(n, n)$ là:

$$F(x) = (1 - 6x + x^2)^{-\frac{1}{2}}$$

Áp dụng khai triển nhị thức Newton tổng quát $(1-u)^{-\frac{1}{2}} = 1 + \frac{1}{2}u + \frac{3}{8}u^2 + \frac{5}{16}u^3 + \dots$ Với $u = 6x - x^2$, ta cần tìm hệ số của x^3 :

$$[x^3]F(x) = [x^3] \left(1 + \frac{1}{2}(6x - x^2) + \frac{3}{8}(6x - x^2)^2 + \frac{5}{16}(6x - x^2)^3 + \dots \right)$$

Ta chỉ cần quan tâm các số hạng có số mũ của x đạt tới 3:

- Từ hạng tử $\frac{3}{8}(6x - x^2)^2 = \frac{3}{8}(36x^2 - 12x^3 + x^4) \Rightarrow [x^3]$ là $\frac{3}{8} \cdot (-12) = -\frac{9}{2} = -4.5$.
- Từ hạng tử $\frac{5}{16}(6x - x^2)^3 = \frac{5}{16}(216x^3 - 36x^4 + \dots) \Rightarrow [x^3]$ là $\frac{5}{16} \cdot 216 = \frac{2080}{16} = 67.5$.
- Các hạng tử bậc cao hơn không chứa lũy thừa x^3 .

Cộng hai kết quả lại:

$$D(3, 3) = -4.5 + 67.5 = \mathbf{63}$$

Công thức hàm sinh cho kết quả cực kỳ thanh lịch và không cần vẽ lưới!

✓ Kết Luận

Số đường đi của robot là **63** đường đi.

Câu 23. Có bao nhiêu đường đi từ điểm $(0, 0)$ đến $(3, 3)$ sử dụng các bước sang phải $(1, 0)$, đi lên $(0, 1)$ và đi chéo $(1, 1)$ sao cho đường đi không bao giờ đi lên phía trên đường chéo chính $y = x$?

Đáp số: **22**

Lời giải.**💡 Phương pháp giải**

Đây chính là bài toán đếm đường đi Schroeder lớn thứ 3 (S_3), trong đó đường đi bị chặn bởi đường biên $y \leq x$.

● Cách 1 — Tổ Hợp / Đại Số Thuần Túy

Quy hoạch động có điều kiện biên: Gọi $S(i, j)$ là số đường đi hợp lệ từ $(0, 0)$ đến (i, j) với điều kiện $i \geq j$.

- Nếu $i > j$, ta có thể đi đến (i, j) từ cả ba hướng:

$$S(i, j) = S(i-1, j) + S(i, j-1) + S(i-1, j-1)$$

- Nếu $i = j$ (nằm trên đường chéo), ta không thể đi từ $(i-1, i)$ vì điểm này vi phạm điều kiện $y \leq x$. Do đó:

$$S(i, i) = S(i, i-1) + S(i-1, i-1)$$

(chỉ nhận bước đi từ dưới lên hoặc đi chéo từ góc dưới trái).

Ta tính bảng giá trị:

- $S(0, 0) = 1$
- Cột 1: $S(1, 0) = 1 \Rightarrow S(1, 1) = S(1, 0) + S(0, 0) = 1 + 1 = 2$.
- Cột 2:
 - $S(2, 0) = 1$
 - $S(2, 1) = S(1, 1) + S(2, 0) + S(1, 0) = 2 + 1 + 1 = 4$
 - $S(2, 2) = S(2, 1) + S(1, 1) = 4 + 2 = 6$
- Cột 3:
 - $S(3, 0) = 1$
 - $S(3, 1) = S(2, 1) + S(3, 0) + S(2, 0) = 4 + 1 + 1 = 6$
 - $S(3, 2) = S(2, 2) + S(3, 1) + S(2, 1) = 6 + 6 + 4 = 16$
 - $S(3, 3) = S(3, 2) + S(2, 2) = 16 + 6 = \mathbf{22}$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Giải bằng Hệ thức khai triển hàm sinh: Hàm sinh số Schroeder lớn $S(x)$ thỏa mãn:

$$S(x) = 1 + xS(x) + xS(x)^2$$

So sánh hệ số của hai vế để thiết lập hệ thức truy hồi của dãy S_n :

$$S_n = [x^n]S(x) = [x^{n-1}]S(x) + [x^{n-1}]S(x)^2$$

$$S_n = S_{n-1} + \sum_{k=0}^{n-1} S_k S_{n-1-k}$$

$$(n \geq 1)$$

Với điều kiện đầu $S_0 = 1$, ta tính liên tiếp:

- $n = 1$: $S_1 = S_0 + S_0^2 = 1 + 1 = 2$
- $n = 2$: $S_2 = S_1 + (S_0 S_1 + S_1 S_0) = 2 + 2(1 \cdot 2) = 6$
- $n = 3$: $S_3 = S_2 + (S_0 S_2 + S_1 S_1 + S_2 S_0) = 6 + (1 \cdot 6 + 2 \cdot 2 + 6 \cdot 1) = 6 + 14 = 22$

Tính toán bằng tích chập hàm sinh cho kết quả cực kỳ chính xác!

✓ Kết Luận

Số đường đi thỏa mãn điều kiện biên là **22** đường đi.

Câu 24. Một robot xuất phát từ gốc tọa độ $(0,0)$ di chuyển đến điểm (m,n) trên lưới tọa độ. Tại mỗi bước, robot chỉ được phép di chuyển sang phải 1 đơn vị: $(1,0)$, đi lên trên 1 đơn vị: $(0,1)$, hoặc thực hiện một bước nhảy dài sang phải 2 đơn vị: $(2,0)$. Hỏi có bao nhiêu đường đi khác nhau từ $(0,0)$ đến $(3,2)$?

Đáp số: **22**

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán đếm đường đi trên lưới tọa độ phẳng có bước đi nhảy xa. Ta dùng quy hoạch động hoặc hàm sinh hai biến để tính toán số đường đi.

● Cách 1 — Tổ Hợp / Đại Số Thuần Túy

Quy hoạch động trên lưới: Gọi $a(m,n)$ là số đường đi từ $(0,0)$ đến (m,n) . Theo quy tắc bước đi, robot chỉ có thể đến (m,n) từ ba ô trước đó: $(m-1,n)$, $(m-2,n)$ và $(m,n-1)$. Hệ thức quy hoạch động:

$$a(m,n) = a(m-1,n) + a(m-2,n) + a(m,n-1)$$

Với điều kiện biên khởi đầu $a(0,0) = 1$ và $a(m,n) = 0$ nếu $m < 0$ hoặc $n < 0$. Ta tính bảng giá trị:

- Dòng $n = 0$:
 - $a(0,0) = 1$

- $a(1, 0) = a(0, 0) = 1$
- $a(2, 0) = a(1, 0) + a(0, 0) = 1 + 1 = 2$
- $a(3, 0) = a(2, 0) + a(1, 0) = 2 + 1 = 3$
- Dòng $n = 1$:
 - $a(0, 1) = a(0, 0) = 1$
 - $a(1, 1) = a(0, 1) + a(1, 0) = 1 + 1 = 2$
 - $a(2, 1) = a(1, 1) + a(0, 1) + a(2, 0) = 2 + 1 + 2 = 5$
 - $a(3, 1) = a(2, 1) + a(1, 1) + a(3, 0) = 5 + 2 + 3 = 10$
- Dòng $n = 2$:
 - $a(0, 2) = a(0, 1) = 1$
 - $a(1, 2) = a(0, 2) + a(1, 1) = 1 + 2 = 3$
 - $a(2, 2) = a(1, 2) + a(0, 2) + a(2, 1) = 3 + 1 + 5 = 9$
 - $a(3, 2) = a(2, 2) + a(1, 2) + a(3, 1) = 9 + 3 + 10 = \mathbf{22}$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Giải bằng Hàm sinh hai biến: Gán biến x cho bước đi $(1, 0)$, x^2 cho bước đi $(2, 0)$ và y cho bước đi $(0, 1)$. Hàm sinh hai biến mô tả tất cả đường đi là:

$$G(x, y) = \frac{1}{1 - x - x^2 - y}$$

Ta cần tìm hệ số của x^3y^2 trong khai triển của $G(x, y)$:

$$G(x, y) = \frac{1}{1 - x - x^2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{y}{1 - x - x^2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{y^n}{(1 - x - x^2)^{n+1}}$$

Hệ số của y^2 tương ứng với $n = 2$:

$$[y^2]G(x, y) = (1 - (x + x^2))^{-3} = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{2+k}{k} (x + x^2)^k$$

Ta cần tìm hệ số của x^3 trong tổng này. Nhận thấy $x^k(1+x)^k$ chỉ đạt lũy thừa bậc 3 khi $k = 2$ hoặc $k = 3$:

- Với $k = 2$: số hạng là $\binom{4}{2}x^2(1+x)^2 = 6(x^2 + 2x^3 + x^4) \Rightarrow [x^3]$ là $6 \times 2 = 12$.
- Với $k = 3$: số hạng là $\binom{5}{3}x^3(1+x)^3 = 10(x^3 + \dots) \Rightarrow [x^3]$ là $10 \times 1 = 10$.
- Với $k > 3$ hoặc $k < 2$: số mũ nhỏ nhất của x lớn hơn 3 hoặc bé hơn 3.

Cộng hai hệ số thu được:

$$[x^3y^2]G(x, y) = 12 + 10 = \mathbf{22}$$

✓ Kết Luận

Số đường đi từ $(0, 0)$ đến $(3, 2)$ là **22** đường đi.

Câu 25. Một robot di chuyển trong không gian 3D từ gốc tọa độ $(0, 0, 0)$ đến điểm (n, n, n) . Tại mỗi bước, robot chỉ được di chuyển theo một trong các hướng sau: sang phải 1 đơn vị $(1, 0, 0)$, lên trên 1 đơn vị $(0, 1, 0)$, đi sâu 1 đơn vị $(0, 0, 1)$, hoặc đi chéo khối 1 đơn vị $(1, 1, 1)$. Hãy thiết lập công thức tổng quát tính số đường đi khác nhau của robot theo n .

Đáp số: $\sum_{j=0}^n \frac{(3n-2j)!}{j!((n-j)!)^3}$

Lời giải.

 Phương pháp giải

Đây là bài toán đếm đường đi trên lưới 3D chéo khối. Ta sử dụng hàm sinh ba biến và khai triển đa thức kết hợp hệ số multinomial để giải bài toán một cách tổng quát.

 Cách 1 — Tổ Hợp / Đại Số Thuần Túy

Lập luận tổ hợp và Hệ số Multinomial: Giả sử trong suốt hành trình từ $(0, 0, 0)$ đến (n, n, n) , robot thực hiện đúng j bước chéo khối $(1, 1, 1)$ (*0lejlen*). Khi đó, robot cần phải bù đắp các khoảng cách còn lại dọc theo mỗi trục bằng các bước đơn vị tương ứng:

- Cần thêm $n - j$ bước sang phải $(1, 0, 0)$.
- Cần thêm $n - j$ bước lên trên $(0, 1, 0)$.
- Cần thêm $n - j$ bước đi sâu $(0, 0, 1)$.

Tổng số bước đi của robot là:

$$N = j + (n - j) + (n - j) + (n - j) = 3n - 2j$$

Trong số $3n - 2j$ bước đi này, ta cần phân bố:

- j bước chéo khối $(1, 1, 1)$.
- $n - j$ bước đi sang phải $(1, 0, 0)$.
- $n - j$ bước đi lên trên $(0, 1, 0)$.
- $n - j$ bước đi sâu $(0, 0, 1)$.

Số cách sắp xếp các bước đi này chính là hệ số multinomial:

$$M(n, j) = \frac{(3n - 2j)!}{j!(n - j)!(n - j)!(n - j)!} = \frac{(3n - 2j)!}{j!((n - j)!)^3}$$

Lấy tổng theo tất cả các giá trị hợp lệ của j từ 0 đến n :

$$a_n = \sum_{j=0}^n \frac{(3n - 2j)!}{j!((n - j)!)^3}$$

 Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Giải bằng Hàm sinh ba biến: Gán các biến x, y, z cho các bước đi đơn vị dọc theo 3 trục, và xyz cho bước đi chéo khối. Hàm sinh ba biến mô tả toàn bộ đường đi là:

$$G(x, y, z) = \frac{1}{1 - x - y - z - xyz}$$

Khai triển thành chuỗi hình thức:

$$G(x, y, z) = \sum_{N=0}^{\infty} (x + y + z + xyz)^N$$

Ta cần tìm hệ số của $x^n y^n z^n$ trong khai triển này. Áp dụng khai triển đa thức:

$$(x + y + z + xyz)^N = \sum_{a+b+c+j=N} \frac{N!}{a!b!c!j!} x^{a+j} y^{b+j} z^{c+j}$$

Để số mũ của x, y, z đều bằng n , ta có hệ điều kiện:

$$a + j = n, \quad b + j = n, \quad c + j = n \Rightarrow a = b = c = n - j$$

Và tổng số bước là $N = a + b + c + j = 3(n - j) + j = 3n - 2j$. Thay a, b, c, N vào công thức số hạng tổng quát, ta thu được:

$$a_n = [x^n y^n z^n] G(x, y, z) = \sum_{j=0}^n \frac{(3n - 2j)!}{j!((n - j)!)^3}$$

- Với $n = 1$: $a_1 = \frac{3!}{0!(1!)^3} + \frac{1!}{1!(0!)^3} = 6 + 1 = 7$.
- Với $n = 2$: $a_2 = \frac{3!}{0!(2!)^3} + \frac{2!}{1!(1!)^3} + \frac{1!}{2!(0!)^3} = 90 + 24 + 1 = 115$.

✓ Kết Luận

Số đường đi tổng quát của robot là $a_n = \sum_{j=0}^n \frac{(3n - 2j)!}{j!((n - j)!)^3}$.

Dạng 11 — Bài Toán Bàn Tròn & Chọn Phần Tử Không Kề Nhau Trên Vòng Tròn

Lý Thuyết

▢ Hàm Sinh Hai Biến Cho Bài Toán Chọn Vòng Tròn (Circular Selection)

1. Chọn phần tử không kề trên hàng ngang (Linear Selection):

- Số cách chọn k phần tử từ n phần tử xếp thành hàng ngang sao cho không có hai phần tử nào đứng cạnh nhau là $\binom{n-k+1}{k}$.
- Hàm sinh hai biến $f(x, y) = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n-k+1}{k} y^k x^n$ được xác định bởi:

$$f(x, y) = \frac{1 + xy}{1 - x - x^2 y}$$

2. Chọn phần tử không kề trên vòng tròn (Circular Selection):

- Cho n phần tử xếp quanh một bàn tròn. Số cách chọn k phần tử sao cho không có hai phần tử nào cạnh nhau là:

$$g(n, k) = \frac{n}{n-k} \binom{n-k}{k}$$

- Hàm sinh hai biến cho số cách chọn trên vòng tròn $F(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=0}^{\infty} g(n, k) y^k x^n$:

$$F(x, y) = \frac{x + 2x^2y}{1 - x - x^2y}$$

- Khi $y = 1$ (chọn số lượng k bất kỳ), số cách chọn các tập hợp không kề nhau trên vòng tròn kích thước n chính là số Lucas L_n :

$$L(x) = \sum_{n=1}^{\infty} L_n x^n = \frac{x + 2x^2}{1 - x - x^2}$$

với dãy số Lucas $L_1 = 1, L_2 = 3, L_3 = 4, L_4 = 7, L_5 = 11, L_6 = 18, \dots$ ($L_n = L_{n-1} + L_{n-2}$).

🔗 Bản Chất Sự Khác Biệt Giữa Hàng Ngang Và Vòng Tròn

Khi chuyển từ hàng ngang sang vòng tròn, phần tử thứ 1 và phần tử thứ n trở nên kề nhau. Ta giải quyết bằng cách chia trường hợp: hoặc chọn phần tử 1 (khen đó phần tử 2 và n không được chọn, quy về bài toán hàng ngang độ dài $n - 3$), hoặc không chọn phần tử 1 (quy về bài toán hàng ngang độ dài $n - 1$). Sự phân rã này giải thích công thức $L_n = F_{n-1} + F_{n-3}$ trong toán học.

Bài Tập Minh Họa

Câu 26. Có 6 chiếc ghế xếp thành một vòng tròn quanh bàn. Cần chọn ra một số chiếc ghế (có thể không chọn chiếc nào) sao cho không có hai chiếc ghế nào cạnh nhau được chọn đồng thời. Hỏi có bao nhiêu cách chọn tất cả?

Đáp số: 18

Lời giải.**💡 Phương pháp giải**

Đây là bài toán đếm số tập con không chứa hai phần tử kề nhau trên vòng tròn 6 đỉnh. Kết quả chính là số Lucas thứ 6 (L_6).

🔵 Cách 1 — Tổ Hợp / Đại Số Thuần Túy

Lập luận chia trường hợp (Tổ hợp): Đánh số các ghế theo vòng tròn từ 1 đến 6.

- Trường hợp 1: Chọn ghế số 1. Do điều kiện không kề, hai ghế cạnh nó là 2 và 6 chắc chắn không được chọn. Ta chỉ có thể chọn thêm các ghế từ tập $\{3, 4, 5\}$ sao cho không kề nhau.
 - Chọn 0 ghế phụ: $\emptyset \Rightarrow$ có 1 cách: $\{1\}$.
 - Chọn 1 ghế phụ từ $\{3, 4, 5\}$: $\{3\}, \{4\}, \{5\} \Rightarrow$ có 3 cách: $\{1, 3\}, \{1, 4\}, \{1, 5\}$.
 - Chọn 2 ghế phụ từ $\{3, 4, 5\}$: chỉ có thể chọn $\{3, 5\} \Rightarrow$ có 1 cách: $\{1, 3, 5\}$.

Tổng số cách của Trường hợp 1 là: $1 + 3 + 1 = 5$ cách.

- Trường hợp 2: Không chọn ghế số 1. Khi đó ta có thể tự do chọn các ghế không kề nhau từ tập $\{2, 3, 4, 5, 6\}$ xếp thành một hàng ngang 5 phần tử. Số cách chọn tập con không kề từ hàng ngang m phần tử là số Fibonacci F_{m+2} (với $F_1 = 1, F_2 = 1, F_3 = 2, F_4 = 3, F_5 = 5, F_6 = 8, F_7 = 13$): Ở đây $m = 5 \Rightarrow F_7 = 13$ cách. (Các cách gồm: rỗng, chọn 1 ghế: 5 cách, chọn 2 ghế không kề: 6 cách: $\{2, 4\}, \{2, 5\}, \{2, 6\}, \{3, 5\}, \{3, 6\}, \{4, 6\}$, chọn 3 ghế không kề: 1 cách: $\{2, 4, 6\} \Rightarrow 1 + 5 + 6 + 1 = 13$ cách).

Tổng số cách chọn thỏa mãn là:

$$N = 5 + 13 = 18 \text{ cách}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng Hàm sinh Lucas: Số cách chọn các ghế không kề nhau quanh bàn tròn n ghế chính là số Lucas L_n . Dãy số Lucas thỏa mãn hệ thức truy hồi $L_n = L_{n-1} + L_{n-2}$ với $L_1 = 1, L_2 = 3$. Ta tính liên tiếp giá trị của dãy số:

- $L_1 = 1$
- $L_2 = 3$
- $L_3 = L_2 + L_1 = 3 + 1 = 4$
- $L_4 = L_3 + L_2 = 4 + 3 = 7$
- $L_5 = L_4 + L_3 = 7 + 4 = 11$
- $L_6 = L_5 + L_4 = 11 + 7 = 18$

Đáp số 18 tìm được ngay lập tức và vô cùng nhanh chóng!

✓ Kết Luận

Số cách chọn ghế thỏa mãn là **18** cách.

Câu 27. Có 8 người ngồi quanh một bàn tròn. Cần chọn ra đúng 3 người sao cho không có 2 người nào ngồi cạnh nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chọn?

Đáp số: 16

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán chọn $k = 3$ phần tử không kề nhau từ vòng tròn $n = 8$ phần tử.

● Cách 1 — Tổ Hợp / Đại Số Thuần Túy

Đếm tổ hợp bằng công thức trực tiếp: Số cách chọn k phần tử từ vòng tròn n phần tử sao cho không có 2 phần tử nào kề nhau được tính bằng công thức:

$$g(n, k) = \frac{n}{n-k} \binom{n-k}{k}$$

Áp dụng cho $n = 8$ và $k = 3$:

$$g(8, 3) = \frac{8}{8-3} \binom{8-3}{3} = \frac{8}{5} \binom{5}{3}$$

Ta tính số tổ hợp:

$$\binom{5}{3} = 10$$

Do đó:

$$g(8, 3) = \frac{8}{5} \cdot 10 = \mathbf{16} \text{ cách}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Giải bằng Hàm sinh hai biến: Số cách chọn là hệ số của $x^8 y^3$ trong hàm sinh hai biến:

$$F(x, y) = \frac{x + 2x^2 y}{1 - x - x^2 y}$$

Khai triển thành chuỗi hình thức:

$$F(x, y) = (x + 2x^2 y) \sum_{m=0}^{\infty} (x + x^2 y)^m$$

Ta khai triển số hạng tổng quát bằng nhị thức Newton:

$$(x + x^2 y)^m = \sum_{j=0}^m \binom{m}{j} x^{m-j} (x^2 y)^j = \sum_{j=0}^m \binom{m}{j} x^{m+j} y^j$$

Thay vào phương trình $F(x, y)$:

$$F(x, y) = \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{j=0}^m \binom{m}{j} x^{m+j+1} y^j + 2 \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{j=0}^m \binom{m}{j} x^{m+j+2} y^{j+1}$$

Ta cần tìm các cặp (m, j) sao cho số mũ của y bằng 3 và số mũ của x bằng 8:

- Ở tổng thứ nhất:
 - Số mũ của y là $j = 3$.
 - Số mũ của x là $m + j + 1 = 8 \Rightarrow m + 3 + 1 = 8 \Rightarrow m = 4$.
 - Hệ số thu được là: $\binom{4}{3} = 4$.
- Ở tổng thứ hai:

- Số mũ của y là $j + 1 = 3 \Rightarrow j = 2$.
- Số mũ của x là $m + j + 2 = 8 \Rightarrow m + 2 + 2 = 8 \Rightarrow m = 4$.
- Hệ số thu được là: $2 \cdot \binom{4}{2} = 2 \cdot 6 = 12$.

Cộng hai hệ số ở hai tổng:

$$N = 4 + 12 = 16$$

Đại số hàm sinh chứng minh sự nhất quán tuyệt đối của toán học!

✓ Kết Luận

Số cách chọn thỏa mãn là **16** cách.

Câu 28. Cho một bàn tròn gồm 9 chiếc ghế. Cần chọn ra đúng 3 chiếc ghế sao cho giữa hai chiếc ghế được chọn bất kỳ luôn có ít nhất 2 chiếc ghế trống. Hỏi có bao nhiêu cách chọn?

Đáp số: 3

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán chọn $k = 3$ phần tử từ vòng tròn $n = 9$ phần tử sao cho khoảng cách (số ô trống) giữa bất kỳ hai phần tử nào được chọn cũng ít nhất là $d = 2$.

● Cách 1 — Tổ Hợp / Đại Số Thuần Túy

Đếm tổ hợp bằng công thức tổng quát: Số cách chọn k phần tử từ vòng tròn n phần tử với khoảng cách trống tối thiểu d được cho bởi công thức:

$$g_d(n, k) = \frac{n}{n - kd} \binom{n - kd}{k}$$

Ở đây $n = 9, k = 3, d = 2$. Thay các giá trị vào công thức:

$$g_2(9, 3) = \frac{9}{9 - 3 \cdot 2} \binom{9 - 3 \cdot 2}{3} = \frac{9}{3} \binom{3}{3}$$

Ta tính trực tiếp:

$$g_2(9, 3) = 3 \cdot 1 = 3 \text{ cách}$$

Ba cách chọn này tương ứng với các tập hợp ghế đối xứng qua tâm: $\{1, 4, 7\}$, $\{2, 5, 8\}$, và $\{3, 6, 9\}$.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Giải bằng Hàm sinh hai biến: Số cách chọn là hệ số của $x^n y^k$ (ở đây là $x^9 y^3$) trong hàm sinh hai biến cho bài toán chọn với khoảng cách tối thiểu d :

$$F(x, y) = \frac{x + (d+1)x^{d+1}y}{1 - x - x^{d+1}y}$$

Với $d = 2$, ta có:

$$F(x, y) = \frac{x + 3x^3y}{1 - x - x^3y} = (x + 3x^3y) \sum_{m=0}^{\infty} (x + x^3y)^m$$

Khai triển số hạng tổng quát của chuỗi:

$$(x + x^3y)^m = \sum_{j=0}^m \binom{m}{j} x^{m-j} (x^3y)^j = \sum_{j=0}^m \binom{m}{j} x^{m+2j} y^j$$

Thay vào biểu thức của $F(x, y)$:

$$F(x, y) = \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{j=0}^m \binom{m}{j} x^{m+2j+1} y^j + 3 \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{j=0}^m \binom{m}{j} x^{m+2j+3} y^{j+1}$$

Ta cần tìm hệ số của $x^9 y^3$:

- Ở tổng thứ nhất:
 - Số mũ của y là $j = 3$.
 - Số mũ của x là $m + 2j + 1 = 9 \Rightarrow m + 6 + 1 = 9 \Rightarrow m = 2$.
 - Hệ số thu được là: $\binom{2}{3} = 0$.
- Ở tổng thứ hai:
 - Số mũ của y là $j + 1 = 3 \Rightarrow j = 2$.
 - Số mũ của x là $m + 2j + 3 = 9 \Rightarrow m + 4 + 3 = 9 \Rightarrow m = 2$.
 - Hệ số thu được là: $3 \cdot \binom{2}{2} = 3$.

Tổng hệ số thu được là $0 + 3 = 3$. Hàm sinh cho kết quả cực kỳ chính xác và nhanh chóng!

✓ Kết Luận

Số cách chọn thỏa mãn là **3** cách.

Câu 29. Một nhóm gồm 6 học sinh ngồi quanh một bàn tròn. Cần chọn ra một số học sinh (có thể không chọn học sinh nào) sao cho không có hai học sinh kề nhau nào được chọn đồng thời, và số lượng học sinh được chọn phải là một số chẵn. Hỏi có bao nhiêu cách chọn?

Đáp số: 10

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán chọn một tập con các học sinh không kề nhau quanh bàn tròn $n = 6$ sao cho kích thước của tập con này là số chẵn.

● Cách 1 — Tổ Hợp / Đại Số Thuần Túy

Lập luận chia trường hợp: Gọi k là số lượng học sinh được chọn. Vì số lượng học sinh được chọn phải là số chẵn và không kề nhau, nên k chỉ có thể nhận các giá trị chẵn $k \in \{0, 2\}$. (Không thể chọn 4 học sinh vì vòng tròn 6 ghế chỉ chứa tối đa 3 ghế không kề nhau).

- Với $k = 0$: Có duy nhất 1 cách chọn (tập rỗng).
- Với $k = 2$: Số cách chọn 2 người không kề nhau từ vòng tròn 6 người là:

$$g(6, 2) = \frac{6}{6-2} \binom{6-2}{2} = \frac{6}{4} \binom{4}{2} = \frac{3}{2} \cdot 6 = 9 \text{ cách}$$

Tổng cộng số cách chọn thỏa mãn là:

$$N = 1 + 9 = 10 \text{ cách}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Giải bằng Hàm sinh đóng và Bộ lọc Parity: Hàm sinh hai biến đếm số cách chọn không kề nhau trên vòng tròn là:

$$F(x, y) = \frac{x + 2x^2y}{1 - x - x^2y}$$

Để lọc các số hạng có số lượng chọn k chẵn, ta áp dụng bộ lọc parity (Roots of Unity Filter cho cấp 2):

$$F_{\text{even}}(x) = \frac{1}{2} [F(x, 1) + F(x, -1)]$$

Ta tính từng thành phần:

$$F(x, 1) = \frac{x + 2x^2}{1 - x - x^2}, \quad F(x, -1) = \frac{x - 2x^2}{1 - x + x^2}$$

Cộng hai phân thức và quy đồng mẫu số:

$$F_{\text{even}}(x) = \frac{1}{2} \cdot \frac{(x + 2x^2)(1 - x + x^2) + (x - 2x^2)(1 - x - x^2)}{(1 - x)^2 - x^4}$$

$$F_{\text{even}}(x) = \frac{x - x^2 + 2x^4}{1 - 2x + x^2 - x^4}$$

Để tìm số cách chọn cho $n = 6$ phần tử, ta cần tìm hệ số $[x^6]$ của khai triển $F_{\text{even}}(x)$. Đặt $F_{\text{even}}(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$. Từ phương trình:

$$(1 - 2x + x^2 - x^4) \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n = x - x^2 + 2x^4$$

Cân bằng hệ số hai vế cho $n \geq 5$, ta có hệ thức truy hồi:

$$a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2} + a_{n-4}$$

Ta tính các giá trị đầu tiên của dãy số:

- $a_1 = 1$
- $a_2 = 1$
- $a_3 = 1$
- $a_4 = 3$
- $a_5 = 2a_4 - a_3 + a_1 = 2(3) - 1 + 1 = 6$
- $a_6 = 2a_5 - a_4 + a_2 = 2(6) - 3 + 1 = 10$

Hàm sinh cho ta một công cụ vạn năng để xử lý cả các ràng buộc tính chẵn lẻ phức tạp!

✓ Kết Luận

Số cách chọn thỏa mãn là **10** cách.

Dạng 12 — Bài Toán Tô Màu & Định Lý Đếm Pólya

Lý Thuyết

🔺 Chỉ Số Chu Trình Và Định Lý Đếm Pólya

Khi đếm các cấu hình tô màu đối xứng dưới một nhóm phép đối xứng G (như phép quay, phép lật), ta sử dụng **Định lý đếm Pólya (Pólya Enumeration Theorem)**.

1. Chỉ số chu trình (Cycle Index Polynomial) của nhóm G : Với mỗi phép biến đổi $g \in G$, ta phân tích nó thành tích các chu trình rời nhau. Gọi $c_{k(g)}$ là số chu trình có độ dài k trong phân tích của g . Chỉ số chu trình của G là:

$$Z(G; z_1, z_2, \dots, z_p) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} z_1^{c_1(g)} z_2^{c_2(g)} \dots z_p^{c_p(g)}$$

2. Định lý đếm Pólya:

- Nếu ta tô màu các đỉnh bằng các màu có sẵn, số cách tô màu không phân biệt đối xứng chính bằng đa thức chỉ số chu trình khi thế biến z_k bởi tổng lũy thừa bậc k của các màu.
- Ví dụ tô màu bằng 3 màu Đỏ (r), Xanh (g), Vàng (b):

$$z_k = r^k + g^k + b^k$$

- Hệ số của hạng tử $r^i g^j b^k$ trong đa thức thế chính là số cách tô màu chứa đúng i hạt Đỏ, j hạt Xanh, k hạt Vàng.

🔗 Chỉ Số Chu Trình Của Nhóm Quay Vòng Cổ 6 Hạt

Vòng cổ gồm 6 hạt có nhóm đối xứng quay là nhóm cyclic C_6 gồm 6 phép quay góc $k \cdot 60^\circ$ ($k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$). Phân tích chu trình của từng phép quay:

- Quay 0° (đồng nhất): 6 chu trình độ dài 1 $\Rightarrow z_1^6$.
- Quay 60° và 300° (cấp 6): 1 chu trình độ dài 6 $\Rightarrow 2z_6^1$.
- Quay 120° and 240° (cấp 3): 2 chu trình độ dài 3 $\Rightarrow 2z_3^2$.
- Quay 180° (cấp 2): 3 chu trình độ dài 2 $\Rightarrow z_2^3$.

Chỉ số chu trình của nhóm quay C_6 là:

$$Z(C_6) = \frac{1}{6}(z_1^6 + z_2^3 + 2z_3^2 + 2z_6^1)$$

Bài Tập Minh Họa

Câu 30. Có bao nhiêu cách tô màu các hạt của một vòng cổ gồm 6 hạt bằng 3 màu Đỏ, Xanh lá, Xanh dương, sao cho hai cấu hình trùng nhau qua phép quay vòng cổ được coi là giống nhau?

Đáp số: 130

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán đếm số cách tô màu vòng cổ dưới tác động quay của nhóm C_6 bằng 3 màu. Ta áp dụng Bổ đề Burnside hoặc Định lý đếm Pólya trực tiếp.

🔵 Cách 1 — Tổ Hợp / Đại Số Thuần Túy

Đếm trực tiếp bằng Bổ đề Burnside: Số cấu hình phân biệt bằng trung bình cộng số cấu hình bất biến dưới các phép quay $g \in C_6$:

- Phép quay 0° : Mọi cách tô màu đều bất biến. Số cách tô tự do là $3^6 = 729$ cách.
- Phép quay 60° và 300° : Tất cả 6 hạt phải có cùng một màu $\Rightarrow 3^1 = 3$ cách cho mỗi phép quay.
- Phép quay 120° và 240° : Các hạt ở vị trí cách nhau 3 bước phải cùng màu. Lưới hạt chia làm 2 nhóm độc lập (hạt lẻ và hạt chẵn) $\Rightarrow 3^2 = 9$ cách cho mỗi phép quay.
- Phép quay 180° : Các hạt đối diện nhau qua tâm phải cùng màu. Lưới chia làm 3 cặp độc lập $\Rightarrow 3^3 = 27$ cách.

Tính giá trị trung bình cộng:

$$N = \frac{1}{6}(729 + 2 \cdot 3 + 2 \cdot 9 + 27)$$

$$N = \frac{1}{6}(729 + 6 + 18 + 27) = \frac{780}{6} = 130 \text{ cách}$$

🟣 Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng Định lý đếm Pólya: Chỉ số chu trình của nhóm quay C_6 :

$$Z(C_6) = \frac{1}{6}(z_1^6 + z_2^3 + 2z_3^2 + 2z_6)$$

Do tô bằng 3 màu bất kỳ và không giới hạn số hạt mỗi màu, ta thay thế biến $z_k = 1^k + 1^k + 1^k = 3$ với mọi k :

$$N = Z(C_6; 3, 3, 3, 3) = \frac{1}{6}(3^6 + 3^3 + 2 \cdot 3^2 + 2 \cdot 3)$$

$$N = \frac{1}{6}(729 + 27 + 18 + 6) = \frac{780}{6} = 130$$

Định lý Pólya tự động hóa hoàn toàn quá trình đếm số điểm cố định của Burnside!

✓ Kết Luận

Có **130** cách tô màu vòng cổ thỏa mãn.

Câu 31. Có bao nhiêu cách tô màu các hạt của một vòng cổ gồm 6 hạt bằng 3 màu Đỏ (r), Xanh lá (g), Xanh dương (b) sao cho vòng cổ có đúng 3 hạt màu Đỏ, 2 hạt màu Xanh lá, và 1 hạt màu Xanh dương (phép quay tính là trùng)?

Đáp số: 10

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán tô màu phân phối số lượng hạt cố định cho mỗi màu. Ta tìm hệ số của hạng tử $r^3g^2b^1$ trong đa thức chỉ số chu trình thế.

● Cách 1 — Tổ Hợp / Đại Số Thuần Túy

Đếm tổ hợp bằng cách chia lớp tương đương: Số cách xếp chuỗi gồm 3 chữ Đỏ, 2 chữ Xanh lá, 1 chữ Xanh dương trên một hàng ngang là:

$$T = \frac{6!}{3!2!1!} = 60 \text{ cách}$$

Mỗi cách xếp trên vòng tròn tạo ra một quỹ đạo dưới nhóm quay C_6 . Kích thước của quỹ đạo của một cấu hình C bằng 6 chia cho số lần đối xứng quay của cấu hình đó. Tuy nhiên, do cấu hình chứa đúng 1 hạt màu Xanh dương (b), hạt Xanh dương này đóng vai trò như một điểm mốc duy nhất. Không thể có bất kỳ phép quay không tầm thường nào biến cấu hình thành chính nó (vì phép quay đó buộc phải di chuyển hạt Xanh dương duy nhất sang vị trí khác). Vì vậy, mọi cấu hình trong số 60 cấu hình đều có tính đối xứng quay tối thiểu (chu kỳ quay bằng 6). Mỗi quỹ đạo (lớp tương đương quay) chứa đúng 6 cấu hình hàng ngang. Do đó, số cấu hình vòng cổ phân biệt là:

$$N = \frac{60}{6} = 10 \text{ cách}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng Đại số Pólya: Số cách tô màu chính là hệ số của r^3g^2b trong đa thức thế:

$$\begin{aligned} & Z(C_6; r + g + b, r^2 + g^2 + b^2, r^3 + g^3 + b^3, r^6 + g^6 + b^6) \\ &= \frac{1}{6} \left[(r + g + b)^6 + (r^2 + g^2 + b^2)^3 + 2(r^3 + g^3 + b^3)^2 + 2(r^6 + g^6 + b^6) \right] \end{aligned}$$

Ta tìm hệ số của r^3g^2b trong từng hạng tử:

- Trong $(r + g + b)^6$: Hệ số là hệ số multinomial:

$$[r^3g^2b](r + g + b)^6 = \frac{6!}{3!2!1!} = 60$$

- Trong $(r^2 + g^2 + b^2)^3$: Số mũ của mọi biến trong khai triển đều chẵn (dạng $r^{2i}g^{2j}b^{2k}$), nên hạng tử lẻ r^3g^2b có hệ số bằng 0.
- Trong $2(r^3 + g^3 + b^3)^2$: Số mũ của mọi biến đều chia hết cho 3 (dạng $r^{3i}g^{3j}b^{3k}$), nên hệ số của r^3g^2b bằng 0.
- Trong $2(r^6 + g^6 + b^6)$: Chỉ chứa lũy thừa bậc 6, nên hệ số bằng 0.

Kết hợp lại ta được:

$$[r^3g^2b]Z(C_6) = \frac{1}{6}(60 + 0 + 2 \cdot 0 + 2 \cdot 0) = 10$$

Một lời giải vô cùng ngắn gọn và đẹp đẽ nhờ sức mạnh của đại số!

✓ Kết Luận

Có đúng **10** cách tô màu vòng cổ thỏa mãn tỷ lệ màu.

Câu 32. Có bao nhiêu cách tô màu các hạt của một vòng cổ gồm 6 hạt bằng 3 màu Đỏ, Xanh lá, Xanh dương, sao cho hai cấu hình trùng nhau qua các phép đối xứng của nhóm Dihedral D_6 (bao gồm cả phép quay và phép lật) được coi là giống nhau? So sánh với kết quả dưới tác động của nhóm quay C_6 .

Đáp số: 92

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán đếm cấu hình tô màu vòng cổ dưới tác động của nhóm Dihedral D_6 gồm 12 phần tử (6 phép quay và 6 phép lật).

● Cách 1 — Tổ Hợp / Đại Số Thuần Túy

Đếm trực tiếp bằng Bổ đề Burnside: Số cách tô màu bằng trung bình cộng số cấu hình cố định dưới 12 phép đối xứng của D_6 :

- 6 phép quay (như nhóm C_6): Tổng số điểm cố định là $3^6 + 2 \cdot 3^1 + 2 \cdot 3^2 + 3^3 = 729 + 6 + 18 + 27 = 780$.
- 3 phép lật qua các đường chéo đi qua đỉnh đối diện: Mỗi phép lật giữ cố định 2 hạt trên trục lật và hoán đổi 2 cặp hạt còn lại. Số nhóm hạt độc lập là $2 + 2 = 4$. Số cách tô cố định là $3^4 = 81$ cách. Tổng cho 3 phép lật là $3 \cdot 81 = 243$.
- 3 phép lật qua các trục đi qua trung điểm của hai cạnh đối diện: Mỗi phép lật hoán đổi 3 cặp hạt. Số nhóm hạt độc lập là 3. Số cách tô cố định là $3^3 = 27$ cách. Tổng cho 3 phép lật là $3 \cdot 27 = 81$.

Tổng số cách tô màu không phân biệt đối xứng gương và quay:

$$N = \frac{780 + 243 + 81}{12} = \frac{1104}{12} = \mathbf{92} \text{ cách}$$

So với nhóm quay C_6 (130 cách), khi cho phép lật gương (nhóm D_6), nhiều cấu hình không đối xứng gương được gộp lại làm một, làm giảm số cách tô phân biệt từ 130 xuống 92.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng Định lý đếm Pólya: Chỉ số chu trình của nhóm Dihedral D_6 tác động trên các đỉnh của lục giác đều được xác định bởi:

$$Z(D_6) = \frac{1}{12}(z_1^6 + 3z_1^2z_2^2 + 4z_2^3 + 2z_3^2 + 2z_6)$$

Thế $z_k = 3$ với mọi k (vì có 3 màu và không giới hạn số hạt mỗi màu):

$$N = Z(D_6; 3, 3, 3, 3, 3, 3)$$

$$N = \frac{1}{12}(3^6 + 3 \cdot 3^2 \cdot 3^2 + 4 \cdot 3^3 + 2 \cdot 3^2 + 2 \cdot 3)$$

$$N = \frac{1}{12}(729 + 3 \cdot 81 + 4 \cdot 27 + 2 \cdot 9 + 6)$$

$$N = \frac{1}{12}(729 + 243 + 108 + 18 + 6) = \frac{1104}{12} = \mathbf{92}$$

Công thức chỉ số chu trình Pólya gom toàn bộ các phép lật và quay vào một biểu thức đại số vô cùng thanh thoát!

✓ Kết Luận

Số cách tô màu vòng cổ dưới nhóm D_6 là **92** cách.

Câu 33. Có bao nhiêu cách tô màu các mặt của một hình lập phương bằng k màu khác nhau sao cho hai cấu hình trùng nhau qua các phép quay trong không gian ba chiều được coi là giống nhau? Áp dụng tính kết quả cụ thể khi hình lập phương được tô bằng $k = 2$ màu và $k = 3$ màu.

Đáp số: 10 (với $k=2$); 57 (với $k=3$)

Lời giải.

 Phương pháp giải

Đây là bài toán đếm số cách tô màu các mặt của khối đa diện 3D dưới nhóm quay của hình lập phương. Nhóm quay này, ký hiệu là G , có cấp $|G| = 24$ và đẳng cấu với nhóm đối xứng S_4 .

 Cách 1 — Tổ Hợp / Đại Số Thuần Túy

Đếm trực tiếp bằng Bổ đề Burnside: Ta phân tích 24 phép quay không gian của hình lập phương và số cách tô mặt cố định tương ứng:

- 1 phép quay đồng nhất (góc 0°): Giữ nguyên cả 6 mặt $\Rightarrow k^6$ cách tô cố định.
- 3 phép quay góc 180° quanh các trục nối tâm hai mặt đối diện: Trục đi qua 2 mặt đối diện (2 mặt này cố định), 4 mặt bên quay 180° tạo thành 2 cặp $\Rightarrow k^{2+2} = k^4$ cách tô cố định cho mỗi phép.
- 6 phép quay góc 90° hoặc 270° quanh các trục nối tâm hai mặt đối diện: 2 mặt trên trục cố định, 4 mặt bên quay góc 90° tạo thành 1 chu trình cấp 4 $\Rightarrow k^{2+1} = k^3$ cách tô cố định cho mỗi phép.
- 8 phép quay góc 120° hoặc 240° quanh các trục nối hai đỉnh đối diện (đường chéo khối): Trục không đi qua mặt nào, các mặt kề đỉnh hoán vị theo 2 nhóm 3 mặt $\Rightarrow k^2$ cách tô cố định cho mỗi phép.
- 6 phép quay góc 180° quanh các trục nối trung điểm hai cạnh đối diện: Hoán vị các mặt theo 3 cặp đối diện $\Rightarrow k^3$ cách tô cố định cho mỗi phép.

Áp dụng Bổ đề Burnside, số cấu hình phân biệt là:

$$N = \frac{1}{24}(k^6 + 3k^4 + 6k^3 + 8k^2 + 6k^3) = \frac{k^6 + 3k^4 + 12k^3 + 8k^2}{24}$$

- Với $k = 2$: $N = \frac{2^6 + 3 \cdot 2^4 + 12 \cdot 2^3 + 8 \cdot 2^2}{24} = \frac{64 + 48 + 96 + 32}{24} = \frac{240}{24} = 10$ cách.
- Với $k = 3$: $N = \frac{3^6 + 3 \cdot 3^4 + 12 \cdot 3^3 + 8 \cdot 3^2}{24} = \frac{729 + 243 + 324 + 72}{24} = \frac{1368}{24} = 57$ cách.

 Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng Định lý đếm Pólya: Chỉ số chu trình của nhóm quay hình lập phương G tác động lên các mặt của nó là:

$$Z(G) = \frac{1}{24}(z_1^6 + 3z_1^2z_2^2 + 6z_1^2z_4 + 8z_3^2 + 6z_2^3)$$

Khi tô bằng k màu tự do, thế $z_m = k$ với mọi m :

$$N = Z(G; k) = \frac{1}{24}(k^6 + 3k^2 \cdot k^2 + 6k^2 \cdot k + 8k^2 + 6k^3)$$

$$N = \frac{k^6 + 3k^4 + 12k^3 + 8k^2}{24}$$

- Thay $k = 2$ màu: $N = 10$ cách.
- Thay $k = 3$ màu: $N = 57$ cách.

Phương pháp Pólya giúp hệ thống hóa và tự động hóa toàn bộ việc đếm các cấu hình đối xứng không gian cực kỳ phức tạp!

✓ Kết Luận

Số cách tô màu hình lập phương là **10** cách (với 2 màu) và **57** cách (với 3 màu).

Tổng Kết — Bảng Chọn Công Cụ Hàm Sinh

🎯 Ba Câu Hỏi Dựng Hàm Sinh

Khi đứng trước bất kỳ bài toán đếm nào, hãy đặt đúng 3 câu hỏi:

Câu 1: Các đối tượng có phân biệt thứ tự không?

- Có (chuỗi, xếp hàng, xếp chỗ ngồi) → Dùng **Hàm sinh mũ (EGF)**: e^x
- Không (tập hợp, chia kẹo đồng nhất, phân hoạch) → Dùng **Hàm sinh thông thường (OGF)**: $\frac{1}{1-x}$

Câu 2: Ràng buộc của từng đối tượng là gì?

- Chẵn lần → $\cosh(x)$ (EGF) hoặc $\frac{1}{1-x^2}$ (OGF)
- Lẻ lần → $\sinh(x)$ (EGF)
- Chia hết cho m → $\frac{1}{1-x^m}$ (OGF)
- Tối đa k → $(1+x+\dots+x^k)$ (OGF)
- Bội số → Roots of Unity Filter

Câu 3: Phép toán cuối cùng là gì?

- Nhân các hàm thành phần lại → **tích**
- Tìm hệ số $[x^n]$ trong hàm tổng → **khai triển**
- Giải phương trình hàm ẩn → **Lagrange Inversion**
- Đối xứng quay vòng cổ → **Định lý đếm Pólya**

📊 Bảng Tra Nhanh Kết Quả Chuẩn

Cấu trúc	Công thức	Ví dụ nhỏ
Số chuỗi n ký tự từ k loại, ký tự i xuất hiện chẵn lần	$\frac{(k)^n + (k-2)^n}{2}$	$k = 3, n = 4$: 41
Số tập con của S có tổng $\equiv 0(\text{mod } 3)$, S cân bằng	$\frac{2^{ S } + 2 \cdot 0}{3} = \frac{2^{ S }}{3}$	$ S = 9$: 176
Toàn ánh từ n phần tử vào k hộp	$k! \cdot S(n, k) = \sum (-1)^j C_k^j (k-j)^n$	$n = 6, k = 3$: 540
Phân hoạch tập n phần tử (mọi cỡ nhóm)	B_n (Số Bell)	$B_5 = 52$
Số phân hoạch số nguyên n	$p(n)$ (Số partition)	$p(8) = 22$
Số cách tam giác hóa đa giác lồi $n + 2$ đỉnh	$C_n = \frac{C_{2n}^n}{n+1}$	$n = 5$: 42
Số cây có nhãn n đỉnh	n^{n-2} (Cayley)	$n = 5$: 125
Lát bảng $3 \times 2m$ bằng domino	$A(x) = \frac{1-x^2}{1-4x^2+x^4}$	$m = 3$ (bảng 3×6): 41
Số đường đi robot trên lưới (Delannoy)	$F(x) = \frac{1}{\sqrt{1-6x+x^2}}$	$D(3, 3) = 63$
Chọn k phần tử vòng tròn không kề nhau	$g(n, k) = \frac{n}{n-k} C_{n-k}^k$	$n = 8, k = 3$: 16
Chọn k phần tử vòng tròn cách nhau $\geq d$ ô trống	$g_d(n, k) = \frac{n}{n-kd} C_{n-kd}^k$	$n = 9, k = 3, d = 2$: 3
Chọn ghế vòng tròn không kề nhau cỡ chẵn	$F_{\text{even}}(x) = \frac{x-x^2+2x^4}{1-2x+x^2-x^4}$	$n = 6$: 10
Tô màu vòng cổ 6 hạt 3 màu quay	$Z(C_6, 3, 3, 3, 3) = 130$	Đỏ/Xanh/Vàng: 130
Tô màu vòng cổ 6 hạt 3 màu lật quay (D_6)	$Z(D_6; 3) = 92$	3 màu: 92
Tô màu 6 mặt lập phương bằng k màu quay	$\frac{Z(S_4; k) = k^6 + 3k^4 + 12k^3 + 8k^2}{24}$	$k = 2 : 10, k = 3 : 57$