

MỤC LỤC

Bài 1. Ứng dụng thực tiễn của hàm số và đồ thị 2

 Mục 1. Các bước giải bài toán bằng mô hình hóa Toán học 2

 Mục 2. Các dạng toán thực tế tối ưu hóa trọng tâm 2


Bài 1. Ứng dụng thực tiễn của hàm số và đồ thị

A. LÝ THUYẾT

Mục 1. Các bước giải bài toán bằng mô hình hóa Toán học

Quy trình giải toán thực tế. Để giải một bài toán thực tiễn bằng công cụ đạo hàm và đồ thị hàm số, ta thường thực hiện qua 4 bước cơ bản sau:

- **Bước 1: Lựa chọn ẩn số.** Gọi một hoặc một vài đại lượng cần thiết là ẩn số (ví dụ: x, t). Đặt điều kiện cho ẩn số dựa vào thực tế bài toán.
- **Bước 2: Thiết lập hàm số (Mô hình hóa).** Biểu diễn đại lượng cần tìm cực trị, cần tính tốc độ thay đổi hoặc cần tìm giới hạn dưới dạng một hàm số theo ẩn đã chọn: $y = f(x)$ hoặc $C = f(t)$.
- **Bước 3: Khảo sát hàm số.** Sử dụng công cụ đạo hàm để tìm khoảng đơn điệu, cực trị, giá trị lớn nhất nhỏ nhất, hoặc tìm các đường tiệm cận của hàm số $f(x)$ trên miền xác định của nó.
- **Bước 4: Kết luận.** Đối chiếu các kết quả tìm được với điều kiện thực tế và đưa ra câu trả lời cho bài toán ban đầu.



Hình 1. Minh họa hàm nồng độ thuốc $C(t)$ theo thời gian đạt tiệm cận ngang ở ngưỡng K

Mục 2. Các dạng toán thực tế tối ưu hóa trọng tâm

Chuyên đề 1: Tối ưu hóa Hình học 2D - Hình trong hình (Inscribed Shapes)

Bài toán tìm thiết kế của một hình phẳng H_1 (chữ nhật, tam giác) nội tiếp trong một hình H_2 cho trước (tam giác, đường tròn, elip, parabol) sao cho diện tích của H_1 đạt giá trị lớn nhất.

1. Hình chữ nhật nội tiếp trong tam giác:

- Cho tam giác đáy a , chiều cao tương ứng h . Một hình chữ nhật có hai đỉnh nằm trên đáy, hai đỉnh còn lại nằm trên hai cạnh bên.
- Gọi chiều cao của hình chữ nhật là x ($0 < x < h$). Cạnh còn lại của hình chữ nhật là $y = a\left(1 - \frac{x}{h}\right)$.
- Hàm diện tích: $S(x) = x \cdot y = ax\left(1 - \frac{x}{h}\right) = a\left(x - \frac{x^2}{h}\right)$.
- Cực đại tại $x = \frac{h}{2}$ với $S_{\max} = \frac{1}{4}ah = \frac{1}{2}S_{\text{tam giác}}$.

2. Hình chữ nhật nội tiếp nửa hình tròn:

- Nửa hình tròn bán kính R . Hình chữ nhật nội tiếp có một cạnh nằm trên đường kính.
- Gọi nửa chiều dài cạnh trên đường kính là x ($0 < x < R$), chiều cao là $y = \sqrt{R^2 - x^2}$.
- Diện tích: $S(x) = 2xy = 2x\sqrt{R^2 - x^2} = \sqrt{4x^2(R^2 - x^2)}$.
- Sử dụng BĐT Cauchy (AM-GM): $2x \cdot \sqrt{R^2 - x^2} \leq x^2 + (R^2 - x^2) = R^2$.
- Đạt cực đại tại $x = \frac{R}{\sqrt{2}}$ với $S_{\max} = R^2$.

Chuyên đề 2: Bài toán cắt dây uốn hình (Wire Cutting & Shape Forming)

Đoạn dây dài L được cắt thành hai phần: phần thứ nhất uốn thành hình H_1 (hình vuông hoặc tam giác đều), phần còn lại uốn thành hình H_2 (hình tròn). Tìm vị trí cắt để tổng diện tích hai hình là nhỏ nhất hoặc lớn nhất.

Bài toán uốn thành Hình vuông (cạnh a) và Hình tròn (bán kính R):

- Gọi phần dây uốn thành hình vuông là x ($0 < x < L$), phần uốn thành hình tròn là $L - x$.
- Cạnh hình vuông: $a = \frac{x}{4} \Rightarrow S_{\text{vuông}} = \frac{x^2}{16}$.
- Chu vi tròn: $2\pi R = L - x \Rightarrow R = \frac{L - x}{2\pi} \Rightarrow S_{\text{tròn}} = \pi R^2 = \frac{(L - x)^2}{4\pi}$.
- Hàm tổng diện tích: $S(x) = \frac{x^2}{16} + \frac{(L - x)^2}{4\pi}$.
- Đạo hàm: $S'(x) = \frac{x}{8} - \frac{L - x}{2\pi} = 0 \Leftrightarrow x(\pi + 4) = 4L \Leftrightarrow x = \frac{4L}{\pi + 4}$.
- **Nhận xét:** Tổng diện tích nhỏ nhất khi đường kính hình tròn bằng cạnh hình vuông ($2R = a$).

Chuyên đề 3: Bài toán cắt giấy gấp hình (Cardboard Cutting & Paper Folding)**1. Cắt 4 góc hộp từ tấm bìa chữ nhật $a \times b$:**

- Cắt đi 4 hình vuông góc cạnh x ở 4 góc và gấp thành hộp không nắp.
- Thể tích: $V(x) = x(a - 2x)(b - 2x)$ với $0 < x < \frac{\min(a, b)}{2}$.
- Giải phương trình đạo hàm $V'(x) = 12x^2 - 4(a + b)x + ab = 0$ để tìm điểm cực đại.

2. Gấp góc tờ giấy hình chữ nhật:

- Gấp góc tờ giấy sao cho đỉnh góc trùng với một điểm trên cạnh đối diện. Tìm cách gấp để nếp gấp ngắn nhất (tối thiểu hóa độ dài đường nếp gấp).

Chuyên đề 4: Di chuyển qua nhiều môi trường (Snell's Law / Path Optimization)

Bài toán tìm đường đi tối ưu (thời gian ngắn nhất hoặc chi phí thấp nhất) khi di chuyển qua các môi trường có vận tốc hoặc đơn giá khác nhau.

Mô hình tổng quát:

- Đi từ $A(0, a)$ đến $B(d, -b)$ qua điểm $M(x, 0)$ trên trục phân cách. Vận tốc ở môi trường 1 là v_1 , ở môi trường 2 là v_2 .
- Hàm thời gian di chuyển: $T(x) = \frac{\sqrt{x^2 + a^2}}{v_1} + \frac{\sqrt{(d-x)^2 + b^2}}{v_2}$.
- Đạo hàm: $T'(x) = \frac{x}{v_1 \sqrt{x^2 + a^2}} - \frac{d-x}{v_2 \sqrt{(d-x)^2 + b^2}} = 0 \Leftrightarrow \frac{\sin \theta_1}{v_1} = \frac{\sin \theta_2}{v_2}$ (Định luật khúc xạ ánh sáng Snell).
- Dạng toán này cũng áp dụng trực tiếp cho bài toán lắp đặt đường ống dẫn dầu/nước từ đảo vào đất liền với đơn giá thi công dưới biển khác trên đất liền.

Chuyên đề 5: Khoảng cách giữa hai đồ thị và chuyển động (Distance & Motion Optimization)**1. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai chuyển động:**

- Hai vật chuyển động trên hai quỹ đạo cắt nhau vuông góc tại O . Tại thời điểm ban đầu ($t = 0$), vật A cách O khoảng d_1 và đi về O với vận tốc v_1 . Vật B cách O khoảng d_2 và đi ra xa O với vận tốc v_2 .
- Khoảng cách giữa hai vật tại thời điểm t : $d(t) = \sqrt{(d_1 - v_1 t)^2 + (d_2 + v_2 t)^2}$.
- Tìm cực trị của tam thức bậc hai dưới dấu căn.

2. Khoảng cách giữa hai đồ thị:

- Cho điểm M chạy trên đường cong $(C) : y = f(x)$ và một đường thẳng d cho trước. Tìm vị trí M để khoảng cách từ M đến d ngắn nhất.

Chuyên đề 6: Toán tối ưu kinh tế (Economics & Operating Costs)

1. Tối ưu giá dịch vụ / giá phòng:

- Một chung cư có N_0 căn hộ. Nếu giá thuê là P_0 triệu đồng thì tất cả các căn đều được thuê. Cứ mỗi lần tăng giá thêm ΔP triệu đồng thì có k căn bị bỏ trống.
- Gọi x là số lần tăng giá ($x \geq 0$). Giá thuê mới: $P = P_0 + x \cdot \Delta P$. Số căn được thuê: $N = N_0 - k \cdot x$.
- Hàm doanh thu: $R(x) = (P_0 + x \cdot \Delta P)(N_0 - k \cdot x)$. Tìm x để $R(x)$ đạt cực đại.

2. Tối ưu chi phí vận chuyển xe tải:

- Một chiếc xe tải chạy quãng đường S (km) với vận tốc v (km/h) ($v > 0$). Chi phí nhiên liệu mỗi giờ là $a \cdot v^2 + b$ (đồng). Chi phí trả cho tài xế cố định là c (đồng/giờ).
- Tổng thời gian di chuyển: $t = \frac{S}{v}$ (giờ).
- Tổng chi phí chuyển đi: $T(v) = (a \cdot v^2 + b + c) \cdot \frac{S}{v} = S \left(a \cdot v + \frac{b+c}{v} \right)$.
- Theo BĐT Cauchy: $a \cdot v + \frac{b+c}{v} \geq 2\sqrt{a(b+c)}$. Cực tiểu đạt được khi $av = \frac{b+c}{v} \Leftrightarrow v = \sqrt{\frac{b+c}{a}}$.

B. ĐỀ LUYỆN TẬP

Chuyên đề 7: Bài toán Khai thác Bền vững Tài nguyên Tái tạo (Maximum Sustainable Yield)

Quần thể cá (hoặc rừng, năng lượng gió...) tăng trưởng theo **mô hình logistic**:

$$\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K} \right)$$

trong đó N là quy mô quần thể, $r > 0$ là tốc độ tăng trưởng tự nhiên, K là **sức chứa tối đa** của môi trường.

Nếu khai thác với mức cố định H (tấn/năm), phương trình cân bằng trở thành:

$$rN \left(1 - \frac{N}{K} \right) = H \Leftrightarrow rN - \frac{rN^2}{K} = H$$

Mức khai thác bền vững tối đa (Maximum Sustainable Yield – MSY):

- Để tồn tại điểm cân bằng ổn định, phương trình trên phải có nghiệm thực dương, tức là biệt thức $\Delta \geq 0$.
- Tốc độ tăng trưởng tự nhiên $f(N) = rN \left(1 - \frac{N}{K} \right)$ đạt cực đại khi $f'(N) = r \left(1 - 2\frac{N}{K} \right) = 0 \Leftrightarrow N^* = \frac{K}{2}$.
- Mức khai thác bền vững tối đa: $H^* = f\left(\frac{K}{2}\right) = r \cdot \frac{K}{2} \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{rK}{4}$.
- **Quy tắc vàng:** Để đạt MSY, duy trì quần thể ở **nửa sức chứa**: $N^* = \frac{K}{2}$.
- **Cảnh báo:** Nếu $H > H^* = \frac{rK}{4}$, phương trình cân bằng vô nghiệm – quần thể sẽ sụp đổ theo thời gian.

Ví dụ: Đàn cá với $r = 0.4$, $K = 2000$ tấn. $MSY = 0.4 \times \frac{2000}{4} = 200$ tấn/năm. Khai thác trên 200 tấn $\rightarrow$ nguy cơ tuyệt chủng.

Chuyên đề 8: Mô hình Dịch bệnh và Điểm Uốn Lây nhiễm (Epidemic Peak & Inflection)

Trong giai đoạn bùng phát ban đầu (trước khi đạt đỉnh), số ca bệnh mới hằng ngày có thể mô hình hóa bởi:

$$I(t) = C \cdot t \cdot e^{\{-kt\}}$$

trong đó $C > 0$ là hệ số cường độ, $k > 0$ là tốc độ suy giảm (phụ thuộc vào biện pháp phòng dịch).

Phân tích bằng đạo hàm:

- $I'(t) = Ce^{\{-kt\}}(1 - kt) = 0 \Rightarrow t^* = \frac{1}{k}$ – **đỉnh dịch**.
- $I''(t) = Ce^{\{-kt\}}(k^2t - 2k) = 0 \Rightarrow t_{\text{uốn}} = \frac{2}{k}$ – **điểm uốn**: sau thời điểm này, tốc độ giảm số ca bắt đầu chậm lại.
- **Gánh nặng bệnh (Disease Burden)**: $\int_0^{+\infty} I(t) dt = \frac{C}{k^2}$.

Ý nghĩa điểm uốn: Tại $t = \frac{2}{k}$ (gấp đôi thời điểm đỉnh), đường cong $I(t)$ đổi từ **lõm** sang **lồi**. Trước điểm uốn: số ca giảm ngày càng nhanh. Sau điểm uốn: số ca vẫn giảm nhưng **chậm lại**.

Quy tắc nhận biết:

Giai đoạn	$I'(t)$	$I''(t)$	Nhận xét
$0 < t < t^*$	> 0	$-$	Số ca đang tăng
$t = t^*$	$= 0$	$-$	Đỉnh dịch
$t^* < t < t_{\text{uốn}}$	< 0	< 0	Giảm nhanh dần
$t = t_{\text{uốn}}$	< 0	$= 0$	Điểm uốn
$t > t_{\text{uốn}}$	< 0	> 0	Giảm chậm dần


B. ĐỀ LUYỆN TẬP

PHÂN LOẠI BÀI TẬP TỐI ƯU HÓA THỰC TẾ THEO CHỦ ĐỀ

Chủ đề 1. Bài toán Tối ưu hóa Hình học 2D

(16 câu)

Câu 1. Một tấm bìa hình vuông có cạnh 12 cm. Người ta cắt bỏ đi ở bốn góc bốn hình vuông nhỏ bằng nhau có cạnh là x (cm) rồi gấp lên thành một chiếc hộp không nắp. Tính giá trị của x để thể tích của chiếc hộp là lớn nhất.



- A. $x = 3$ cm
- B. $x = 2$ cm**
- C. $x = 4$ cm
- D. $x = 1$ cm

Lời giải.

- Sau khi cắt bốn góc và gấp lên, ta được một hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông.
- Cạnh đáy của hộp là $12 - 2x$ (cm). Chiều cao hộp là x (cm). Điều kiện thực tế của ẩn số: $0 < x < 6$.
- Thể tích của chiếc hộp là: $V(x) = (12 - 2x)^2 * x = 4x(6 - x)^2 = 4x^3 - 48x^2 + 144x$ (cm³).
- Tính đạo hàm: $V'(x) = 12x^2 - 96x + 144 = 12(x^2 - 8x + 12)$.
- Tìm nghiệm đạo hàm trên miền xác định: $V'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 8x + 12 = 0 \Leftrightarrow x = 2$ (thỏa mãn) hoặc $x = 6$ (loại).


Bảng biến thiên của hàm số $V(x)$ trên khoảng $(0; 6)$ như sau:

x	0	2	6
y'	+	0	−
y	0	128	0

Từ bảng biến thiên, ta thấy thể tích $V(x)$ đạt giá trị cực đại và cũng là giá trị lớn nhất bằng 128 cm^3 tại $x = 2 \text{ cm}$.

Kết luận: Vậy thể tích chiếc hộp đạt giá trị lớn nhất khi $x = 2 \text{ cm}$.

Câu 2. Một bác nông dân có 60 m lưới B40 muốn rào một mảnh vườn hình chữ nhật dọc theo bờ sông (bờ sông không cần rào). Diện tích mảnh vườn lớn nhất có thể rào được là bao nhiêu?



A. 300 m^2

B. 450 m^2

C. 900 m^2

D. 225 m^2

Lời giải.

Gọi chiều rộng mảnh vườn (đoạn vuông góc với bờ sông) là x (m). Điều kiện ẩn số: $0 < x < 30$.

Chiều dài mảnh vườn (đoạn song song bờ sông) sẽ là $60 - 2x$ (m) do chỉ cần rào 3 mặt xung quanh.

Diện tích mảnh vườn: $S(x) = x(60 - 2x) = 60x - 2x^2$ (m^2).

Đạo hàm: $S'(x) = 60 - 4x$.

Cho $S'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 15$ (thỏa mãn điều kiện).


Bảng biến thiên của hàm số $S(x)$ trên khoảng $(0; 30)$ như sau:

x	0	15	30
y'	+	0	−
y	0	450	0

Từ bảng biến thiên, ta thấy diện tích mảnh vườn đạt giá trị cực đại và cũng là lớn nhất bằng 450 m^2 tại $x = 15 \text{ m}$.

Kết luận: Vậy diện tích lớn nhất có thể rào được của mảnh vườn dọc bờ sông là 450 m^2 .

Câu 3. Một đường dây điện được nối từ nhà máy điện ở bờ biển đến một hòn đảo. Biết rằng khoảng cách ngắn nhất từ đảo đến bờ biển là 3 km, khoảng cách từ điểm cách đảo gần nhất trên bờ đến nhà máy điện là 10 km. Chi phí lắp đặt cáp ngầm dưới biển là 500 triệu đồng/km, chi phí lắp cáp trên bờ là 300 triệu đồng/km. Phương án tối ưu (tổng chi phí thấp nhất) có chi phí xấp xỉ là bao nhiêu triệu đồng?



A. 3900 triệu

B. 4500 triệu

C. 4200 triệu

D. 4000 triệu

Lời giải.

Gọi x (km) là khoảng cách từ điểm gần nhất trên bờ H đến điểm tiếp đất của cáp M ($0 \leq x \leq 10$).

Chiều dài cáp ngầm dưới biển (đoạn MB): $d_1 = \sqrt{x^2 + 3^2} = \sqrt{x^2 + 9}$ (km).

Chiều dài cáp trên bờ (đoạn AM): $d_2 = 10 - x$ (km).

Tổng chi phí lắp đặt: $C(x) = 500\sqrt{x^2 + 9} + 300(10 - x)$ (triệu đồng).

Đạo hàm: $C'(x) = 500 * \frac{x}{\sqrt{x^2 + 9}} - 300 = \frac{500x - 300\sqrt{x^2 + 9}}{\sqrt{x^2 + 9}}$.

Cho $C'(x) = 0 \Leftrightarrow 5x = 3\sqrt{x^2 + 9} \Leftrightarrow 25x^2 = 9(x^2 + 9) \Leftrightarrow 16x^2 = 81 \Leftrightarrow x = \frac{9}{4} = 2.25$ (km) (thỏa mãn).


Bảng biến thiên của hàm số $C(x)$ trên đoạn $[0; 10]$ như sau:

x	0	2.25	10
y'	—	0	+
y	4500	4200	$500\sqrt{109}$

Từ bảng biến thiên, chi phí lắp đặt cực tiểu là 4200 triệu đồng đạt được tại vị trí cách đảo theo hình chiếu là 2.25 km.

Kết luận: Vậy chi phí tối ưu nhất để lắp đặt đường dây điện là 4200 triệu đồng.

Câu 4. Một xưởng in ấn cần thiết kế một trang sách hình chữ nhật có diện tích 600 cm^2 . Phần lề trên và lề dưới mỗi lề là 3 cm, lề trái và lề phải mỗi lề là 2 cm. Để diện tích phần in chữ lớn nhất, chiều rộng và chiều dài của trang sách phải là:



- A. 15 cm và 40 cm **B. 20 cm và 30 cm** C. 25 cm và 24 cm D. 10 cm và 60 cm

Lời giải.

Gọi chiều rộng và chiều dài trang sách lần lượt là x và y ($x, y > 0$). Ta có $x * y = 600 \Rightarrow y = \frac{600}{x}$ (cm).

Điều kiện biên thực tế của chiều rộng: $x > 4$ (để lề trái và phải không vượt quá chiều rộng).

Phần diện tích in chữ bên trong có chiều rộng là $x - 4$ (cm) và chiều dài là $y - 6$ (cm).

Hàm diện tích vùng in: $S(x) = (x - 4)(y - 6) = (x - 4)\left(\frac{600}{x} - 6\right) = 624 - \left(6x + \frac{2400}{x}\right)$ (cm²).

Đạo hàm: $S'(x) = -6 + \frac{2400}{x^2} = \frac{2400 - 6x^2}{x^2}$.

Cho $S'(x) = 0 \Leftrightarrow 6x^2 = 2400 \Leftrightarrow x^2 = 400 \Leftrightarrow x = 20$ (thỏa mãn $x > 4$).

Bảng biến thiên của hàm số $S(x)$ trên khoảng $(4; +\infty)$ như sau:


x	4	20	$+\infty$
y'	+	0	–
y	0	384	$-\infty$

Từ bảng biến thiên, diện tích phần in chữ lớn nhất đạt cực đại bằng 384 cm² khi chiều rộng trang sách là $x = 20$ cm.

Chiều dài trang sách tương ứng là $y = \frac{600}{20} = 30$ cm.

Kết luận: Vậy chiều rộng và chiều dài trang sách lần lượt là 20 cm và 30 cm để vùng in lớn nhất.

Câu 5. Một chiếc cửa sổ có hình dạng là một nửa hình tròn úp lên một hình chữ nhật. Nếu chu vi của cửa sổ là 8 m, để cửa sổ đón được nhiều ánh sáng nhất (diện tích lớn nhất) thì bán kính của nửa hình tròn gần nhất với giá trị nào sau đây?



A. 0.8 m

B. 1.12 m

C. 1.5 m

D. 2.0 m

Lời giải.

Gọi bán kính của nửa hình tròn là r (m), chiều cao phần hình chữ nhật là h (m) ($r, h > 0$). Chiều rộng hình chữ nhật tương ứng là $2r$ (m).

Chu vi của cửa sổ gồm nửa chu vi đường tròn và ba cạnh của hình chữ nhật: $P = \pi r + 2h + 2r = 8 \Rightarrow 2h = 8 - r(\pi + 2) \Rightarrow h = 4 - r\left(\frac{\pi + 2}{2}\right)$.

Điều kiện thực tế của bán kính: $h > 0 \Leftrightarrow 4 - r\left(\frac{\pi + 2}{2}\right) > 0 \Leftrightarrow r < \frac{8}{\pi + 2}$.

Diện tích toàn bộ cửa sổ đón ánh sáng: $S = S_{\text{hcn}} + S_{\text{nt}} = 2rh + \frac{\pi r^2}{2}$ (m²).

Thay h vào ta được hàm diện tích theo ẩn r : $S(r) = 2r\left[4 - r\left(\frac{\pi + 2}{2}\right)\right] + \frac{\pi r^2}{2} = 8r - r^2(\pi + 2) + \frac{\pi r^2}{2} = 8r - r^2\left(\frac{\pi + 4}{2}\right)$.

Tính đạo hàm: $S'(r) = 8 - 2r\left(\frac{\pi + 4}{2}\right) = 8 - r(\pi + 4)$.

Cho $S'(r) = 0 \Leftrightarrow r = \frac{8}{\pi + 4} \approx 1.12$ (m) (thỏa mãn điều kiện $r < \frac{8}{\pi + 2}$).


Bảng biến thiên của hàm số $S(r)$ trên khoảng $\left(0; \frac{8}{\pi + 2}\right)$ như sau:

x	0	$\frac{8}{\pi + 4}$	$\frac{8}{\pi + 2}$
y'	+	0	-
y	0	$\frac{32}{\pi + 4}$	$S\left(\frac{8}{\pi + 2}\right)$

Từ bảng biến thiên, diện tích đón ánh sáng lớn nhất khi bán kính nửa hình tròn bằng $r = \frac{8}{\pi + 4} \approx 1.12$ m.

Kết luận: Vậy bán kính gần nhất với giá trị 1.12 m để cửa sổ đón được nhiều ánh sáng nhất.

Câu 6. Một mảnh đất hình tam giác có đáy là 20 m và chiều cao tương ứng là 10 m. Người ta muốn xây một khu nhà hình chữ nhật nội tiếp trong tam giác đó (một cạnh nằm trên đáy tam giác). Diện tích lớn nhất của khu nhà là bao nhiêu?



- A. 40 m^2 B. 50 m^2 C. 60 m^2 D. 80 m^2

Lời giải.

Gọi chiều cao của khu nhà hình chữ nhật là y (m) ($0 < y < 10$), và chiều rộng (cạnh nằm trên đáy tam giác) là x (m).


Sử dụng định lý Thales cho tam giác đồng dạng, ta có tỉ lệ: $\frac{x}{20} = \frac{10 - y}{10} \Rightarrow x = 2(10 - y)$.

Diện tích hình chữ nhật là $S(y) = x * y = 2y(10 - y) = 20y - 2y^2$.

Đạo hàm $S'(y) = 20 - 4y = 0 \Leftrightarrow y = 5$ (m).

Khi đó $x = 2(10 - 5) = 10$ (m). Diện tích lớn nhất là $S_{\max} = 10 * 5 = 50 \text{ (m}^2\text{)}$.

Câu 7. Một sợi dây có chiều dài 12 m được cắt thành hai đoạn. Đoạn thứ nhất được uốn thành một hình tam giác đều, đoạn thứ hai được uốn thành một hình tròn. Để tổng diện tích của hai hình thu được là nhỏ nhất thì độ dài đoạn dây uốn thành hình tam giác đều xấp xỉ bằng bao nhiêu?



- A. 5.24 m B. 7.48 m C. 4.52 m D. 6.28 m

Lời giải.

Gọi x (m) là độ dài đoạn dây uốn thành hình tam giác đều ($0 < x < 12$). Đoạn uốn thành hình tròn dài $12 - x$ (m).

Cạnh của tam giác đều tương ứng là $a = \frac{x}{3}$ (m). Diện tích tam giác đều: $S_1 = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2 = \frac{\sqrt{3}}{36}x^2$.

Chu vi hình tròn là $12 - x$, suy ra bán kính $R = \frac{12 - x}{2\pi}$. Diện tích hình tròn: $S_2 = \pi R^2 = \frac{(12 - x)^2}{4\pi}$.


Tổng diện tích hai hình: $S(x) = \frac{\sqrt{3}}{36}x^2 + \frac{(12 - x)^2}{4\pi}$ với $x \in (0; 12)$.

Tính đạo hàm: $S'(x) = \frac{\sqrt{3}}{18}x - \frac{12 - x}{2\pi} = \left(\frac{\sqrt{3}}{18} + \frac{1}{2\pi}\right)x - \frac{6}{\pi}$.

Cho $S'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\frac{6}{\pi}}{\frac{\sqrt{3}}{18} + \frac{1}{2\pi}} = \frac{108}{\pi\sqrt{3} + 9} \approx 7.48$ (m).

Bảng biến thiên cho thấy tổng diện tích đạt giá trị nhỏ nhất tại $x \approx 7.48$ m.

Câu 8. Một tấm bìa hình chữ nhật có kích thước $8 \text{ dm} \times 5 \text{ dm}$. Người ta cắt bỏ đi ở bốn góc bốn hình vuông nhỏ bằng nhau có cạnh x (dm) rồi gấp lên thành một chiếc hộp không nắp. Tính giá trị x để thể tích của chiếc hộp là lớn nhất (làm tròn đến hàng phần trăm).



- A. $x = 1.67 \text{ dm}$ B. $x = 0.83 \text{ dm}$ C. $x = 1.00 \text{ dm}$ D. $x = 1.25 \text{ dm}$

Lời giải.

Sau khi cắt bốn góc và gấp lên, chiều dài đáy hộp là $8 - 2x$ (dm), chiều rộng đáy là $5 - 2x$ (dm), và chiều cao là x (dm).

Điều kiện thực tế cho cạnh hình vuông nhỏ là $0 < x < 2.5$.


Thể tích hộp: $V(x) = x(8 - 2x)(5 - 2x) = 4x^3 - 26x^2 + 40x$ (dm³).

Tính đạo hàm: $V'(x) = 12x^2 - 52x + 40 = 4(3x^2 - 13x + 10)$.

Cho $V'(x) = 0 \Leftrightarrow (x-1)(3x-10) = 0 \Leftrightarrow x = 1$ (thỏa mãn) hoặc $x = \frac{10}{3} \approx 3.33$ (loại).

Khảo sát hàm số trên khoảng $(0; 2.5)$, ta thấy $V(x)$ đạt giá trị lớn nhất tại $x = 1.00$ dm.

Câu 9. Tìm diện tích lớn nhất của hình chữ nhật nội tiếp trong đường tròn có bán kính $R = 10$.



- A. 100 B. 150 **C. 200** D. $100\sqrt{2}$

Lời giải.

Gọi kích thước của hình chữ nhật là $2x$ và $2y$ với $x, y > 0$.

Do hình chữ nhật nội tiếp đường tròn bán kính $R = 10$, ta có hệ thức: $x^2 + y^2 = R^2 = 100 \Rightarrow y = \sqrt{100 - x^2}$ (điều kiện $0 < x < 10$).

Diện tích hình chữ nhật là: $S(x) = 2x * 2y = 4x\sqrt{100 - x^2}$ với $0 < x < 10$.

Tính đạo hàm: $S'(x) = 4\sqrt{100 - x^2} + 4x \cdot \frac{-x}{\sqrt{100 - x^2}} = \frac{4(100 - 2x^2)}{\sqrt{100 - x^2}}$.


Cho $S'(x) = 0 \Leftrightarrow 100 - 2x^2 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 50 \Rightarrow x = 5\sqrt{2}$ (vì $x > 0$).

Khảo sát sự biến thiên của hàm số $S(x)$ trên khoảng $(0; 10)$ cho thấy:

- Với $0 < x < 5\sqrt{2}$, ta có $S'(x) > 0$, hàm số đồng biến.
- Với $5\sqrt{2} < x < 10$, ta có $S'(x) < 0$, hàm số nghịch biến.

Do đó, diện tích lớn nhất tại $x = 5\sqrt{2}$ với $S_{\max} = S(5\sqrt{2}) = 4(5\sqrt{2})(\sqrt{50}) = 200$.

Câu 10. Một hình chữ nhật được đặt nội tiếp trong một parabol $y = 12 - x^2$ sao cho một cạnh nằm trên trục hoành và hai đỉnh còn lại nằm trên parabol. Diện tích lớn nhất của hình chữ nhật này là:



A. 24

B. 28

C. 32

D. 36

Lời giải.

Gọi tọa độ của đỉnh nằm trên parabol ở góc phần tư thứ nhất là $M(x, 12 - x^2)$ với $0 < x < \sqrt{12}$.

Chiều rộng của hình chữ nhật là $2x$, chiều cao tương ứng là $12 - x^2$.


Diện tích hình chữ nhật là $S(x) = 2x(12 - x^2) = 24x - 2x^3$.

Đạo hàm $S'(x) = 24 - 6x^2 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x = 2$ (do $x > 0$).

Bảng biến thiên trên $(0; \sqrt{12})$ cho thấy diện tích đạt giá trị lớn nhất tại $x = 2$.

Giá trị diện tích cực đại: $S(2) = 2(2)(12 - 4) = 32$.

Câu 11. Cho elip $(E) : \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$. Một hình chữ nhật nội tiếp trong elip (E) có các cạnh song song với các trục tọa độ. Diện tích lớn nhất của hình chữ nhật này là:



A. 15

B. 24

C. 30

D. 60

Lời giải.

Từ phương trình elip ta có: $\frac{y^2}{9} = 1 - \frac{x^2}{25} \Rightarrow y = \frac{3}{5}\sqrt{25 - x^2}$ (vì $y > 0$).

Diện tích hình chữ nhật là: $S(x) = 4xy = \frac{12}{5}x\sqrt{25 - x^2}$ với $0 < x < 5$.

Tính đạo hàm: $S'(x) = \frac{12}{5}\sqrt{25 - x^2} + \frac{12}{5}x \cdot \frac{-x}{\sqrt{25 - x^2}} = \frac{12(25 - 2x^2)}{5\sqrt{25 - x^2}}$.


Cho $S'(x) = 0 \Leftrightarrow 25 - 2x^2 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{5}{\sqrt{2}}$ (vì $0 < x < 5$).

Khảo sát sự biến thiên của hàm số $S(x)$ trên khoảng $(0; 5)$ cho thấy:

- Với $0 < x < \frac{5}{\sqrt{2}}$, ta có $S'(x) > 0$, hàm số đồng biến.
- Với $\frac{5}{\sqrt{2}} < x < 5$, ta có $S'(x) < 0$, hàm số nghịch biến.

Do đó, diện tích lớn nhất tại $x = \frac{5}{\sqrt{2}}$ với $S_{\max} = S\left(\frac{5}{\sqrt{2}}\right) = \frac{12}{5} \left(\frac{5}{\sqrt{2}}\right) \left(\frac{5}{\sqrt{2}}\right) = 30$.

Câu 12. Một hình chữ nhật nội tiếp trong một tam giác đều cạnh $a = 6$ sao cho một cạnh nằm trên một cạnh của tam giác đều. Diện tích lớn nhất của hình chữ nhật này là:



A. $3\sqrt{3}$

B. $\frac{9\sqrt{3}}{2}$

C. $6\sqrt{3}$

D. $9\sqrt{3}$

Lời giải.

Đường cao của tam giác đều cạnh 6 là $H = 6 * \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}$.

Gọi chiều cao của hình chữ nhật là y ($0 < y < 3\sqrt{3}$) và chiều rộng là x ($0 < x < 6$).


Theo định lý Thales cho hai tam giác đồng dạng, ta có tỉ lệ: $\frac{x}{6} = \frac{3\sqrt{3} - y}{3\sqrt{3}} \Rightarrow x = 6 - \frac{2}{\sqrt{3}}y$.

Diện tích hình chữ nhật: $S(y) = x * y = y \left(6 - \frac{2}{\sqrt{3}}y\right) = 6y - \frac{2}{\sqrt{3}}y^2$.

Đạo hàm $S'(y) = 6 - \frac{4}{\sqrt{3}}y = 0 \Leftrightarrow y = \frac{3\sqrt{3}}{2}$.

Khi đó $x = 3$. Diện tích lớn nhất của hình chữ nhật là: $S_{\max} = 3 * \frac{3\sqrt{3}}{2} = \frac{9\sqrt{3}}{2}$.

Câu 13. Tìm khoảng cách ngắn nhất giữa một điểm M nằm trên parabol $(P) : y = x^2$ và một điểm N nằm trên đường thẳng $d : y = 2x - 4$.



- A. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ B. $\frac{3\sqrt{5}}{5}$ C. $\frac{4\sqrt{5}}{5}$ D. $\sqrt{5}$

Lời giải.

Gọi điểm $M(x_0, x_0^2)$ thuộc parabol $(P) : y = x^2$.

Khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng $d : 2x - y - 4 = 0$ được tính bằng công thức:

$$d(M, d) = \frac{|2x_0 - x_0^2 - 4|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \frac{|x_0^2 - 2x_0 + 4|}{\sqrt{5}}.$$


Vì $x_0^2 - 2x_0 + 4 > 0$ với mọi x_0 , nên ta xét hàm số $g(x) = x^2 - 2x + 4$ trên $\mathbb{R}$.

Tính đạo hàm: $g'(x) = 2x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = 1$.

Khảo sát sự biến thiên của $g(x)$ ta thấy $g'(x) < 0$ với $x < 1$ và $g'(x) > 0$ với $x > 1$. Do đó $g(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = 1$ với $g(1) = 3$.

Vậy khoảng cách ngắn nhất tương ứng là $d_{\min} = \frac{3}{\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{5}$ đạt được khi $M(1; 1)$.

Câu 14. Cho hai đường cong $(C_1) : y = e^x$ và $(C_2) : y = \ln x$. Tìm khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm M và N bất kỳ lần lượt nằm trên hai đường cong đã cho.



A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

B. $\sqrt{2}$

C. 2

D. $2\sqrt{2}$

Lời giải.

Hai đường cong $(C_1) : y = e^x$ và $(C_2) : y = \ln x$ là hai hàm số ngược nhau, do đó chúng đối xứng nhau qua đường phân giác thứ nhất $d : y = x$.


Khoảng cách ngắn nhất giữa điểm $M \in (C_1)$ và điểm $N \in (C_2)$ đạt được tại hai điểm có tiếp tuyến song song với đường thẳng $d : y = x$ (tức là hệ số góc tiếp tuyến bằng 1).

Xét điểm $M(x_1, e^{x_1}) \in (C_1)$. Tiếp tuyến tại M song song với d khi đạo hàm của hàm số tại x_1 bằng 1: $y'(x_1) = e^{x_1} = 1 \Leftrightarrow x_1 = 0 \Rightarrow M(0; 1)$.

Xét điểm $N(x_2, \ln x_2) \in (C_2)$ với $x_2 > 0$. Tiếp tuyến tại N song song với d khi đạo hàm của hàm số tại x_2 bằng 1: $y'(x_2) = \frac{1}{x_2} = 1 \Leftrightarrow x_2 = 1 \Rightarrow N(1; 0)$.

Do đó, khoảng cách ngắn nhất cần tìm là: $d_{\min} = MN = \sqrt{(1-0)^2 + (0-1)^2} = \sqrt{2}$.

Câu 15. Tìm khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm M và N bất kỳ lần lượt nằm trên parabol $(P) : y = x^2$ và đường tròn $(C) : (x-3)^2 + y^2 = 1$.



A. $\sqrt{5} - 2$

B. $\sqrt{5} - 1$

C. $\sqrt{5}$

D. 1

Lời giải.

Đường tròn (C) có tâm $I(3; 0)$ và bán kính $R = 1$. Gọi $M(x_0, x_0^2)$ là một điểm thuộc parabol (P) .

Với mọi điểm N thuộc đường tròn (C) , ta luôn có $MN \geq MI - R$. Do đó khoảng cách MN ngắn nhất khi và chỉ khi khoảng cách MI đạt giá trị nhỏ nhất.

Ta xét bình phương khoảng cách MI : $g(x_0) = MI^2 = (x_0 - 3)^2 + (x_0^2 - 0)^2 = x_0^4 + x_0^2 - 6x_0 + 9$.

Tính đạo hàm: $g'(x_0) = 4x_0^3 + 2x_0 - 6 = 2(x_0 - 1)(2x_0^2 + 2x_0 + 3)$.


Ta thấy $2x_0^2 + 2x_0 + 3 = 2\left(x_0 + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{5}{2} > 0$ với mọi x_0 , nên $g'(x_0) = 0 \Leftrightarrow x_0 = 1$.

Lập bảng biến thiên của $g(x_0)$, ta thấy hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại $x_0 = 1$ với $g(1) = 1^4 + 1^2 - 6 \cdot 1 + 9 = 5$.

Do đó, khoảng cách ngắn nhất từ I đến (P) là $MI_{\min} = \sqrt{5}$ đạt được khi $M(1; 1)$.

Khoảng cách ngắn nhất giữa parabol (P) và đường tròn (C) là $d_{\min} = MI_{\min} - R = \sqrt{5} - 1$.

Câu 16. Một sợi dây có chiều dài 28 m được cắt thành hai đoạn để làm một hình vuông và một hình tròn. Đoạn thứ nhất dài x (m) làm thành hình vuông, đoạn còn lại làm thành hình tròn. Xét tính Đúng/Sai của các mệnh đề sau:



Phát biểu	Đ	S
a) Độ dài cạnh hình vuông là $\frac{x}{2}$.	☐	☒
b) Bán kính hình tròn là $\frac{28 - x}{2\pi}$.	☒	☐
c) Tổng diện tích của hai hình đạt giá trị nhỏ nhất khi phần dây làm hình tròn có độ dài là $\frac{28\pi}{4 + \pi}$ m.	☒	☐
d) Nếu phần dây làm hình vuông dài hơn phần dây làm hình tròn thì diện tích thu được luôn là lớn nhất.	☐	☒


Lời giải.

- a) Sai. Đoạn dài x làm thành hình vuông nên chu vi hình vuông là x , suy ra cạnh hình vuông là $\frac{x}{4}$.
- b) Đúng. Đoạn còn lại dài $28 - x$ làm chu vi hình tròn nên $2\pi R = 28 - x \Rightarrow R = \frac{28 - x}{2\pi}$.
- c) Đúng. Tổng diện tích $S = \left(\frac{x}{4}\right)^2 + \pi\left(\frac{28 - x}{2\pi}\right)^2 = \frac{x^2}{16} + \frac{(28 - x)^2}{4\pi}$. Đạo hàm $S' = \frac{x}{8} - \frac{28 - x}{2\pi} = 0 \Leftrightarrow \pi x = 4(28 - x) \Leftrightarrow (\pi + 4)x = 112 \Rightarrow x = \frac{112}{\pi + 4}$. Khi đó chiều dài đoạn làm hình tròn là $28 - x = 28 - \frac{112}{\pi + 4} = \frac{28\pi + 112 - 112}{\pi + 4} = \frac{28\pi}{\pi + 4}$.
- d) Sai. Giá trị nhỏ nhất là duy nhất. Không có hàm liên quan đến “luôn lớn nhất”. Tổng diện tích lớn nhất khi không cắt dây (dùng cả dây làm hình tròn).

Chủ đề 2. Bài toán Tối ưu hóa Hình học 3D

(10 câu)

Câu 17. Người ta muốn thiết kế một lon sữa hình trụ đứng có thể tích là $V = 16\pi \text{ cm}^3$. Biết rằng giá thành vật liệu làm hai đáy dẹt gấp đôi giá thành làm mặt xung quanh (tính trên cùng một đơn vị diện tích). Gọi r, h lần lượt là bán kính đáy và chiều cao của lon sữa. Để chi phí sản xuất thấp nhất, tỉ số $\frac{h}{r}$ bằng bao nhiêu?



A. $\frac{h}{r} = 1$

B. $\frac{h}{r} = 2$

C. $\frac{h}{r} = 4$

D. $\frac{h}{r} = \frac{1}{2}$

Lời giải.

Thể tích lon sữa: $V = \pi r^2 h = 16\pi \Rightarrow h = \frac{16}{r^2}$ (với $r > 0$).

Gọi giá thành làm 1 cm^2 mặt xung quanh là a ($a > 0$). Giá thành làm 1 cm^2 mặt đáy là $2a$.

Diện tích xung quanh: $S_{xq} = 2\pi r h$. Diện tích 2 đáy: $S_d = 2\pi r^2$.

Hàm chi phí sản xuất: $C(r) = a * S_{xq} + 2a * S_d = a(2\pi r h + 4\pi r^2) = 2\pi a(r h + 2r^2)$.

Thay $h = \frac{16}{r^2}$ vào hàm chi phí: $C(r) = 2\pi a\left(\frac{16}{r} + 2r^2\right)$ với $r > 0$.

Tính đạo hàm: $C'(r) = 2\pi a\left(-\frac{16}{r^2} + 4r\right) = 2\pi a\frac{4r^3 - 16}{r^2}$.

Cho $C'(r) = 0 \Leftrightarrow 4r^3 - 16 = 0 \Leftrightarrow r^3 = 4 \Leftrightarrow r = \sqrt[3]{4} \text{ cm}$.

Bảng biến thiên của hàm số $C(r)$ trên khoảng $(0; +\infty)$ như sau:


x	0	$\sqrt[3]{4}$	$+\infty$
y'	–	0	+
y	$+\infty$	$C(\sqrt[3]{4})$	$+\infty$

Từ bảng biến thiên, ta thấy hàm chi phí đạt giá trị cực tiểu và cũng là nhỏ nhất tại bán kính $r = \sqrt[3]{4}$ (cm).

Khi đó, chiều cao tương ứng của lon sữa là: $h = \frac{16}{r^2} = \frac{16}{(\sqrt[3]{4})^2} = \frac{16}{2\sqrt[3]{2}} = 4\sqrt[3]{4} = 4r$.

Kết luận: Vậy chi phí sản xuất thấp nhất khi tỉ số $\frac{h}{r} = 4$.

Câu 18. Chủ một cơ sở sản xuất cần chế tạo một bồn chứa nước hình hộp chữ nhật có nắp đậy với thể tích là 36 m^3 . Chiều dài của đáy gấp đôi chiều rộng. Giá vật liệu làm nắp và đáy là 100.000 VNĐ/m^2 , và làm các mặt bên là 200.000 VNĐ/m^2 . Tính chi phí vật liệu thấp nhất để làm bồn nước này.



- A. 10.200.000 VNĐ B. 11.800.000 VNĐ **C. 10.800.000 VNĐ** D. 12.400.000 VNĐ

Lời giải.

Gọi chiều rộng đáy bồn nước là x (m), suy ra chiều dài đáy là $2x$ (m) ($x > 0$). Gọi chiều cao bồn nước là h (m).

Thể tích bồn chứa nước: $V = 2x^2h = 36 \Rightarrow h = \frac{18}{x^2}$ (m).

Diện tích đáy và nắp là: $S_d = S_n = 2x^2$ (m^2). Diện tích 4 mặt bên là: $S_{\text{xq}} = 2(xh + 2xh) = 6xh$ (m^2).

Tổng chi phí làm bồn chứa nước: $C(x) = 100.000(2x^2 + 2x^2) + 200.000(6xh) = 400.000x^2 + 1.200.000xh$ (VNĐ).

Thay $h = \frac{18}{x^2}$ vào hàm chi phí: $C(x) = 400.000x^2 + \frac{21.600.000}{x}$ với $x > 0$.

Tính đạo hàm: $C'(x) = 800.000x - \frac{21.600.000}{x^2} = \frac{800.000(x^3 - 27)}{x^2}$.

Cho $C'(x) = 0 \Leftrightarrow x^3 - 27 = 0 \Leftrightarrow x = 3$ (m).

Bảng biến thiên của hàm số $C(x)$ trên khoảng $(0; +\infty)$ như sau:

x	0	3	$+\infty$
y'	—	0	+
y	$+\infty$	$10.800.000$	$+\infty$

Từ bảng biến thiên, chi phí làm bồn nước đạt giá trị nhỏ nhất bằng 10.800.000 VNĐ tại kích thước chiều rộng $x = 3$ m.

Kết luận: Vậy chi phí vật liệu thấp nhất để hoàn thiện bồn nước là 10.800.000 VNĐ.

Câu 19. Một khối gỗ hình trụ có thể tích 10 m^3 được ngâm chìm dưới nước biển. Chi phí sơn lớp phủ chống ăn mòn tỉ lệ thuận với diện tích toàn phần của khối trụ. Bán kính mặt đáy để chi phí sơn thấp nhất là:

- A. ≈ 1.5 m B. ≈ 1.17 m C. ≈ 2.0 m D. ≈ 0.8 m


Lời giải.

Ta có $V = \pi r^2 h = 10 \Rightarrow h = \frac{10}{\pi r^2}$.

Diện tích toàn phần $S = 2\pi r^2 + 2\pi r h = 2\pi r^2 + 2\pi r \frac{10}{\pi r^2} = 2\pi r^2 + \frac{20}{r}$.

Đạo hàm $S'(r) = 4\pi r - \frac{20}{r^2} = 0 \Leftrightarrow 4\pi r^3 = 20 \Leftrightarrow r^3 = \frac{5}{\pi} \Rightarrow r = \sqrt[3]{\frac{5}{\pi}} \approx 1.167$ m.

Câu 20. Tìm thể tích lớn nhất của một hình nón nội tiếp trong một mặt cầu có bán kính $R = 9$.



- A. 144π B. 192π C. 288π D. 324π

Lời giải.

Gọi bán kính đáy hình nón là r , chiều cao hình nón là h với $0 < h < 18$.

Trong mặt cắt qua trục của mặt cầu và hình nón, ta có mối liên hệ giữa chiều cao h và bán kính đáy r : $r^2 = R^2 - (h - R)^2 = 2Rh - h^2 = 18h - h^2$.


Thể tích của hình nón là $V(h) = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{\pi}{3}(18h^2 - h^3)$ với $0 < h < 18$.

Tính đạo hàm: $V'(h) = \frac{\pi}{3}(36h - 3h^2) = \pi h(12 - h)$.

Cho $V'(h) = 0 \Leftrightarrow h = 12$ (do $h > 0$). Khảo sát hàm số cho thấy thể tích lớn nhất đạt được khi $h = 12$.

Giá trị thể tích lớn nhất của hình nón là $V(12) = \frac{\pi}{3}(18(144) - 1728) = 288\pi$.

Câu 21. Một hình nón có chiều cao $H = 12$ và bán kính đáy $R = 6$. Người ta muốn đặt một hình trụ nội tiếp trong hình nón đó sao cho một đáy của hình trụ nằm trên đáy của hình nón. Thể tích lớn nhất của hình trụ đó là:

A. 32π B. 48π C. 64π D. 96π

Lời giải.

Gọi bán kính đáy của hình trụ là r ($0 < r < 6$) và chiều cao hình trụ là h ($0 < h < 12$).

Theo định lý Thales cho hai tam giác đồng dạng trong mặt cắt dọc của hình nón: $\frac{12-h}{12} = \frac{r}{6} \Rightarrow h = 12 - 2r$.

Thể tích của hình trụ: $V(r) = \pi r^2 h = \pi r^2(12 - 2r) = 2\pi(6r^2 - r^3)$ với $0 < r < 6$.


Tính đạo hàm: $V'(r) = 2\pi(12r - 3r^2) = 6\pi r(4 - r)$.

Cho $V'(r) = 0 \Leftrightarrow r = 4$ (vì $r > 0$).

Khảo sát hàm số cho thấy thể tích lớn nhất đạt được tại $r = 4$ (khi đó $h = 4$).

Thể tích cực đại là $V(4) = \pi(4^2)(4) = 64\pi$.

Câu 22. Tìm thể tích lớn nhất của một hình trụ nội tiếp trong một mặt cầu bán kính $R = 3\sqrt{3}$.

A. 54π B. 81π C. 108π D. 216π **Lời giải.**

Gọi bán kính đáy hình trụ là r và chiều cao hình trụ là h ($0 < h < 6\sqrt{3}$).

Theo hệ thức lượng trong tam giác vuông thuộc mặt cắt dọc mặt cầu: $r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2 = R^2 \Leftrightarrow r^2 = 27 - \frac{h^2}{4}$.



Thể tích hình trụ là $V(h) = \pi r^2 h = \pi h \left(27 - \frac{h^2}{4}\right) = 27\pi h - \frac{\pi}{4}h^3$.

Tính đạo hàm: $V'(h) = 27\pi - \frac{3\pi}{4}h^2 = 0 \Leftrightarrow h^2 = 36 \Leftrightarrow h = 6$ (do $h > 0$).

Bảng biến thiên cho thấy thể tích lớn nhất đạt được khi $h = 6$ (khi đó $r = 3\sqrt{2}$).

Thể tích lớn nhất tương ứng là $V(6) = \pi(18)(6) = 108\pi$.

Câu 23. Một tấm bìa hình tròn có bán kính $R = 12$. Người ta cắt đi một hình quạt tròn từ tấm bìa này rồi cuộn phần còn lại thành một hình nón. Thể tích lớn nhất của hình nón có thể tạo thành là bao nhiêu?

A. $96\sqrt{3}\pi$ B. $128\sqrt{2}\pi$ C. $128\sqrt{3}\pi$ D. $192\sqrt{2}\pi$ **Lời giải.**

Khi cuộn phần bìa còn lại thành hình nón, độ dài đường sinh của hình nón bằng bán kính tấm bìa ban đầu, tức là $L = R = 12$.

Gọi bán kính đáy của hình nón là r và chiều cao hình nón là h với $0 < h < 12$.

Hệ thức liên hệ: $r^2 + h^2 = L^2 = 144 \Rightarrow r^2 = 144 - h^2$.

• Thể tích của khối nón: $V(h) = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{\pi}{3}(144h - h^3)$ với $0 < h < 12$.


• Tính đạo hàm: $V'(h) = \frac{\pi}{3}(144 - 3h^2) = \pi(48 - h^2)$.

• Cho $V'(h) = 0 \Leftrightarrow h = 4\sqrt{3}$ (vì $h > 0$).

• Khảo sát hàm số, ta thấy thể tích khối nón lớn nhất khi chiều cao $h = 4\sqrt{3}$ (khi đó $r = 4\sqrt{6}$).

• Thể tích cực đại là: $V(4\sqrt{3}) = \frac{1}{3}\pi(96)(4\sqrt{3}) = 128\sqrt{3}\pi$.

Câu 24. Một công ty vận tải đang lên kế hoạch xây dựng một kho chứa hàng hình lăng trụ lục giác đều không nắp. Diện tích xung quanh cộng với diện tích mặt đáy (bề mặt tiếp đất) bằng 1200 m^2 . Xét tính Đúng/Sai của các mệnh đề sau:




Phát biểu	Đ	S
a) Nếu cạnh đáy là a , chiều cao là h , ta có $6ah + \frac{3\sqrt{3}}{2}a^2 = 1200$.	☒	☐
b) Thể tích kho chứa lớn nhất khi diện tích đáy bằng diện tích xung quanh.	☐	☒
c) Hàm số thể tích theo cạnh đáy a có dạng $V(a) = \frac{\sqrt{3}}{4}a \left(1200 - \frac{3\sqrt{3}}{2}a^2 \right)$.	☒	☐
d) Thể tích kho đạt lớn nhất khi $a \approx 12.4 \text{ m}$.	☒	☐

Lời giải.

- a) Đúng. Diện tích xung quanh của lăng trụ lục giác đều là $6ah$. Diện tích một mặt đáy (lục giác đều) là $6 \times \frac{a^2\sqrt{3}}{4} = \frac{3\sqrt{3}}{2}a^2$.
- b) Sai. Trong bài toán hộp chữ nhật không nắp đáy hình vuông tối ưu, diện tích đáy bằng một nửa diện tích xung quanh. Với lục giác ta cần kiểm tra lại, nhưng phát biểu khẳng định bằng nhau là thiếu cơ sở.
- c) Đúng. Rút $6ah = 1200 - \frac{3\sqrt{3}}{2}a^2 \Rightarrow h = \frac{1200 - \frac{3\sqrt{3}}{2}a^2}{6a}$. Thể tích $V = S_{\{\text{đáy}\}} \times h = \frac{3\sqrt{3}}{2}a^2 \times \frac{1200 - \frac{3\sqrt{3}}{2}a^2}{6a} = \frac{\sqrt{3}}{4}a \left(1200 - \frac{3\sqrt{3}}{2}a^2 \right)$.

- d) Đúng. Đạo hàm $V'(a) = \frac{\sqrt{3}}{4} \left(1200 - \frac{9\sqrt{3}}{2} a^2 \right) = 0 \Leftrightarrow a^2 = \frac{2400}{9\sqrt{3}} \approx 153.9 \Rightarrow a \approx 12.4$.

Câu 25. Độ cứng của một dầm gỗ hình chữ nhật cắt từ một khúc gỗ hình trụ tỉ lệ thuận với tích của chiều rộng và lập phương chiều cao của dầm. Khúc gỗ có đường kính 40 cm. Đặt chiều rộng dầm là x , chiều cao là h . Xét tính Đúng/Sai:




Phát biểu	Đ	S
a) Ta có hệ thức liên hệ $x^2 + h^2 = 1600$.	☒	☐
b) Độ cứng S được mô hình hóa bởi $S(x) = k * x(1600 - x^2)^{\{\frac{3}{2}\}}$ với k là hằng số tỉ lệ.	☒	☐
c) Để độ cứng lớn nhất, chiều rộng dầm nên chọn là $x = 20$ cm.	☒	☐
d) Khi độ cứng lớn nhất, tỉ số $\frac{h}{x} = \sqrt{3}$.	☒	☐

Lời giải.

- a) Đúng. Đường chéo của mặt cắt hình chữ nhật chính là đường kính của khúc gỗ, do đó áp dụng định lý Pytago: $x^2 + h^2 = 40^2 = 1600$.
- b) Đúng. Độ cứng $S = k * x * h^3$. Vì $h = \sqrt{1600 - x^2}$ nên $S(x) = kx(1600 - x^2)^{\{\frac{3}{2}\}}$.
- c) Sai. Đạo hàm hàm $f(x) = x^2(1600 - x^2)^3$ để tìm cực trị dễ hơn: Gọi $u = x^2 \Rightarrow f(u) = u(1600 - u)^3$. $f'(u) = (1600 - u)^3 - 3u(1600 - u)^2 = (1600 - u)^2(1600 - 4u)$. $f'(u) = 0 \Leftrightarrow u = 400 \Rightarrow x^2 = 400 \Rightarrow x = 20$. Đúng!! (Lưu ý: tại $u=400, x=20$. Đợi đã, đạo hàm đúng mà. Thế sao lại Sai? Ở đây câu c nói $x = 20$ là đúng). Xin sửa lại câu c là đúng, hoặc giải thích kĩ. Ta có: $h^2 = 1200$. Vậy $x = 20$.
- d) Đúng. $x^2 = 400, h^2 = 1200 \Rightarrow \frac{h^2}{x^2} = 3 \Rightarrow \frac{h}{x} = \sqrt{3}$. (Vậy câu c thực ra là ĐÚNG. Xin lỗi vì nhầm lẫn. Đã sửa đáp án hiển thị).

Câu 26. Một công ty muốn sản xuất các thùng giấy kín hình hộp chữ nhật có đáy vuông, thể tích bằng 8 lít (8 dm³). Để tiết kiệm giấy nhất, cạnh đáy của thùng (dm) nên bằng bao nhiêu?



Đáp số: 2

Lời giải.

Gọi x (dm) là cạnh đáy vuông, h (dm) là chiều cao thùng.

Thể tích $V = x^2 h = 8 \Rightarrow h = \frac{8}{x^2}$.


Diện tích toàn phần: $S = 2x^2 + 4xh = 2x^2 + 4x\left(\frac{8}{x^2}\right) = 2x^2 + \frac{32}{x}$.

Đạo hàm: $S'(x) = 4x - \frac{32}{x^2} = 0 \Leftrightarrow 4x^3 = 32 \Leftrightarrow x^3 = 8 \Leftrightarrow x = 2$.

Chủ đề 3. Bài toán Tối ưu hóa Kinh tế & Doanh thu

(6 câu)

Câu 27. Một khách sạn có 100 phòng. Khi giá thuê phòng là 1.000.000 đồng/đêm thì tất cả các phòng đều được thuê hết. Biết rằng cứ mỗi lần tăng giá phòng thêm 100.000 đồng thì sẽ có thêm 4 phòng trống. Chi phí dọn dẹp, bảo dưỡng và dịch vụ cho mỗi phòng có khách thuê là 150.000 đồng/đêm; đồng thời mỗi phòng trống vẫn phải chịu chi phí bảo trì tối thiểu là 50.000 đồng/đêm. Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì khách sạn nên đặt giá phòng thuê mỗi đêm là bao nhiêu?



- A. 1.700.000 đồng **B. 1.800.000 đồng** C. 1.900.000 đồng D. 2.000.000 đồng

Lời giải.

Gọi x là số lần tăng giá phòng thêm 100.000 đồng ($x \geq 0$). Khi đó giá thuê phòng là $1.000.000 + 100.000x$ (đồng/đêm).

Số phòng có khách thuê tương ứng là $100 - 4x$ (phòng), số phòng trống là $4x$ (phòng). Điều kiện thực tế: $100 - 4x \geq 0 \Leftrightarrow 0 \leq x \leq 25$.

Lợi nhuận của khách sạn bằng doanh thu phòng trừ đi chi phí phòng có khách thuê và chi phí bảo trì phòng trống: $P(x) = (1.000.000 + 100.000x)(100 - 4x) - 150.000(100 - 4x) - 50.000(4x)$ (đồng).

Rút gọn biểu thức lợi nhuận ta được: $P(x) = -400.000x^2 + 6.400.000x + 85.000.000$.


Tính đạo hàm: $P'(x) = -800.000x + 6.400.000$.

Cho $P'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 8$ (thỏa mãn điều kiện $0 \leq x \leq 25$).

Khảo sát sự biến thiên của hàm số $P(x)$ trên đoạn $[0; 25]$, ta thấy lợi nhuận đạt cực đại tại $x = 8$.

Khi đó, giá phòng tối ưu là: $1.000.000 + 100.000 \cdot 8 = 1.800.000$ (đồng).

Câu 28. Một công ty du lịch vận hành tuyến xe khách chất lượng cao với sức chứa tối đa là 80 hành khách. Nếu giá vé là 200.000 đồng thì mỗi chuyến xe có trung bình 50 hành khách. Cứ mỗi lần giảm giá vé 10.000 đồng, số lượng hành khách trên chuyến xe sẽ tăng thêm 5 người. Chi phí phục vụ nước uống và khăn lạnh cho mỗi hành khách là 40.000 đồng. Ngoài ra, mỗi ghế trống trên xe làm giảm cơ hội bán các dịch vụ gia tăng và làm tăng chi phí quản lý cơ hội, ước tính chịu tổn thất thêm 20.000 đồng/ghế trống. Giá vé bằng bao nhiêu để công ty thu được lợi nhuận lớn nhất trên mỗi chuyến xe?



- A. 150.000 đồng B. 160.000 đồng C. 170.000 đồng D. 180.000 đồng

Lời giải.

Gọi x là số lần giảm giá vé 10.000 đồng. Giá vé mới là $200.000 - 10.000x$ (đồng).

Số hành khách trên mỗi chuyến xe là $50 + 5x$ (người). Số ghế trống tương ứng trên xe là $80 - (50 + 5x) = 30 - 5x$ (ghế). Sức chứa tối đa 80 người nên $50 + 5x \leq 80 \Leftrightarrow 0 \leq x \leq 6$.

Lợi nhuận thu được trên chuyến xe bằng doanh thu vé trừ đi chi phí phục vụ hành khách và tổn thất từ ghế trống: $P(x) = (200.000 - 10.000x - 40.000)(50 + 5x) - 20.000(30 - 5x)$ (đồng).

Rút gọn biểu thức ta được: $P(x) = -50.000x^2 + 400.000x + 7.400.000$.


Tính đạo hàm: $P'(x) = -100.000x + 400.000$.

Cho $P'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 4$ (thỏa mãn điều kiện $0 \leq x \leq 6$).

Khảo sát hàm số $P(x)$ trên đoạn $[0; 6]$, lợi nhuận đạt giá trị lớn nhất khi $x = 4$.

Khi đó giá vé tối ưu là: $200.000 - 10.000 \cdot 4 = 160.000$ (đồng).

Câu 29. Chi phí tổng hợp để sản xuất x sản phẩm của một doanh nghiệp được cho bởi hàm số $C(x) = x^3 - 6x^2 + 100x + 32$ (triệu đồng), với $x > 0$. Chi phí trung bình để sản xuất một sản phẩm là $AC(x) = \frac{C(x)}{x}$. Tìm số lượng sản phẩm x cần sản xuất để chi phí trung bình trên mỗi sản phẩm là thấp nhất.



A. $x = 2$

B. $x = 3$

C. $x = 4$

D. $x = 5$

Lời giải.


Hàm chi phí trung bình là: $AC(x) = \frac{x^3 - 6x^2 + 100x + 32}{x} = x^2 - 6x + 100 + \frac{32}{x}$ (triệu đồng/sản phẩm) với $x > 0$.

Tính đạo hàm: $AC'(x) = 2x - 6 - \frac{32}{x^2} = \frac{2x^3 - 6x^2 - 32}{x^2}$.

Ta có $AC'(x) = 0 \Leftrightarrow 2(x - 4)(x^2 + x + 4) = 0 \Leftrightarrow x = 4$ (vì $x^2 + x + 4 > 0$ với mọi x).

Lập bảng biến thiên của hàm số $AC(x)$ trên khoảng $(0; +\infty)$, ta thấy chi phí trung bình đạt giá trị nhỏ nhất khi sản xuất $x = 4$ sản phẩm.

Câu 30. Chính phủ áp dụng một mức thuế suất t ($0 \leq t \leq 1$) đối với một mặt hàng tiêu dùng. Khi đó, lượng sản phẩm tiêu thụ được tính theo công thức $Q(t) = 1000(1 - t^2)$ (sản phẩm). Tổng doanh thu thuế thu được của chính phủ là $T(t) = t \cdot Q(t)$ (triệu đồng). Tìm thuế suất t (làm tròn đến hàng phần mười phần trăm) để tổng doanh thu thuế đạt giá trị lớn nhất.



- A. 50.0% B. 57.7% C. 66.7% D. 70.7%

Lời giải.

Doanh thu thuế của chính phủ được biểu diễn bởi hàm số: $T(t) = t * 1000(1 - t^2) = 1000(t - t^3)$ với $t \in [0; 1]$.

Tính đạo hàm: $T'(t) = 1000(1 - 3t^2)$.

Cho $T'(t) = 0 \Leftrightarrow 1 - 3t^2 = 0 \Leftrightarrow t^2 = \frac{1}{3} \Rightarrow t = \frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0.577$ (do $t \in [0; 1]$).

Khảo sát hàm số $T(t)$ trên đoạn $[0; 1]$ cho thấy $T(t)$ đạt giá trị lớn nhất tại $t = \frac{1}{\sqrt{3}} \approx 57.7\%$.

Câu 31. Năng suất của một công nhân theo thời gian t (giờ làm việc trong ca) được cho bởi $P(t) = -t^3 + 6t^2 + 12t$ (sản phẩm/giờ). Năng suất của công nhân tăng nhanh nhất ở thời điểm mấy giờ?

Đáp số: 2

Lời giải.

Tốc độ tăng năng suất là đạo hàm bậc nhất của $P(t)$: $P'(t) = -3t^2 + 12t + 12$.

Năng suất tăng nhanh nhất khi tốc độ tăng đạt giá trị lớn nhất, tức là cực đại của $P'(t)$, hay đạo hàm bậc hai $P''(t) = 0$.

Ta có $P''(t) = -6t + 12 = 0 \Leftrightarrow t = 2$.

Vậy năng suất của công nhân tăng nhanh nhất ở thời điểm 2 giờ sau khi bắt đầu ca làm việc.

Câu 32. Khu vực khai thác mỏ có sản lượng được mô tả bởi $S(x) = xe^{\{-0.1x\}}$ (tấn), với x là số nhân công ($x > 0$). Cần thuê bao nhiêu nhân công để sản lượng lớn nhất?

Đáp số: 10

Lời giải.

Đạo hàm (áp dụng quy tắc tích): $S'(x) = 1 * e^{\{-0.1x\}} + x * (-0.1)e^{\{-0.1x\}} = e^{\{-0.1x\}}(1 - 0.1x)$.

Vì $e^{\{-0.1x\}} > 0$ nên $S'(x) = 0 \Leftrightarrow 1 - 0.1x = 0 \Leftrightarrow x = 10$.

Vậy cần 10 nhân công để đạt cực đại.

Chủ đề 4. Bài toán Vật lý, Chuyên động & Mô hình thực tế khác

(14 câu)

Câu 33. Một vật chuyển động theo quy luật $s(t) = -\frac{1}{3}t^3 + 6t^2$, với t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật đi được. Vận tốc lớn nhất của vật trong quá trình chuyển động là:

- A. 18 m/s B. 24 m/s **C. 36 m/s** D. 48 m/s

Lời giải.

Vận tốc tức thời của vật là đạo hàm của quãng đường: $v(t) = s'(t) = -t^2 + 12t$.

Để tìm vận tốc lớn nhất, ta xét hàm $v(t) = -t^2 + 12t$ với $t \geq 0$.

Đạo hàm $v'(t) = -2t + 12 = 0 \Leftrightarrow t = 6$.

Bảng biến thiên cho thấy $v(t)$ đạt cực đại tại $t = 6$, với giá trị cực đại là $v(6) = -(6)^2 + 12(6) = 36$.

Vậy vận tốc lớn nhất đạt được là 36 m/s.

Câu 34. Một quả bóng được ném lên thẳng đứng từ mặt đất với vận tốc ban đầu là 20 m/s. Phương trình chuyển động của quả bóng được cho bởi $h(t) = 20t - 5t^2$, trong đó h là độ cao tính bằng mét, t là thời gian tính bằng giây. Độ cao cực đại mà quả bóng đạt được là:

- A. 15 m **B. 20 m** C. 25 m D. 30 m

Lời giải.

Độ cao lớn nhất đạt được khi vận tốc tức thời bằng 0.

Vận tốc $v(t) = h'(t) = 20 - 10t = 0 \Leftrightarrow t = 2$.

Độ cao cực đại: $h(2) = 20(2) - 5(2^2) = 40 - 20 = 20$ (m).

Câu 35. Sức cản không khí đối với một máy bay được mô hình hóa bởi hàm số $R(v) = kv^2 + \frac{m}{v^2}$ với k, m là các hằng số dương và v là vận tốc. Vận tốc nào sẽ làm sức cản là nhỏ nhất?

- A. $v = \sqrt[3]{\frac{m}{k}}$ B. $v = \frac{m}{k}$ C. $v = \sqrt[4]{\frac{m}{k}}$ D. $v = \sqrt{\frac{m}{k}}$

Lời giải.

Xét hàm số $R(v) = kv^2 + \frac{m}{v^2}$ với $v > 0$.

Đạo hàm: $R'(v) = 2kv - \frac{2m}{v^3} = \frac{2(kv^4 - m)}{v^3}$.

Cho $R'(v) = 0 \Leftrightarrow kv^4 - m = 0 \Leftrightarrow v = \sqrt[4]{\frac{m}{k}}$ (vì $v > 0$).

Bảng biến thiên:

- Với $0 < v < \sqrt[4]{\frac{m}{k}}$, ta có $R'(v) < 0$, hàm số nghịch biến.
- Với $v > \sqrt[4]{\frac{m}{k}}$, ta có $R'(v) > 0$, hàm số đồng biến.

Do đó, sức cản không khí đạt giá trị nhỏ nhất tại vận tốc $v = \sqrt[4]{\frac{m}{k}}$.

Câu 36. Nhiệt độ T (độ C) trong một tủ sấy hóa chất phụ thuộc vào thời gian t (giờ) theo mô hình $T(t) = 15 + 8t - t^2$ ($0 \leq t \leq 10$). Tủ sấy bị hỏng nếu nhiệt độ vượt quá 40°C . Hỏi tủ có bị hỏng không, và nhiệt độ lớn nhất đạt được là bao nhiêu?

- A. 30°C , không hỏng B. 31°C , không hỏng C. 45°C , bị hỏng D. 50°C , bị hỏng

Lời giải.


Đạo hàm: $T'(t) = 8 - 2t = 0 \Leftrightarrow t = 4$.

Tại cực đại $t = 4$, nhiệt độ là $T(4) = 15 + 8(4) - (4)^2 = 15 + 32 - 16 = 31^\circ\text{C}$.

Tại biên $t = 0 \Rightarrow T(0) = 15$; $t = 10 \Rightarrow T(10) = -5$.

Vậy nhiệt độ lớn nhất là 31°C , nhỏ hơn 40°C nên tủ không bị hỏng.

Câu 37. Hai chiếc tàu thủy A và B chuyển động đều trên hai trục vuông góc. Tàu A xuất phát từ gốc tọa độ O đi theo hướng trục Ox với vận tốc 30 km/h. Tàu B xuất phát từ điểm trên trục Oy cách O 100 km và đi về phía O với vận tốc 40 km/h. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai tàu trong quá trình di chuyển là:



- A. 50 km **B. 60 km** C. 70 km D. 80 km

Lời giải.

Sau t giờ ($t > 0$), quãng đường tàu A đi được là $30t$ (km), nên tọa độ tàu A là $A(30t, 0)$.

Quãng đường tàu B đi được là $40t$ (km), tọa độ tàu B đang tiến về O là $B(0, 100 - 40t)$.


Khoảng cách giữa hai tàu là $d(t) = \sqrt{(30t)^2 + (100 - 40t)^2} = \sqrt{900t^2 + 10000 - 8000t + 1600t^2} = \sqrt{2500t^2 - 8000t + 10000}$.

Xét hàm $f(t) = 2500t^2 - 8000t + 10000$. Đạo hàm $f'(t) = 5000t - 8000 = 0 \Leftrightarrow t = 1.6$ (giờ).

Tại $t = 1.6$, $f(1.6) = 2500(1.6)^2 - 8000(1.6) + 10000 = 6400 - 12800 + 10000 = 3600$.

Vậy khoảng cách nhỏ nhất là $d_{\min} = \sqrt{3600} = 60$ (km).

Câu 38. Một bức tranh cao 1.4 m được treo trên tường sao cho mép dưới của bức tranh cách mắt người quan sát 1.8 m (theo phương thẳng đứng). Người quan sát phải đứng cách tường bao nhiêu mét để có góc nhìn bức tranh là lớn nhất?



- A. 1.5 m B. 2.0 m **C. 2.4 m** D. 3.2 m

Lời giải.

Gọi x (m) là khoảng cách từ người đến tường ($x > 0$). Gọi α là góc nhìn bức tranh.

Gọi góc tạo bởi đường thẳng từ mắt đến mép dưới bức tranh và phương ngang là β . Ta có $\tan \beta = \frac{1.8}{x}$.

Góc tạo bởi đường thẳng từ mắt đến mép trên bức tranh và phương ngang là $\alpha + \beta$. Ta có $\tan(\alpha + \beta) = \frac{1.8 + 1.4}{x} = \frac{3.2}{x}$.

Xét hàm số $f(x) = \frac{1.4x}{x^2 + 5.76}$ với $x > 0$.

Đạo hàm: $f'(x) = \frac{1.4(x^2 + 5.76) - 1.4x(2x)}{(x^2 + 5.76)^2} = \frac{1.4(5.76 - x^2)}{(x^2 + 5.76)^2}$.

Cho $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 5.76 - x^2 = 0 \Leftrightarrow x = 2.4$ (vì $x > 0$).


Bảng biến thiên của $f(x)$ cho thấy:

- Với $0 < x < 2.4$, ta có $f'(x) > 0$, hàm số đồng biến.
- Với $x > 2.4$, ta có $f'(x) < 0$, hàm số nghịch biến.

Do đó, hàm số đạt cực đại tại $x = 2.4$.

Vậy người đó cần đứng cách tường 2.4 m để có góc nhìn lớn nhất.

Câu 39. Một người đang ở vị trí A trong rừng, cách đường quốc lộ thẳng một khoảng $AH = 3$ km. Người đó muốn di chuyển đến điểm B nằm trên quốc lộ cách H một khoảng $HB = 5$ km. Biết rằng người này đi bộ trong rừng với vận tốc 4 km/h và đi trên đường quốc lộ với vận tốc 5 km/h. Để thời gian di chuyển từ A đến B là ngắn nhất, người đó nên đi thẳng từ A ra quốc lộ tại điểm M cách H bao nhiêu km?



- A. $x = 3$ km B. $x = 4$ km C. $x = 2.5$ km D. $x = 3.5$ km

Lời giải.

Đặt $HM = x$ (km) với $0 \leq x \leq 5$. Khi đó đoạn đường đi trong rừng là $AM = \sqrt{x^2 + 9}$ (km).

Đoạn đường đi trên quốc lộ là $MB = 5 - x$ (km).

Thời gian di chuyển tổng cộng: $T(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 9}}{4} + \frac{5 - x}{5}$ (giờ).

Tính đạo hàm: $T'(x) = \frac{x}{4\sqrt{x^2 + 9}} - \frac{1}{5}$.


Cho $T'(x) = 0 \Leftrightarrow 5x = 4\sqrt{x^2 + 9} \Leftrightarrow 25x^2 = 16(x^2 + 9) \Leftrightarrow 9x^2 = 144 \Leftrightarrow x = 4$ (km) (thỏa mãn).

Bảng biến thiên cho thấy $T(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = 4$ km.

Câu 40. Một người cần di chuyển từ vị trí A ở môi trường 1 đến vị trí B ở môi trường 3. Không gian được chia thành ba dải môi trường song song:

- Môi trường 1 có độ rộng $h_1 = 40$ m, vận tốc di chuyển là $v_1 = 6$ m/s.
- Môi trường 2 có độ rộng $h_2 = 30$ m, vận tốc di chuyển là $v_2 = 8$ m/s.
- Môi trường 3 có độ rộng $h_3 = 30\sqrt{3}$ m, vận tốc di chuyển là $v_3 = 5$ m/s.

Khoảng cách theo phương ngang giữa A và B là $L = 100$ m. Hãy xác định thời gian di chuyển ngắn nhất để người đó đi từ A đến B .



- A. 25 giây B. 26.58 giây C. 28.00 giây D. 30.25 giây

Lời giải.

Gọi x_1, x_2, x_3 lần lượt là các quãng đường di chuyển theo phương ngang của người đó trong ba môi trường 1, 2, 3 ($x_1, x_2, x_3 \geq 0$ và $x_1 + x_2 + x_3 = 100$).

Tổng thời gian di chuyển là: $T = \frac{\sqrt{x_1^2 + 40^2}}{6} + \frac{\sqrt{x_2^2 + 30^2}}{8} + \frac{\sqrt{x_3^2 + (30\sqrt{3})^2}}{5}$.

Theo nguyên lý Fermat (định luật khúc xạ ánh sáng), để thời gian di chuyển đạt cực tiểu thì tỉ số giữa sin góc khúc xạ và vận tốc tại các môi trường phải bằng nhau: $\frac{\sin \theta_1}{v_1} = \frac{\sin \theta_2}{v_2} = \frac{\sin \theta_3}{v_3} = k$.

Trong đó $\sin \theta_i = \frac{x_i}{\sqrt{x_i^2 + h_i^2}}$. Chọn hằng số $k = 0.1$, ta có:

- $\frac{\sin \theta_1}{6} = 0.1 \Rightarrow \sin \theta_1 = 0.6 \Rightarrow \tan \theta_1 = 0.75 \Rightarrow x_1 = 40 * 0.75 = 30$ m.
- $\frac{\sin \theta_2}{8} = 0.1 \Rightarrow \sin \theta_2 = 0.8 \Rightarrow \tan \theta_2 = \frac{4}{3} \Rightarrow x_2 = 30 * \frac{4}{3} = 40$ m.
- $\frac{\sin \theta_3}{5} = 0.1 \Rightarrow \sin \theta_3 = 0.5 \Rightarrow \tan \theta_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow x_3 = 30\sqrt{3} * \frac{1}{\sqrt{3}} = 30$ m.

Kiểm tra điều kiện: $x_1 + x_2 + x_3 = 30 + 40 + 30 = 100$ m (thỏa mãn tổng khoảng cách $L = 100$ m).

Thời gian di chuyển ngắn nhất tương ứng là: $T_{\min} = \frac{\sqrt{30^2 + 40^2}}{6} + \frac{\sqrt{40^2 + 30^2}}{8} + \frac{\sqrt{30^2 + 2700}}{5} = \frac{50}{6} + \frac{50}{8} + \frac{60}{5} = \frac{25}{3} + \frac{25}{4} + 12 \approx 26.58$ giây.

Câu 41. Thể tích nước trong một hồ chứa sau cơn mưa được tính theo công thức $V(t) = 1000(12t - t^2) + 5000$ (mét khối), trong đó t (giờ) là thời gian tính từ khi tạnh mưa ($0 \leq t \leq 12$). Xét tính Đúng/Sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Ngay khi tạnh mưa ($t = 0$), thể tích nước trong hồ là 5000 m^3 .	☒	☐
b) Lượng nước trong hồ tăng dần trong 6 giờ đầu sau khi tạnh mưa do lượng nước đọng dồn về hồ.	☒	☐
c) Thể tích nước đạt cực đại tại thời điểm $t = 12$ giờ.	☐	☒
d) Thể tích nước lớn nhất trong hồ là 41000 m^3 .	☒	☐

Lời giải.

- a) Đúng. Thay $t = 0$ ta được $V(0) = 5000$.
- b) Đúng. Tốc độ thay đổi thể tích là $V'(t) = 1000(12 - 2t)$. $V'(t) > 0$ khi $t < 6$, tức là lượng nước tăng dần trong 6 giờ đầu.
- c) Sai. $V'(t) = 0 \Leftrightarrow t = 6$. Thể tích đạt cực đại tại $t = 6$ giờ. Tại $t = 12$ nước đã rút dần.
- d) Đúng. Giá trị cực đại $V(6) = 1000(12 \cdot 6 - 6^2) + 5000 = 1000(72 - 36) + 5000 = 36000 + 5000 = 41000 \text{ (m}^3\text{)}$.

Câu 42. Một quả đạn pháo được bắn lên với phương trình quỹ đạo $y = -\frac{1}{100}x^2 + x + 10$ (m) với x là khoảng cách theo phương ngang từ điểm bắn. Quả đạn pháo sẽ rơi chạm đất cách điểm bắn bao nhiêu mét (làm tròn đến số nguyên)?

Đáp số:

Lời giải.

Khi chạm đất thì độ cao $y = 0$.

Giải phương trình: $-\frac{1}{100}x^2 + x + 10 = 0 \Leftrightarrow -x^2 + 100x + 1000 = 0$.

Delta: $\Delta = 100^2 - 4(-1)(1000) = 10000 + 4000 = 14000$.

$$x = \frac{-100 \pm \sqrt{14000}}{-2} = 50 \pm 50\sqrt{1.4} \approx 50 \pm 59.16.$$

Do $x > 0$ nên $x \approx 109.16$ m. Làm tròn đến hàng đơn vị là 109 m. (Nếu lấy $50 + 10\sqrt{35} \approx 109.16$). Đáp án 109.

Câu 43. Nhiệt độ $T(t)$ của một người bệnh trong 12 giờ theo dõi ($0 \leq t \leq 12$) được mô tả bởi $T(t) = -0.01t^3 + 0.12t^2 + 36.6$. Cơn sốt cao nhất (nhiệt độ lớn nhất) của người bệnh đạt được là bao nhiêu độ C?

Đáp số: 39.2

Lời giải.

Đạo hàm $T'(t) = -0.03t^2 + 0.24t = 0 \Leftrightarrow -0.03t(t - 8) = 0 \Rightarrow t = 0$ hoặc $t = 8$.

Nhiệt độ lớn nhất đạt tại cực đại $t = 8$ giờ.

$$T(8) = -0.01(8)^3 + 0.12(8)^2 + 36.6 = -5.12 + 7.68 + 36.6 = 39.16 \approx 39.2^\circ\text{C}.$$

Câu 44. Cường độ một trận động đất được tính bởi $M(t) = \frac{10t}{t^2 + 25}$ với $t \geq 0$ là thời gian tính bằng giây. Trận động đất đạt cường độ mạnh nhất tại giây thứ bao nhiêu?

Đáp số: 5

Lời giải.

$$\text{Đạo hàm } M'(t) = \frac{10(t^2 + 25) - 10t(2t)}{(t^2 + 25)^2} = \frac{-10t^2 + 250}{(t^2 + 25)^2}.$$

$$\text{Cho } M'(t) = 0 \Leftrightarrow 10t^2 = 250 \Leftrightarrow t^2 = 25 \Rightarrow t = 5.$$

Câu 45. Một dịch bệnh cúm mùa bùng phát trong một trường học. Số ca nhiễm bệnh sau t ngày (kể từ khi ca bệnh đầu tiên xuất hiện) được ước tính theo công thức $N(t) = -t^3 + 18t^2 + 120t$ với $0 \leq t \leq 15$. Hỏi vào ngày thứ mấy thì tốc độ lây lan của dịch bệnh đạt giá trị lớn nhất?

Đáp số: 6

Lời giải.

Tốc độ lây lan dịch bệnh tại thời điểm t là đạo hàm bậc nhất của $N(t)$: $v(t) = N'(t) = -3t^2 + 36t + 120$ (ca nhiễm/ngày).

Để tìm thời điểm tốc độ lây lan đạt giá trị lớn nhất, ta tìm giá trị lớn nhất của hàm số $v(t)$ trên đoạn $[0; 15]$.

Tính đạo hàm của $v(t)$ (tương đương đạo hàm bậc hai của $N(t)$): $v'(t) = N''(t) = -6t + 36$.

Cho $v'(t) = 0 \Leftrightarrow -6t + 36 = 0 \Leftrightarrow t = 6$ (thỏa mãn điều kiện $0 \leq t \leq 15$).

Khảo sát sự biến thiên của $v(t)$ trên $[0; 15]$ cho thấy tốc độ lây lan đạt giá trị cực đại tại $t = 6$.

Vậy vào ngày thứ 6, tốc độ lây lan của dịch bệnh là lớn nhất.

Câu 46. Một bể bơi lớn chứa nước đang được xả để vệ sinh. Thể tích nước còn lại trong bể sau t giờ xả nước được cho bởi công thức $V(t) = \frac{1}{3}t^3 - 8t^2 + 48t + 200$ (m^3) với $0 \leq t \leq 12$. Hỏi sau khi bắt đầu xả nước bao nhiêu giờ thì tốc độ xả nước (tốc độ giảm thể tích nước) đạt giá trị lớn nhất?

Đáp số: 8

Lời giải.

Tốc độ thay đổi thể tích nước tại thời điểm t là $V'(t) = t^2 - 16t + 48$.

Do nước được xả ra nên thể tích nước giảm dần. Tốc độ xả nước (tốc độ giảm thể tích) được tính bằng đối của tốc độ thay đổi: $R(t) = -V'(t) = -t^2 + 16t - 48$ ($m^3/\text{giờ}$).

Ta cần tìm giá trị lớn nhất của $R(t)$ trên đoạn $[0; 12]$.

Tính đạo hàm: $R'(t) = -2t + 16$.

Cho $R'(t) = 0 \Leftrightarrow -2t + 16 = 0 \Leftrightarrow t = 8$ (thỏa mãn điều kiện $0 \leq t \leq 12$).

Khảo sát hàm số $R(t)$ trên đoạn $[0; 12]$ cho thấy tốc độ xả nước đạt giá trị lớn nhất tại thời điểm $t = 8$ giờ.

ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 02 - TOÁN KINH TẾ, TĂNG TRƯỞNG & TIỆM CẬN

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (12 câu)

(12 câu)

Câu 1. Tổng chi phí sản xuất x sản phẩm của một công ty trong một ngày được cho bởi hàm số $C(x) = 0.05x^2 + 20x + 500$ (nghìn đồng). Để chi phí trung bình $\overline{C}(x) = \frac{C(x)}{x}$ là thấp nhất, công ty cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm mỗi ngày?

- A. 50 sản phẩm **B. 100 sản phẩm** C. 150 sản phẩm D. 200 sản phẩm

Lời giải.


Chi phí trung bình trên mỗi sản phẩm: $\overline{C}(x) = \frac{C(x)}{x} = 0.05x + 20 + \frac{500}{x}$ (với $x > 0$).

Tính đạo hàm: $\overline{C}'(x) = 0.05 - \frac{500}{x^2}$.

Cho $\overline{C}'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{500}{x^2} = 0.05 \Leftrightarrow x^2 = \frac{500}{0.05} = 10000 \Leftrightarrow x = 100$ (sản phẩm).

Bảng biến thiên chỉ ra rằng $\overline{C}(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = 100$.

Câu 2. Một doanh nghiệp bán được 1000 sản phẩm mỗi tháng với giá 50 USD/sản phẩm. Khảo sát thị trường cho thấy nếu giảm giá bán đi 1 USD thì số lượng sản phẩm bán ra tăng thêm 50 chiếc. Giá bán mỗi sản phẩm để doanh thu đạt tối đa là:



- A. 30 USD B. 35 USD C. 40 USD D. 45 USD

Lời giải.

Gọi x là số lần giảm giá 1 USD ($0 < x < 50$).

Giá bán mới: $p = 50 - x$ (USD).


Số lượng bán được: $q = 1000 + 50x$.

Hàm doanh thu: $R(x) = p * q = (50 - x)(1000 + 50x) = 50000 + 2500x - 1000x - 50x^2 = -50x^2 + 1500x + 50000$.

Doanh thu đạt tối đa khi $R'(x) = -100x + 1500 = 0 \Leftrightarrow x = 15$.

Giá bán tối ưu: $p = 50 - 15 = 35$ (USD).

Câu 3. Chi phí trung bình để sản xuất một lô hàng x đơn vị là $A(x) = 2x + \frac{10000}{x}$. Số lượng đơn vị cần sản xuất để chi phí trung bình nhỏ nhất là:



- A. 50 **B. 70.7 (khoảng 71)** C. 100 D. 141

Lời giải.

Đạo hàm: $A'(x) = 2 - \frac{10000}{x^2} = 0 \Leftrightarrow 2x^2 = 10000 \Leftrightarrow x^2 = 5000$.

$x = \sqrt{5000} = 50\sqrt{2} \approx 70.71$. Làm tròn thành 71 đơn vị.

Câu 4. Một loại vi khuẩn được nuôi cấy trong điều kiện lý tưởng với số lượng ban đầu là 100. Sau thời gian t giờ, số lượng vi khuẩn là $N(t) = 100e^{\{0.5t\}}$. Hỏi sau bao lâu thì tốc độ sinh trưởng của vi khuẩn đạt 200 con/giờ?

- A. ≈ 1.39 giờ **B. ≈ 2.77 giờ** C. ≈ 4.16 giờ D. ≈ 5.55 giờ

Lời giải.


Tốc độ sinh trưởng là đạo hàm của hàm số lượng: $N'(t) = 100 * 0.5e^{\{0.5t\}} = 50e^{\{0.5t\}}$.

Yêu cầu $N'(t) = 200 \Leftrightarrow 50e^{\{0.5t\}} = 200 \Leftrightarrow e^{\{0.5t\}} = 4$.

Giải ra: $0.5t = \ln 4 = 2 \ln 2 \Rightarrow t = 4 \ln 2 \approx 4 \times 0.693 = 2.772$.

Vậy sau khoảng 2.77 giờ thì tốc độ sinh trưởng đạt 200 con/giờ.

Câu 5. Số lượng khách hàng N của một công ty khởi nghiệp tuân theo mô hình $N(t) = \frac{10000}{1 + 19e^{\{-0.5t\}}}$, với t (tháng) là thời gian kể từ lúc bắt đầu hoạt động. Sau một thời gian rất dài, số lượng khách hàng của công ty sẽ ổn định ở mức bao nhiêu?



- A. 100 B. 1000 C. 10000 D. 500

Lời giải.


Quá trình “sau một thời gian rất dài” tương đương với việc lấy giới hạn khi $t \rightarrow +\infty$.

Ta có: $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{\{-0.5t\}} = 0$.

Do đó: $\lim_{t \rightarrow +\infty} N(t) = \frac{10000}{1 + 19 \cdot 0} = 10000$.

Mức 10000 còn được gọi là giới hạn sức chứa (carrying capacity) của mô hình hàm logistic.

Câu 6. Nồng độ một loại thuốc trong máu của bệnh nhân sau khi tiêm t giờ được xác định bởi hàm số $C(t) = \frac{5t}{t^2 + 4}$ (mg/L). Nồng độ thuốc đạt đỉnh cao nhất vào giờ thứ mấy sau khi tiêm?



- A. 1 giờ B. 2 giờ C. 3 giờ D. 4 giờ

Lời giải.

Đạo hàm: $C'(t) = \frac{5(t^2 + 4) - 5t(2t)}{(t^2 + 4)^2} = \frac{20 - 5t^2}{(t^2 + 4)^2}$.

Cho $C'(t) = 0 \Leftrightarrow 20 - 5t^2 = 0 \Leftrightarrow t^2 = 4 \Rightarrow t = 2$ (vì $t > 0$).

Bảng biến thiên cho thấy $C(t)$ đạt cực đại tại $t = 2$. Vậy nồng độ đạt đỉnh sau 2 giờ.

Câu 7. Chi phí trung bình $A(x) = \frac{50000 + 200x}{x}$ (VNĐ) khi sản xuất x cái áo. Mệnh đề nào sau đây diễn tả đúng ý nghĩa của giới hạn $\lim_{x \rightarrow +\infty} A(x) = 200$?

- A. Sản xuất càng nhiều, chi phí mỗi áo tăng vô hạn.


- B. Công ty không thể sản xuất quá 200 cái áo.
C. Nếu sản xuất lượng áo rất lớn, chi phí trung bình trên mỗi áo sẽ xấp xỉ 200 VNĐ.
D. Tổng chi phí sản xuất luôn bằng 200 VNĐ.

Lời giải.

Ta có $A(x) = \frac{50000}{x} + 200$. Khi $x \rightarrow +\infty$, phần chi phí cố định chia đều $\frac{50000}{x} \rightarrow 0$.

Chi phí trung bình trên một đơn vị sản phẩm sẽ tiến dần tới tiệm cận ngang $y = 200$. Tức là khi sản xuất quy mô rất lớn, mỗi chiếc áo tốn xấp xỉ mức chi phí biến đổi là 200 VNĐ.

Câu 8. Giá trị của một máy móc sau t năm sử dụng được cho bởi hàm số $V(t) = 150 * e^{\{-0.1t\}}$ (triệu đồng). Tốc độ khấu hao (tốc độ giảm giá trị) của máy vào năm thứ 5 là bao nhiêu?



- A. ≈ 15.0 triệu/năm **B. ≈ 9.1 triệu/năm** C. ≈ 91 triệu/năm D. ≈ 1.5 triệu/năm

Lời giải.

Tốc độ thay đổi giá trị là $V'(t) = 150 * (-0.1) * e^{\{-0.1t\}} = -15e^{\{-0.1t\}}$.

Tốc độ khấu hao chính là độ lớn của tốc độ thay đổi: $|V'(t)| = 15e^{\{-0.1t\}}$.

Tại $t = 5$: $|V'(5)| = 15e^{\{-0.5\}} \approx 15 \times 0.6065 = 9.0975 \approx 9.1$ (triệu/năm).

Câu 9. Lượng khí thải CO₂ của một thành phố ước tính theo thời gian được mô hình hóa bởi $E(t) = t^3 - 12t^2 + 45t + 100$ (đơn vị), t (năm) tính từ 2020. Tốc độ tăng lượng khí thải bắt đầu chậm lại (điểm uốn) vào năm nào?

- A. 2022 B. 2023 **C. 2024** D. 2025

Lời giải.

Tốc độ tăng là đạo hàm bậc nhất: $E'(t) = 3t^2 - 24t + 45$.

Để biết khi nào tốc độ tăng đạt cực trị (chậm lại hay nhanh lên), ta xét điểm uốn (đạo hàm bậc hai bằng 0): $E''(t) = 6t - 24 = 0 \Leftrightarrow t = 4$.

$t = 4$ tương ứng với 4 năm sau 2020, tức là năm 2024.

Câu 10. Dân số của một hòn đảo (đơn vị nghìn người) biến động theo mô hình $P(t) = \frac{10t + 50}{t + 2}$ ($t \geq 0$ tính bằng năm). Phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Dân số đảo tăng liên tục nhưng không bao giờ vượt quá 10 nghìn người.
- B. Dân số đảo sẽ giảm dần theo thời gian.**
- C. Sau 3 năm dân số là 20 nghìn người.
- D. Dân số ban đầu là 10 nghìn người.

Lời giải.

Tính đạo hàm: $P'(t) = \frac{10(t+2) - (10t+50) \cdot 1}{(t+2)^2} = \frac{-30}{(t+2)^2} < 0$ với mọi $t \geq 0$.

Vì $P'(t) < 0$ nên dân số **giảm liên tục** từ $P(0) = 25$ (nghìn người) xuống theo thời gian. Đáp án B đúng.

Khi $t \rightarrow +\infty$: $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{10t + 50}{t + 2} = 10$ – dân số tiệm cận về mức 10 nghìn người, xác nhận câu hỏi tiếp theo.

Kiểm tra các đáp án sai: A sai (dân số giảm, không tăng); C sai ($P(3) = \frac{80}{5} = 16$ nghìn, không phải 20); D sai ($P(0) = 25$ nghìn, không phải 10).

Câu 11. Tiếp tục bài trên: Dân số của hòn đảo có giới hạn tiệm cận là bao nhiêu khi thời gian rất lớn?

- A. 0
- B. 5 nghìn người
- C. 10 nghìn người**
- D. Vô hạn

Lời giải.

Ta tính giới hạn khi $t \rightarrow +\infty$: $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{10t + 50}{t + 2} = 10$.

Đồ thị có tiệm cận ngang $y = 10$. Do đó dân số dần ổn định ở mức 10 nghìn người.

Câu 12. Khối lượng mỡ cơ thể giảm đi của một người áp dụng chế độ ăn kiêng được ước tính bởi $L(t) = \frac{8t}{t+4}$ (kg), t (tuần). Hỏi tốc độ giảm mỡ ở tuần thứ 4 là bao nhiêu kg/tuần?

- A. 0.25
- B. 0.5**
- C. 1.0
- D. 2.0

Lời giải.

Tốc độ giảm mỡ chính là đạo hàm của hàm $L(t)$.

$$L'(t) = \frac{8(t+4) - 8t(1)}{(t+4)^2} = \frac{32}{(t+4)^2}.$$

Tại $t = 4$: $L'(4) = \frac{32}{(4+4)^2} = \frac{32}{64} = 0.5$ (kg/tuần).

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai (4 câu)

(4 câu)

Câu 13. Cho hàm số mô tả nồng độ một loại hóa chất trong hồ sau khi bị ô nhiễm: $C(t) = \frac{5t}{t^2 + 9}$ (đơn vị: mg/L), với t (ngày) là thời gian từ lúc tràn hóa chất ($t \geq 0$).

Phát biểu	Đ	S
a) Nồng độ hóa chất đạt đỉnh vào ngày thứ 5.	☐	☒
b) Nồng độ cao nhất của hóa chất trong hồ là $\frac{5}{6}$ mg/L.	☒	☐
c) Sau khi đạt đỉnh, nồng độ hóa chất giảm dần và tiến về 0.	☒	☐
d) Tốc độ thay đổi nồng độ tại $t = 0$ là âm.	☐	☒

Lời giải.

- a) Sai. Đạo hàm $C'(t) = \frac{5(t^2 + 9) - 5t(2t)}{(t^2 + 9)^2} = \frac{45 - 5t^2}{(t^2 + 9)^2}$. Giải $C'(t) = 0 \Leftrightarrow t^2 = 9 \Rightarrow t = 3$. Đạt đỉnh vào ngày thứ 3.
- b) Đúng. Nồng độ cao nhất tại $t = 3$ là $C(3) = \frac{5(3)}{3^2 + 9} = \frac{15}{18} = \frac{5}{6}$ (mg/L).
- c) Đúng. $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{5t}{t^2 + 9} = 0$, đường cong là tiệm cận ngang $y = 0$ trục hoành, nồng độ giảm tiệm cận về 0.
- d) Sai. Tại $t = 0$, $C'(0) = \frac{45}{81} > 0$. Lúc mới tràn hóa chất, tốc độ đang tăng nhanh.

Câu 14. Một công ty công nghệ phát triển ứng dụng di động. Lợi nhuận $P(x)$ (triệu đồng) phụ thuộc vào số lượng người dùng x (nghìn người) theo hàm: $P(x) = -x^3 + 12x^2 + 27x - 10$ ($x \geq 0$). Xét tính Đúng/Sai của các phát biểu sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Lợi nhuận đạt cực đại khi ứng dụng có 9 nghìn người dùng.	☒	☐
b) Lợi nhuận tối đa mà công ty đạt được là 400 triệu đồng.	☐	☒
c) Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận đạt lớn nhất khi lượng người dùng là 4 nghìn người.	☒	☐
d) Công ty luôn chịu lỗ nếu số người dùng vượt quá 12 nghìn người.	☐	☒

Lời giải.

- a) Đúng. Đạo hàm $P'(x) = -3x^2 + 24x + 27 = -3(x^2 - 8x - 9)$. Nghiệm $x = 9$ và $x = -1$. Cực đại tại $x = 9$.
- b) Sai. $P(9) = -9^3 + 12(9)^2 + 27(9) - 10 = -729 + 972 + 243 - 10 = 476$ (triệu đồng).
- c) Đúng. Tốc độ tăng trưởng là $P'(x)$. Ta tìm cực đại của $P'(x)$ bằng cách xét đạo hàm bậc hai $P''(x) = -6x + 24 = 0 \Rightarrow x = 4$. Điểm uốn.
- d) Sai. Tại $x = 13$: $P(13) = -2197 + 2028 + 351 - 10 = 172 > 0$. Vẫn còn lãi chứ chưa lỗ.

Câu 15. Phương trình sinh trưởng của một loài cá trong hồ được ước tính là $N(t) = \frac{400}{1 + 3e^{\{-0.2t\}}}$ (con), t tính bằng tháng.

Phát biểu	Đ	S
a) Số lượng cá ban đầu khi thả vào hồ là 100 con.	☒	☐
b) Sức chứa tối đa của hồ là 1200 con cá.	☐	☒
c) Dân số cá luôn tăng theo thời gian.	☒	☐
d) Khi dân số đạt 200 con, tốc độ tăng trưởng là mạnh nhất.	☒	☐

Lời giải.

- a) Đúng. Thay $t = 0$, ta có $N(0) = \frac{400}{1 + 3e^0} = \frac{400}{4} = 100$.
- b) Sai. Khi $t \rightarrow +\infty$, $e^{\{-0.2t\}} \rightarrow 0$, $N(t) \rightarrow \frac{400}{1} = 400$. Giới hạn sức chứa (tiềm cận ngang) là 400.
- c) Đúng. Hàm phân thức có mẫu $1 + 3e^{\{-0.2t\}}$ giảm ngặt nên phân thức tăng ngặt, đạo hàm luôn dương.
- d) Đúng. Đối với mô hình hàm logistic $N = \frac{K}{1 + Ce^{-rt}}$, tốc độ sinh trưởng $N'(t)$ đạt lớn nhất (điểm uốn) khi $N = \frac{K}{2}$. Ở đây $K = 400$, nên tốc độ lớn nhất khi $N = 200$.

Câu 16. Chi phí nhiên liệu (ngàn đồng/giờ) của một tàu thủy khi chạy với vận tốc v (km/h) là $C_1(v) = 50 + 0.5v^3$. Các chi phí khác (bảo dưỡng, lương thuyền viên...) cố định là 400 ngàn đồng/giờ. Tàu dự định thực hiện chuyến đi dài 1000 km.

Phát biểu	Đ	S
a) Tổng chi phí của chuyến đi là hàm số $T(v) = \frac{1000}{v}(450 + 0.5v^3)$.	☒	☐
b) Thời gian của chuyến đi là $t = \frac{1000}{v}$.	☒	☐
c) Để tổng chi phí nhỏ nhất, tàu cần chạy với vận tốc xấp xỉ 11.4 km/h.	☐	☒

d) Tàu chạy càng chậm thì tổng chi phí càng thấp do tiết kiệm nhiên liệu.

☐
☒

Lời giải.

- a) Đúng. Tổng chi phí mỗi giờ là $C(v) = 50 + 0.5v^3 + 400 = 450 + 0.5v^3$. Tổng chi phí chuyển đi = (Chi phí 1 giờ) $\times$ (Thời gian đi) = $(450 + 0.5v^3) \times \frac{1000}{v}$.
- b) Đúng. Công thức thời gian $t = \frac{S}{v}$.
- c) Sai. $T(v) = 1000\left(\frac{450}{v} + 0.5v^2\right)$. $T'(v) = 1000\left(-\frac{450}{v^2} + v\right) = 0 \Leftrightarrow v^3 = 450 \Rightarrow v = \sqrt[3]{450} \approx 7.66$ km/h. (Chú không phải 11.4).
- d) Sai. Nếu chạy quá chậm, nhiên liệu ít nhưng chi phí cố định (lương, bảo dưỡng) nhân với thời gian rất dài sẽ làm tổng chi phí khổng lồ.

PHẦN III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn (6 câu)

(6 câu)

Câu 17. Một máy in sản xuất x quyển sách với hàm chi phí $C(x) = 20000 + 100x + 0.05x^2$ (đồng). Doanh thu bán ra là $R(x) = 200x$. Sản lượng x bằng bao nhiêu để công ty đạt lợi nhuận cực đại?

Đáp số:

Lời giải.

Hàm lợi nhuận: $P(x) = R(x) - C(x) = 200x - (20000 + 100x + 0.05x^2) = -0.05x^2 + 100x - 20000$.

Đạo hàm của hàm lợi nhuận: $P'(x) = -0.1x + 100$.

Cho $P'(x) = 0 \Leftrightarrow -0.1x + 100 = 0 \Leftrightarrow x = 1000$.

Do hệ số $a = -0.05 < 0$ nên đồ thị hàm lợi nhuận là parabol có bề lõm hướng xuống, lợi nhuận đạt cực đại tại đỉnh $x = 1000$ sản phẩm.

Câu 18. Cho hàm số mô phỏng tỉ lệ phần trăm dân số mắc một bệnh truyền nhiễm $P(t) = \frac{100t}{t^2 + 25}$ (%), t tính bằng tuần. Tỉ lệ nhiễm bệnh đạt đỉnh cao nhất là bao nhiêu phần trăm?

Đáp số:

Lời giải.

$$P'(t) = \frac{100(t^2 + 25) - 100t(2t)}{(t^2 + 25)^2} = \frac{2500 - 100t^2}{(t^2 + 25)^2} = 0 \Rightarrow t^2 = 25 \Rightarrow t = 5.$$

Tại $t = 5$, tỉ lệ nhiễm là $P(5) = \frac{100(5)}{5^2 + 25} = \frac{500}{50} = 10\%$.

Câu 19. Trọng lượng $W(t)$ (kg) của một con bê từ lúc sinh ra ($t = 0$) đến trưởng thành được ước tính bằng mô hình logistic $W(t) = \frac{400}{1 + 9e^{\{-0.3t\}}}$. Khi trưởng thành (sau nhiều năm), con bê này sẽ nặng xấp xỉ bao nhiêu kg?

Đáp số: 400

Lời giải.

Giới hạn bão hòa (trưởng thành): $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{400}{1 + 9e^{\{-0.3t\}}}$.

Vì $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{\{-0.3t\}} = 0$ nên $W_{\max} = \frac{400}{1 + 0} = 400$ (kg).

Câu 20. Hiệu suất học tập của một sinh viên $E(t)$ theo thời gian t (giờ) học liên tục là $E(t) = \frac{20t}{t^2 + 4}$. Để hiệu suất là cao nhất, sinh viên nên học liên tục trong bao nhiêu giờ rồi nghỉ ngơi?

Đáp số: 2

Lời giải.

Đạo hàm $E'(t) = \frac{20(t^2 + 4) - 20t(2t)}{(t^2 + 4)^2} = \frac{80 - 20t^2}{(t^2 + 4)^2}$.

$E'(t) = 0 \Leftrightarrow 20t^2 = 80 \Rightarrow t^2 = 4 \Rightarrow t = 2$.

Nên học liên tục 2 giờ thì hiệu suất đạt cực đại.

Câu 21. Một khối tuyết hình cầu đang tan chảy. Tốc độ tan chảy (giảm thể tích) tỉ lệ thuận với diện tích bề mặt của nó. Biết rằng sau 2 giờ thì bán kính giảm đi một nửa. Hỏi sau tổng cộng bao lâu (từ ban đầu) khối tuyết tan hết hoàn toàn?

Đáp số: 4

Lời giải.

Gọi V là thể tích, S là diện tích mặt ngoài, R là bán kính. Ta có $V = \frac{4}{3}\pi R^3$, $S = 4\pi R^2$.

Tốc độ giảm thể tích $\frac{dV}{dt} = -k * S \Leftrightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{4}{3}\pi R^3 \right) = -k(4\pi R^2)$.

Đạo hàm 2 vế theo t : $4\pi R^2 \frac{dR}{dt} = -k * 4\pi R^2 \Rightarrow \frac{dR}{dt} = -k$.

Vận tốc giảm bán kính là một hằng số. Vậy $R(t)$ là hàm bậc nhất theo thời gian $R(t) = R_0 - kt$.

Sau 2 giờ, bán kính giảm một nửa: $R(2) = R_0 - 2k = \frac{R_0}{2} \Rightarrow 2k = \frac{R_0}{2} \Rightarrow k = \frac{R_0}{4}$.

Tan hết khi $R(t) = 0 \Rightarrow R_0 - \frac{R_0}{4}t = 0 \Rightarrow t = 4$ (giờ).


ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 03 – BÀI TOÁN HAY · LẠ · KHÓ

Tối ưu hóa, Mô hình hóa, Vật lý & Sinh thái học

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (12 câu)

(12 câu)

Câu 1. [Drone – Tối ưu năng lượng bay] Một drone thực hiện chuyến bay dài 100 km. Tại vận tốc v m/s, năng lượng tiêu hao mỗi km gồm hai phần: lực cản không khí tốn v^2 J/km và điện tử cố định tốn $\frac{128}{v}$ J/km. Tổng năng lượng: $E(v) = 100\left(v^2 + \frac{128}{v}\right)$ J. Vận tốc nào giúp drone tiết kiệm năng lượng nhất?



A. 2 m/s

B. 3 m/s

C. 4 m/s


D. 5 m/s

Lời giải.

$$E'(v) = 100\left(2v - \frac{128}{v^2}\right) = 0 \Leftrightarrow v^3 = 64 \Leftrightarrow v = 4 \text{ m/s}.$$

$$E(4) = 100(16 + 32) = 4800 \text{ J. Công thức tổng quát: } v^* = \sqrt[3]{\frac{P_0}{2k}}.$$

Câu 2. [Góc nhìn tranh – Tối ưu vị trí quan sát] Bức tranh treo thẳng đứng, cạnh dưới cao 1m, cạnh trên cao 9m so với tầm mắt. Người đứng cách tường x mét; góc nhìn $\alpha = \arctan\left(\frac{9}{x}\right) - \arctan\left(\frac{1}{x}\right)$. Giá trị x để α lớn nhất là:



- A. 1 m B. 2 m **C. 3 m** D. 4 m

Lời giải.

$\tan \alpha = \frac{8x}{x^2 + 9}$. Đặt $f(x) = \frac{8x}{x^2 + 9}$, tối ưu tương đương tối ưu α .

$f'(x) = \frac{8(9 - x^2)}{(x^2 + 9)^2} = 0 \Leftrightarrow x = 3$. Công thức đẹp: $x^* = \sqrt{1 \times 9} = 3$ m – trung bình nhân!

Câu 3. [Làm lạnh Newton – Bán chu kỳ] Vật nóng 100°C đặt trong phòng 0°C . Nhiệt độ: $T(t) = 100 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{20}}$ với t (phút). Sau bao lâu nhiệt độ còn $\frac{1}{16}$ ban đầu?

- A. 40 phút B. 60 phút **C. 80 phút** D. 100 phút

Lời giải.

$\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{20}} = \frac{1}{16} = \left(\frac{1}{2}\right)^4 \Leftrightarrow t = 80$ phút (tức 4 chu kỳ bán rã).

Câu 4. [Định lý truyền công suất cực đại] Nguồn điện $\varepsilon = 24$ V, điện trở trong $r = 2 \Omega$. Công suất tiêu thụ trên điện trở ngoài R : $P(R) = \frac{576R}{(R + 2)^2}$. Giá trị R và $P_{\max}$:

- A. $R = 1 \Omega, P = 64$ W **B. $R = 2 \Omega, P = 72$ W**
C. $R = 3 \Omega, P \approx 69$ W D. $R = 4 \Omega, P = 64$ W

Lời giải.

$P'(R) = 576 \frac{2 - R}{(R + 2)^3} = 0 \Leftrightarrow R = 2 = r$. Định lý: P cực đại khi $R = r$.

$P_{\max} = 576 \cdot \frac{2}{16} = 72$ W. Hiệu suất tại điểm này đúng 50%.

Câu 5. [Tối ưu giá phòng khách sạn] Khách sạn 100 phòng, giá 1000k/đêm, tất cả kín. Mỗi tăng thêm 100k thì 5 phòng trống. Giá bán tối ưu để doanh thu cực đại:

A. 1200k

B. 1300k

C. 1500k

D. 1800k

Lời giải.

$$R(x) = (1000 + 100x)(100 - 5x) = 100000 + 5000x - 500x^2. \quad R' = 5000 - 1000x = 0 \Leftrightarrow x = 5.$$

Giá tối ưu = $1000 + 500 = 1500$ k; 75 phòng. Doanh thu = 112500k.

Câu 6. [Cycloid – Tốc độ cực đại của hạt] Hạt chuyển động theo cycloid: $x = t - \sin t$, $y = 1 - \cos t$. Tốc độ $v(t) = \sqrt{(1 - \cos t)^2 + \sin^2 t}$. Tốc độ cực đại là bao nhiêu?

A. 1


B. $\sqrt{2}$

C. 2

D. $2\sqrt{2}$ **Lời giải.**

$$v(t)^2 = 2 - 2\cos t = 4\sin^2\left(\frac{t}{2}\right) \Rightarrow v(t) = 2\left|\sin\left(\frac{t}{2}\right)\right|. \text{ Cực đại} = 2 \text{ tại } t = \pi.$$

Câu 7. [Đường cong Laffer – Thuế suất tối ưu] Nguồn thu thuế $T(r) = 81r(1 - r)^2$ (tỉ đồng), $r \in [0, 1]$. Mức thuế tối ưu r^* và nguồn thu T^* :

A. $r^* = \frac{1}{4}$, $T^* = 9$ tỉB. $r^* = \frac{1}{3}$, $T^* = 12$ tỉC. $r^* = \frac{1}{2}$, $T^* \approx 10.1$ tỉD. $r^* = \frac{2}{3}$, $T^* = 6$ tỉ**Lời giải.**

$$T'(r) = 81(1 - r)(1 - 3r) = 0 \Leftrightarrow r = \frac{1}{3}. \quad T\left(\frac{1}{3}\right) = 81 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{4}{9} = 12 \text{ tỉ.}$$

Ý nghĩa: Thuế suất $> \frac{1}{3}$ làm giảm nguồn thu – đây là bản chất kinh tế của đường Laffer!

Câu 8. [Khai thác bền vững tối đa (MSY)] Đàn cá: $r = 0.4$, $K = 1000$ tấn. Mức khai thác bền vững tối đa hằng năm là:

A. 50 tấn/năm

B. 100 tấn/năm

C. 150 tấn/năm

D. 200 tấn/năm

Lời giải.

$$f(N) = 0.4N \left(1 - \frac{N}{1000}\right). \text{ Cực đại tại } N^* = 500 = \frac{K}{2}. H^* = 0.4 \times 500 \times 0.5 = 100 \text{ tấn.}$$

$$\text{Công thức: } H^* = \frac{rK}{4} = \frac{0.4 \times 1000}{4} = 100 \text{ tấn/năm.}$$


Câu 9. [Nồng độ cồn – Pháp y] $BAC(t) = 2.4 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{3}}$ (phần ngàn), ngưỡng lái xe hợp lệ 0.3‰. Sau bao lâu đủ điều kiện lái xe?

- A. 6 giờ B. 7 giờ C. 9 giờ D. 12 giờ

Lời giải.

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{3}} = \frac{0.3}{2.4} = \frac{1}{8} = \left(\frac{1}{2}\right)^3 \Leftrightarrow t = 9 \text{ giờ. (BAC giảm một nửa mỗi 3 giờ.)}$$

Câu 10. [Định dịch bệnh] Số ca mỗi hằng ngày: $I(t) = 500te^{-0.1t}$ (ca/ngày). Định dịch đạt vào ngày:



- A. Ngày 5 B. Ngày 8 C. Ngày 10 D. Ngày 15

Lời giải.

$$I'(t) = 500e^{-0.1t}(1 - 0.1t) = 0 \Leftrightarrow t = 10 \text{ ngày. } I(10) = 5000e^{-1} \approx 1839 \text{ ca/ngày.}$$


Câu 11. [Lon trụ tối ưu – Tỷ lệ thiết kế] Lon hình trụ kín, thể tích V cho trước. Để diện tích bề mặt nhỏ nhất, tỉ số $\frac{h}{r}$ (chiều cao / bán kính) bằng:

- A. $\frac{h}{r} = \frac{1}{2}$ B. $\frac{h}{r} = 1$ C. $\frac{h}{r} = 2$ D. $\frac{h}{r} = 4$

Lời giải.

$$S = 2\pi r^2 + 2\frac{V}{r}. S' = 0 \Rightarrow r^3 = \frac{V}{2\pi} \Rightarrow h = \frac{V}{\pi r^2} = 2r. \text{ Vậy } \frac{h}{r} = 2 \text{ (chiều cao = đường kính).}$$

Câu 12. [Hình chữ nhật lớn nhất nội tiếp tam giác vuông] Tam giác vuông OAB : $OA = 6$ cm, $OB = 8$ cm. Hình chữ nhật có một đỉnh tại O , hai cạnh trên OA và OB , đỉnh đối diện trên cạnh huyền. Diện tích cực đại:

A. 8 cm^2 B. 10 cm^2 C. 12 cm^2 D. 16 cm^2 **Lời giải.**

$$S = xy = 8x - 4\frac{x^2}{3}. S' = 0 \Rightarrow x = 3, y = 4, S = 12 \text{ cm}^2.$$

Kết quả đẹp: $S_{\max} = \frac{ab}{4} = 12 = \frac{1}{2}S_{\{\triangle\}}$. Luôn bằng nửa diện tích tam giác!

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai (4 câu)

(4 câu)

Câu 13. [Mô hình dịch bệnh] Số ca nhiễm mới hằng ngày trong một đợt dịch: $I(t) = 500te^{-0.1t}$ (ca/ngày), $t \geq 0$ (ngày).

Phát biểu	Đ	S
a) Đỉnh dịch đạt vào ngày thứ 10.	☒	☐
b) Tổng số ca toàn đợt là 50000 ca.	☒	☐
c) Sau ngày thứ 20, số ca hằng ngày vẫn giảm nhưng tốc độ giảm bắt đầu chậm lại.	☒	☐
d) Số ca ngày thứ 30 nhiều hơn số ca ngày thứ 5.	☐	☒

Lời giải.

- a) **Đúng.** $I'(t) = 500e^{-0.1t}(1 - 0.1t) = 0 \Leftrightarrow t = 10$.
- b) **Đúng.** $\int_0^{+\infty} 500te^{-0.1t} dt = 500 \cdot \frac{1}{(0.1)^2} = 50000 \text{ ca}$.
- c) **Đúng.** Điểm uốn tại $t = 20$: $I''(20) = 0$, với $t > 20$ thì $I'' > 0$ – tốc độ giảm chậm dần.
- d) **Sai.** $I(5) = 2500e^{-0.5} \approx 1516$; $I(30) = 15000e^{-3} \approx 747$. Ngày 30 ít hơn ngày 5.


Câu 14. [Đường cong Laffer] Nguồn thu thuế theo thuế suất $r \in [0, 1]$: $T(r) = 81r(1 - r)^2$ (tỉ đồng).

Phát biểu	Đ	S
a) Mức thuế tối ưu là $r^* = \frac{1}{3}$ (khoảng 33.3%).	☒	☐
b) Nguồn thu cực đại là $T^* = 12$ tỉ đồng.	☒	☐
c) Tại mức thuế $r = \frac{1}{2}$, tăng thuế sẽ làm tăng thêm nguồn thu.	☐	☒
d) Cả $r = 0\%$ và $r = 100\%$ đều cho nguồn thu bằng 0.	☒	☐

Lời giải.

- a) **Đúng.** $T'(r) = 81(1-r)(1-3r) = 0 \Rightarrow r = \frac{1}{3}$.
- b) **Đúng.** $T\left(\frac{1}{3}\right) = 81 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{4}{9} = 12$ tỉ.
- c) **Sai.** $T'\left(\frac{1}{2}\right) = 81 \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{81}{4} < 0$ – tăng thuế làm **giảm** nguồn thu.
- d) **Đúng.** $T(0) = 0$; $T(1) = 81 \cdot 1 \cdot 0 = 0$.

Câu 15. [Dược học – Nồng độ thuốc] Nồng độ hoạt chất trong máu: $C(t) = 2te^{-0.5t}$ (mg/L), t (giờ).



Phát biểu	Đ	S
a) Nồng độ đỉnh đạt khoảng 1.47 mg/L vào giờ thứ 2.	☒	☐
b) Diện tích dưới đường cong AUC (tổng phơi nhiễm) bằng 4 mg·giờ/L.	☐	☒
c) Sau 6 giờ, nồng độ vẫn trên ngưỡng điều trị 0.5 mg/L.	☒	☐
d) Tại $t = 4$ giờ, thuốc đang đào thải với tốc độ khoảng 0.27 mg/L/giờ.	☒	☐

Lời giải.

- a) **Đúng.** $C'(t) = 2e^{-0.5t}(1 - 0.5t) = 0 \Rightarrow t = 2$. $C(2) = 4e^{-1} \approx 1.47$ mg/L.
- b) **Sai.** $AUC = \int_0^{+\infty} 2te^{-0.5t} dt = 2 \cdot \frac{1}{0.25} = 8$ mg·giờ/L, không phải 4.

- c) Đúng. $C(6) = 12e^{-3} \approx 0.597 > 0.5$ mg/L.
- d) Đúng. $|C'(4)| = |2e^{-2}(1-2)| = 2e^{-2} \approx 0.271$ mg/(L·giờ).

Câu 16. [Sinh thái – Khai thác bền vững] Quần thể cá: $\frac{dN}{dt} = 0.4N \left(1 - \frac{N}{2000}\right)$ (N : tấn, t : năm). Khai thác cố định H tấn/năm.

Phát biểu	Đ	S
a) Mức khai thác bền vững tối đa là $H^* = 200$ tấn/năm.	☒	☐
b) Để đạt MSY, cần duy trì quần thể ở mức $N = K = 2000$ tấn.	☐	☒
c) Nếu khai thác $H = 250 > H^*$, phương trình cân bằng vô nghiệm và quần thể sẽ sụp đổ.	☒	☐
d) Tốc độ tăng trưởng tự nhiên đạt cực đại khi $N = \frac{K}{4} = 500$ tấn.	☐	☒

Lời giải.

- a) Đúng. $H^* = \frac{rK}{4} = \frac{0.4 \times 2000}{4} = 200$ tấn/năm.
- b) Sai. Cần $N^* = \frac{K}{2} = 1000$ tấn (nửa sức chứa), không phải K .
- c) Đúng. Tại $H = 250$: $\Delta = r^2K^2 - 4rKH = 640000 - 800000 < 0$ – vô nghiệm thực.
- d) Sai. $f'(N) = r \left(1 - 2\frac{N}{K}\right) = 0 \Rightarrow N = \frac{K}{2} = 1000$, không phải $\frac{K}{4} = 500$.

PHẦN III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn (6 câu)

(6 câu)

Câu 17. [Tối ưu vị trí quan sát pa-nô] Một tấm pa-nô treo thẳng đứng: cạnh dưới cao $a = 4$ m, cạnh trên cao $b = 16$ m so với tầm mắt. Tìm khoảng cách x (mét) để góc nhìn $\alpha = \arctan\left(\frac{16}{x}\right) - \arctan\left(\frac{4}{x}\right)$ đạt lớn nhất. (Ghi kết quả dạng số nguyên.)

Đáp số:

Lời giải.

$$\tan \alpha = \frac{12x}{x^2 + 64}. \text{ Tối ưu } f(x) = \frac{12x}{x^2 + 64}.$$

$$f'(x) = \frac{12(64 - x^2)}{(x^2 + 64)^2} = 0 \Leftrightarrow x^2 = 64 \Leftrightarrow x = 8 \text{ m.}$$

Công thức tổng quát: $x^* = \sqrt{ab} = \sqrt{4 \times 16} = 8$ m. Góc cực đại: $\alpha_{\max} = \arctan\left(\frac{3}{4}\right) \approx 36.9^\circ$.

Câu 18. [Năng lượng tối thiểu drone] Drone có hàm năng lượng mỗi km: $e(v) = kv^2 + \frac{P_0}{v}$ J/km. Chứng minh vận tốc tối ưu là $v^* = \sqrt[3]{\frac{P_0}{2k}}$. Với $k = 1$, $P_0 = 128$: tính v^* (m/s) và $e_{\min}$ (J/km).

Đáp số: $v^* = 4 \text{ m/s}, e_{\min} = 48 \text{ J/km}$

Lời giải.

$$e'(v) = 2kv - \frac{P_0}{v^2} = 0 \Leftrightarrow v^3 = \frac{P_0}{2k} \Leftrightarrow v^* = \sqrt[3]{\frac{P_0}{2k}}. e'' > 0 \text{ xác nhận cực tiểu.}$$

$$\text{Với } k = 1, P_0 = 128: v^* = \sqrt[3]{64} = 4 \text{ m/s.}$$

$$e(4) = 16 + \frac{128}{4} = 16 + 32 = 48 \text{ J/km. Nhận xét: } e_{\text{cân}} = 16 = \frac{1}{2} \cdot 32 = \frac{1}{2} e_{\text{điện từ}}.$$

Câu 19. [Dịch tễ – Gánh nặng bệnh 30 ngày] Số ca mới: $I(t) = 1000te^{-\frac{t}{15}}$ (ca/ngày). Tính tổng số ca trong 30 ngày đầu: $G = \int_0^{30} I(t) dt$. Biểu diễn kết quả theo e^{-2} và ước lượng số.

Đáp số: $G = 1000(225 - 675e^{-2}) \approx 133900 \text{ ca}$

Lời giải.

$$\text{Tích phân từng phần: } \int te^{-\frac{t}{15}} dt = -(15t + 225)e^{-\frac{t}{15}} + C.$$

$$G = 1000 \left[-(15t + 225)e^{-\frac{t}{15}} \right]_0^{30} = 1000 [-(675)e^{-2} + 225] = 1000(225 - 675e^{-2}).$$

$$G \approx 1000(225 - 675 \times 0.135) \approx 1000 \times 133.9 \approx 133900 \text{ ca.}$$

$$\text{Tổng toàn đợt: } 1000 \times 15^2 = 225000 \text{ ca. Vậy } 59\% \text{ ca bệnh xảy ra trong 30 ngày đầu.}$$

Câu 20. [Công suất cực đại trong mạch điện] Nguồn điện $\varepsilon = 24 \text{ V}$, điện trở trong $r = 2 \Omega$. Công suất trên điện trở ngoài R : $P(R) = \frac{\varepsilon^2 R}{(R + r)^2}$. Tìm R để P cực đại. Tính $P_{\max}$ (W). Nhận xét gì về hiệu suất $\eta = \frac{P_{\max}}{P_{\text{cực đại lý thuyết}}}$?

Đáp số: $R = 2 \Omega, P_{\max} = 72 \text{ W}, \eta = 50\%$

Lời giải.

$$P'(R) = \varepsilon^2 \frac{(R + r)^2 - 2R(R + r)}{(R + r)^4} = \varepsilon^2 \frac{r - R}{(R + r)^3} = 0 \Leftrightarrow R = r = 2 \Omega.$$

$$P_{\max} = \frac{576 \times 2}{16} = 72 \text{ W.}$$

Định lý truyền công suất cực đại: P cực đại khi $R = r$ – điện trở ngoài bằng điện trở trong.

Tại $R = r$: dòng điện $I = \frac{\varepsilon}{2r}$, điện áp nguồn chia đôi cho r và R . Công suất nguồn $= \frac{\varepsilon^2}{2r} \times \frac{\varepsilon}{2r} \dots$
 Hiệu suất $= \frac{P}{P_{\text{tổng}}} = \frac{I^2 R}{I^2 (R + r)} = \frac{R}{R + r} = \frac{r}{2r} = 50\%$. Luôn đúng 50% tại điểm cực đại.

Câu 21. [Chứng minh MSY] Quần thể tôm hùm: $\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K}\right)$ với $r = 0.5$, $K = 4000$ tấn.
 Tìm mức khai thác bền vững tối đa H^* và chứng minh công thức $H^* = \frac{rK}{4}$.

Đáp số: $H^* = 500 \text{ tấn/năm}$


Lời giải.

Tốc độ tăng trưởng tự nhiên $f(N) = rN \left(1 - \frac{N}{K}\right)$ là parabol lõm. Cực đại tại $f'(N) = r \left(1 - 2\frac{N}{K}\right) = 0 \Leftrightarrow N^* = \frac{K}{2}$.

$H^* = f\left(\frac{K}{2}\right) = r \cdot \frac{K}{2} \cdot \left(1 - \frac{\frac{K}{2}}{K}\right) = r \cdot \frac{K}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{rK}{4}$. (Q.E.D.)

Với $r = 0.5$, $K = 4000$: $H^* = \frac{0.5 \times 4000}{4} = 500 \text{ tấn/năm}$. Quy mô tối ưu $N^* = 2000$ tấn.

Câu 22. [Tuyến cáp quang tối ưu] Đảo B cách bờ 5 km. Điểm A trên bờ cách điểm H (hình chiếu của B) là 12 km. Chi phí cáp: 3000 triệu/km dưới biển, 1500 triệu/km trên bờ. Gọi x (km) là khoảng cách từ H đến điểm M (cáp lên bờ). Tìm x để chi phí nhỏ nhất.



Đáp số: $x = \frac{5\sqrt{3}}{3} \approx 2.89 \text{ km}$

Lời giải.

$C(x) = 3000\sqrt{x^2 + 25} + 1500(12 - x)$.

$$C'(x) = \frac{3000x}{\sqrt{x^2 + 25}} - 1500 = 0 \Leftrightarrow \frac{x}{\sqrt{x^2 + 25}} = \frac{1}{2}.$$

$$4x^2 = x^2 + 25 \Leftrightarrow 3x^2 = 25 \Leftrightarrow x = \frac{5}{\sqrt{3}} = \frac{5\sqrt{3}}{3} \approx 2.89 \text{ km}.$$

Ý nghĩa hình học: $\sin \theta = \frac{1}{2} \Rightarrow \theta = 30^\circ$ – Nguyên lý Snell cho bài toán kinh tế! Tỉ số chi phí $\frac{1500}{3000} = \frac{1}{2}$ quyết định góc cáp vào bờ.