

Natureza Ondulatória da Luz

1. Quando determinadas quantidades de gás xenônio são adicionadas às luzes de néon, sua cor se torna azul-esverdeada. Se o comprimento de onda dessa luz é 480 nm, qual é a frequência?

Para calcular a frequência da luz, utilizamos a relação entre a velocidade da luz (c), o comprimento de onda (λ) e a frequência (f):

$$c = \lambda \times f$$

Sabemos que a velocidade da luz no vácuo é $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$ e o comprimento de onda é $\lambda = 480 \text{ nm}$. Representado por $480 \times 10^{-9} \text{ m}$. Portanto, a frequência f é dada por:

$$f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3,00 \times 10^8 \text{ m/s}}{480 \times 10^{-9} \text{ m}} = 6,25 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

A frequência da luz azul-esverdeada é $6,25 \times 10^{14} \text{ Hz}$.

2. Um laser infravermelho para uso de uma rede de comunicações de fibra ótica emite um comprimento de onda de 1,2 μm . Qual é a energia de um fóton para esta radiação?

Para calcular a energia de um fóton, utilizamos a equação de Planck:

$$E = h \times f$$

Onde E é a energia do fóton, h é a constante de Planck ($h = 6,626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$) e f é a frequência da radiação. Primeiro, calculamos a frequência f a partir do comprimento de onda $\lambda = 1,2 \mu\text{m} = 1,2 \times 10^{-6} \text{ m}$, utilizando a relação:

$$f = \frac{c}{\lambda}$$

Onde $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$ é a velocidade da luz. Substituindo os valores:

$$f = \frac{3,00 \times 10^8 \text{ m/s}}{1,2 \times 10^{-6} \text{ m}} = 2,50 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

Agora, calculamos a energia do fóton:

$$E = h \times f = 6,626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} \times 2,50 \times 10^{14} \text{ Hz} = 1,66 \times 10^{-19} \text{ J}$$

Portanto, a energia de um fóton para esta radiação é $1,66 \times 10^{-19} \text{ J}$.

3. Uma dada forma de radiação eletromagnética tem uma frequência de $8,11 \times 10^{14} \text{ s}^{-1}$.

- a) Qual o seu comprimento de onda em nanômetro?

Para calcular o comprimento de onda (λ), utilizamos a relação entre a velocidade da luz (c), a frequência (f) e o comprimento de onda:

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

Onde $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$ é a velocidade da luz e $f = 8,11 \times 10^{14} \text{ s}^{-1}$ é a frequência. Substituindo os valores:

$$\lambda = \frac{3,00 \times 10^8 \text{ m/s}}{8,11 \times 10^{14} \text{ s}^{-1}} = 3,699 \times 10^{-7} \text{ m}$$

Convertendo o comprimento de onda para nanômetros ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$):

$$\lambda = 3,699 \times 10^{-7} \times 10^9 = 3,69 \times 10^2 \text{ nm}$$

b) Qual a energia (em Joule) de um quantum dessa radiação?

A energia de um quantum (fóton) é dada pela equação de Planck:

$$E = h \times f$$

Onde $h = 6,626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ é a constante de Planck e $f = 8,11 \times 10^{14} \text{ s}^{-1}$ é a frequência. Substituindo os valores:

$$E = 6,626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} \times 8,11 \times 10^{14} \text{ s}^{-1} = 5,376 \times 10^{-19} \text{ J}$$

Arredondando para duas casas decimais, a energia de um quantum dessa radiação é $5,38 \times 10^{-19} \text{ J}$.

4. Uma análise espectral cuidadosa mostra que a luz amarela das lâmpadas de sódio (usadas nos postes de rua) é uma mistura de fótons de dois comprimentos de onda, $589,0 \text{ nm}$ e $589,6 \text{ nm}$. Qual é a diferença de energia (em Joule) entre os fótons com estes comprimentos de onda?

Para calcular a diferença de energia entre os fótons, primeiro determinamos a energia de cada fóton usando a equação de Planck:

$$E = \frac{h \cdot c}{\lambda}$$

Onde:

$h = 6,626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ é a constante de Planck.

$c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$ é a velocidade da luz.

λ é o comprimento de onda.

Para o comprimento de onda de $589,0 \text{ nm}$:

$$\lambda_1 = 589,0 \text{ nm} = 589,0 \times 10^{-9} \text{ m}$$

$$E_1 = \frac{6,626 \times 10^{-34} \times 3,00 \times 10^8}{589,0 \times 10^{-9}} = 3,375 \times 10^{-19} \text{ J}$$

Para o comprimento de onda de $589,6 \text{ nm}$:

$$\lambda_2 = 589,6 \text{ nm} = 589,6 \times 10^{-9} \text{ m}$$

$$E_2 = \frac{6,626 \times 10^{-34} \times 3,00 \times 10^8}{589,6 \times 10^{-9}} = 3,371 \times 10^{-19} \text{ J}$$

A diferença de energia entre os fótons é:

$$\Delta E = E_1 - E_2 = 3,375 \times 10^{-19} \text{ J} - 3,370 \times 10^{-19} \text{ J} = 4,00 \times 10^{-22} \text{ J}$$

Portanto, a diferença de energia entre os fótons com comprimentos de onda de $589,0 \text{ nm}$ e $589,6 \text{ nm}$ é $4,00 \times 10^{-22} \text{ J}$.

5. Calcule a frequência em Hertz, a energia em joules de um fóton de raios X que tem comprimento de onda de $2,70 \text{ \AA}$.

Para calcular a frequência e a energia do fóton, utilizamos as seguintes relações:

A frequência (f) é dada por:

$$f = \frac{c}{\lambda}$$

A energia (E) de um fóton é dada pela equação de Planck:

$$E = h \cdot f$$

Onde:

$c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$ é a velocidade da luz.

$h = 6,626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ é a constante de Planck.

λ é o comprimento de onda.

Primeiro, convertamos o comprimento de onda de angstroms (\AA) para metros (m):

$$\lambda = 2,70 \text{ \AA} = 2,70 \times 10^{-10} \text{ m}$$

Cálculo da frequência:

$$f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3,00 \times 10^8 \text{ m/s}}{2,70 \times 10^{-10} \text{ m}} = 1,11 \times 10^{18} \text{ Hz}$$

Cálculo da energia:

$$E = h \cdot f = 6,626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} \times 1,11 \times 10^{18} \text{ Hz} = 7,36 \times 10^{-16} \text{ J}$$

Portanto:

A frequência do fóton de raios X é $1,11 \times 10^{18} \text{ Hz}$.

A energia do fóton de raios X é $7,36 \times 10^{-16} \text{ J}$.

6. Analise as seguintes informações sobre a radiação eletromagnética e determine se são verdadeiras ou falsas. Se forem falsas, corrija-as.

- a) (V) Numa superfície metálica nenhum elétron é ejetado até que a radiação tenha frequência igual ou acima de um determinado valor, característico da ligação do elétron com o metal.

Justificativa: A afirmação é verdadeira, pois descreve corretamente o efeito fotoelétrico. Segundo esse fenômeno, a radiação incidente só pode ejetar elétrons de uma superfície metálica se sua frequência for maior ou igual à frequência de limiar, que depende da energia necessária para liberar o elétron do metal.

- b) (F) A energia de um fóton é diretamente proporcional ao comprimento de onda da radiação.

Justificativa: A afirmação é falsa. A energia de um fóton é inversamente proporcional ao comprimento de onda, como descrito pela fórmula $E = \frac{h \cdot c}{\lambda}$, onde h é a constante de Planck, c a velocidade da luz e λ o comprimento de onda. Isso significa que quanto maior o comprimento de onda, menor a energia do fóton.

- c) (F) Num espectro eletromagnético a faixa de frequência das radiações infravermelha e da ultravioleta é na ordem de 10^{14} s^{-1} e 10^{16} s^{-1} , respectivamente, portanto a radiação ultravioleta é de menor energia.

Justificativa: A afirmação é falsa. A radiação ultravioleta tem frequências mais altas do que a radiação infravermelha, o que implica em maior energia. De acordo com a fórmula $E = h \cdot f$, onde f é a frequência, a radiação ultravioleta possui maior energia do que a infravermelha, pois sua frequência é maior.

7. Calcule e compare a energia de um fóton de comprimento de onda de $3,3 \mu\text{m}$ com um de comprimento de onda de $0,154 \text{ nm}$.

Para calcular a energia de um fóton, utilizamos a equação de Planck:

$$E = \frac{h \cdot c}{\lambda}$$

Onde:

$h = 6,626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ é a constante de Planck.

$c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$ é a velocidade da luz.

λ é o comprimento de onda.

Fóton 1: Comprimento de onda de $3,3 \mu\text{m}$ Primeiro, convertamos o comprimento de onda de micrômetros (μm) para metros (m):

$$\lambda_1 = 3,3 \mu\text{m} = 3,3 \times 10^{-6} \text{ m}$$

Agora, calculamos a energia do fóton:

$$E_1 = \frac{6,626 \times 10^{-34} \times 3,00 \times 10^8}{3,3 \times 10^{-6}} = 6,02 \times 10^{-20} \text{ J}$$

Fóton 2: Comprimento de onda de $0,154 \text{ nm}$ Primeiro, convertamos o comprimento de onda de nanômetros (nm) para metros (m):

$$\lambda_2 = 0,154 \text{ nm} = 0,154 \times 10^{-9} \text{ m}$$

Agora, calculamos a energia do fóton:

$$E_2 = \frac{6,626 \times 10^{-34} \times 3,00 \times 10^8}{0,154 \times 10^{-9}} = 1,29 \times 10^{-15} \text{ J}$$

Comparação das energias:

A energia do fóton com comprimento de onda de $3,3 \mu\text{m}$ é $6,02 \times 10^{-20} \text{ J}$.

A energia do fóton com comprimento de onda de $0,154 \text{ nm}$ é $1,29 \times 10^{-15} \text{ J}$.

$$\frac{E_2}{E_1} = \frac{1,29 \times 10^{-15}}{6,02 \times 10^{-20}} = 2,14 \times 10^4$$

Portanto, o fóton com comprimento de onda de $0,154 \text{ nm}$ tem uma energia $2,14 \times 10^4$ vezes maior que o fóton com comprimento de onda de $3,3 \mu\text{m}$.

8. Calcule o comprimento de onda (em nanômetro) do fóton emitido quando o elétron do átomo de hidrogênio decai do nível $n = 5$ para o nível $n = 2$.

Para calcular o comprimento de onda do fóton emitido, utilizamos a fórmula de Rydberg para o átomo de hidrogênio:

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)$$

Onde:

λ é o comprimento de onda do fóton emitido.

$R_H = 1,097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$ é a constante de Rydberg para o hidrogênio.

$n_i = 5$ é o nível inicial.

$n_f = 2$ é o nível final.

Substituindo os valores na fórmula:

$$\frac{1}{\lambda} = 1,097 \times 10^7 \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{5^2} \right)$$

$$\frac{1}{\lambda} = 1,097 \times 10^7 \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{25} \right)$$

$$\frac{1}{\lambda} = 1,097 \times 10^7 (0,25 - 0,04)$$

$$\frac{1}{\lambda} = 1,097 \times 10^7 \times 0,21$$

$$\frac{1}{\lambda} = 2,3037 \times 10^6 \text{ m}^{-1}$$

Agora, calculamos o comprimento de onda λ :

$$\lambda = \frac{1}{2,3037 \times 10^6} = 4,34 \times 10^{-7} \text{ m}$$

Convertendo o comprimento de onda para nanômetros ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$):

$$\lambda = 4,34 \times 10^{-7} \text{ m} \times 10^9 \text{ nm/m} = 434 \text{ nm}$$

Apresentando o resultado em notação científica:

$$\lambda = 4,34 \times 10^2 \text{ nm}$$

Portanto, o comprimento de onda do fóton emitido é **434 nm** ou $4,34 \times 10^2 \text{ nm}$.

9. As cores de luz exibidas na queima de fogos de artifício dependem de certas substâncias utilizadas na sua fabricação. Sabe-se que a frequência da luz emitida pela combustão do níquel é $6,0 \times 10^{14} \text{ Hz}$ e que a velocidade da luz é $3 \times 10^8 \text{ m/s}$. Com base nesses dados e no espectro visível fornecido pela figura a seguir, diga qual a cor da luz dos fogos de artifício que contêm compostos de níquel.

Para determinar a cor da luz emitida pelo níquel, primeiro calculamos seu comprimento de onda utilizando a relação entre a velocidade da luz c , o comprimento de onda λ e a frequência f :

$$c = \lambda \cdot f$$

Isolando o comprimento de onda:

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

Substituindo os valores:

$$\lambda = \frac{3,0 \times 10^8 \text{ m/s}}{6,0 \times 10^{14} \text{ Hz}}$$

$$\lambda = 5,0 \times 10^{-7} \text{ m}$$


Convertendo para nanômetros ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$):

$$\lambda = 5,0 \times 10^{-7} \text{ m} \times 10^9 \text{ nm/m}$$

$$\lambda = 500 \text{ nm}$$

Consultando o espectro visível, a luz com comprimento de onda em torno de 500 nm corresponde à cor verde.

Espectro Visível



10. Um átomo de hidrogênio está em um estado excitado com $n = 2$, com uma energia $E_2 = -3,4\text{eV}$. Ocorre uma transição para o estado $n = 1$, com energia $E_1 = -13,6\text{eV}$, e um fóton é emitido. Qual a frequência da radiação emitida em Hz? (Dados: $1\text{eV} = 1,6 \times 10^{-19}\text{J}$; $h = 6,63 \times 10^{-34}\text{Js}$.)

Para calcular a frequência da radiação emitida, utilizamos a diferença de energia entre os estados $n = 2$ e $n = 1$ e a relação de Planck:

$$E = h \cdot f$$

Onde:

E é a energia do fóton emitido.

$h = 6,63 \times 10^{-34}\text{Js}$ é a constante de Planck.

f é a frequência da radiação emitida.

A diferença de energia (ΔE) entre os estados $n = 2$ e $n = 1$ é:

$$\Delta E = E_1 - E_2 = -13,6\text{eV} - (-3,4\text{eV}) = -10,2\text{eV}$$

Como a energia do fóton emitido é positiva, consideramos o valor absoluto:

$$\Delta E = 10,2\text{eV}$$

Convertemos a energia de elétron-volts (eV) para joules (J) usando a conversão $1\text{eV} = 1,6 \times 10^{-19}\text{J}$:

$$\Delta E = 10,2\text{eV} \times 1,6 \times 10^{-19}\text{J/eV} = 1,632 \times 10^{-18}\text{J}$$

Agora, calculamos a frequência da radiação emitida usando a relação de Planck:

$$f = \frac{\Delta E}{h} = \frac{1,632 \times 10^{-18}\text{J}}{6,63 \times 10^{-34}\text{Js}} = 2,46 \times 10^{15}\text{Hz}$$

Portanto, a frequência da radiação emitida é $2,46 \times 10^{15}\text{Hz}$.

11. Calcule o comprimento de onda de De Broglie, em nanômetros, associado a uma bola de futebol, com massa de 400 g que se desloca a uma velocidade de 10 m/s.

Para calcular o comprimento de onda de De Broglie, utilizamos a fórmula:

$$\lambda = \frac{h}{mv}$$

Onde:

$h = 6,626 \times 10^{-34}\text{J} \cdot \text{s}$ é a constante de Planck;

$m = 400\text{g} = 0,400\text{kg}$ é a massa da bola de futebol;

$v = 10\text{m/s}$ é a velocidade da bola.

Substituindo os valores:

$$\lambda = \frac{6,626 \times 10^{-34}}{0,400 \times 10} = \frac{6,626 \times 10^{-34}}{4}$$

$$\lambda = 1,6565 \times 10^{-34}\text{m}$$

Convertendo para nanômetros ($1\text{nm} = 10^{-9}\text{m}$):

$$\lambda = 1,6565 \times 10^{-34}\text{m} \times 10^9\text{nm/m} = 1,6565 \times 10^{-25}\text{nm}$$

Portanto, o comprimento de onda de De Broglie associado à bola de futebol é $1,66 \times 10^{-25}\text{nm}$.

12. Um elétron se move a velocidade igual a $4,7 \times 10^6$ m/s. Determine o comprimento de onda de De Broglie, em nanômetro, para esse elétron. Obs.: apresentar todas as unidades durante as operações.

Para determinar o comprimento de onda de De Broglie, utilizamos a fórmula:

$$\lambda = \frac{h}{mv}$$

Onde:

$h = 6,626 \times 10^{-34}$ J·s é a constante de Planck;

$m = 9,11 \times 10^{-31}$ kg é a massa do elétron;

$v = 4,7 \times 10^6$ m/s é a velocidade do elétron.

Substituindo os valores na fórmula:

$$\lambda = \frac{6,626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}}{9,11 \times 10^{-31} \text{ kg} \times 4,7 \times 10^6 \text{ m/s}}$$

Calculando o denominador:

$$9,11 \times 10^{-31} \text{ kg} \times 4,7 \times 10^6 \text{ m/s} = 4,2817 \times 10^{-24} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

Assim:

$$\lambda = \frac{6,626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}}{4,2817 \times 10^{-24} \text{ kg} \cdot \text{m/s}} = 1,548 \times 10^{-10} \text{ m}$$

Convertendo para nanômetros ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$):

$$\lambda = 1,548 \times 10^{-10} \text{ m} \times 10^9 \text{ nm} = 1,548 \times 10^{-1} \text{ nm}$$

Portanto, o comprimento de onda de De Broglie para esse elétron é $0,1548 \text{ nm}$ ou $1,548 \times 10^{-1} \text{ nm}$.

Números Quânticos

13. Um orbital tem números quânticos de $n = 4$, $l = 2$, $m_l = -1$. Que tipo de orbital é esse?
14. Qual é o número máximo de elétrons em um átomo que podem ter os seguintes números quânticos:
- $n = 4$, $l = 3$, $m_l = -3$, $m_s = -1/2$.
 - $n = 2$, $l = 1$, $m_l = 0$, $m_s = -1/2$.
15. Escreva um conjunto completo de números quânticos (n , l , m_l , m_s) permitidos pela teoria quântica para cada um dos seguintes orbitais:
- $2p^2$
 - $4f^{12}$
16. Qual o número máximo de elétrons no orbital que podem ser identificados a cada um dos seguintes conjuntos de número quânticos:
- $n = 6$, $l = 1$, $m_l = -1$
 - $n = 3$, $l = 3$, $m_l = -3$
17. Um elétron num certo átomo está no nível quântico $n = 2$. Indique os valores possíveis de l e m_l .

18. Indique qual (ais) dos seguintes conjuntos dos números quânticos para um átomo é (são) inaceitável (eis) e explique por quê.
- a) $(3, 0, 0, +1/2)$
 - b) $(2, 2, 1, +1/2)$
 - c) $(4, 3, -2, +1/2)$
19. Qual é a designação (notação) para o subnível $n = 5$ e $l = 1$? Quantos orbitais existem nesse subnível e indique os valores de m_l para cada um desses orbitais.
20. Em relação aos números quânticos responda:
- a) A notação da subcamada e o número de orbitais para: $\{n = 6, l = 1\}$, $\{n = 5, l = 3\}$, $\{n = 4, l = 2\}$.
 - b) A ordem crescente de energia dos conjuntos de número quânticos de (a).
21. Com relação aos números quânticos responda:
- a) O número de elétrons no orbital p do terceiro nível do elemento de número atômico 16.
 - b) O conjunto dos quatro números quânticos para o último elétron de um átomo neutro, cuja configuração é: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$.
22. Quais são os quatro números quânticos do último elétron representado, seguindo a regra de Hund, ao efetuar a representação gráfica de 9 elétrons no subnível $4f$?
23. Qual o conjunto dos quatro números quânticos para o elétron diferenciador do íon $^{20}\text{Ca}^{+2}$?