




មេរៀន ចំនួនកុំផ្លិច Complex Numbers

១. ទម្រង់ពិជគណិត (Algebraic Form)



ទម្រង់ពិជគណិត:  $z = a + bi$  ដែល  $a, b \in \mathbb{R}$

- $a$  ផ្នែកពិត (Real part)
- $b$  ផ្នែកនិម្មិត (Imaginary part)
- ឯកតានិម្មិត:  $i^2 = -1$  ( $i = \sqrt{-1}$ )
- ស្វ័យគុណនៃ  $i$ :  $i^{4k} = 1, i^{4k+r} = i^r$
- ចំនួននិមិត្ត:  $\sqrt{-C} = \sqrt{C}i$
- ចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់:  $\bar{z} = a - bi$
- បើ  $X + Yi = a + bi \Leftrightarrow \begin{cases} X = a \\ Y = b \end{cases}$
- បើ  $z = a + bi$  ជាចំនួនពិត  $\Leftrightarrow b = 0$
- បើ  $z = a + bi$  ជាចំនួននិមិត្ត  $\Leftrightarrow a = 0$

២. ប្រមាណវិធីនៃទម្រង់ពិជគណិត

បើ  $z_1 = a + bi$  និង  $z_2 = c + di$ :

- វិធីបូក/ដក:  $z_1 \pm z_2 = (a \pm c) + (b \pm d)i$
- វិធីគុណ:  $z_1 \cdot z_2 = (ac - bd) + (ad + bc)i$
- វិធីចែក:  $\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \cdot \bar{z}_2}{z_2 \cdot \bar{z}_2} = \frac{(a + bi)(c - di)}{c^2 + d^2}$

៣. សមីការដឺក្រេទី២ (Quadratic Equations)


មានរាងទូទៅ  $az^2 + bz + c = 0$  (ដែល  $a \neq 0$  និង  $a, b, c \in \mathbb{R}$ ) ។ គណនាឌីសក្រីមីណង់  $\Delta = b^2 - 4ac$ :

- បើ  $\Delta < 0$ : មានបូសជាចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់គ្នាពីរគឺ:

$$z_1 = \frac{-b - i\sqrt{|\Delta|}}{2a}, \quad z_2 = \frac{-b + i\sqrt{|\Delta|}}{2a}$$

៤. ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

$\Im(z)$  (ផ្នែកនិម្មិត)



- ម៉ូឌុល:  $r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$  ដែល  $r > 0$
- អាកុយម៉ង់  $\theta$ : រកតាម  $\cos \theta = \frac{a}{r}$  និង  $\sin \theta = \frac{b}{r}$
- ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ:  $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$

| សញ្ញារបស់ $(a, b)$ | ទីតាំងកាត្រង់ | រកមុំរហ័ស $(\theta)$    |
|--------------------|---------------|-------------------------|
| $(+, +)$           | កាត្រង់ទី I   | $\theta = \alpha$       |
| $(-, +)$           | កាត្រង់ទី II  | $\theta = \pi - \alpha$ |
| $(-, -)$           | កាត្រង់ទី III | $\theta = \pi + \alpha$ |
| $(+, -)$           | កាត្រង់ទី IV  | $\theta = -\alpha$      |

ករណីពិសេស (ភ្នែកទិព្វ)

$$\begin{aligned}
 z &= a \quad (a > 0) \implies \theta = 0 \\
 z &= -a \quad (a > 0) \implies \theta = \pi \\
 z &= bi \quad (b > 0) \implies \theta = \frac{\pi}{2} \\
 z &= -bi \quad (b > 0) \implies \theta = -\frac{\pi}{2}
 \end{aligned}$$

៥. លក្ខណៈម៉ូឌុល

- $|z| = |\bar{z}| = |-z|$
- $\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$
- $|z^n| = |z|^n$
- $|z|^2 = z \cdot \bar{z}$
- $|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$
- $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$

៦. លក្ខណៈអាកុយម៉ង់

- $\arg(z_1 \cdot z_2) = \arg(z_1) + \arg(z_2) + 2k\pi$
- $\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \arg(z_1) - \arg(z_2) + 2k\pi$
- $\arg(z^n) = n \cdot \arg(z) + 2k\pi$
- $\arg(\bar{z}) = -\arg(z) + 2k\pi$

៧. ប្រមាណវិធីនៃទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

បើ  $z_1 = r_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1)$ ;  $z_2 = r_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2)$

- $z_1 \cdot z_2 = r_1 r_2 [\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2)]$
- $\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} [\cos(\theta_1 - \theta_2) + i \sin(\theta_1 - \theta_2)]$

៨. រូបមន្តសំខាន់ៗបំផុត (ត្រូវតែចាំ)


- រូបមន្តដឺម៉រ  $z^n = r^n(\cos n\theta + i \sin n\theta)$
- រូបមន្តអឺល័រ:  $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$
- បូសទី  $n$  នៃចំនួនកុំផ្លិច (n-th Roots):  

$$w_k = \sqrt[n]{r} \left[ \cos\left(\frac{\theta + 2k\pi}{n}\right) + i \sin\left(\frac{\theta + 2k\pi}{n}\right) \right]$$
 ដោយ  $k = 0, 1, 2, \dots, n - 1$

៨. រូបមន្តត្រីកោណមាត្រសំខាន់ៗ

- $1 + \cos \theta = 2 \cos^2 \frac{\theta}{2}$ ;  $1 - \cos \theta = 2 \sin^2 \frac{\theta}{2}$
- $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$
- $\sin \theta = 2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}$
- $\sin k\pi = 0$
- និង  $\cos k\pi = \begin{cases} 1 & k : \text{គូ} \\ -1 & k : \text{សេស} \end{cases}$
- $\sin(2k\pi + \theta) = \sin \theta$
- $\cos(2k\pi + \theta) = \cos \theta$
- $\cos x = \cos a$  នោះ  $x = \pm a + 2k\pi$
- $\sin x = \sin a$  នោះ  $\begin{cases} x = a + 2k\pi \\ x = \pi - a + 2k\pi \end{cases}$

ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ





មេរៀន លីមីតនៃអនុគមន៍ Limit of Function

រាងមិនកំណត់គ្រិះ

មាន ៤ រាងសំខាន់ៗដែលជួបញឹកញាប់៖

0/0, ∞/∞, 0 × ∞, (+∞ - ∞)

និងរាងស្វ័យគុណមិនកំណត់៖

1^∞, 0^0, ∞^0

- ±∞ + c = ∞ (បូកថែមប៉ុន្មានក៏នៅតែអនន្ត)
• ∞ + ∞ = ∞
• -∞ - c = -∞
• -∞ - ∞ = -∞
• បើ c > 0 នោះ c · ∞ = ∞
• បើ c < 0 នោះ c · ∞ = -∞
• (+∞) · (+∞) = +∞
• -∞ · (+∞) = -∞
• (-∞) · (-∞) = ∞
• c/±∞ = 0 (ចំនួនពិតថេរនិងអនន្ត ស្មើសូន្យ)
• c/±∞ = 0
• បើ c > 0 នោះ ∞/c = ∞
• បើ c < 0 នោះ ∞/c = -∞
• បើ c > 0 នោះ (+∞)^c = +∞
• បើ c < 0 នោះ (+∞)^c = 0
• បើ c > 1 នោះ c^(+∞) = ∞
• បើ 0 < c < 1 នោះ c^(+∞) = 0

១. លីមីតរាងមិនកំណត់

លីមីតរាងមិនកំណត់ 0/0 គន្លឹះ៖ ត្រូវដាក់ភាគយក និងភាគបែង ជា ផលគុណ កត្តា ដើម្បីសម្រួល កត្តាដែលស្មើ 0 ចោល (កត្តា (x-a)) ។

- a^2 - 1 = (a - 1)(a + 1)
• a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)
• a^3 ± b^3 = (a ± b)(a^2 ∓ ab + b^2)
• a^n - 1 = (a - 1)(a^{n-1} + ... + a + 1)
• a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + ... + b^{n-1})
• បើ n = 3, 5, 7, ... ស៊េស៖
a^n + b^n = (a + b)(a^{n-1} - a^{n-2}b + ... + b^{n-1})

លីមីតរាងមិនកំណត់ 0/0 (មានវ៉ាឌីកាល់/ប្រូស)

- គន្លឹះ៖ គុណនិងកន្សោមផ្លាស់ប្តូរធាតុបូស ។
- √A - B ត្រូវគុណនឹង √A + B
- √[3]{A} - B ត្រូវគុណនឹង √[3]{A^2} + √[3]{A} · B + B^2
- √[3]{A} + B ត្រូវគុណនឹង √[3]{A^2} - √[3]{A} · B + B^2
• បើរាង lim\_{x→∞} f(x)/g(x) មើលតួមានដឺក្រេខ្ពស់ជាងគេ ។
• បើដឺក្រេលើ = ដឺក្រេក្រោម៖ lim\_{x→∞} (ax^n + ...)/(px^n + ...) = a/p
• បើដឺក្រេលើ < ដឺក្រេក្រោម៖ lim\_{x→∞} f(x)/g(x) = 0
• បើ កន្សោម ជាប់ វ៉ាឌីកាល់ ត្រូវ គុណ ភាគយក និង ភាគបែងនិងកន្សោមផ្លាស់ប្តូរធាតុបូស ។

• ករណីបញ្ចេញពីវ៉ាឌីកាល់

√(ax^2 + bx + c) = |x|√(a + b/x + c/x^2)

២. លីមីតនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រសំខាន់ៗ

- lim\_{x→0} sin x / x = 1 ⇒ lim\_{x→0} sin ax / ax = 1
• lim\_{x→0} tan x / x = 1 ⇒ lim\_{x→0} tan ax / ax = 1
• lim\_{x→0} (1 - cos x) / x = 0 ⇒ lim\_{x→0} (1 - cos ax) / x = 0
• lim\_{x→0} (1 - cos x) / x^2 = 1/2 ⇒ lim\_{x→0} (1 - cos ax) / x^2 = a^2/2
• lim\_{x→a} sin[u(x)] / u(x) = 1 ; lim\_{x→a} (1 - cos[u(x)]) / u(x) = 0

៣. លីមីតអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល (e^x)

- lim\_{x→0} (e^x - 1) / x = 1 ⇒ lim\_{x→0} (e^{u(x)} - 1) / u(x) = 1
• lim\_{x→+∞} e^x = +∞ និង lim\_{x→-∞} e^x = 0
• lim\_{x→+∞} e^x / x^n = +∞ និង lim\_{x→+∞} x^n / e^x = 0
• lim\_{x→-∞} x^n e^x = 0 បើ x→+∞ [e^x > x^n > ln x]
• lim\_{x→0} (1 + x)^{1/x} = e ; lim\_{x→±∞} (1 + 1/x)^x = e
• lim\_{x→0} [1 + u(x)]^{1/u(x)} = e
• រ៉ឺធីរ៉ាសៈ lim\_{x→x\_0} f(x)^{g(x)} = e^{lim\_{x→x\_0} g(x)[f(x)-1]} \*

៥. លីមីតនៃអនុគមន៍លោការីត

- lim\_{x→0} ln(1+x)/x = 1 និង lim\_{x→0} ln(1+u(x))/u(x) = 1
• lim\_{x→+∞} ln x / x^n = 0 និង lim\_{x→+∞} x^n / ln x = +∞; (n>0)
• lim\_{x→0+} x^n ln x = 0 (n > 0); lim\_{x→0+} ln x / x^n = -∞
• ln e = 1, ln 1 = 0, ln 2 = 0.7, ln 3 = 1.1
• ln(0+) → -∞ និង ln(+∞) → +∞
• ln(ab) = ln a + ln b និង ln(a/b) = ln a - ln b
• ln(a^r) = r ln a និង e^{ln a} = a


រូបមន្តត្រីកោណមាត្រសំខាន់ៗ៖

- cos(2x) = cos^2 x - sin^2 x
• cos(2x) = 1 - 2 sin^2 x = 2 cos^2 x - 1
• 1 - cos x = 2 sin^2 (x/2)
• 1 - cos 2x = 2 sin^2 x
• cos p + cos q = 2 cos((p+q)/2) cos((p-q)/2)
• cos p - cos q = -2 sin((p+q)/2) sin((p-q)/2)
• sin p + sin q = 2 sin((p+q)/2) cos((p-q)/2)
• sin p - sin q = 2 sin((p-q)/2) cos((p+q)/2)
• tan p ± tan q = sin(p ± q) / cos p cos q



មេរៀន ភាពជាប់នៃអនុគមន៍ Continuity Function

១. ភាពជាប់ត្រង់មួយចំណុច



$y = f(x)$  ជាប់ត្រង់  $x = c$  លុះត្រាតែ៖

- $f$  កំណត់ចំពោះ  $x = c$
- $f$  មានលីមីត ពេល  $x \rightarrow c$
- $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$

សំគាល់៖ អនុ.  $f$  មានលីមីតត្រង់  $x = c$  កាលណា


$$\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow c^+} f(x)$$

២. លក្ខណៈនៃអនុគមន៍ជាប់


បើអនុគមន៍  $f$  និង  $g$  ជាប់ត្រង់  $x = c$  គេបាន៖

- $f(x) + g(x)$  ជាអនុគមន៍ ជាប់ត្រង់  $x = c$
- $f(x) - g(x)$  ជាអនុគមន៍ ជាប់ត្រង់  $x = c$
- $f(x) \cdot g(x)$  ជាអនុគមន៍ ជាប់ត្រង់  $x = c$
- $Kf(x)$  ជាអនុ. ជាប់ត្រង់  $x = c$
- $\frac{f(x)}{g(x)}$  ជាអនុ. ជាប់ត្រង់  $x = c$  ដែល  $g(c) \neq 0$

៣. ភាពជាប់លើចន្លោះ



$f$  ជាប់លើចន្លោះបើក  $(a, b)$  លុះត្រាតែ៖  
 $f$  ជាប់ត្រង់គ្រប់ចំណុច  $x_0$  ស្ថិតក្នុងចន្លោះបើក  $(a, b)$   
គឺ  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$  ចំពោះគ្រប់  $x_0 \in (a, b)$




$f$  ជាប់លើចន្លោះបិទ  $[a, b]$  លុះត្រាតែ៖  
1.  $f$  ជាប់លើចន្លោះបើក  $(a, b)$   
2.  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$   
3.  $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$

៤. ភាពជាប់នៃអនុគមន៍បណ្តាក់

បើអនុគមន៍  $g$  ជាប់ត្រង់  $c$  និងអនុ.  $f$  ជាប់ត្រង់  $g(c)$  នោះអនុ.បណ្តាក់  $(f \circ g)(x) = f[g(x)]$  ជាប់ត្រង់  $c$  ។


៥. អនុគមន៍បន្លាយតាមភាពជាប់




- បើ  $f$  ជាអនុគមន៍មិនកំណត់ត្រង់  $x = a$  និងមាន  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$  នោះអនុគមន៍បន្លាយនៃ  $f$  តាមភាពជាប់ត្រង់  $x = a$  កំណត់ដោយ៖

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & , x \neq a \\ L & , x = a \end{cases}$$


៦. ទ្រឹស្តីបទកន្លែងកណ្តាល



ដោយ  $f$  ជាប់លើ  $[a, b]$  និង  $f(a) < K < f(b)$  នោះមានយ៉ាងហោចណាស់  $c \in [a, b]$  មួយ ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់  $f(c) = K$  ។



- $f$  ជាប់លើចន្លោះបិទ  $[a, b]$
- $(f(a) \cdot f(b) < 0) \Rightarrow$  មានចំនួនពិត  $c \in (a, b)$  យ៉ាងហោចណាស់មួយដែល  $f(c) = 0$



- $f$  ជាប់លើចន្លោះបិទ  $[a, b]$
- $f(a) \cdot f(b) < 0$  (សញ្ញាផ្ទុយគ្នា)
- $f$  ជាអនុ.កើនដាច់ខាត ឬ ចុះដាច់ខាតលើ  $[a, b]$   
 $\Rightarrow$  សមីការ  $f(x) = 0$  មានឫស  $c \in (a, b)$  តែមួយគត់


ប្រភេទអនុគមន៍សំខាន់ៗ

- អនុគមន៍ ពហុធា  $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$  និង  $f(x) = \sin(x)$  និង  $g(x) = \cos(x)$  ជាប់លើ សំណុំចំនួនពិត  $\mathbb{R}$  ។
- អនុ.សនិទាន  $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ ;  $Q(x) \neq 0$
- អនុ.អសនិទាន  $f(x) = \sqrt{g(x)}$ ;  $g(x) \geq 0$
- អនុ.លោការីតនេព័យ  $y = \ln[f(x)]$ ;  $f(x) > 0$



មេរៀន ដេរីវេនៃអនុគមន៍ Continuity Function

១. ដេរីវេនៃអនុគមន៍  $x_0$



ដេរីវេត្រង់  $x_0$  នៃអនុគមន៍  $y = f(x)$  ជាលីមីតនៃ ផលធៀបកំណើនកាលណា  $\Delta x$  ខិតជិត ០ ។ គេសរសេរ៖

$$y'_0 = f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} ; h = x - x_0$$

២. លក្ខខណ្ឌដេរីវេរួច និងដេរីវេស្តាំ

គេតាង  $f'_-(a)$  ជាដេរីវេខាងឆ្វេង និង  $f'_+(a)$  ជាដេរីវេខាងស្តាំ៖

• ដេរីវេឆ្វេង៖  $f'_-(a) = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$

• ដេរីវេស្តាំ៖  $f'_+(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$

សន្និដ្ឋាន៖

1. អនុគមន៍  $f$  មានដេរីវេត្រង់  $x = a$  លុះត្រាតែ  $f'_-(a) = f'_+(a)$  ។ បើ វាខុសគ្នា នោះ អនុគមន៍គ្មានដេរីវេត្រង់  $x = a$  ទេ ។

2.  $f$  មានដេរីវេត្រង់  $x_0 = a$  នោះ  $f$  ជាប់ត្រង់  $x_0 = a$  ។

៣. ដេរីវេនៃអនុគមន៍បណ្តាក់

បើ  $y = f(u)$  និង  $u = g(x)$  នោះ  $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \times \frac{du}{dx}$

៤. រូបមន្តដេរីវេនៃអនុគមន៍សំខាន់ៗ

•  $y = c \implies y' = 0$  ;  $k$ : ថេរ

•  $y = x \implies y' = 1$  ;  $x$ : អថេរ

•  $y = x^n \implies y' = nx^{n-1}$

•  $y = \frac{1}{x} \implies y' = -\frac{1}{x^2}$

•  $y = \frac{1}{x^n} \implies y' = -\frac{n}{x^{n+1}}$

•  $y = \sqrt{x} \implies y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$

•  $y = k \cdot u \implies y' = k \cdot u'$

•  $y = u \pm v \implies y' = u' \pm v'$

•  $y = u \cdot v \implies y' = u' \cdot v + v' \cdot u$

•  $y = \frac{u}{v} \implies y' = \frac{u'v - v'u}{v^2}$

•  $y = \frac{c}{v} \implies y' = -\frac{cv'}{v^2}$  ;  $c$ : ថេរ

•  $y = u^n \implies y' = nu'u^{n-1}$

•  $y = \frac{1}{u^n} \implies y' = -\frac{nu'}{u^{n+1}}$

•  $y = \frac{1}{u} \implies y' = -\frac{u'}{u^2}$

•  $y = \sqrt{u} \implies y' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$

៥. ដេរីវេអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

•  $y = \sin x \implies y' = \cos x$

•  $y = \cos x \implies y' = -\sin x$

•  $y = \tan x \implies y' = 1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$

•  $y = \cot x \implies y' = -(1 + \cot^2 x) = -\frac{1}{\sin^2 x}$

•  $y = \sin u \implies y' = u' \cos u$

•  $y = \cos u \implies y' = -u' \sin u$

•  $y = \tan u \implies y' = u'(1 + \tan^2 u) = \frac{u'}{\cos^2 u}$

•  $y = \cot u \implies y' = -u'(1 + \cot^2 u) = -\frac{u'}{\sin^2 u}$

៦. ដេរីវេនៃអនុ.អិចស្ប៉ូ. និងលោការីត

•  $y = e^x \implies y' = e^x$

•  $y = e^u \implies y' = u'e^u$

•  $y = a^u \implies y' = a^u \ln a$

•  $y = \ln x \implies y' = \frac{1}{x}$

•  $y = \ln u \implies y' = \frac{u'}{u}$

•  $y = \log_a u \implies y' = \frac{u'}{u \ln a}$

៧. ដេរីវេលំដាប់ ២

ដេរីវេលំដាប់ ២ នៃអនុគមន៍  $y = f(x)$  គឺជាដេរីវេនៃ  $y'$  កំណត់តាងដោយ  $y''$  ឬ  $f''(x)$  ឬ  $\frac{d^2y}{dx^2}$  ។

៨. ដេរីវេលំដាប់ខ្ពស់

ដេរីវេលំដាប់ខ្ពស់ តាង  $f', f'', \dots, f^{(n)}$

ដេរីវេលំដាប់ខ្ពស់  $f^{(n)}(x), \frac{d^n}{dx^n} [f(x)]$  ឬ  $y^{(n)}$

•  $\frac{d^n}{dx^n} \left[ \frac{1}{ax+b} \right] = \frac{(-1)^n \cdot n! \cdot a^n}{(ax+b)^{n+1}}$

•  $\frac{d^n}{dx^n} [e^{(ax+b)}] = a^n e^{ax+b}$

•  $\frac{d^n}{dx^n} [\sin(ax+b)] = a^n \sin \left( ax+b + \frac{n\pi}{2} \right)$

•  $\frac{d^n}{dx^n} [\cos(ax+b)] = a^n \cos \left( ax+b + \frac{n\pi}{2} \right)$


៩. ដេរីវេនៃអនុគមន៍ច្រាស់

ដេរីវេនៃអនុ.ច្រាស់  $\frac{d}{dx} (f^{-1}(x)) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$

| ដេរីវេអនុគមន៍ច្រាស់របស់អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ |                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ដែន                                        | ដេរីវេ                                                    |
| $ x  < 1$                                  | $\frac{d}{dx} (\sin^{-1} x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$     |
| $ x  < 1$                                  | $\frac{d}{dx} (\cos^{-1} x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$    |
| $x \in \mathbb{R}$                         | $\frac{d}{dx} (\tan^{-1} x) = \frac{1}{1+x^2}$            |
| $x \in \mathbb{R}$                         | $\frac{d}{dx} (\cot^{-1} x) = -\frac{1}{1+x^2}$           |
| $ x  > 1$                                  | $\frac{d}{dx} (\sec^{-1} x) = \frac{1}{ x \sqrt{x^2-1}}$  |
| $ x  > 1$                                  | $\frac{d}{dx} (\csc^{-1} x) = -\frac{1}{ x \sqrt{x^2-1}}$ |



មេរៀន អនុវត្តជីវិត Application of Derivative



- មេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ប៉ះក្រាប (C) :  $y = f(x)$  ត្រង់  $x_0$  គឺ  $a = f'(x_0)$
- សមីការបន្ទាត់ប៉ះត្រង់អាបស៊ីស  $x_0$  គឺ (T) :  $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$

២. ភាពកើន និងចុះនៃអនុគមន៍ (Monotonicity)

គេប្រើដេរីវេទី១  $f'(x)$  ដើម្បីកំណត់ទិសដៅអថេរភាពរបស់អនុគមន៍លើចន្លោះ  $I$  ៖

- បើ  $f'(x) > 0$  លើ  $I \Rightarrow f$  ជាអនុ.កើន។
- បើ  $f'(x) < 0$  លើ  $I \Rightarrow$  អនុ.  $f$  ជាអនុ.ចុះ។
- បើ  $f'(x) = 0$  លើ  $I \Rightarrow f$  ជា អនុ.ថេរ។

លក្ខណៈ អនុគមន៍កើន និងអនុគមន៍ចុះ

| ប្រភេទអនុ. | លក្ខខណ្ឌប្រៀបធៀប                   |
|------------|------------------------------------|
| អនុគមន៍កើន | បើ $x > a \Rightarrow f(x) > f(a)$ |
| អនុគមន៍ចុះ | បើ $x > a \Rightarrow f(x) < f(a)$ |

៣. មហាធៀប

បើ  $f$  មានដេរីវេលើ  $I$  បើ  $f$  មានមហាធៀបត្រង់  $x_0$  នោះ  $f'(x_0) = 0$  ។

- បើ  $f'(x) = 0$  ប្តូរសញ្ញាពី (+)  $\rightarrow$  (-) ត្រង់  $x = x_0$  នោះអនុ.  $f$  មានតម្លៃអតិបរមាលើ  $y = f(x_0)$  ។

|         |               |       |           |
|---------|---------------|-------|-----------|
| $x$     | $-\infty$     | $x_0$ | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | +             | 0     | -         |
| $f(x)$  | $f(x_0)$ -អតិ |       |           |

- បើ  $f'(x) = 0$  ប្តូរសញ្ញាពី (-)  $\rightarrow$  (+) ត្រង់  $x = x_0$  នោះអនុ.  $f$  មានតម្លៃអប្បបរមាលើ  $y = f(x_0)$  ។

|         |                |       |           |
|---------|----------------|-------|-----------|
| $x$     | $-\infty$      | $x_0$ | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | -              | 0     | +         |
| $f(x)$  | $f(x_0)$ -អប្ប |       |           |

- តារាងអថេរភាព៖ អនុគមន៍កើនដាច់ខាត


|         |           |           |
|---------|-----------|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | +         |           |
| $f(x)$  | $-\infty$ | $+\infty$ |

- តារាងអថេរភាព៖ អនុគមន៍ចុះដាច់ខាត


|         |           |           |
|---------|-----------|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | -         |           |
| $f(x)$  | $+\infty$ | $-\infty$ |

៤. ភាពមានមហាត្រង់  $x_0$

$f$  មានអប្បបរមា  $\begin{cases} f''(x_0) > 0 \\ f'(x_0) = 0 \end{cases}$




$f$  មានអប្បបរមា  $\begin{cases} f''(x_0) < 0 \\ f'(x_0) = 0 \end{cases}$



៥. ចំណុចបត់

ចំណុចបត់៖ ជាចំណុចដែលខ្សែកោងប្តូរភាពប៉ោង ជ្រក



ចំណុច  $I(x_0, f(x_0))$  ជាចំណុចបត់ កាលណា៖

- ដេរីវេទីពីរ  $f''(x)$  សូន្យត្រង់  $x_0$  ( $f''(x_0) = 0$ ) ។
- $f''(x)$  ប្តូរសញ្ញា នៅសងខាង  $x_0$  ។

ចំណោទបរិមា

- បរិមាត្រគឺជាប្រវែងជុំវិញ។
- ផ្ទៃគឺជាទំហំនៃផ្ទៃដែលយើងមើលឃើញ។
- មាឌគឺជាទំហំនៃចំណុះដែលសូលីតអាចផ្ទុកបាន។


រូបមន្តដោះស្រាយចំណោទបរិមា

- តាងអញ្ញាតដាក់លក្ខខណ្ឌ
- បង្កើតអនុគមន៍ដែលចង់បាន
- ប្រៀបធៀបអនុគមន៍ឱ្យមានអថេរតែមួយ
- សិក្សាសញ្ញាដេរីវេ និងគូសតារាងអថេរភាព

សំគាល់៖ គេអាចរកតាមដេរីវេទី២ ដោយមិនចាំបាច់គូសតារាងអថេរភាព។


រូបមន្តគណិតវិទ្យាសំខាន់ៗមួយចំនួន

១. ចតុកោណកែង



- ផ្ទៃក្រឡា  $S = a \cdot b$
- បរិមាត្រ  $P = 2(a+b)$
- អង្កត់ទ្រូង  $d = \sqrt{a^2 + b^2}$


២. ការ៉េ



- ផ្ទៃក្រឡា  $S = a \cdot a = a^2$
- បរិមាត្រ  $P = 4a$
- អង្កត់ទ្រូង  $d = a\sqrt{2}$

## មេរៀន អនុវត្តជីវិត Application of Derivative

### ៣. ត្រីកោណ




• ផ្ទៃក្រឡា  $S = \frac{1}{2} a \cdot h$

• ផ្ទៃក្រឡា  $S = \frac{1}{2} ac \sin \alpha$

• ផ្ទៃក្រឡា  $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$   
ដែលកន្លះបរិមាត្រ  $p = \frac{a+b+c}{2}$

### ៤. ត្រីកោណកែង




• ទ្រឹស្តីបទពីតាករ

$$c^2 = a^2 + b^2$$


• ផ្ទៃក្រឡា  $S = \frac{1}{2} a \cdot b$

### ៥. រង្វង់



- ផ្ទៃក្រឡា  $S = \pi r^2$
- បរិមាត្រ  $P = 2\pi r$
- ប្រវែងធ្នូ  $\ell = \alpha \cdot r$


### ៥. ស៊ីឡាំង



• ផ្ទៃក្រឡា  $S = 4\pi r^2$

• មាឌ  $V = \frac{4\pi r^3}{3}$

### ៦. ប្រលេពីប៉ែតកែង




• ផ្ទៃបាត  $S_B = a \cdot b$

• ផ្ទៃខាង  $S_L = 2ac + 2bc$

• ផ្ទៃសរុប  $S_T = 2S_B + S_L$

• មាត  $V = S_B \cdot c = abc$

### ៧. គូប




• ផ្ទៃបាត  $S_B = a \cdot a = a^2$

• ផ្ទៃខាង  $S_L = 4a^2$

• ផ្ទៃសរុប  $S_T = 2S_B + S_L$

• មាត  $V = S_B \cdot a = a^3$

### ៨. ពីរ៉ាមីតនិយ័ត




• ផ្ទៃបាត  $S_B$

• ផ្ទៃខាង  $S_L = \frac{1}{2} P_B \cdot d$

• ផ្ទៃសរុប  $S_T = S_B + S_L$

• មាត  $V = \frac{1}{3} S_B \cdot h$

### ៩. កោណ




• ផ្ទៃបាត  $S_B = \pi r^2$

• ផ្ទៃខាង  $S_L = \pi r l$

• ផ្ទៃសរុប  $S_T = S_B + S_L$

• មាត  $V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$

### ១០. ស៊ីឡាំង



• ផ្ទៃបាត  $S_B = \pi r^2$

• ផ្ទៃខាង  $S_L = 2\pi r h$

• ផ្ទៃសរុប  $S_T = 2S_B + S_L$

• មាត  $V = \pi r^2 h$

### ៥. វិសមភាពកំណើនមានកំណត់

[i].  $f$  ជាអនុគមន៍មានដេរីវេលើចន្លោះ  $I$  បើមាន  $m$  និង  $M$  ចំពោះ  $\forall x \in \mathbb{R}$  ដែល  $m \leq f'(x) \leq M$  នោះ

$$m(x-\alpha) \leq f(x) - f(\alpha) \leq M(x-\alpha), \forall \alpha, x \in I$$

[ii].  $f$  ជាអនុគមន៍មានដេរីវេលើចន្លោះ  $I$  ហើយ  $\forall a, b \in I$  ដែល  $a < b$  បើមាន  $M \in \mathbb{R}$  មួយដែល  $|f'(x)| \leq M$  នោះគេបាន

$$|f(b) - f(a)| \leq M|b - a|$$

### ៦. ទ្រឹស្តីបទតម្លៃមធ្យម-ឡាក្រង់

បើ  $f$  មានដេរីវេលើ  $(a, b)$  នោះនឹងមាន  $c$  មួយលើ  $(a, b)$  ដែល

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

### ២. តម្លៃប្រហែលតាមឌីផេរ៉ង់ស្យែល

$$f(x_0 + h) \approx f(x_0) + hf'(x_0)$$

ដែល  $dy = hf'(x_0)$  ហៅថាឌីផេរ៉ង់ស្យែលនៃ  $y = f(x)$  ត្រង់  $x_0$

### ៧. ទ្រឹស្តីបទរ៉ូល

៖ បើ  $f$  មានដេរីវេលើ  $[a, b]$  បើ  $f(a) = f(b)$  នោះនឹងមានតម្លៃ  $c$  មួយលើ  $(a, b)$  ដែល  $f'(c) = 0$  ។

### ៥. ការអនុវត្តក្នុងរូបវិទ្យា (Kinematics)

បើ គេ មាន សមីការ ចម្ងាយចរ  $s(t)$  គិតជាអនុគមន៍នៃពេល  $t$ ៖

• ល្បឿនខណៈ (Velocity):  $v(t) = s'(t)$  (ដេរីវេទី១ នៃចម្ងាយធៀបនឹងពេល)

• សំទុះខណៈ (Acceleration):  $a(t) = v'(t) = s''(t)$  (ដេរីវេទី២ នៃល្បឿន ឬដេរីវេទី៣ នៃចម្ងាយ)


### ការអនុវត្តជីវិតក្នុងសេដ្ឋកិច្ច

| អនុគមន៍សរុប             | រូបមន្តគណនា                 |
|-------------------------|-----------------------------|
| ថ្លៃដើមសរុប: $C(x)$     | $MC = C'(x)$                |
| ចំណូលសរុប: $R(x)$       | $MR = R'(x) = (p \cdot x)'$ |
| ប្រាក់ចំណេញសរុប: $P(x)$ | $MP = P'(x) = MR - MC$      |




មេរៀន សិក្សាអថេរភាព និងសម្រា Graph

ប្លង់សិក្សាអនុគមន៍




១. អាស៊ីមតូត

ក. អាស៊ីមតូតឈរ




បើ  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$  នោះ  
បន្ទាត់  $x = a$  ជាអាស៊ីមតូត  
ឈរនៃក្រាប (C) ។

ខ. អាស៊ីមតូតដេក



បើ  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = b$  នោះ  
បន្ទាត់  $y = b$  ជាអាស៊ីមតូត  
ដេកនៃក្រាប (C) ។

គ. អាស៊ីមតូតទ្រូត



បើ  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (ax+b)] = 0$   
នោះបន្ទាត់  $y = ax + b$  ជា  
អាស៊ីមតូតទ្រូតនៃ (C) ។

២. សិក្សាអនុគមន៍  $y = \frac{ax^2 + bx + c}{cx + d}$

ក. ដែនកំណត់៖  $D = \mathbb{R} - \{x_0\}$  ដែល  $x_0 = -\frac{d}{c}$

ខ. លីមីតចុងដែនកំណត់៖  
 $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty$ ;  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \pm\infty$

គ. អាស៊ីមតូត៖

បន្ទាត់  $x = x_0$  ជាអាស៊ីមតូតឈរ

បន្ទាត់  $y = mx + n$  ជាអាស៊ីមតូតទ្រូត

ដែល  $\frac{ax^2 + bx + c}{cx + d} = mx + n + \frac{q}{cx + d}$


ឃ. ដេរីវេ៖ ប្រើ  $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - v'u}{v^2}$

1. បើ  $y' = 0$  មានបួសពិតពីរផ្សេងគ្នា នោះ  
អនុគមន៍មានតម្លៃអតិបរមានៅប្រមូល និង  
អប្បបរមាផ្សេងៗគ្នា ។


2. បើ  $y' = 0$  មានបួសឌុប នោះអនុគមន៍គ្មាន  
តម្លៃបរមាផ្សេងៗគ្នា ។

3. បើ  $y' = 0$  គ្មានបួស នោះអនុគមន៍គ្មានតម្លៃ  
បរមាផ្សេងៗគ្នា ។


• ករណី  $y' = 0$  មានបួសពីរ និង  $a > 0$




• ករណី  $y' = 0$  មានបួសពីរ និង  $a < 0$



• ករណី  $y' = 0$  គ្មានបួសពីរ និង  $a > 0$




• ករណី  $y' = 0$  គ្មានបួសពីរ និង  $a < 0$




៣. ផ្ចិតឆ្លុះ និង អ័ក្សឆ្លុះ (Symmetry)

ក. ផ្ចិតឆ្លុះ (Center of Symmetry)



ចំណុច  $I(a, b)$  ជាផ្ចិតឆ្លុះនៃក្រាប (C) លុះត្រាតែគ្រប់  
 $x \in D_f$  គេបាន  $(2a-x) \in D_f$  ផ្ទៀងផ្ទាត់រូបមន្ត៖  
 $f(2a-x) + f(x) = 2b$

ខ. អ័ក្សឆ្លុះ (Symmetry axis)  $x = a$  ជាអ័ក្សឆ្លុះនៃក្រាប  
(C) លុះត្រាតែគ្រប់  $x \in D_f$  គេបាន  $(2a-x) \in D_f$   
ហើយផ្ទៀងផ្ទាត់រូបមន្ត៖  $f(2a-x) = f(x)$



គ. ភាពគូ និង ភាពសេស

- អនុគមន៍គូ៖ លក្ខខណ្ឌ៖  $f(-x) = f(x)$   
លក្ខណៈ៖ ក្រាបឆ្លុះគ្នាជុំប្រសិន អ័ក្ស (Oy) ។
- អនុគមន៍សេស៖ លក្ខខណ្ឌ៖  $f(-x) = -f(x)$   
លក្ខណៈ៖ ក្រាបឆ្លុះគ្នាជុំប្រសិន គល់  $O(0, 0)$  ។

៤. រកចំណុចប្រសព្វជាមួយអ័ក្សកូអរដោនេ

- ប្រសព្វអ័ក្ស y (អ័ក្សឈរ)៖ ឱ្យ  $x = 0$  រួចគណនាក y ។  
(ចំណុចគឺ  $(0, y)$ )
- ប្រសព្វអ័ក្ស x (អ័ក្សដេក)៖ ឱ្យ  $y = 0$  រួចដោះស្រាយ  
សមីការរក x ។ (ចំណុចគឺ  $(x, 0)$ )



## មេរៀន សិក្សាអថេរភាព និងសម្រាប Graph

សិក្សាអនុគមន៍  $y = \frac{ax^2 + bx + c}{px^2 + qx + r}$

ក. អនុគមន៍មានអាស៊ីមតូតដេកមួយ ជាធម្មតា  $y = \frac{a}{p}$  ។

ខ. អនុគមន៍មិនមានអាស៊ីមតូតទ្រេតទេ ។

គ. ចំពោះអាស៊ីមតូតឈរមានបីករណី ដោយពិនិត្យទៅលើសមីការ  $px^2 + qx + r = 0$



- $\Delta > 0$  នោះមានអាស៊ីមតូតឈរពីរ ។
- $\Delta = 0$  នោះមានអាស៊ីមតូតឈរមួយ ។
- $\Delta < 0$  នោះគ្មានអាស៊ីមតូតឈរទេ ។

### រូបមន្តដេរីវេតាមដេរីវេមីណង់


ប្រសិនបើ  $y = \frac{ax^2 + bx + c}{px^2 + qx + r}$  នោះដេរីវេរបស់វាគឺ៖

$$y' = \frac{\begin{vmatrix} a & b \\ p & q \end{vmatrix} x^2 + 2 \begin{vmatrix} a & c \\ p & r \end{vmatrix} x + \begin{vmatrix} b & c \\ q & r \end{vmatrix}}{(px^2 + qx + r)^2}$$




ករណី  $\Delta < 0$



ករណី  $\Delta = 0$



ករណី  $\Delta > 0$




### មេរៀនទី២ អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

#### និយមន័យ

ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត  $x$  អនុគមន៍  $f(x) = e^x$  ហៅថា អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែលគោល  $e$  ដែល  $e = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \approx 2.7182 \dots$  ។

#### ក្រាបនៃអនុគមន៍ $f(x) = e^x$



#### លក្ខណៈ ចំពោះចំនួនពិត $m$ និង $n$

1.  $e^m \cdot e^n = e^{m+n}$
2.  $\frac{e^m}{e^n} = e^{m-n}$
3.  $e^{-n} = \frac{1}{e^n}$
4.  $(e^m)^n = e^{m \cdot n}$

#### សមីការនិងវិសមីការ

1.  $e^x = a \Leftrightarrow x = \ln a$  ដែល  $a > 0$
2.  $e^x \geq a \Leftrightarrow x \geq \ln a$  ដែល  $a > 0$
3.  $e^x \leq a \Leftrightarrow x \leq \ln a$  ដែល  $a > 0$

#### រូបមន្តលីមីត

1.  $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$
2.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$
3.  $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0; n > 0$
4.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^x} = 0; n > 0$

#### រូបមន្តដេរីវេ

1.  $(e^x)' = e^x$
2.  $(e^{ax})' = ae^{ax}; a \in \mathbb{R}$
3.  $(e^u)' = u'e^u; u$  ជាអនុគមន៍នៃ  $x$  ។

#### អនុវត្តន៍

រូបមន្ត ការប្រាក់សមាស  $A = p \left(1 + \frac{r}{n}\right)^t$

- $A$  ប្រាក់សរុប  $p$  ប្រាក់ដើម
- $r$  អត្រាការប្រាក់ក្នុងឆ្នាំ
- $n$  ចំនួនដងទូទាត់ប្រាក់ក្នុងឆ្នាំ
- $t$  រយៈពេលសន្សំជាឆ្នាំ

#### ចំណាំ

បើចំនួនដងនៃការទូទាត់ច្រើនអនន្ត ឬការទូទាត់ជាបន្តបន្ទាប់ នោះការប្រាក់សមាសគឺ៖

$$A = pe^{rt}$$



មេរៀន សិក្សាអថេរភាព និងសម្រាប Graph

មេរៀនទី៣ អនុគមន៍លោការីតនេពែ


និយមន័យ

បើ  $x > 0$  អនុគមន៍លោការីតនេពែនៃ  $x$  កំណត់ដោយ  $y = \ln x$  ដែលជាអនុគមន៍ប្រាសនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល  $y = e^x$  ។

រូបមន្តសំខាន់ៗ

- $e^a = b \Leftrightarrow a = \ln b; b > 0$
- $\ln e = 1$
- $\ln 1 = 0$
- $\ln a + \ln b = \ln(a \cdot b); a, b > 0$
- $\ln a - \ln b = \ln\left(\frac{a}{b}\right); a, b > 0$
- $\ln a^n = n \ln a; a > 0, n \in \mathbb{R}$
- $e^{\ln a} = a; a > 0$
- $e^{a \ln a} = a^a; a > 0$

ក្រាបនៃអនុគមន៍  $y = \ln x$



រូបមន្តលីមីត

- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^n \ln x = 0; n > 0$
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x^n} = -\infty; n > 0$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0; n > 0$

រូបមន្តដេរីវេ

- $(\ln x)' = \frac{1}{x}$
- $(\ln u)' = \frac{u'}{u}; u$  ជាអនុគមន៍នៃ  $x$

សមីការនិងវិសមីការ

- $\ln x = a \Leftrightarrow x = e^a$  ដែល  $a \in \mathbb{R}$
- $\ln x \geq a \Leftrightarrow x \geq e^a$
- $\ln x \leq a \Leftrightarrow x \leq e^a$  ដែល  $a \in \mathbb{R}$

អនុគមន៍ជំនួយ

បើដេរីវេទី១  $f'(x)$  មិនអាចសិក្សាសញ្ញាបានយើងត្រូវការសិក្សាអថេរភាពនៃអនុគមន៍ជំនួយ  $g(x)$  ដែល  $f'(x)$  មានសញ្ញាដូច  $g(x)$  ។

ការកំណត់សញ្ញានៃអនុគមន៍ជំនួយ

ករណី  $g$  មានអតិបរមា

|         |           |             |           |
|---------|-----------|-------------|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $\alpha$    | $+\infty$ |
| $g'(x)$ | +         | 0           | -         |
| $g(x)$  | $-\infty$ | $g(\alpha)$ | $-\infty$ |

សន្និដ្ឋាន៖  $g(x) \leq g(\alpha)$

- បើ  $g(\alpha) < 0$  នោះ  $g(x) < 0$  ។
- បើ  $g(\alpha) = 0$  នោះ  $g(x) \leq 0$  ។

ករណី  $g$  មានអប្បបរមា

|         |           |             |           |
|---------|-----------|-------------|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $\alpha$    | $+\infty$ |
| $g'(x)$ | -         | 0           | +         |
| $g(x)$  | $+\infty$ | $g(\alpha)$ | $+\infty$ |

សន្និដ្ឋាន៖  $g(x) \geq g(\alpha)$

- បើ  $g(\alpha) > 0$  នោះ  $g(x) > 0$  ។
- បើ  $g(\alpha) = 0$  នោះ  $g(x) \geq 0$  ។

ករណី  $g$  ជាអនុកើនជាដាច់ខាត

|         |           |          |           |
|---------|-----------|----------|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $\alpha$ | $+\infty$ |
| $g'(x)$ | +         | 0        | +         |
| $g(x)$  | $-\infty$ | 0        | $+\infty$ |

សន្និដ្ឋាន៖  $g(x)$  ជាអនុកើន និង  $g(\alpha) = 0$

- $\forall x < \alpha$  នោះ  $g(x) < g(\alpha): g(x) < 0$
- $\forall x > \alpha$  នោះ  $g(x) > g(\alpha): g(x) > 0$
- $x = \alpha$  នោះ  $g(x) = g(\alpha) = 0$

ករណី  $g$  ជាអនុគមន៍ចុះជាដាច់ខាត

|         |           |          |           |
|---------|-----------|----------|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $\alpha$ | $+\infty$ |
| $g'(x)$ | -         | 0        | -         |
| $g(x)$  | $+\infty$ | 0        | $-\infty$ |

សន្និដ្ឋាន៖  $g(x)$  ជាអនុគមន៍ចុះ និង  $g(\alpha) = 0$

- $\forall x < \alpha$  នោះ  $g(x) > g(\alpha): g(x) > 0$
- $\forall x > \alpha$  នោះ  $g(x) < g(\alpha): g(x) < 0$
- $x = \alpha$  នោះ  $f(x) = f(\alpha) = 0$



មេរៀន អាំងតេក្រាលមិនកំណត់ Integral Function

ព្រឹត្តិបត្រ

និយមន័យ

ឧបមាថា  $F(x)$  ជាព្រឹត្តិបត្រនៃ  $f(x)$  នោះគេបាន  $F'(x) = f(x)$  ហើយអនុគមន៍ព្រឹត្តិបត្រទូទៅត្រូវបូកថែមចំនួនថេរ  $C (C \in \mathbb{R})$  ។

អាំងតេក្រាលមិនកំណត់ (Indefinite Integral)

អាំងតេក្រាលមិនកំណត់ នៃអនុគមន៍  $f(x)$  គឺជាព្រឹត្តិបត្រទាំងអស់(សរុប  $+C$ ) របស់  $f(x)$  ។ យើងសរសេរបានថា៖

$$\int f(x)dx = F(x) + C$$

- $\int Kf(x)dx = K \int f(x)dx$
- $\int f'(x) dx = f(x) + c$
- $\int \frac{d}{dx}f(x) dx = f(x) + c$
- $\frac{d}{dx} \int f(x) dx = f(x)$
- $\int [f(x) \pm g(x)]dx = \int f(x)dx \pm \int g(x)dx$
- $\int c \cdot f(x)dx = c \int f(x)dx$

រូបមន្តគ្រឹះ

1.  $\int 0dx = C$ ;
2.  $\int kdx = kx + C \quad (k \in \mathbb{R})$ ;
3.  $\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C \quad (\alpha \neq -1)$ ;
4.  $\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$ ;
5.  $\int e^x dx = e^x + C$ ;
6.  $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$ ;
7.  $\int \cos x dx = \sin x + C$ ;
8.  $\int \sin x dx = -\cos x + C$ ;
9.  $\int (1 + \tan^2 x)dx = \int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + C$
10.  $\int (1 + \cot^2 x)dx = \int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\cot x + C$

អាំងតេក្រាលដោយប្រើអថេរជំនួស

វិធីសាស្ត្រនេះប្រើដើម្បីបំប្លែងអាំងតេក្រាលស្មុគស្មាញ  $\int f(g(x))dx$  ទៅជាទម្រង់  $\int f(u)du$  ។ រូបមន្ត៖

$$\int f(g(x))g'(x)dx = F(g(x)) + C$$

វិធានគ្រឹះសំខាន់ៗ

1.  $\int u^n u' dx = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C, \quad (n \neq -1)$
2.  $\int \frac{u'}{\sqrt{u}} dx = 2\sqrt{u} + C$
3.  $\int \frac{u'}{u^2} dx = -\frac{1}{u} + C$
4.  $\int \frac{u'}{u} dx = \ln |u| + C$
5.  $\int u' e^u dx = e^u + C$
6.  $\int u' \sin(u) dx = -\cos(u) + C$
7.  $\int u' \cos(u) dx = \sin(u) + C$
8.  $\int u' \sec^2(u) du = \int \frac{u'}{\cos^2 u} dx = \tan(u) + C$
9.  $\int u' \csc^2(u) du = \int \frac{u'}{\sin^2 u} dx = -\cot(u) + C$
10.  $\int \frac{1}{u^2 + a^2} du = \frac{1}{a} \arctan\left(\frac{u}{a}\right) + C$

អាំងតេក្រាលដោយផ្នែក

- $\int u dv = u \cdot v - \int v du$
- $I \rightarrow L \rightarrow A \rightarrow T \rightarrow E$
  - $L: \arcsin(x), \arctan(x)$
  - $L: \ln(x), \log(x)$
  - $A: x^n, x^2 + 1$
  - $T: \sin(x), \cos(x)$
  - $E: e^x, a^x$

អាំងតេក្រាលនៃអនុសនិទាន

១. បំរាងទី១៖ ពិនិត្យដឺក្រេ

- បើ  $\deg(P(x)) < \deg(Q(x))$  បន្តទៅការបំបែកជាភាគបែងផ្នែក។
- បើ  $\deg(P(x)) \geq \deg(Q(x))$  ធ្វើការចែកហុដាសិន៖

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = S(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}$$

ដែល  $\deg(R(x)) < \deg(Q(x))$  ។

២. បំរាងទី២៖ បំបែកហុដាសធម្មតា

បំបែកភាគបែង  $Q(x)$  ទៅជាផលគុណនៃកត្តាដឺក្រេមួយមិនអាចបំបែកបាន។

- កត្តាលីនេអ៊ែរមិនត្រួតគ្នា៖  $(ax + b)(cx + d) \dots$

$$\frac{P(x)}{(ax + b)(cx + d)(\dots)} = \frac{A}{ax + b} + \frac{B}{cx + d} + \dots$$

- កត្តាលីនេអ៊ែរត្រួតគ្នា៖  $(ax + b)^n$

$$\frac{P(x)}{(ax + b)^n(\dots)} = \frac{A_1}{ax + b} + \frac{A_2}{(ax + b)^2} + \dots + \frac{A_n}{(ax + b)^n} + \dots$$

- កត្តាឌីក្រាដេក្រេមិនអាចបំបែកបាន៖  $(ax^2 + bx + c)$

$$\frac{P(x)}{(ax^2 + bx + c)(\dots)} = \frac{Ax + B}{ax^2 + bx + c} + \dots$$

វិធានគណនា  $\int \sin^n x dx$  និង  $\int \cos^n x dx$

ដើម្បី គណនា អាំងតេក្រាល នៃ  $\sin^n x dx$  និង  $\cos^n x dx$  យើង អាច ប្រើ វិធី បំបែក ករណី អាស្រ័យ លើ  $n$  គូ ឬ  $n$  សេស។



ករណីទី១៖  $n$  ជាចំនួនសេស

នៅពេល  $n$  ជាចំនួនសេស (ឧទាហរណ៍  $n = 3, 5, 7, \dots$ ), យើងអាចបំបែកវាជាផលគុណនៃ  $\sin^{n-1} x \cdot \sin x$  ឬ  $\cos^{n-1} x \cdot \cos x$  ។ បន្ទាប់មកយើងប្រើទំនាក់ទំនងត្រីកោណមាត្រ  $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$  ឬ  $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$  ដើម្បីបំប្លែងកន្សោមដែលនៅសល់ (ដែលមានស្វ័យគុណគូ) ។

• សម្រាប់អាំងតេក្រាលនៃ  $\int \sin^n x \, dx$ :

1. បំបែកអាំងតេក្រាលជា

$$\int \sin^{n-1} x \cdot \sin x \, dx$$

2. ប្រើទំនាក់ទំនង  $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$  ដើម្បីបំប្លែងកន្សោម

$$\sin^{n-1} x = (\sin^2 x)^{\frac{n-1}{2}} = (1 - \cos^2 x)^{\frac{n-1}{2}}$$

3. ប្តូរអថេរ  $u = \cos x$  នោះ  $du = -\sin x \, dx$  ។

• សម្រាប់អាំងតេក្រាលនៃ  $\int \cos^n x \, dx$ :

1. បំបែកអាំងតេក្រាលជា

$$\int \cos^{n-1} x \cdot \cos x \, dx$$

2. ប្រើទំនាក់ទំនង  $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$  ដើម្បីបំប្លែងកន្សោម

$$\cos^{n-1} x = (\cos^2 x)^{\frac{n-1}{2}} = (1 - \sin^2 x)^{\frac{n-1}{2}}$$

3. ប្តូរអថេរ  $u = \sin x$  នោះ  $du = \cos x \, dx$  ។

ករណីទី២៖  $n$  ជាចំនួនគូ

នៅពេល  $n$  ជាចំនួនគូ (ឧទាហរណ៍  $n = 2, 4, 6, \dots$ ), យើងត្រូវប្រើរូបមន្តបន្ថយដ៏ក្រេះ

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2}$$

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos(2x)}{2}$$

• សម្រាប់អាំងតេក្រាលនៃ  $\int \sin^n x \, dx$ :

1. ជំនួស  $\sin^2 x$  នៅក្នុងអាំងតេក្រាលដោយ

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2}$$

2. អាំងតេក្រាលនឹងក្លាយជា

$$\int \left( \frac{1 - \cos(2x)}{2} \right)^{\frac{n}{2}} dx$$

3. ពន្លាតកន្សោមនេះ និងបន្តធ្វើអាំងតេក្រាលជាផ្នែកៗ ។

• សម្រាប់អាំងតេក្រាលនៃ  $\int \cos^n x \, dx$ :


1. ជំនួស  $\cos^2 x$  នៅក្នុងអាំងតេក្រាលដោយ  $\frac{1 + \cos(2x)}{2}$  ។

2. អាំងតេក្រាលនឹងក្លាយជា

$$\int \left( \frac{1 + \cos(2x)}{2} \right)^{\frac{n}{2}} dx$$

3. ពន្លាតកន្សោមនេះ និងបន្តធ្វើអាំងតេក្រាលជាផ្នែកៗ ។

រំនេរក្រាលកំណត់ Deninite Integral



អនុគមន៍  $f$  ជាអនុគមន៍ជាប់លើចន្លោះ  $[a, b]$  និង  $F$  ជាព្រីមីទីវនៃ  $f$  នៅលើ  $[a, b]$  ។

$$\int_a^b f(x) \, dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

អានថាអាំងតេក្រាលកំណត់ពី  $a$  ទៅ  $b$  នៃ  $f(x) \, dx$

លក្ខណៈគ្រឹះ

$$1. \int_a^b f(x) \, dx = \int_a^b f(t) \, dt = \dots$$

$$2. \int_a^b c \, dx = c(b - a)$$

$$3. \int_a^b f(x) \, dx = - \int_b^a f(x) \, dx$$

$$4. \int_a^a f(x) \, dx = 0$$

$$6. \int_a^b (\alpha f(x) \pm \beta g(x)) \, dx = \alpha \int_a^b f(x) \, dx \pm \beta \int_a^b g(x) \, dx$$

$$7. \int_a^b f(x) \, dx = \int_a^c f(x) \, dx + \int_c^b f(x) \, dx \text{ (ចំពោះ } a < c < b \text{)}$$

$$8. \int_a^b f(x) \, dx = \int_a^b f(a + b - x) \, dx$$

រូបមន្តគ្រឹះ

$$1. \int_a^b x^n \, dx = \left[ \frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_a^b \quad (n \neq -1)$$

$$2. \int_a^b \frac{1}{x^n} \, dx = \left[ -\frac{1}{(n-1)x^{n-1}} \right]_a^b; (n \neq 1)$$

$$3. \int_a^b \frac{1}{x^2} \, dx = \left[ -\frac{1}{x} \right]_a^b$$

$$4. \int_a^b \frac{1}{\sqrt{x}} \, dx = [2\sqrt{x}]_a^b$$

$$5. \int_a^b \frac{1}{x} \, dx = [\ln |x|]_a^b$$

$$6. \int_a^b \frac{1}{\alpha x + \beta} \, dx = \left[ \frac{1}{\alpha} \ln |\alpha x + \beta| \right]_a^b$$

$$7. \int_a^b \cos x \, dx = [\sin x]_a^b$$

$$8. \int_a^b \sin x \, dx = [-\cos x]_a^b$$

$$9. \int_a^b \cos(ax+b) \, dx = \left[ \frac{1}{a} \sin(ax+b) \right]_a^b$$

$$10. \int_a^b \sin(ax+b) \, dx = \left[ -\frac{1}{a} \cos(ax+b) \right]_a^b$$

$$11. \int_a^b e^{ax+b} \, dx = \left[ \frac{1}{a} e^{ax+b} \right]_a^b$$

$$12. \int_a^b (1 + \tan^2 x) \, dx = \int_a^b \frac{1}{\cos^2 x} \, dx = [\tan x]_a^b$$

$$13. \int_a^b (1 + \cot^2 x) \, dx = \int_a^b \frac{1}{\sin^2 x} \, dx = [-\cot x]_a^b$$



# រូបមន្តសម្រាប់ គណិតវិទ្យា

រៀបចំដោយ៖ គ្រូបង្រៀននៃសាលារៀនជំនាន់ទី (NGS)

## ថ្នាក់ទី ១២

### រំលឹកគ្រឹះនៃអនុគមន៍បណ្តាញ $u$

- $\int_a^b u^n u' dx = \left[ \frac{u^{n+1}}{n+1} \right]_a^b, \quad (n \neq -1)$
- $\int_a^b \frac{u'}{\sqrt{u}} dx = [2\sqrt{u}]_a^b$
- $\int_a^b \frac{u'}{u^2} dx = \left[ -\frac{1}{u} \right]_a^b$
- $\int_a^b \frac{u'}{u} dx = [\ln |u|]_a^b$
- $\int_a^b u' e^u dx = [e^u]_a^b$
- $\int_a^b u' \sin(u) dx = [-\cos(u)]_a^b$
- $\int_a^b u' \cos(u) dx = [\sin(u)]_a^b$
- $\int_a^b u' \sec^2(u) du = \int \frac{u'}{\cos^2 u} dx = [\tan(u)]_a^b$
- $\int_a^b u' \csc^2(u) du = \int \frac{u'}{\sin u} dx = [-\cot(u)]_a^b$

### រំលឹកគ្រឹះកំណត់ដោយផ្នែក

រូបមន្តអាំងតេក្រាលកំណត់ដោយផ្នែក គឺ៖

$$\int_a^b u dv = [uv]_a^b - \int_a^b v du$$

វិធីសាស្ត្រក្នុងការតាង  $u$  និង  $dv$


- $u$  គឺជាអនុគមន៍ដែលយើងងាយស្រួលគណនាដេរីវេ ។
- $dv$  គឺជាអនុគមន៍ដែលយើងងាយស្រួលគណនាអាំងតេក្រាល ។

### ការគណនាផ្ទៃក្រឡា

#### ១. ផ្ទៃក្រឡានៅពីលើអ័ក្ស $x$

ប្រសិនបើអនុគមន៍  $f(x)$  ស្ថិតនៅពីលើ ឬស្មើអ័ក្ស  $x$  ( $f(x) \geq 0$ ) នៅលើចន្លោះ  $[a, b]$  នោះផ្ទៃក្រឡា  $A$  គឺ៖


$$A = \int_a^b f(x) dx$$



#### ២. ផ្ទៃក្រឡានៅពីក្រោមអ័ក្ស $x$

ប្រសិនបើអនុគមន៍  $f(x)$  ស្ថិតនៅពីក្រោម ឬស្មើអ័ក្ស  $x$  ( $f(x) \leq 0$ ) នៅលើចន្លោះ  $[a, b]$


$$A = - \int_a^b f(x) dx = \int_a^b -f(x) dx$$



#### ៣. ផ្ទៃក្រឡាខាងខ្សែកោងពីរ


គេ មាន មាន អនុគមន៍ពីរ គឺ  $f(x)$  និង  $g(x)$  ហើយ  $f(x) \geq g(x)$  នៅលើចន្លោះ  $[a, b]$  គឺ

$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$




### មាឌសូលីត

#### ១. មុំវិញអ័ក្ស $Ox$ : $V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$



$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$$

#### ២. មុំវិញអ័ក្ស $Oy$ : $V = \pi \int_c^d [g(y)]^2 dy$




$$V = \pi \int_c^d [g(y)]^2 dy$$

#### ៣. រូបមន្តមាឌសូលីតបរិវត្តន៍ខណ្ឌដោយខ្សែពីរ

ឧបមាថាគេមានអនុគមន៍  $f$  និង  $g$  ជាអនុគមន៍ជាប់លើចន្លោះ  $[a, b]$  ។ តាង  $D$  ជាផ្ទៃក្រឡាខណ្ឌដោយក្រាបតំណាងអនុគមន៍ទាំងពីរ និងបន្ទាត់ឈរ  $x = a$  និង  $x = b$  ។


- ករណីវិលជុំវិញអ័ក្សអាប់ស៊ីស ( $ox$ ) ៖  
បើ  $f(x) \geq g(x) \geq 0$  ចំពោះគ្រប់  $x \in [a, b]$   
នោះមាឌសូលីតបរិវត្តន៍កំណត់ដោយការវិលជុំវិញអ័ក្ស ( $ox$ ) នៃផ្ទៃ  $D$  គឺកំណត់ដោយរូបមន្ត៖

$$V = \pi \int_a^b [f(x)^2 - g(x)^2] dx$$



- ករណីវិលជុំវិញអ័ក្សអរដោនេ ( $oy$ ) ៖  
បើផ្ទៃរាបខណ្ឌដោយក្រាបនៃអនុគមន៍  $x = f(y)$  និង  $x = g(y)$  ព្រមទាំងបន្ទាត់ដេក  $y = c$  និង  $y = d$  ហើយ  $f(y) \geq g(y) \geq 0$  ចំពោះគ្រប់  $y \in [c, d]$  នោះមាឌសូលីតបរិវត្តន៍កំណត់ដោយការវិលជុំវិញអ័ក្ស ( $oy$ ) គឺកំណត់ដោយរូបមន្ត៖

$$V = \pi \int_c^d [f(y)^2 - g(y)^2] dy$$





មេរៀន សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល Defferential Equation

មេរៀនទី១៖ សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់ទី១

និយមន័យ

សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់ទី១ គឺជាសមីការដែលទាក់ទងរវាងអថេរឯករាជ្យ  $x$  អនុគមន៍មិនស្គាល់  $y$  និងដេរីវេទី១របស់វា  $y'$  ។

១.១ សមីការទូទៅ  $\frac{dy}{dx} = f(x)$

- របៀបដោះស្រាយ៖ ធ្វើអាំងតេក្រាលលើអង្គទាំងពីរ រៀបចំនិងអថេរ  $x$  ។

ចម្លើយទូទៅ  $y = \int f(x)dx + c$

១.២ សមីការដែលអថេរព្យែកអថេរបាន

- ទម្រង់ទូទៅ៖  $g(y) \frac{dy}{dx} = f(x)$
- របៀបដោះស្រាយ៖ បោះអថេរ  $y$  ទៅមួយចំហៀង និង  $x$  ទៅមួយចំហៀង រួចធ្វើអាំងតេក្រាល ។

ចម្លើយទូទៅ  $\int g(y)dy = \int f(x)dx + c$

១.៣ សមីការលីនេអ៊ែរអូម៉ូសែន

- ទម្រង់ទូទៅ៖ ផ្នែកខាងស្តាំស្មើសូន្យ  $y' + ay = 0$

ចម្លើយទូទៅ  $y = Ke^{-ax}$  ( $K$  ជាចំនួនថេរ)

១.៤ សមីការលីនេអ៊ែរមិនអូម៉ូសែន

- ទម្រង់ទូទៅ៖  
 $y' + ay = p(x), p(x) \neq 0$

វិធីទី១៖ កេចម្លើយទូទៅ និងចម្លើយពិសេស

- ចម្លើយទូទៅនៃ  $y' + ay = 0$  តាងដោយ  $y_c$
- ចម្លើយពិសេសនៃ  $y' + ay = p(x)$  តាងដោយ  $y_p$

ចម្លើយទូទៅនៃសមីការ  $y' + ay = p(x)$  គឺអនុគមន៍  $y$  ដែល៖  $y = y_c + y_p$

វិធីទី២ វិធីបម្រែបម្រួលចំនួនថេរ៖

- រកចម្លើយទូទៅនៃសមីការ  $y' + ay = 0$  គឺ  
 $y = Ae^{-ax}$

- ក្នុងចម្លើយ  $y = Ae^{-ax}$  ជំនួសចំនួនថេរ  $A$  ដោយអនុគមន៍  $A(x)$
- ពី  $y = A(x)e^{-ax}$  ទាញរក  $y'$  រួចយក  $y, y'$  ជំនួសក្នុងសមីការដើម

ចម្លើយទូទៅនៃសមីការ ( $E$ ) គឺ

$y = ce^{-ax} + e^{-ax} \int e^{ax}p(x)dx$

វិធីតាងចម្លើយពិសេស  $y_p$  នៃ  $y' + ay = p(x)$

- ករណី  $P(x) = a_nx^n + \dots + a_1x + a_0$  តាង  $y_p = Q(x)$  ជាពហុធាមានដឺក្រេដូច  $P(x)$
- ករណី  $P(x) = k_1 \cos \beta x + k_2 \sin \beta x$  ត្រូវតាង  $y_p = A \cos \beta x + B \sin \beta x$
- ករណី  $P(x) = ke^{\alpha x}$ 
  - បើ  $\alpha \neq -a$  ត្រូវតាង  $y_p = ce^{\alpha x}$
  - បើ  $\alpha = -a$  ត្រូវតាង  $y_p = cxe^{\alpha x}$
- ករណី  $P(x) = e^{\alpha x}g(x)$  ដែល  $g(x)$  ជាពហុធា
  - បើ  $\alpha \neq -a$  ត្រូវតាង  $y_p = e^{\alpha x}Q(x)$
  - បើ  $\alpha = -a$  ត្រូវតាង  $y_p = xe^{\alpha x}Q(x)$
- ករណី  $P(x) = e^{\alpha x}(k_1 \cos \beta x + k_2 \sin \beta x)$ 
  - បើ  $\alpha \neq -a$  និង  $\alpha = -a$  ត្រូវតាង  
 $y_p = e^{\alpha x}(A \cos \beta x + B \sin \beta x)$

មេរៀនទី២៖ សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់២

និយមន័យ

សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់ទី២ គឺជាសមីការដែលទាក់ទងរវាងអថេរឯករាជ្យ  $x$  អនុគមន៍មិនស្គាល់  $y$  និងដេរីវេទី១  $y'$  ព្រមទាំងដេរីវេទី២របស់វា  $y''$  ។

២.១ សមីការលីនេអ៊ែរអូម៉ូសែនមេគុណថេរ

- ទម្រង់៖  $ay'' + by' + cy = 0$  ( $a \neq 0, b, c \in \mathbb{R}$ )

សមីការសម្គាល់

$a\lambda^2 + b\lambda + c = 0$  ( $\Delta = b^2 - 4ac$ )

ចម្លើយនៃសមីការអូម៉ូសែន ( $y_c$ )

ចម្លើយទូទៅអាស្រ័យលើ  $\Delta$ ៖

- បើ  $\Delta > 0$  មានឫសពីរ  $\lambda_1, \lambda_2$ ៖  
 $y = Ae^{\lambda_1 x} + Be^{\lambda_2 x}$
- បើ  $\Delta = 0$  មានឫសឌុប  $\lambda_0$ ៖  
 $y = (Ax + B)e^{\lambda_0 x}$
- បើ  $\Delta < 0$  មានឫសកុំផ្លិច  $\alpha \pm i\beta$ ៖  
 $y = (A \cos \beta x + B \sin \beta x)e^{\alpha x}$  ដែល  $\beta > 0$

២.២ សមីការលីនេអ៊ែរមិនអូម៉ូសែន

- ទម្រង់ទូទៅ៖  $ay'' + by' + cy = P(x)$
- ចម្លើយទូទៅ៖  $y = y_c + y_p$
- ការរកចម្លើយពិសេស ( $y_p$ )៖ តាងតាមរាង  $P(x)$ 
  - បើ  $P(x)$  ជាពហុធាដឺក្រេ  $n \implies y_p$  ត្រូវតែជាពហុធាដឺក្រេ  $n$  ដែរ ។
  - បើ  $P(x) = ke^{\alpha x}$  គេតាង៖
    - \*  $\alpha$  មិនមែនឫសសមីការសម្គាល់៖  $y_p = Ae^{\alpha x}$
    - \*  $\alpha$  ជាឫសតែមួយ៖  $y_p = Axe^{\alpha x}$
    - \*  $\alpha$  ជាឫសឌុប៖  $y_p = Ax^2e^{\alpha x}$
  - បើ  $P(x) = k \cos \omega x$  ឬ  $k \sin \omega x$  គេតាង៖  
 $y_p = A \cos \omega x + B \sin \omega x$



មេរៀន ប្រូបាបប៊ីលីតេ Probability

ក្នុងករណី វិភាគប្រូបាបប៊ីលីតេ

- ហ្វាក់តូរ្យែល (Factorial)៖  $n! = n(n-1) \dots 1$
- ចម្លស់នៃ  $n$  ធាតុ៖  $P_n = n!$
- ចម្លស់រង្វង់៖  $(n-1)!$

តម្រៀប និងចម្លស់  $P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$

- ចម្លស់ច្រំដែល៖  $n^r$
- ចម្លស់បែងចែកបាន  $\frac{n!}{n_1!n_2! \dots n_r!}$

បន្សំ  $C(n, r) = \binom{n}{r} = \frac{n!}{(n-r)!r!}$

- លក្ខណៈបន្សំ៖  $\binom{n}{r} = \binom{n-1}{r-1} + \binom{n-1}{r}$
- ទ្រឹស្តីបទទ្វេធា៖  $(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$
- ចំនួនសំណុំរងទាំងអស់៖  $2^n$

មេរៀនទី១៖ ប្រូបាបមានលក្ខខណ្ឌ

១.១ ការគណនាប្រូបាប

និយមន័យ

ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍  $A$  គឺជាផលធៀបរវាងចំនួនករណីស្រប និងចំនួនករណីអាចទាំងអស់ក្នុងលំហសំណាក  $S$  ។

រូបមន្តប្រូបាប  $P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$

- ស្វ័យសក្យនៃប្រូបាប៖

- ក.  $0 \leq P(A) \leq 1$  ចំពោះគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍  $A$
- ខ.  $P(S) = 1$  (លំហសំណាក/ព្រឹត្តិការណ៍ប្រាកដ)
- គ.  $P(\emptyset) = 0$  (សំណុំទទេ/មិនអាចកើតមាន)
- ឃ. បើ  $A_1, A_2, \dots$  មិនចុះសម្រុងគ្នា៖

$$P(\cup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

- ព្រឹត្តិការណ៍បំពេញ៖  $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
- ប្រូបាបផលបូកព្រឹត្តិការណ៍៖  
 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- បើ  $A$  និង  $B$  មិនចុះសម្រុងគ្នា ( $A \cap B = \emptyset$ )៖  
 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

១.២ ប្រូបាបមានលក្ខខណ្ឌ

និយមន័យ

បើ  $A$  និង  $B$  ជាព្រឹត្តិការណ៍ពីរក្នុងលំហសំណាក  $S$  ដែល  $P(B) \neq 0$  នោះប្រូបាបមានលក្ខខណ្ឌនៃ  $A$  ដោយដឹងថា  $B$  បានកើតឡើងហើយកំណត់ដោយ៖

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

- វិធានផលគុណ៖ ផ្អែកតាមរូបមន្តខាងលើ គេអាចទាញរកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងព្រមគ្នាបាន៖  
 $P(A \cap B) = P(B) \times P(A|B)$

១.៣ ព្រឹត្តិការណ៍ឯករាជ្យ និងមិនឯករាជ្យ

- ព្រឹត្តិការណ៍មិនអាស្រ័យ (មិនទាក់ទងគ្នា)៖ គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលការកើតឡើងនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយមិនមានឥទ្ធិពលដល់ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀត។

លក្ខខណ្ឌមិនអាស្រ័យ

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

- ព្រឹត្តិការណ៍អាស្រ័យ (ទាក់ទងគ្នា)៖ កាលណា  
 $P(A \cap B) \neq P(A) \times P(B)$

រូបមន្តកាត់ និងបែរន្ទុយី

- $P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B)$
- $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B)$
- វិញ្ញាសាបែរន្ទុយី៖ ប្រូបាបជោគជ័យ  $k$  ដង ក្នុងការសាកល្បង  $n$  ដងគឺ៖  
 $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$  (ដែល  $q = 1 - p$ )

មេរៀនទី២៖ ទ្រឹស្តីបទបែយស

២.១ រូបមន្តប្រូបាបសរុប

- បំណែងចែកលំហសំណាក៖ ព្រឹត្តិការណ៍  $A_1, A_2, \dots, A_n$  ដែលផ្តាច់គ្នាពីរៗ ហើយមានផលបូកស្មើនឹងលំហសំណាកសរុប។
- ករណីព្រឹត្តិការណ៍២ទូទៅ ( $F, F^c$ )៖  
 $P(E) = P(E|F)P(F) + P(E|F^c)P(F^c)$

រូបមន្តប្រូបាបសរុប

បើព្រឹត្តិការណ៍  $B$  កើតឡើងក្នុងបំណែងចែក  $A_i$  នោះ៖  $P(B) = \sum_{i=1}^n P(B|A_i)P(A_i)$

២.២ ទ្រឹស្តីបទបែយស


ទ្រឹស្តីបទបែយស

ប្រើសម្រាប់គណនាប្រូបាបដើមវិញ (ត្រលប់ក្រោយ) នៅពេលដឹងលទ្ធផល  $B$  ៖

$$P(A_k|B) = \frac{P(B|A_k)P(A_k)}{\sum_{i=1}^n P(B|A_i)P(A_i)}$$


ចំណាំបន្ថែម

- គំនូសបំព្រួញមែកធាង (Tree Diagram)៖
  - ផលបូកប្រូបាបតាមខ្ទង់ចេញពីគល់តែមួយ ត្រូវតែស្មើ 1 ។
  - ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ចុងខ្ទង់គឺជាផលគុណនៃប្រូបាបតាមខ្ទង់នោះ។



### មេរៀន កោសិក Connic Section


#### មេរៀនទី១៖ ប៉ារ៉ាបូល



#### និយមន័យ

ប៉ារ៉ាបូលគឺជាសំណុំចំណុច  $P(x, y)$  នៅក្នុងប្លង់ដែល មានចម្ងាយស្មើពីចំណុចនិង  $F$  (Focus) មួយទៅនិងបន្ទាត់និង  $\Delta$  មួយ (Directrix) ។


- $F$  (Focus) នោះហៅថា កំណុំ
- បន្ទាត់និង  $\Delta$  ហៅថា បន្ទាត់ប្រាប់ទិស
- បន្ទាត់ដែលកាត់តាមកំណុំហើយកែងនឹងបន្ទាត់ប្រាប់ទិសហៅថា អ័ក្សឆ្លុះ នៃប៉ារ៉ាបូល ។
- $V$  ជាចំណុចកណ្តាលដែលភ្ជាប់រវាងកំណុំ  $F$  និងបន្ទាត់ប្រាប់ទិស  $\Delta$  ។
- គ្រប់ចំណុច  $P(x, y)$  ស្ថិតនៅលើប៉ារ៉ាបូល មានកំណុំ  $F$  និងបន្ទាត់ប្រាប់ទិស  $\Delta$  គេបាន  $MF = d(M, \Delta)$  ។



#### ១. សមីការស្តង់ដារនៃប៉ារ៉ាបូល (អ័ក្សឆ្លុះឈរ)


ក. ទម្រង់  $x^2 = 4py$  (កំពូលនៅ  $(0, 0)$ )

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| លក្ខណៈ/សមីការ    | $x^2 = 4py$                        |
| អ័ក្សឆ្លុះ       | $x = 0$ (អ័ក្ស $y$ )               |
| កំពូល (Vertex)   | $(0, 0)$                           |
| កំណុំ (Focus)    | $(0, p)$                           |
| បន្ទាត់ប្រាប់ទិស | $y = -p$                           |
| ទិសដៅបើក         | លើ ( $p > 0$ ) / ក្រោម ( $p < 0$ ) |



ខ. ទម្រង់  $(x - h)^2 = 4p(y - k)$  (កំពូលនៅ  $(h, k)$ )


|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| លក្ខណៈ/សមីការ        | $(x - h)^2 = 4p(y - k)$            |
| អ័ក្សឆ្លុះ (Symetry) | $x = h$                            |
| កំពូល (Vertex)       | $(h, k)$                           |
| កំណុំ (Focus)        | $(h, k + p)$                       |
| បន្ទាត់ប្រាប់ទិស     | $y = k - p$                        |
| ទិសដៅបើក             | លើ ( $p > 0$ ) / ក្រោម ( $p < 0$ ) |



#### ២. សមីការស្តង់ដារនៃប៉ារ៉ាបូល (អ័ក្សឆ្លុះដេក)


ក. ទម្រង់  $y^2 = 4px$  (កំពូលនៅតំបន់តម្រុយ  $(0, 0)$ )

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| លក្ខណៈ/សមីការ    | $y^2 = 4px$                           |
| អ័ក្សឆ្លុះ       | $y = 0$ (អ័ក្ស $Ox$ )                 |
| កំពូល (Vertex)   | $(0, 0)$                              |
| កំណុំ (Focus)    | $(p, 0)$                              |
| បន្ទាត់ប្រាប់ទិស | $x = -p$                              |
| ទិសដៅបើក         | ស្តាំ ( $p > 0$ ) / ឆ្វេង ( $p < 0$ ) |



ខ. ទម្រង់  $(y - k)^2 = 4p(x - h)$  (កំពូលនៅ  $(h, k)$ )

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| លក្ខណៈ/សមីការ    | $(y - k)^2 = 4p(x - h)$               |
| អ័ក្សឆ្លុះ       | $y = k$                               |
| កំពូល (Vertex)   | $(h, k)$                              |
| កំណុំ (Focus)    | $(h + p, k)$                          |
| បន្ទាត់ប្រាប់ទិស | $x = h - p$                           |
| ទិសដៅបើក         | ស្តាំ ( $p > 0$ ) / ឆ្វេង ( $p < 0$ ) |



#### សមីការទូទៅនៃប៉ារ៉ាបូល

- អ័ក្សឆ្លុះឈរ  $y = ax^2 + bx + c$  ( $a \neq 0$ ) ឬទម្រង់ម្យ៉ាងទៀត៖  
 $Ax^2 + Dx + Ey + F = 0$  ( $A \neq 0, E \neq 0$ )
- អ័ក្សឆ្លុះដេក  $x = ay^2 + by + c$  ( $a \neq 0$ ) ឬទម្រង់ម្យ៉ាងទៀត៖  
 $Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$  ( $C \neq 0, D \neq 0$ )

#### វិធីសាស្ត្រប៉ារ៉ាបូល

ដៅកំពូល  $\rightarrow$  ដៅកំណុំ  $\rightarrow$  មើលសញ្ញាកំណត់ទិសបើក ( $P$ )  $\rightarrow$  គូសបន្ទាត់ប្រាប់ទិស  $\rightarrow$  រកចំណុចកាត់អ័ក្ស  $\rightarrow$  គូសភ្ជាប់!

#### សមីការបន្ទាត់ប៉ះនៃប៉ារ៉ាបូល

សមីការបន្ទាត់ប៉ះនិងខ្សែកោងត្រង់ចំណុច  $M(x_0, y_0)$

$$y - y_0 = y'(x_0)(x - x_0)$$


ជំហានក្នុងការអនុវត្ត៖

1. រកតួអនុគារនៃចំណុចប៉ះ  $(x_0, y_0)$  ៖ បើគេប្រាប់តែ  $x_0$  ត្រូវយកវាទៅជំនួសក្នុងសមីការប៉ារ៉ាបូលដើម្បីរក  $y_0$  ។
2. គណនាដេរីវេ  $y'$  ៖ ធ្វើដេរីវេនៃអនុគមន៍  $y$  ។
3. រកមេគុណប្រាប់ទិស  $m$  ៖ យកតម្លៃ  $x_0$  ទៅជំនួសក្នុងដេរីវេដើម្បីរក  $m = y'(x_0)$  ។
4. សរសេរសមីការបន្ទាត់ប៉ះ ៖ ជំនួសតម្លៃ  $x_0, y_0$  និង  $m$  ចូលក្នុងរូបមន្តប្រភេទជាទូទៅ។



មេរៀន កោសិក Conic Section

អេលីប



លក្ខខណ្ឌ៖  $d_1 + d_2 = 2a$

អេលីប គឺជា គន្លងនៃសំណុំចំណុចទាំងអស់ (P) នៅលើប្លង់មួយ ដែល ផលបូកនៃចម្ងាយ ពីចំណុច P នោះទៅកាន់ ចំណុចថេរពីរ (ហៅថា កំណុំ) គឺមាន តម្លៃថេរ។

$PF_1 + PF_2 = \text{តម្លៃថេរ} = 2a$

ធាតុសំខាន់ៗនៃអេលីប

| ធាតុ     | និយមន័យ                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
| ផ្ចិត    | ចំណុចកណ្តាលនៃអ័ក្សធំ និងអ័ក្សតូច ឬ កំពូលទាំងពីរ ឬ កំណុំទាំងពីរ។ |
| កំពូល    | ចំណុចកាន់នៃអ័ក្សធំ និងអេលីប។                                    |
| កំណុំ    | ចំណុចថេរទាំងពីរ (តាងដោយ $F_1$ និង $F_2$ ) ដែលស្ថិតនៅខាងក្នុង    |
| អ័ក្សធំ  | អ័ក្សធំ អង្កត់ដែលឆ្លងកាត់ផ្ចិតមានប្រវែងស្មើ $[V_1V_2] = 2a$ ។   |
| អ័ក្សតូច | អ័ក្សតូច ជាអ័ក្សដែលកាត់កែងនឹងអ័ក្សធំត្រង់ផ្ចិតនៃចំណុចកណ្តាល។    |


សមីការស្តង់ដារនៃអេលីបមានពីរទម្រង់ ដោយផ្អែកលើទិសដៅនៃអ័ក្សធំ (Major Axis) របស់វា។

លក្ខខណ្ឌគឺ  $a > b > 0$  និង  $c^2 = a^2 - b^2$ ។

សមីការស្តង់ដារនៃអេលីប ផ្ចិត(0, 0)


1. អេលីបដេក (អ័ក្សធំស្របអ័ក្ស x)៖  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

- ផ្ចិត (Center):  $I(0, 0)$
- កំពូល (Vertices):  $V(\pm a, 0)$
- ផ្ចិត (Foci):  $F(\pm c, 0)$
- កំពូលអ័ក្សតូច៖  $F(0, \pm b)$
- ប្រវែងអ័ក្សធំ =  $2a$  ; អ័ក្សតូច =  $2b$



2. អេលីបឈរ (អ័ក្សធំស្របអ័ក្ស y)៖  $\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$


- ផ្ចិត (Center):  $I(h, k)$
- កំពូល (Vertices):  $V(h, k \pm a)$
- ផ្ចិត (Foci):  $F(h, k \pm c)$
- កំពូលអ័ក្សតូច៖  $F(h \pm b, k)$
- ប្រវែងអ័ក្សធំ =  $2a$  ; អ័ក្សតូច =  $2b$



សមីការស្តង់ដារនៃអេលីប ផ្ចិត(h, k)


1. អេលីបដេក៖  $\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$

- ផ្ចិត (Center):  $I(h, k)$
- កំពូល (Vertices):  $V(h \pm a, k)$
- ផ្ចិត (Foci):  $F(h \pm c, k)$
- កំពូលអ័ក្សតូច៖  $B(h, k \pm b)$
- ប្រវែងអ័ក្សធំ =  $2a$  ; អ័ក្សតូច =  $2b$



2. អេលីបឈរ៖  $\frac{(x-h)^2}{b^2} + \frac{(y-k)^2}{a^2} = 1$

- ផ្ចិត (Center):  $I(h, k)$
- កំពូល (Vertices):  $V(h, k \pm a)$
- ផ្ចិត (Foci):  $F(h, k \pm c)$
- កំពូលអ័ក្សតូច៖  $B(h \pm b, k)$
- ប្រវែងអ័ក្សធំ =  $2a$  ; អ័ក្សតូច =  $2b$



ទម្រង់សមីការទូទៅ (General Form)

សមីការទូទៅ

សមីការដឺក្រេទី២ ដែលមានពីរអថេរ x និង y ជាសមីការទូទៅនៃអេលីប លុះត្រាតែវាស្ថិតក្នុងទម្រង់៖

$Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + E = 0$

- A និង B ត្រូវមានសញ្ញាដូចគ្នា ( $A \cdot B > 0$ )
- $A \neq B$  (ព្រោះបើ  $A = B$  វានឹងក្លាយជាសមីការរង្វង់)

វិធីសាស្ត្រសម្រួលអេលីប

ដៅផ្ចិត → រាបចម្ងាយ a និង b យកចំណុចទាំង៤ → គូសរង្វង់សំប៉ែត!

សមីការបន្លាស់ប្តូរនៃអេលីប

ករណីផ្ចិត  $C(0, 0)$ :

- អ័ក្សធំដេក៖  $\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} = 1$
- អ័ក្សធំឈរ៖  $\frac{xx_0}{b^2} + \frac{yy_0}{a^2} = 1$

ករណីផ្ចិត  $C(h, k)$ :

- អ័ក្សធំដេក៖  $\frac{(x-h)(x_0-h)}{a^2} + \frac{(y-k)(y_0-k)}{b^2} = 1$
- អ័ក្សធំឈរ៖  $\frac{(x-h)(x_0-h)}{b^2} + \frac{(y-k)(y_0-k)}{a^2} = 1$




មេរៀន កោសិក Connic Section


មេរៀនទី៣៖ អ៊ីពែបូល Hyperbola

១. និយមន័យ (Definition) អ៊ីពែបូល គឺជាសំនុំនៃចំនុច  $P(x, y)$  នៅក្នុងប្លង់ ដែលផលដក ដាច់ខាតនៃចម្ងាយពីចំនុច  $P$  ទៅកាន់ចំនុចនិង ពីរ (កំណុំ  $F_1$  និង  $F_2$ ) មានតម្លៃថេរជានិច្ច៖

$|PF_1 - PF_2| = 2a$



២. ធាតុសំខាន់ៗ




- ផ្ចិត (Center):  $I(h, k)$
- កំពូល (Vertices): ចម្ងាយ  $a$  ពីផ្ចិត តាងដោយ  $V$
- កំណុំ (Foci): មានចម្ងាយ  $c$  ពីផ្ចិត តាងដោយ  $F$
- ទំនាក់ទំនង  $a, b$  និង  $c$  គឺ  $c^2 = a^2 + b^2$
- $c > 0; c > b, c > a$  និង  $e = \frac{c}{a} > 1$

៣. សមីការស្តង់ដារ (Standard Equations)

ក. ផ្ចិតនៅ  $I(0, 0)$  អ័ក្សរលើ  $a$  ប្រែប្រួល


1. អ័ក្សទទឹងដេក:  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

- ផ្ចិត:  $I(0, 0)$
- កំពូល:  $(\pm a, 0)$
- កំណុំ:  $(\pm c, 0)$
- អាស៊ីមតូត:  $y = \pm \frac{b}{a}x$



2. អ័ក្សទទឹងឈរ:  $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$

- ផ្ចិត:  $I(0, 0)$
- កំពូល:  $(0, \pm a)$
- កំណុំ:  $(0, \pm c)$
- អាស៊ីមតូត:  $y = \pm \frac{a}{b}x$




៣. សមីការស្តង់ដារ (Standard Equations)

ខ. ផ្ចិតនៅ  $V(h, k)$  អ័ក្សរលើ  $a$  ប្រែប្រួល


1. អ័ក្សទទឹងដេក:  $\frac{(x - h)^2}{a^2} - \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1$

- ផ្ចិត:  $I(h, k)$
- កំពូល:  $(h \pm a, k)$
- កំណុំ:  $(h \pm c, k)$
- អាស៊ីមតូត:  $y - k = \pm \frac{b}{a}(x - h)$



2. អ័ក្សទទឹងឈរ:  $\frac{(y - k)^2}{a^2} - \frac{(x - h)^2}{b^2} = 1$

- ផ្ចិត:  $I(h, k)$
- កំពូល:  $(h, k \pm a)$
- កំណុំ:  $(h, k \pm c)$
- អាស៊ីមតូត:  $y - k = \pm \frac{a}{b}(x - h)$



៤. ទម្រង់សមីការទូទៅ (General Form)

សមីការទូទៅ

សមីការដេក្រទីប ដែលមានពីរអថេររវាង  $x$  និង  $y$  គឺជាសមីការទូទៅនៃអ៊ីពែបូល លុះត្រាតែវាស្ថិតក្នុងទម្រង់៖

$Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + E = 0$

លក្ខខណ្ឌដាច់ខាត៖ មេគុណ  $A$  និង  $B$  ត្រូវមានសញ្ញាផ្ទុយគ្នាជានិច្ច ( $A \cdot B < 0$ ) ។

៥. វិធីសម្គាល់រូបរាងអ៊ីពែបូលពីសមីការទូទៅ

សមីការទូទៅ

- បើ  $A > 0$  និង  $B < 0$  (ឬ  $x^2$  វិជ្ជមាន)៖ អ៊ីពែបូលមាន អ័ក្សទទឹងដេក (ស្របអ័ក្ស  $x$ ) ។
- បើ  $A < 0$  និង  $B > 0$  (ឬ  $y^2$  វិជ្ជមាន)៖ អ៊ីពែបូលមាន អ័ក្សទទឹងឈរ (ស្របអ័ក្ស  $y$ ) ។

៦. វិធីសង់ត្រាបអ៊ីពែបូល

ដោយផ្អែកលើកំពូល  $\rightarrow$  គូសចតុកោណកែងប្រាង  $\rightarrow$  គូសបន្ទាត់ ខ្សែង (អាស៊ីមតូត)  $\rightarrow$  គូសខ្សែកោងអាបអាស៊ីមតូត!



មេរៀន វិច្ឆិកា ក្នុងលំហ Vector Space

មេរៀនទី១៖ វិច្ឆិកា ក្នុងលំហ

១.១ កូអរដោនេ និងលាមនៃវិច្ឆិកា

រូបមន្តសំខាន់

បើ  $A(x_A, y_A, z_A)$  និង  $B(x_B, y_B, z_B)$   
នោះ តាង  $\Delta x = x_B - x_A, \Delta y = y_B - y_A,$   
 $\Delta z = z_B - z_A$  ។

•  $\vec{AB} = (\Delta x, \Delta y, \Delta z)$

•  $|\vec{AB}| = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2}$


១.២ ផលគុណស្កាលែនៃពីរវិច្ឆិកា

ផលគុណស្កាលែ

បើ  $\vec{u} = (a, b, c)$  និង  $\vec{v} = (x, y, z)$  នោះ

$\vec{u} \cdot \vec{v} = ax + by + cz = |\vec{u}| |\vec{v}| \cos \theta$

ហើយ  $\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$  ។




១.៣ ផលគុណខ្វែងនៃពីរវិច្ឆិកា

បើ  $\vec{u} = (a_1, b_1, c_1)$  និង  $\vec{v} = (a_2, b_2, c_2)$

$\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix} = \vec{i} \begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_2 & c_2 \end{vmatrix} - \vec{j} \begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix} + \vec{k} \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}$   
 $= (b_1 c_2 - b_2 c_1) \vec{i} - (a_1 c_2 - a_2 c_1) \vec{j} + (b_2 a_1 - a_2 b_1) \vec{k}$

និង  $|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}| |\vec{v}| \sin \theta$  ។




- $\vec{u} \times \vec{v} = -(\vec{v} \times \vec{u})$
- $\vec{u} \times (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \times \vec{v} + \vec{u} \times \vec{w}$
- $k(\vec{u} \times \vec{v}) = (k\vec{u}) \times \vec{v} = \vec{u} \times (k\vec{v})$
- $\vec{u} \times \vec{0} = \vec{0}$  និង  $\vec{u} \times \vec{u} = \vec{0}$
- បើ  $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0}$  នោះ  $\vec{u} \parallel \vec{v}$

១.៤ ផលគុណមធ្យម៖ ផ្ទៃក្រឡា និង មាឌ


•  $S = |\vec{u} \times \vec{v}|$  ជា ផ្ទៃក្រឡា ប្រលេឡូក្រាម ដែលផ្គុំ  
ដោយវ៉ិចទ័រ  $\vec{u}$  និង  $\vec{v}$




•  $S = \frac{1}{2} |\vec{u} \times \vec{v}|$  ជា ផ្ទៃក្រឡា ត្រីកោណ ដែលផ្គុំ  
ដោយវ៉ិចទ័រ  $\vec{u}$  និង  $\vec{v}$



• មាឌប្រលេពីប៉ែត  $V = |\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})|$



• មាឌចតុមុខ  $= \frac{1}{6}$  នៃមាឌប្រលេពីប៉ែត (ចតុមុខ ពីរ៉ាមីត  
និយ័ត តេត្រាអែត)



លក្ខណៈ

- បើ  $\vec{AB} \times \vec{AC} = \vec{0}$  នោះបីចំណុច  $A, B, C$ 
  1. រត់មិនត្រង់ជួរគ្នា
  2. មិនស្ថិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយ
  3. បង្កើតបានប្លង់មួយ
  4. ជាកំពូលនៃត្រីកោណមួយ ។
- បើ  $\vec{AB} \cdot (\vec{AC} \times \vec{AD}) \neq 0$  នោះ គេថា  
បួនចំណុច  $A, B, C$  និង  $D$  មិនស្ថិតក្នុងប្លង់  
តែមួយ ។

មេរៀនទី២៖ បន្ទាត់ ប្លង់ និងស្វ៊ែរ

២.១ សមីការបន្ទាត់ក្នុងលំហ

បន្ទាត់កាត់តាមចំណុច  $P(x_0, y_0, z_0)$

បើបន្ទាត់  $L$  ស្របនឹងវ៉ិចទ័រ  $\vec{u} = (a, b, c)$  នោះ

$$\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases}$$

បើ  $abc \neq 0$  នោះសមីការឆ្លុះកំណត់ដោយ៖


$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}$$

២.២ ចម្ងាយពីចំណុចទៅបន្ទាត់

រូបមន្តចម្ងាយ

បើ  $P$  ជាចំណុចមួយលើ  $L$  និង  $\vec{u}$  ជាវ៉ិចទ័រប្រាប់  
ទិសនៃ  $L$  នោះ

$$d(M, L) = \frac{|\vec{PM} \times \vec{u}|}{|\vec{u}|}$$



## មេរៀន វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ Vector Space

### មេរៀនទី១៖ វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ

#### ២.៣ សមីការប្លង់ និងប្លង់មួយពីចំណុចនៅប្លង់


ប្លង់មានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់  $\vec{n} = (a, b, c)$

បើប្លង់  $(\alpha)$  កាត់តាម  $P(x_0, y_0, z_0)$  នោះ៖

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

សមីការទូទៅ៖  $ax + by + cz + d = 0$  ។

$$d(M, \alpha) = \frac{|ax_M + by_M + cz_M + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$




#### ២.៤ មុំរវាងប្លង់ពីរ


##### រូបមន្តមុំ

បើប្លង់ពីរមានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់  $\vec{n}_1$  និង  $\vec{n}_2$  នោះ៖

$$\cos \theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|}$$



#### ២.៥ សមីការស្វ័យ



បើស្វ័យ  $(S)$  មានផ្ចិត  $I = (a, b, c)$  និងកាំ  $R$  នោះ៖

- សមីការស្វ័យជា

$$(S) : (x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$$

- សមីការទូទៅ


$$(S) : x^2 + y^2 + z^2 + Ax + By + Cz + D = 0$$

- បើស្វ័យ  $(S)$  មានអង្កត់ផ្ចិត  $[AB]$  នោះ  $(S)$  មានផ្ចិត  $I = \left( \frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}, \frac{z_A + z_B}{2} \right)$  និងមានកាំ  $R = \frac{1}{2}AB$

ទីតាំងរវាងស្វ័យ  $(S)$  និងប្លង់  $(P)$

បើស្វ័យ  $(S)$  មានផ្ចិត  $I(x_0, y_0, z_0)$  និងកាំ  $R$  និងប្លង់  $(\alpha) : ax + by + cz + d = 0$

- បើ  $d(I, \alpha) > R$  នោះប្លង់  $\alpha$  មិនកាត់ស្វ័យទេ ។
- បើ  $d(I, \alpha) = R$  នោះប្លង់  $\alpha$  ប៉ះស្វ័យត្រង់មួយចំណុច ។
- បើ  $d(I, \alpha) < R$  នោះប្លង់  $\alpha$  កាត់ស្វ័យបានរង្វង់មួយ ។



#### ៣.១ ប្រភេទត្រីកោណត្រីកោណកែង

- វិធីទី១៖  $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 0$  ( $\perp$   $AC$ )

- វិធីទី២៖ ទ្រឹស្តីបទពីតាក័រ៖

$$BC^2 = AC^2 + AB^2$$

#### ត្រីកោណសមបាត

- គណនា  $|\vec{AB}|, |\vec{BC}|, |\vec{AC}|$

- មានប្រវែងពីរស្មើគ្នា ។

#### ត្រីកោណកែងសមបាត

- បង្ហាញជ្រុងពីរស្មើគ្នា

- បង្ហាញថាមានមុំកែងមួយ

#### ត្រីកោណសម័ង្ស

- គណនាប្រវែងជ្រុងទាំងបី

- $|\vec{AB}| = |\vec{BC}| = |\vec{AC}|$

- វិធីទី២៖ រកមុំទាំងបីឱ្យមានរង្វាស់ស្មើ  $60^\circ$  ដូចគ្នា ។

#### ៣.២ ប្រភេទចតុកោណប្រលេឡូក្រាម







- រក  $\vec{AB}, \vec{DC}$  និង  $\vec{AD}, \vec{BC}$

- វ៉ិចទ័រស្មើគ្នា  $\vec{AB} = \vec{DC}$  និង  $\vec{AD} = \vec{BC}$

#### ចតុកោណកែង

- ជាប្រលេឡូក្រាម ( $\vec{AB} = \vec{DC}$ )

- និងមានមុំកែងមួយ៖  $\vec{AB} \cdot \vec{AD} = 0$



#### ការវាស់

- ជាប្រលេឡូក្រាម  $\vec{AB} = \vec{DC}$

- ជ្រុងជាប់គ្នាស្មើគ្នា  $|\vec{AB}| = |\vec{AD}|$

- មានមុំកែងមួយ៖  $\vec{AB} \cdot \vec{AD} = 0$

- (សិស្សអាចបង្ហាញជ្រុងទាំង ៤ ស្មើគ្នា និង មានមុំកែងមួយ)

#### ចតុកោណស្មើ

- ជ្រុងទាំងបួនមានប្រវែងស្មើគ្នា៖

$$|\vec{AB}| = |\vec{BC}| = |\vec{CD}| = |\vec{DA}|$$

- ឬបង្ហាញថាអង្កត់ទ្រូងទាំងពីរកែងគ្នា៖

$$\vec{AC} \cdot \vec{BD} = 0$$

#### ២.៦ ប្លង់រវាងបន្ទាត់ពីរ

##### រូបមន្តចម្ងាយ

បន្ទាត់  $L_1$  កាត់តាម  $M_1$  មានទិស  $\vec{u}_1$  និង  $L_2$  កាត់តាម  $M_2$  មានទិស  $\vec{u}_2$  ។

- បើបន្ទាត់ស្របគ្នា៖

$$d(L_1, L_2) = \frac{|\overrightarrow{M_1 M_2} \times \vec{u}_1|}{|\vec{u}_1|}$$

- បើបន្ទាត់មិនស្របគ្នា

$$d(L_1, L_2) = \frac{|\overrightarrow{M_1 M_2} \cdot (\vec{u}_1 \times \vec{u}_2)|}{|\vec{u}_1 \times \vec{u}_2|}$$