



រូបមន្តសង្ខេបគណិតវិទ្យា

រៀបចំដោយ៖ គ្រូបង្រៀននៃសាលារៀនជំនាន់ទី១ (NGS)

ថ្នាក់ទី ១១

ជំពូកទី ១

ស្វ៊ីត

មេរៀនទី១. ស្វ៊ីតចំនួនពិត

- ស្វ៊ីតនៃចំនួនពិតគឺជាអនុគមន៍លេខដែលកំណត់ពី $\mathbb{N}$ ទៅ $\mathbb{R}$ ។

មេរៀនទី២. ស្វ៊ីតពន្លា

- ស្វ៊ីតពន្លា គឺជាស្វ៊ីតនៃចំនួនពិតដែលមានកូដិមួយៗ (ក្រៅពីកូដិ ១) ស្មើនឹងកូដិមុនបន្ទាប់បូកចំនួនថេរ d មួយ (ហៅថាផលសងរួម $d = U_{n+1} - U_n$) ។

រូបមន្តកូទៅនៃស្វ៊ីតពន្លា

$$U_n = U_1 + (n-1) \times d$$

ផលបូក n តួនៃស្វ៊ីតពន្លា

$$S_n = \frac{(U_1 + U_n) \times n}{2}$$

មេរៀនទី៣. ស្វ៊ីតធរណីមាត្រ

- ស្វ៊ីតធរណីមាត្រគឺជាស្វ៊ីតចំនួនពិតដែលកូដិមួយៗ (ក្រៅពីកូដិ ១) ស្មើនឹងកូដិមុនបន្ទាប់គុណនឹងចំនួនថេរ q ដែល $q \neq 0$ ។ ចំនួនថេរ q នេះហៅថាផលធៀបរួមស្វ៊ីតធរណីមាត្រ ។

រូបមន្តកូទៅនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រ

$$U_{n+1} = U_n \times q, U_n = U_1 \times q^{n-1}$$

ផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រ

$$S_n = \frac{U_1(q^n - 1)}{q - 1} \text{ ដែល } q \neq 1$$

ផលបូកស្វ៊ីតធរណីមាត្រអនន្ត

$$S_n = \frac{U_1}{1 - q} \text{ បើ } |q| < 1$$

មេរៀនទី៤. ផលបូកតួនៃស្វ៊ីតផ្សេងៗ

- លក្ខណៈនៃស្វ៊ីតថ្នាំ

លក្ខណៈនៃស្វ៊ីតថ្នាំ

$$\text{ក. } \sum_{k=1}^n c = nc$$

$$\text{ខ. } \sum_{k=1}^n ca_k = c \sum_{k=1}^n a_k$$

$$\text{គ. } \sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k$$

$$\text{ឃ. } \sum_{k=1}^n (a_k - b_k) = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^n b_k$$

$$\text{ង. } \sum_{k=1}^n (a_k + b_k)^2 = \sum_{k=1}^n a_k^2 + 2 \sum_{k=1}^n a_k b_k + \sum_{k=1}^n b_k^2$$

- រូបមន្តផលបូកសំខាន់ៗ

រូបមន្តផលបូកនៃស្វ៊ីតលំដាប់ខ្ពស់

$$\text{ក. } \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\text{ខ. } \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\text{គ. } \sum_{k=1}^n k^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2$$

$$\text{ឃ. } \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \frac{n}{n+1}$$

$$\text{ង. } \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \frac{n(n+3)}{4(n+1)(n+2)}$$

- ផលសងលំដាប់ទី១ នៃស្វ៊ីត

ជាទូទៅទី១៖ ផលសងលំដាប់ទី១ នៃស្វ៊ីត

- គេមានស្វ៊ីត (a_n) : $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ ហើយ $b_1 = a_2 - a_1, b_2 = a_3 - a_2, b_3 = a_4 - a_3, \dots, b_{n-1} = a_n - a_{n-1}$ ។ ស្វ៊ីត (b_n) : $b_1, b_2, b_3, \dots, b_{n-1}$ ហៅថាផលសងតួលំដាប់ទី ១ នៃស្វ៊ីត (a_n) ។

- គេមានស្វ៊ីត (a_n) និងស្វ៊ីត (b_n) ដែលកំណត់ដោយ $b_n = a_{n+1} - a_n, n = 1, 2, 3, \dots$ តួទី n នៃស្វ៊ីត (a_n) កំណត់ដោយ

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k \text{ ចំពោះ } n \geq 2$$

- ផលសងលំដាប់ទី២ នៃស្វ៊ីត

ជាទូទៅទី២៖ ផលសងលំដាប់ទី២ នៃស្វ៊ីត

- គេមានស្វ៊ីត (a_n) ។ ស្វ៊ីត (b_n) កំណត់ដោយ $b_n = a_{n+1} - a_n, n = 1, 2, 3, \dots$ ហៅថាផលសងតួលំដាប់ទី ១ នៃស្វ៊ីត (a_n) ដែលមានតួទី n កំណត់ដោយ

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k \text{ ចំពោះ } n \geq 2$$

- ស្វ៊ីត (c_n) ជាផលសងតួលំដាប់ទី ២ នៃស្វ៊ីត (a_n) គឺជាផលសងតួលំដាប់ទី ១ នៃស្វ៊ីត (b_n) កំណត់ដោយ $c_n = b_{n+1} - b_n, n = 1, 2, 3, \dots$ ដែលមានតួទី n នៃស្វ៊ីត

$$(b_n) \text{ កំណត់ដោយ } b_n = b_1 + \sum_{k=1}^{n-1} c_k \text{ ចំពោះ } n \geq 2$$

មេរៀនទី៥. ទំនាក់ទំនងរវាងស្វ៊ីត

- កំណត់តួទី n ដោយប្រើស្វ៊ីតជំនួយ

ជាទូទៅទី១៖ កំណត់តួទី n ដោយប្រើស្វ៊ីតជំនួយ

គេប្រើស្វ៊ីតជំនួយ (r_n) ដែល $r_n = \alpha \cdot n + \beta$ (α, β ថេរ) ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ទំនាក់ទំនងនៃស្វ៊ីត ។ ក្នុងករណីនេះ គេជំនួស (r_n) ក្នុងទំនាក់ទំនងនៃស្វ៊ីត រួចគណនាតម្លៃ α និង β បន្ទាប់មកកំណត់បានស្វ៊ីត (r_n) គេនឹងធ្វើផលសង $a_{n+1} - r_n$ ។

- ទំនាក់ទំនងរវាង a_n និង S_n

កំណត់តួទី n ដោយប្រើទំនាក់ទំនង a_n និង S_n

ចំពោះ $n \geq 2$ គេបាន $S_n - S_{n-1} = a_n$ និង $S_1 = a_1$ ។

• ទំនាក់ទំនងកំណត់កំណើន $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$

កំណត់ តួទី n ដោយ ប្រើ ទំនាក់ទំនង កំណត់កំណើន $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$

ដោះស្រាយ $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$ បើ ទំនាក់ទំនងនៃស្វ៊ីត (a_n) មានទម្រង់

$a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$ គេពិចារណាពី ចំនួន α និង β ដែលបំពេញលក្ខខណ្ឌ

$\alpha + \beta = -p, \alpha\beta = q$ នោះ គេបាន $a_{n+2} - (\alpha + \beta)a_{n+1} + \alpha\beta a_n = 0$ ។ ទំនាក់ទំនងនេះ អាចបម្លែងតាមរបៀបពីរ យ៉ាងដូចខាងក្រោម ៖ $a_{n+2} - \alpha a_{n+1} = \beta(a_{n+1} - \alpha a_n)$ $a_{n+2} - \beta a_{n+1} = \alpha(a_{n+1} - \beta a_n)$ ទំនាក់ទំនងទាំង 2 ខាងលើនេះ គឺជា ស្វ៊ីតធរណីមាត្រ អាចឱ្យ គេរក a_n

បាន ។ គេអាចរក α និង β ដោយដោះស្រាយ សមីការ $x^2 + px + q = 0$ ព្រោះគេស្គាល់ ផលបូកនិងផលគុណវា ។ សមីការ $x^2 + px + q = 0$ ហៅថា "សមីការសម្គាល់នៃ $a_{n+2} - (\alpha + \beta)a_{n+1} + \alpha\beta a_n = 0$ " ។

បើ a និង b ជាចំនួនពិត ហើយ m និង n ជាចំនួនគត់ គេបាន៖

- ក. $a^m \times a^n = a^{m+n}$ ខ. $(a^m)^n = a^{mn}$
- គ. $(ab)^n = a^n b^n$ ឃ. $a^0 = 1, (a \neq 0)$
- ង. $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, (a \neq 0)$
- ច. $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}, (b \neq 0)$
- ន. $\frac{1}{a^n} = a^{-n}, (a \neq 0), n \in \mathbb{N}$

• បូសទី n

បើ a ជាចំនួនពិត

- ក. $\sqrt[n]{a^n} = |a|$ បើ n គូ
- ខ. $\sqrt[n]{a^n} = a$ បើ n សេស

លក្ខណៈបូសទី n

- ក. $\sqrt[n]{a} \times \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$
- ខ. $\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}, b \neq 0$
- គ. $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$ ឃ. $\sqrt[n]{\sqrt[k]{a}} = \sqrt[nk]{a}$
- ង. $\sqrt[nk]{a^{mk}} = \sqrt[n]{a^m}$

• អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល


និយមន័យទី ២

អនុគមន៍ អិចស្ប៉ូណង់ស្យែលគឺជា អនុគមន៍កំណត់ដោយ $f(x) = a^x$ ដែល $x \in \mathbb{R}$ ហើយ a ជាចំនួនពិតវិជ្ជមានខុសពី 1 ។ មានន័យថា


$$f(x) = a^x \text{ ដែល } \begin{cases} x \in \mathbb{R} \\ a > 0 \\ a \neq 1 \end{cases} \quad ។$$

ក្រាបនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល $y = a^x$ ៖

• $a > 1, y = a^x$ កើនជាដាច់ខាត



• $0 < a < 1, y = a^x$ ចុះជាដាច់ខាត



• សមីការអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

សមីការ អនុគមន៍ អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល ចំពោះ

គ្រប់ $a > 0; a \neq 1; x \in \mathbb{R}$

- ☞ $a^x = a^y \iff x = y$
 - ☞ $a^{u(x)} = a^{v(x)} \iff u(x) = v(x)$
 - ☞ $[f(x)]^{u(x)} = [f(x)]^{v(x)}$
- $$\iff \begin{cases} f(x) > 0 \\ [f(x) - 1][u(x) - v(x)] = 0 \end{cases}$$

• វិសមីការអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

វិសមីការអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែលចំពោះ គ្រប់ $a > 0; a \neq 1; x \in \mathbb{R}$

១. បើ $a > 1$

- ☞ $a^x \geq a^y \iff x \geq y$ ☞ $a^x > a^y \iff x > y$
- ☞ $a^x \leq a^y \iff x \leq y$ ☞ $a^x < a^y \iff x < y$

២. បើ $0 < a < 1$

- ☞ $a^x \geq a^y \iff x \leq y$ ☞ $a^x > a^y \iff x < y$
- ☞ $a^x \leq a^y \iff x \geq y$ ☞ $a^x < a^y \iff x > y$

៣. ដូចគ្នាដែរចំពោះ ទំនាក់ទំនង $f(x)$ និង $u(x)$ ឬ $v(x)$ យើងបានដូចខាងក្រោម៖

- ☞ $[f(x)]^{u(x)} > [f(x)]^{v(x)}$
- $\iff \begin{cases} f(x) > 0 \\ [f(x) - 1][u(x) - v(x)] > 0 \end{cases}$
- ☞ $[f(x)]^{u(x)} < [f(x)]^{v(x)}$
- $\iff \begin{cases} f(x) > 0 \\ [f(x) - 1][u(x) - v(x)] < 0 \end{cases}$

• អនុវត្តអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

អនុវត្តន៍ អនុគមន៍ អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល រូបមន្តនៃការគណនាប្រាក់សរុប ដោយស្គាល់អត្រាការប្រាក់ប្រាក់ដើម និងរយៈពេល៖

១. តាង P ជាប្រាក់ដើម i ជាអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ t ជាចំនួនឆ្នាំ គេបាន ប្រាក់សរុបគឺ $A = P(1 + i)^t$ (ប្រើបានចំពោះប្រាក់ទូទាត់ 1 ឆ្នាំម្តង) ។

២. បើ n ជាចំនួនដងនៃការទូទាត់ការប្រាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ គេបានរូបមន្ត $A = P \left(1 + \frac{i}{n}\right)^{nt}$ ។

ជំពូកទី ២

អនុគមន៍ អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល និងលោការីត

មេរៀនទី៤. អនុ.អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

និយមន័យទី ១

ស្វ៊ីយគុណ n នៃចំនួន a ជាផលគុណនៃ n កត្តាដែលកត្តានីមួយៗស្មើនឹង a ។ (មានន័យថា a គុណនឹងខ្លួនឯងចំនួន n ដង) ។ កំណត់ដោយ $\underbrace{a \times a \times a \times \dots \times a}_n = a^n$ ដែល $n \in \mathbb{N}$ ។

មេរៀនទី៥. អនុគមន៍លោការីត

• អនុគមន៍ប្រាស

និយមន័យទី ១

បើ (a, b) ផ្ទៀងផ្ទាត់ $y = f(x)$ ហើយ (b, a) ផ្ទៀងផ្ទាត់ $f^{-1}(x)$ នោះ $f^{-1}(x)$ ជាអនុគមន៍ប្រាសនៃអនុគមន៍ $f(x)$

របៀបរកអនុគមន៍ប្រាស

✎ ជំនួស $f(x)$ ដោយ y ។

✎ ប្តូរ x ទៅជា y និង ប្តូរ y ទៅជា x គេបានសមីការថ្មីរួចទាញរកតម្លៃ y ។

✎ បើសមីការថ្មីនេះមិនមាន y ជាអនុគមន៍នៃ x ទេ នោះអនុគមន៍ f គ្មានអនុគមន៍ប្រាសទេ ។

✎ ជំនួស y ដោយ $f^{-1}(x)$ ។

• អនុគមន៍លោការីត

និយមន័យទី ២

បើ $y = a^x$ នោះគេបាន $x = \log_a y$, $y > 0$, $a > 0$, $a \neq 1$ ហើយ $f(x) = a^x$ មានអនុគមន៍ប្រាស $f^{-1}(x) = \log_a x$ ជាអនុគមន៍លោការីតគោល a នៃ x ។

• ករណី $a = 10$ គេបាន $\log_{10} x$ ហៅថា លោការីតទសភាគ គេអាចសរសេរដោយងាយ $\log x$ ។

• ករណី $a = e$ ($e \approx 2.7182\dots$) គេបាន $\log_e x$ ហៅថា លោការីតធម្មជាតិ ឬ លោការីតនេពែ គេអាចសរសេរដោយងាយ $\ln x$ ។

• លក្ខណៈនៃលោការីត

លក្ខណៈ ចំពោះ គ្រប់ ចំនួនវិជ្ជមាន x, y, n និង a និង b ដែល $a \neq 1, b \neq 1$ គេបាន៖

១. បើ $a^x = n$ នោះ $x = \log_a n$
២. $\log_a b \times \log_b c \times \log_c d \times \log_d a = 1$
៣. $\log_a 1 = 0$
៤. $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$
៥. $\log_b a = \frac{\log_m a}{\log_m b}$ ដែល $m \neq 1, m > 0$
៦. $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$
៧. $a^{\log_n b} = b^{\log_n a}$
៨. $\log_a a = 1$
៩. $\log_a \left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$
១០. $\log_{a^\alpha} b = \frac{1}{\alpha} \log_a b$
១១. $\log_a x^n = n \log_a x$
១២. $a^{\log_a x} = x$
១៣. $\log_{a^\alpha} b^\beta = \frac{\beta}{\alpha} \log_a b$
១៤. $\log_a b \times \log_b a = 1$


• ក្រាបនៃអនុគមន៍លោការីត

អនុគមន៍ $y = a^x$ និង $y = \log_a x$ ដែល $a > 0$, $a \neq 1$ មានក្រាបដូចខាងក្រោម៖

✎ បើ $a > 1$ នោះក្រាប $y = \log_a x$ កើនពីឆ្វេងទៅស្តាំ ។ គេថា $y = \log_a x$ ជាអនុគមន៍កើន ។

✎ ករណី $0 < x < 1$ នោះតម្លៃ $y = \log_a x < 0$ ។

• ករណី $x > 1$ នោះតម្លៃ $y = \log_a x > 0$ ។




អនុគមន៍ $y = a^x$ និង $y = \log_a x$ ដែល $0 < a < 1$, $a \neq 1$ មានក្រាបដូចខាងក្រោម៖

✎ បើ $0 < a < 1$ នោះក្រាប $y = \log_a x$ ចុះពីឆ្វេងទៅស្តាំ ។ គេថា $y = \log_a x$ ជាអនុគមន៍ចុះ ។

✎ ករណី $0 < x < 1$ នោះតម្លៃ $y = \log_a x > 0$ ។

✎ ករណី $x > 1$ នោះតម្លៃ $y = \log_a x < 0$ ។



សង្ខេប

- ✎ អនុគមន៍ $y = \log_a x$ មានក្រាបកាត់តាមចំណុចដែលមានកូអរដោនេ $(1, 0)$ ជានិច្ច ។
- ✎ អនុគមន៍ $y = \log_a x$ មានន័យចំពោះ $x > 0$ ជានិច្ច ។
- ✎ អនុគមន៍ $y = \log_a x$ និង $y = a^x$ មានក្រាបឆ្លុះគ្នាជ្រៀបនឹងបន្ទាត់ $y = x$ ។

• សមីការលោការីត

ជាទូទៅ

បើ $a > 0, a \neq 1$ នោះសមីការ $\log_a x = \log_a y$ គេបាន $x = y$ ។


បើ $a > 1$ នោះក្រាប $y = \log_a x$ កើនពីឆ្វេងទៅស្តាំមានន័យថាកាលណាតម្លៃ x កើន នោះតម្លៃ $y = \log_a x$ កើន ។ ដូចនេះ គេទាញបាន៖

✎ បើ $\log_a x_1 < \log_a x_2$ នោះ $x_1 < x_2$

✎ បើ $\log_a x_1 > \log_a x_2$ នោះ $x_1 > x_2$


✎ បើ $\log_a x_1 \leq \log_a x_2$ នោះ $x_1 \leq x_2$

✎ បើ $\log_a x_1 \geq \log_a x_2$ នោះ $x_1 \geq x_2$



បើ $0 < a < 1$ នោះក្រាប $y = \log_a x$ ចុះពី
ឆ្វេងទៅស្តាំ មានន័យថាកាលណាថ្លៃ x កើន
នោះតម្លៃ $y = \log_a x$ ចុះ ។
ដូចនេះ ចំពោះ $x_1 > 0, x_2 > 0$

- បើ $\log_a x_1 < \log_a x_2$ នោះ $x_1 > x_2$
- បើ $\log_a x_1 > \log_a x_2$ នោះ $x_1 < x_2$
- បើ $\log_a x_1 \leq \log_a x_2$ នោះ $x_1 \geq x_2$
- បើ $\log_a x_1 \geq \log_a x_2$ នោះ $x_1 \leq x_2$



• អនុវត្តលើអនុគមន៍លោការីត

អនុវត្តន៍ អនុគមន៍ អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល រូបមន្ត
នៃការគណនាប្រាក់សរុប ដោយស្គាល់អត្រា
ការប្រាក់ ប្រាក់ដើម និងរយៈពេល ។

- តាង P ជាប្រាក់ដើម i ជាអត្រាការប្រាក់
ប្រចាំឆ្នាំ t ជាចំនួនឆ្នាំ គេបានប្រាក់សរុប
គឺ $A = P(1 + i)^t$ (ប្រើបានចំពោះ
ប្រាក់ទូទាត់ឆ្នាំម្តង)
- បើ n ជាចំនួនដងនៃការទូទាត់ការប្រាក់ក្នុង
មួយឆ្នាំគេបានរូបមន្ត $A = P \left(1 + \frac{i}{n}\right)^{nt}$ ។

ជំពូកទី ៣

អនុគមន៍ ត្រីកោណមាត្រ

មេរៀនទី១ អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

- ការកំណត់មុំមានទិសដៅ


ជាទូទៅ

- $\overrightarrow{OP_0}$ និង $\overrightarrow{OP}$ ជាពីរវ៉ិចទ័រដែលកំណត់បាន
មុំ $\alpha + k \times 360^\circ, k \in \mathbb{Z}$ ដែល k ជាចំនួនដុំ ។
- មុំ α និង $\alpha + 360^\circ$ មានរង្វាស់ខុសគ្នា តែ
មានវ៉ិចទ័រគល់ និង វ៉ិចទ័រចុងដូចគ្នា ។

- រង្វាស់មុំគិតជាវ៉ាដ្យង់

និយមន័យទី១

1 វ៉ាដ្យង់ គឺ ជាវ៉ាស់មុំដែលស្លាកផ្ចមួយ មាន
ប្រវែង ស្មើនឹង កាំ នៃ រង្វង់ ហើយ គេ កំណត់
សរសេរដោយ 1 rd ។



ជាទូទៅទី១

- $360^\circ = 2\pi$ វ៉ាដ្យង់ និង $180^\circ = \pi$ វ៉ាដ្យង់ ។
- $1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ rd}$ និង $1 \text{ rd} = \left(\frac{180^\circ}{\pi}\right)$ ។

ជាទូទៅទី២

$$(\overrightarrow{OP_0}, \overrightarrow{OP}) = \alpha + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \text{ ដែល } k \text{ ជាចំនួនដុំ ។}$$


វិធាននៃការបំប្លែងពីដឺក្រេទៅវ៉ាដ្យង់ និង ពី
វ៉ាដ្យង់ទៅដឺក្រេ

- ដើម្បីបំប្លែងពីដឺក្រេទៅវ៉ាដ្យង់ គ្រាន់តែគុណ
នឹង $\frac{\pi}{180}$ ។
- ដើម្បីបំប្លែងពីវ៉ាដ្យង់ទៅដឺក្រេ គ្រាន់តែគុណ
នឹង $\frac{180}{\pi}$ ។

- ស៊ីនុស កូស៊ីនុស តង់សង់ និងកូតង់សង់


ផលធៀបត្រីកោណមាត្រ

- $\sin \alpha = \frac{\text{ជ្រុងឈម}}{\text{អ៊ីប៉ូតេនុស}} = \frac{BC}{AC}$
- $\cos \alpha = \frac{\text{ជ្រុងជាប់}}{\text{អ៊ីប៉ូតេនុស}} = \frac{AB}{AC}$
- $\tan \alpha = \frac{\text{ជ្រុងឈម}}{\text{ជ្រុងជាប់}} = \frac{BC}{AB}$
- $\cot \alpha = \frac{\text{ជ្រុងជាប់}}{\text{ជ្រុងឈម}} = \frac{AB}{BC}$



នៅក្នុងរង្វង់ ត្រីកោណមាត្រដែលមានផ្ចិត O
និង កាំ r គេមានចំណុច P ជាចំណុចនៅលើ
រង្វង់ដែលមានកូអរដោនេ $P(x, y)$ ហើយ
 $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OP}) = \theta$ ។ P' ជាចំណោលកែងនៃ
 P លើអ័ក្ស $x'x$ និង Q ជាចំណោលកែងនៃ P
លើអ័ក្ស $y'y$ ដូចរូបខាងស្តាំ ។
គេបានទាញបាន៖

- $\sin \theta = \frac{OQ}{OP} = \frac{y}{r}$
- $\cos \theta = \frac{OP'}{OP} = \frac{x}{r}$
- $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{y}{x}$
- $\cot \theta = \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \frac{x}{y}$



ជាទូទៅ៖ គេបាន ស៊ីនុស កូស៊ីនុស តង់សង់ និង
កូតង់សង់ គឺជាអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ ។


- អ័ក្ស yy' ហៅថា អ័ក្សស៊ីនុស
- អ័ក្ស uu' ហៅថា អ័ក្សតង់សង់
- អ័ក្ស xx' ហៅថា អ័ក្សកូស៊ីនុស
- អ័ក្ស vv' ហៅថា អ័ក្សកូតង់សង់

ជំនួយ: គេបាន តាង តម្លៃ អនុត្រីកោណមាត្រ ពី 0° ដល់ 360° ៖

កម្រិត	ដឺក្រេ	រ៉ាដ្យង់	sin	cos	tan	cot
កម្រិតទី I	0°	$0rd$	0	1	0	∞
	30°	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\sqrt{3}$
	45°	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	1
	60°	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
	90°	$\frac{\pi}{2}$	1	0	∞	0
កម្រិតទី II	120°	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\sqrt{3}$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$
	135°	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1	-1
	150°	$\frac{5\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	$-\sqrt{3}$
	180°	π	0	-1	0	∞
កម្រិតទី III	210°	$\frac{7\pi}{6}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$-\sqrt{3}$
	225°	$\frac{5\pi}{4}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	1
	240°	$\frac{4\pi}{3}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
	270°	$\frac{3\pi}{2}$	-1	0	∞	0
	300°	$\frac{5\pi}{3}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\sqrt{3}$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$
កម្រិតទី IV	315°	$\frac{7\pi}{4}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1	-1
	330°	$\frac{11\pi}{6}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	$-\sqrt{3}$

• សញ្ញានៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

	កម្រិតទី I	កម្រិតទី II	កម្រិតទី III	កម្រិតទី IV
sin	+	+	-	-
cos	+	-	-	+
tan	+	-	+	-
cot	+	-	+	-



• ទំនាក់ទំនងសំខាន់ៗ

រូបមន្តទំនាក់សំខាន់ៗនៃអនុត្រីកោណមាត្រ

$$\begin{aligned} ១. \sin^2 \theta + \cos^2 \theta &= 1 & ២. 1 + \tan^2 \theta &= \frac{1}{\cos^2 \theta} \\ ៣. 1 + \cot^2 \theta &= \frac{1}{\sin^2 \theta} & ៤. \tan \theta &= \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \\ ៥. \cot \theta &= \frac{\cos \theta}{\sin \theta} & ៦. \tan \theta \cdot \cot \theta &= 1 \end{aligned}$$

• អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រនៃមុំ θ និង $\theta + 2k\pi$

អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រនៃមុំ θ និង $\theta + 2k\pi$

$$\begin{aligned} \sin(\theta + 2k\pi) &= \sin \theta \\ \cos(\theta + 2k\pi) &= \cos \theta \\ \tan(\theta + 2k\pi) &= \tan \theta \\ \cot(\theta + 2k\pi) &= \cot \theta \end{aligned} \quad \text{ដែល } k \in \mathbb{Z}$$

ចំណាំ


ចំពោះ $k \in \mathbb{Z}$ គេបាន $\tan(\theta + k\pi) = \tan \theta$ និង $\cot(\theta + k\pi) = \cot \theta$ ។

• មុំជួបគ្នា θ និង $-\theta$

ចំណាំ

មុំជួបគ្នា θ និង $-\theta$ គឺជាមុំពីរជួបគ្នា កាលណា ផលបូករង្វាស់មុំទាំងពីរស្មើទស្សន៍តាម 2π ។


រូបមន្ត៖ មុំជួបគ្នា θ និង $-\theta$



$$\begin{aligned} \sin(-\theta) &= -\sin \theta \\ \cos(-\theta) &= \cos \theta \\ \tan(-\theta) &= -\tan(\theta) \\ \cot(-\theta) &= -\cot(\theta) \end{aligned}$$

• មុំបំពេញ $\frac{\pi}{2} - \theta$ និង θ


មុំបំពេញ $\frac{\pi}{2} - \theta$ និង θ



$$\begin{aligned} \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) &= \cos \theta \\ \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) &= \sin \theta \\ \tan\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) &= \cot \theta \\ \cot\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) &= \tan \theta \end{aligned}$$

• មុំបន្ថែម $\pi - \theta$ និង θ


មុំបន្ថែម $\pi - \theta$ និង θ



$$\begin{aligned} \sin(\pi - \theta) &= \sin \theta \\ \cos(\pi - \theta) &= -\cos \theta \\ \tan(\pi - \theta) &= -\tan \theta \\ \cot(\pi - \theta) &= -\cot \theta \end{aligned}$$

• មុំដែលមានផលសងស្មើ π


មុំដែលមានផលសងស្មើ π



$$\begin{aligned} \sin(\pi + \theta) &= -\sin \theta \\ \cos(\pi + \theta) &= -\cos \theta \\ \tan(\pi + \theta) &= \tan \theta \\ \cot(\pi + \theta) &= \cot \theta \end{aligned}$$

- មុំដែលមានជលសងស្មើ $\frac{\pi}{2}$

មុំដែលមានជលសងស្មើ $\frac{\pi}{2}$



- $\sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = \cos \theta$
- $\cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = -\sin \theta$
- $\tan\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = -\cot \theta$
- $\cot\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = -\tan \theta$

- ដែនកំណត់

វិធានដើម្បីកំណត់ដែនកំណត់

- អនុគមន៍ $f(x) = \sin x$ កំណត់ចំពោះគ្រប់ $x \in \mathbb{R}$ គេបាន $D = \mathbb{R}$ ។
- អនុគមន៍ $f(x) = \cos x$ កំណត់ចំពោះគ្រប់ $x \in \mathbb{R}$ គេបាន $D = \mathbb{R}$ ។
- អនុគមន៍ $f(x) = \tan x$ កំណត់បានលុះត្រាតែ $\cos x \neq 0$ គេបាន $x \neq (2k+1)\frac{\pi}{2}$ ដែល $k \in \mathbb{Z}$ ។ ដូចនេះ $D = \mathbb{R} \setminus \left\{(2k+1)\frac{\pi}{2}\right\}$ ។
- អនុគមន៍ $f(x) = \cot x$ កំណត់បានលុះត្រាតែ $\sin x \neq 0$ គេបាន $x \neq k\pi$ ដែល $k \in \mathbb{Z}$ ។ ដូចនេះ $D = \mathbb{R} \setminus \{k\pi\}$ ។

- ខួបនៃអនុគមន៍

និយមន័យ

• គេមានអនុគមន៍ f ដែលមានដែនកំណត់ D ។ គេថា f ជាអនុគមន៍មានខួប p លុះត្រាតែ p ជាចំនួនពិតវិជ្ជមានតូចបំផុតដែល $\forall x \in D$ គេបាន $f(x+p) = f(x)$ ។ បើ f ជាអនុគមន៍ខួបនោះគេបាន៖
 $f(x) = f(x+p) = f[(x+p)+p] = f(x+2p) = \dots$
 $f(x) = f(x-p) = f[(x-p)-p] = f(x-2p) = \dots$

ជាទូទៅ៖ $\forall x \in D, \forall k \in \mathbb{Z}$ គេបាន $f(x+kp) = f(x)$ ។

- អនុគមន៍ $f(x) = A \sin ax$ និង $g(x) = A \cos ax$ មានខួប $T = \frac{2\pi}{|a|}$ ដែល $a \in \mathbb{R}$ ។
- អនុគមន៍ $f(x) = A \tan ax$ និង $g(x) = A \cot ax$ មានខួប $T = \frac{\pi}{|a|}$ ដែល $a \in \mathbb{R}$ ។
- អនុគមន៍ $f(x) = A \sin(ax - \theta) + B$ និង $f(x) = A \cos(ax - \theta) + B$ មានខួប $T = \frac{2\pi}{|a|}$ ដែល $a \in \mathbb{R}$ ។
- អនុគមន៍ $f(x) = A \tan(ax - \theta) + B$ និង $f(x) = A \cot(ax - \theta) + B$ មានខួប $T = \frac{\pi}{|a|}$ ដែល $a \in \mathbb{R}$ ។

- ភាពគូ និងសេសនៃអនុគមន៍


និយមន័យ

គេមានអនុគមន៍ f ដែលមានដែនកំណត់ $\mathbb{D}$ ។

- គេថា f ជាអនុគមន៍គូ លុះត្រាតែគ្រប់ $x \in \mathbb{D}, -x \in \mathbb{D}$ គេបាន $f(-x) = f(x)$ ។
- គេថា f ជាអនុគមន៍សេស លុះត្រាតែគ្រប់ $x \in \mathbb{D}, -x \in \mathbb{D}$ គេបាន $f(-x) = -f(x)$ ។

អថេរភាពនិមិត្តរូបនៃអនុគមន៍ $y = \sin x$


- ដែនកំណត់៖ $y = \sin x$ ជាអនុគមន៍កំណត់គ្រប់ $x \in \mathbb{R}$ មានន័យថា $D = \mathbb{R}$
- ខួប៖ $y = \sin x$ ជាអនុគមន៍ខួប ដែលមានខួប $p = 2\pi$ ព្រោះ $\sin(x+2\pi) = \sin x$
- ភាពសេស៖ មាន $\sin(-x) = -\sin x$ ។ ដូចនេះ អនុគមន៍ $y = \sin x$ ជាអនុគមន៍សេស ។ ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \sin x$ មានគល់តម្រុយជាជួរគ្នា៖ ។
- ទិសដៅអថេរភាព៖ គេសង្កេតឃើញថា កាលណា x កើនពី 0 ទៅ $\frac{\pi}{2}$ នោះតម្លៃ $\sin x$ កើនពី 0 ទៅ 1 ។ បើ x កើនពី $\frac{\pi}{2}$ ទៅ π តម្លៃ $\sin x$ ចុះពី 1 ទៅ 0 ។



អថេរភាពនិមិត្តរូបនៃអនុគមន៍ $y = \cos x$


- ដែនកំណត់៖ $y = \cos x$ ជាអនុគមន៍កំណត់គ្រប់ $x \in \mathbb{R}$ មានន័យថា $D = \mathbb{R}$
- ខួប៖ $y = \cos x$ ជាអនុគមន៍ខួប ដែលមានខួប $p = 2\pi$ ព្រោះ $\cos(x+2\pi) = \cos x$
- ភាពសេស៖ មាន $\cos(-x) = \cos x$ ។ ដូចនេះ អនុគមន៍ $y = \cos x$ ជាអនុគមន៍សេស ។ ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \cos x$ មានគល់តម្រុយជាជួរគ្នា៖ ។

- ទិសដៅអថេរភាព៖ គេសង្កេតឃើញថា កាលណា x កើនពី 0 ទៅ $\frac{\pi}{2}$ នោះតម្លៃ $\cos x$ កើនពី 0 ទៅ 1 ។ បើ x កើនពី $\frac{\pi}{2}$ ទៅ π តម្លៃ $\cos x$ ចុះពី 0 ទៅ -1 ។



អថេរភាពនិមិត្តរូបនៃអនុគមន៍ $y = \tan x$

- ដែនកំណត់៖ $y = \tan x$ ជាអនុគមន៍កំណត់គ្រប់ $x \neq (2k+1)\frac{\pi}{2}$ ដែល $k \in \mathbb{Z}$ ។ ដូចនេះ $D = \mathbb{R} \setminus \left\{(2k+1)\frac{\pi}{2}\right\}$ ។
- ខួប៖ $y = \tan x$ ជាអនុគមន៍ខួប ដែលមានខួប $p = \pi$
- ភាពសេស៖ $\tan(-x) = -\tan x$ ។ ដូចនេះ អនុគមន៍ $y = \tan x$ ជាអនុគមន៍សេស ។
- ទិសដៅអថេរភាព៖



មេរៀនទី២ រូបមន្តត្រីកោណមាត្រ

- រូបមន្តផលបូក និងផលដក

រូបមន្តផលបូក និងផលដក

- ☛ $\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$
- ☛ $\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$
- ☛ $\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$
- ☛ $\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$
- ☛ $\tan(a + b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}$
- ☛ $\tan(a - b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b}$
- ☛ $\cot(a + b) = \frac{\cot a \cot b - 1}{\cot b + \cot a}$
- ☛ $\cot(a - b) = \frac{\cot a \cot b + 1}{\cot b - \cot a}$

- រូបមន្តមុំឌុប

រូបមន្តមុំឌុប

- ☛ $\sin(2x) = 2 \sin x \cos x$
- ☛ $\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x$
 $= 2 \cos^2 x - 1$
 $= 1 - 2 \sin^2 x$
- ☛ $\tan(2x) = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}$
- ☛ $\cot(2x) = \frac{\cot^2 x - 1}{2 \cot x}$
- ☛ $\sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2}$
- ☛ $\cos^2 x = \frac{1 + \cos(2x)}{2}$

- រូបមន្តមុំខ្ចី

រូបមន្តមុំខ្ចី

- ☛ $\sin \alpha = 2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2}$
- ☛ $\sin^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{2}$
- ☛ $\cos^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 + \cos \alpha}{2}$
- ☛ $\tan^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}$

បើ គេ យក $t = \tan \frac{\alpha}{2}$ គេ បាន រូបមន្ត ខាងក្រោម៖

- ☛ $\cos \alpha = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}$
- ☛ $\sin \alpha = \frac{2t}{1 + t^2}$
- ☛ $\tan \alpha = \frac{2t}{1 - t^2}$

- រូបមន្តបម្លែងពីផលបូក និងដកទៅជាផលគុណ

រូបមន្ត បម្លែង ពី ផលបូក និង ដក ទៅជា ផលគុណ

- ☛ $\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$
- ☛ $\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$
- ☛ $\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha - \beta}{2} \sin \frac{\alpha + \beta}{2}$
- ☛ $\sin \alpha - \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha - \beta}{2} \cos \frac{\alpha + \beta}{2}$


- រូបមន្តបម្លែងពីផលគុណទៅជាផលបូក និងដក

រូបមន្ត បម្លែង ពី ផលគុណ ទៅជា ផលបូក និងដក

- ☛ $\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)]$
- ☛ $\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$
- ☛ $\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$
- ☛ $\sin \beta \cos \alpha = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)]$


មេរៀន ទី៣ សមីការ និង វិស មី ការ ត្រីកោណមាត្រ

ចំនួនដែលមានកូស៊ីនុសដូចគ្នា




បើ ពីរ ចំនួន x និង y មាន កូស៊ីនុស ដូចគ្នា $\cos x = \cos y$ លុះត្រាតែ $x = y + 2k\pi$ ឬ $x = -y + 2k\pi$ ដែល $k \in \mathbb{Z}$ ។

ចំនួនដែលមានស៊ីនុសដូចគ្នា



បើ x និង y ជាពីរចំនួនពិតមានស៊ីនុសដូចគ្នា $\sin x = \sin y$ លុះត្រាតែ $x = y + 2k\pi$ ឬ $x = \pi - y + 2k\pi$ ដែល $k \in \mathbb{Z}$ ។

របៀបដោះស្រាយសមីការ $\cos x = a$




- សមីការ $\cos x = \cos \alpha$ មានចម្លើយពីរ
ឬ $\begin{cases} x = \alpha + 2k\pi \\ x = -\alpha + 2k\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$
- សមីការ $\cos u(x) = \cos v(x)$ មាន ចម្លើយពីរ
ឬ $\begin{cases} u(x) = v(x) + 2k\pi \\ u(x) = -v(x) + 2k\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$

សម្គាល់បើ $a = \{-1, 0, 1\}$

$$\begin{cases} \cos x = 0 \implies x = \frac{\pi}{2} + k\pi, & k \in \mathbb{Z} \\ \cos x = 1 \implies x = 2k\pi, & k \in \mathbb{Z} \\ \cos x = -1 \implies x = \pi + 2k\pi, & k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

របៀបដោះស្រាយសមីការ $\sin x = a$



- សមីការ $\sin x = \sin \alpha$ មានចម្លើយពីរគឺ

$$\begin{cases} x = \alpha + 2k\pi \\ x = \pi - \alpha + 2k\pi \end{cases}, \quad k \in \mathbb{Z}$$
- សមីការ $\sin u(x) = \sin v(x)$ មានចម្លើយពីរគឺ

$$\begin{cases} u(x) = v(x) + 2k\pi \\ u(x) = \pi - v(x) + 2k\pi \end{cases}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

សម្គាល់បើ $a = \{-1, 0, 1\}$

$$\begin{cases} \sin x = 0 \implies x = k\pi, & k \in \mathbb{Z} \\ \sin x = 1 \implies x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, & k \in \mathbb{Z} \\ \sin x = -1 \implies x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi, & k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

របៀបដោះស្រាយសមីការ $\tan x = a$

- សមីការ $\tan x = \tan \alpha$ មានចម្លើយពីរគឺ $x = \alpha + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$
- សមីការ $\tan u(x) = \tan v(x)$ មានចម្លើយពីរគឺ $u(x) = v(x) + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$

របៀបដោះស្រាយសមីការ $\cot x = a$

- សមីការ $\cot x = \cot \alpha$ មានចម្លើយពីរគឺ $x = \alpha + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$
- សមីការ $\cot u(x) = \cot v(x)$ មានចម្លើយពីរគឺ $u(x) = v(x) + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$

របៀបដោះស្រាយសមីការ $\cos x \geq a$

ចំពោះ $a \in [-1, 1]$ វិសមីការ $\cos x \geq a$ មានសំណុំចម្លើយ

$$-\alpha + 2k\pi \leq x \leq \alpha + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

របៀបដោះស្រាយសមីការ $\cos x \leq a$

ចំពោះ $a \in [-1, 1]$ វិសមីការ $\cos x \leq a$ មានសំណុំចម្លើយ

$$\alpha + 2k\pi \leq x \leq 2\pi - \alpha + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

របៀបដោះស្រាយសមីការ $\sin x \geq a$

ចំពោះ $a \in [-1, 1]$ វិសមីការ $\sin x \geq a$ មានសំណុំចម្លើយ

$$\alpha + 2k\pi \leq x \leq \pi - \alpha + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

របៀបដោះស្រាយសមីការ $\sin x \leq a$

ចំពោះ $a \in [-1, 1]$ វិសមីការ $\sin x \leq a$ មានសំណុំចម្លើយ

$$\pi - \alpha + 2k\pi \leq x \leq \alpha + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

របៀបដោះស្រាយសមីការ $\tan x \geq a$

វិសមីការ $\tan x \geq a$ មានសំណុំចម្លើយ

$$\alpha + k\pi \leq x < \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

របៀបដោះស្រាយសមីការ $\tan x \leq a$

វិសមីការ $\tan x \leq a$ មានសំណុំចម្លើយ

$$-\frac{\pi}{2} + k\pi < x \leq \alpha + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

របៀបដោះស្រាយសមីការ $\cot x \geq a$

វិសមីការ $\cot x \geq a$ មានសំណុំចម្លើយ

$$k\pi < x \leq \alpha + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

របៀបដោះស្រាយសមីការ $\cot x \leq a$

វិសមីការ $\cot x \leq a$ មានសំណុំចម្លើយ

$$\alpha + k\pi \leq x < \pi + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

របៀបដោះស្រាយសមីការ $a \cos x + b \sin x = c$

ដើម្បីដោះស្រាយសមីការមានរាង $a \cos x + b \sin x = c$ គេមានពីរបៀបក្នុងការដោះស្រាយគឺ៖

វិធីទី១ ៖ បំប្លែងសមីការ $a \cos x + b \sin x = c$ ជារាង $\cos(x - \theta) = \frac{c}{r}$ ដែល

$$r = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad (r > 0) \text{ និង } \cos \theta = \frac{a}{r}, \quad \sin \theta = \frac{b}{r}$$

វិធីទី២ ៖ ដោះស្រាយដោយតាង $t = \tan \frac{x}{2}$

$$\text{រួច ជំនួស តម្លៃ } \cos x = \frac{1 - t^2}{1 + t^2} \text{ និង } \sin x = \frac{2t}{1 + t^2} \text{ នោះ គេបាន}$$

សមីការ ដឺក្រេទី២ ដែល មាន អញ្ញាត t រួច ដោះស្រាយ សមីការ ដឺក្រេទី២ នេះ ហើយ យក តម្លៃ t ដែល រកបាន ផ្ទៀងផ្ទាត់នឹង $\tan \frac{x}{2}$ ដើម្បីទាញរក x ជាបួសនៃសមីការ ។

ប្រយ័ត្ន ៖ ដោះស្រាយ តាមរបៀប ទី២នេះ អាចបាត់បួស $x = \pi + 2k\pi$ ដូចនេះ ជំហាន ត្រូវពិនិត្យថា $x = \pi + 2k\pi$ ជាបួសនៃសមីការ ដឺក្រេទី ២ នៃសមីការ $a \cos x + b \sin x = c$ ឬទេ?

របៀបដោះស្រាយ សមីការដឺក្រេទី ២ ធៀបនឹងអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនពិត x

ដើម្បីដោះស្រាយសមីការបែបនេះគេត្រូវ៖

- បំប្លែងសមីការ ឱ្យទៅជាសមីការដឺក្រេទី២ ដូចខាងលើសិន
- តាង អនុគមន៍ ត្រីកោណមាត្រ នៃ x ដោយ អញ្ញាត t

- ដាក់លក្ខខណ្ឌឱ្យអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រដើម្បីឱ្យមានន័យ
- ដោះស្រាយ សមីការ ដឺក្រេ ទី ២ ដែល មានអញ្ញាត t
- យកតម្លៃ t ជួបនឹងអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ ដែល បាន តាង ដើម្បី ទាញ រក ចម្លើយនៃអញ្ញាត x ។

របៀបដោះស្រាយ សមីការ ត្រីកោណមាត្រ រាង $a \sin^2 x + b \sin x \cos x + c \cos^2 x = d$

ដើម្បីដោះស្រាយសមីការបែបនេះ គេត្រូវចែកអង្គទាំងពីរនៃសមីការនិង $\cos^2 x \neq 0, x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ ។ គេបានសមីការ $a \tan^2 x + b \tan x + c = 0$ រួចដោះស្រាយតាមរបៀបខាងលើ ។

របៀបដោះស្រាយ សមីការត្រីកោណមាត្រ

ដើម្បីដោះស្រាយសមីការដែលមានរាង $\sin x \geq a, \cos x < a, \tan x < a, \cot x < a, \dots$ គេត្រូវ៖

- រក α ដែល $\sin \alpha = a, \cos \alpha = a, \tan \alpha = a, \cot \alpha = a, \dots$
- ដៅ ចុង ផ្ទៃ តាម តម្លៃ α រួច បកស្រាយ ដោយប្រើរង្វង់ត្រីកោណមាត្រ ។
- បំប្លែងវិសមីការ ឱ្យ មាន ទម្រង់ ដោយ $\sin x \geq \sin \alpha, \cos x < \cos \alpha, \cot x < \cot \alpha, \dots$ មុននឹងដោះស្រាយរកសំណុំចម្លើយ ។

លីមីត និង
ដេរីវេ

មេរៀនទី១ លីមីតនៃអនុគមន៍

ជាទូទៅ

បើ x ខិតជិត a ហើយអនុគមន៍ $y = f(x)$ ខិតទៅជិត ℓ ណាមួយនោះ គេកំណត់សរសេរ $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$ ។

• ប្រមាណវិធីលីមីត

ប្រមាណវិធីលីមីត៖ បើ $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$ ហើយ L, M, k ជាចំនួនពិត

១. $\lim_{x \rightarrow a} k = k$
២. $\lim_{x \rightarrow a} k f(x) = k \lim_{x \rightarrow a} f(x) = k \times L$
៣. $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L + M$
៤. $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) - g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L - M$
៥. $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \times g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \times \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L \times M$
៦. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}$
 $= \frac{L}{M}$ បើ $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M \neq 0$
៧. $\lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^n = L^n$

• លីមីតរាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$

ជាទូទៅ

បើ $\frac{f(x)}{g(x)}$ ដែល $g(x) \neq 0$ ជាប្រភាគសនិទាន
នោះ $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x_0)}{g(x_0)}$; $g(x_0) \neq 0$

លីមីតរាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$

បើ $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ ហើយតម្លៃនៃ $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) = 0$ និង $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = g(a) = 0$ នោះ
លីមីត $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ មានរាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$ នោះ
គេត្រូវគណនាដូចជំហានខាងក្រោម៖

ជំហានទី ១ បំបែកកត្តាទាំងពីរនៃប្រភាគជាផលគុណ
កត្តាដែលមាន $(x - a)$ ជាកត្តារួម

ជំហានទី ២ សម្រួលកត្តារួមចោល

ជំហានទី ៣ រកលីមីតនៃប្រភាគថ្មី ។

- បើកន្សោមនៃលីមីតដែលត្រូវគណនា
ជាវ៉ាឌីកាល់គេត្រូវគុណចែកកន្សោម
នោះជាមួយកន្សោមផ្ទាល់របស់វា ។

សមភាពសំខាន់ៗ

១. $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$
២. $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$
៣. $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$
៤. $a^4 - b^4 = (a - b)(a^3 + a^2b + ab^2 + b^3)$
៥. $\frac{\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b}}{\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{a} \cdot \sqrt[3]{b} + \sqrt[3]{b^2}} = \frac{(\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b})(\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{a} \cdot \sqrt[3]{b} + \sqrt[3]{b^2})}{(\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{a} \cdot \sqrt[3]{b} + \sqrt[3]{b^2})} = \frac{a - b}{\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{a} \cdot \sqrt[3]{b} + \sqrt[3]{b^2}}$

រូបមន្តប្រើក្នុងការគណនាលីមីត



$$\begin{aligned} ១. \sqrt{a} - \sqrt{b} &= \frac{(\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a} + \sqrt{b})}{(\sqrt{a} + \sqrt{b})} = \frac{a - b}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} \\ ២. \sqrt[n]{a} - \sqrt[n]{b} &= \frac{(\sqrt[n]{a} - \sqrt[n]{b}) \left(\sqrt[n]{a^{n-1}} + \sqrt[n]{a^{n-2}} \cdot \sqrt[n]{b} + \dots + \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b^{n-2}} + \sqrt[n]{b^{n-1}} \right)}{\left(\sqrt[n]{a^{n-1}} + \sqrt[n]{a^{n-2}} \cdot \sqrt[n]{b} + \dots + \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b^{n-2}} + \sqrt[n]{b^{n-1}} \right)} \\ &= \frac{a - b}{\left(\sqrt[n]{a^{n-1}} + \sqrt[n]{a^{n-2}} \cdot \sqrt[n]{b} + \dots + \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b^{n-2}} + \sqrt[n]{b^{n-1}} \right)} \\ ៣. a^n - b^n &= (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2} \cdot b + \dots + a \cdot b^{n-2} + b^{n-1}) \\ ៤. a^n + b^n &= (a + b)(a^{n-1} - a^{n-2} \cdot b + \dots - a \cdot b^{n-2} + b^{n-1}) \end{aligned}$$

• លីមីតអនន្តនៃអនុគមន៍

ជាទូទៅ

☛ $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} ax^2 = \begin{cases} +\infty & \text{បើ } a > 0 \\ -\infty & \text{បើ } a < 0 \end{cases}$

☛ $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a}{x} = 0$ ចំពោះគ្រប់ $a \in \mathbb{R}$

• លីមីតរាងមិនកំណត់ $\infty - \infty$

លីមីតរាងមិនកំណត់ $\infty - \infty$

☛ បើ លីមីតនៃពហុធា មានរាងមិនកំណត់ $+\infty - \infty$ ឬ $-\infty + \infty$ នៅត្រង់អនន្ត នោះ
គេត្រូវ៖

- ដាក់តួដែលទិន្នន័យដ៏ក្រៃធំជាងគេជាកត្តារួម ។
- គណនាលីមីតនៃកន្សោមថ្មី ។

☛ លីមីតនៃពហុធា នៅត្រង់អនន្ត គឺគណនាលីមីតដែលទិន្នន័យដ៏ក្រៃធំជាងគេ

• លីមីតរាងមិនកំណត់ $\frac{\infty}{\infty}$

លីមីតរាងមិនកំណត់ $\frac{\infty}{\infty}$

☛ បើ លីមីតនៃប្រភាគសនិទាន មានរាងមិនកំណត់ $\frac{\infty}{\infty}$ នៅត្រង់អនន្ត នោះគេត្រូវ៖

- ដាក់តួដែលមានដ៏ក្រៃធំជាងគេនៅភាគយកនៅភាគបែងជាកត្តារួម ហើយសម្រួលកត្តារួមចោល
- គណនាលីមីតនៃកន្សោមថ្មី ។

☛ លីមីតនៃប្រភាគសនិទាននៅត្រង់អនន្ត គឺទាក់ទងនឹងផលធៀបរវាងលីមីតនៃតួដែលមានដ៏ក្រៃធំជាងគេនៅភាគយកនិងលីមីតនៃតួដែលមានដ៏ក្រៃធំជាងគេនៅភាគបែង ។

រូបមន្តសំខាន់ៗ

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x)}{x} = 1$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x} = 0$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} = \frac{1}{2}$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin(x)}{x} = 0$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cos(x)}{x} = 0$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(ax)}{x} = a$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(ax)}{x} = a$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$
- $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x} = e$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^n} = \infty \quad (n > 0)$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0, (n > 0)$
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^n \ln x = 0$
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x^n} = -\infty, (n > 0)$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n \ln x = +\infty$

មេរៀនទី២ ដេរីវេនៃអនុគមន៍

អត្រាប្រែប្រួលមធ្យម

បើ x ប្រែប្រួលពី a ទៅ b នោះ៖

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

ហៅថាអត្រាប្រែប្រួលមធ្យម ។

ដេរីវេនៃអនុគមន៍ត្រង់មួយចំណុច

ដេរីវេ $f'(a)$ នៃអនុគមន៍ $y = f(x)$ នៅត្រង់ $x = a$ កំណត់ដោយ៖

$$f'(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

ឬអាចសរសេរបានថា៖

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

ដែល $x = a + h$ ឬ $h = x - a$ ។ បើ $x \rightarrow a$

និយមន័យដេរីវេ

ដេរីវេ $f'(x)$ នៃអនុគមន៍ $f(x)$ កំណត់ដោយ៖

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

និមិត្តសញ្ញាដែលគេប្រើសម្រាប់ដេរីវេ៖

$$y', \quad \frac{dy}{dx}, \quad \frac{d}{dx}f(x)$$

ដេរីវេទី ២

បើអនុគមន៍ $y = f(x)$ មានដេរីវេទី ១ តាងដោយ $f'(x)$ ហើយ $f'(x)$ មានដេរីវេម្តងទៀត នោះដេរីវេនៃ $f'(x)$ ហៅថា ដេរីវេទី ២ នៃអនុគមន៍ $f(x)$ ដែលតាងដោយ $f''(x)$ ៖

$$f''(x) = \frac{d}{dx}[f'(x)] = \frac{d^2 y}{dx^2}$$

តារាងដេរីវេនៃអនុគមន៍

អនុគមន៍ $f(x)$	ដេរីវេ $f'(x)$
1. $f(x) = a$	$f'(x) = 0$
2. $f(x) = ax$	$f'(x) = a$
3. $f(x) = ax^n$	$f'(x) = a \cdot nx^{n-1}$
4. $f(x) = a\sqrt{x}$	$f'(x) = \frac{a}{2\sqrt{x}}$
5. $f(x) = a\sqrt[n]{x}$	$f'(x) = \frac{a}{n\sqrt[n]{x^{n-1}}}$
6. $f(x) = ae^x$	$f'(x) = ae^x$
7. $f(x) = a \ln x$	$f'(x) = \frac{a}{x}$
8. $f(x) = a \log_b x$	$f'(x) = \frac{a}{x \ln b}$
9. $f(x) = a \sin x$	$f'(x) = a \cos x$
10. $f(x) = a \cos x$	$f'(x) = -a \sin x$
11. $f(x) = a \sin u$	$f'(x) = a \cdot u' \sin u$
12. $f(x) = a \cos u$	$f'(x) = -a \cdot u' \sin u$

ច្បាប់នៃដេរីវេ (Derivative Rules)

ដេរីវេផលគុណ	$(uv)' = u'v + uv'$
ដេរីវេផលចែក	$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$
ដេរីវេបណ្តាក់	$(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

មេរៀនទី៣ អនុគមន៍ដេរីវេ

សមីការបន្ទាត់ប៉ះ (Tangent Line Equation)

សមីការបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = f(x)$ នៅត្រង់ចំណុចដែលមានអាប់ស៊ីស $x = a$ កំណត់ដោយ៖

$$y - f(a) = f'(a)(x - a)$$

ជំហានក្នុងការរកបន្ទាត់ប៉ះ៖

- រកតម្លៃ $y_0 = f(a)$
- រកមេគុណប្រាប់ទិស $m = f'(a)$
- ជំនួស ចូលក្នុង សមីការ $y - y_0 = m(x - a)$

អនុគមន៍កើន និង អនុគមន៍ចុះ

ឱ្យ f ជាអនុគមន៍ជាប់លើចន្លោះ I ៖

- អនុគមន៍កើន៖ បើ $f'(x) > 0$ លើ I នោះក្រាបនៃ f មានទិសដៅឡើងលើ ។
- អនុគមន៍ចុះ៖ បើ $f'(x) < 0$ លើ I នោះក្រាបនៃ f មានទិសដៅចុះក្រោម ។

ចំណាំ៖ ចំណុចដែល $f'(x) = 0$ គឺជាចំណុចអតិបរមា ឬ អប្បបរមា នៃអនុគមន៍ ។

អតិបរមា អប្បបរមាផ្សេង និងដេរីវេទី១

១. តម្លៃអតិបរមាផ្សេង មានត្រង់ x_0 លុះត្រាតែ $f'(x)$ ប្តូរសញ្ញាពី (+) ទៅ (-) ៖

- $f'(x) > 0$ បើ $x < x_0$ (អនុគមន៍កើន)
- $f'(x) = 0$ បើ $x = x_0$
- $f'(x) < 0$ បើ $x > x_0$ (អនុគមន៍ចុះ)

២. តម្លៃ អប្បបរមា ធៀបមាន ត្រង់ x_0 លុះត្រាតែ $f'(x)$ ប្តូរសញ្ញាពី $(-)$ ទៅ $(+)$ ៖

- $f'(x) < 0$ បើ $x < x_0$ (អនុគមន៍ចុះ)
- $f'(x) = 0$ បើ $x = x_0$
- $f'(x) > 0$ បើ $x > x_0$ (អនុគមន៍កើន)

ជំហានក្នុងការអនុវត្ត៖

- រកដេរីវេទី១៖ គណនា $f'(x)$ ។
- រកចំណុចសំខាន់៖
ដោះស្រាយ $f'(x) = 0$ ដើម្បីរក x_0 ។
- បង្កើតតារាងបំរែបំរួល៖ សិក្សាសញ្ញានៃ $f'(x)$ នៅចន្លោះមុន និងក្រោយ x_0 ។
- សន្និដ្ឋាន៖
 - ប្តូរពី $(+)$ ទៅ $(-)$ → អតិបរមាធៀប ។
 - ប្តូរពី $(-)$ ទៅ $(+)$ → អប្បបរមាធៀប ។

អតិបរមា អប្បបរមាធៀប និងដេរីវេទី២

អនុគមន៍ f មាន ដេរីវេទី ២ ត្រង់ x_0 ដែល $f'(x_0) = 0$ ៖

- អតិបរមាធៀប៖ បើ $f''(x_0) < 0$
- អប្បបរមាធៀប៖ បើ $f''(x_0) > 0$

ចំណាំ៖ បើ $f''(x_0) = 0$ មិនអាចសន្និដ្ឋានបានទេ (ត្រូវត្រឡប់ទៅប្រើតារាងសញ្ញាដេរីវេទី ១) ។

ចំណុចរេតនៃខ្សែកោង

ចំណុច $(x_0, f(x_0))$ ជា ចំណុច រេត បើ $f''(x_0) = 0$ ហើយសញ្ញានៃ $f''(x)$ ប្តូរ

នៅត្រង់ x_0 ៖

- កោងឡើងលើ៖ បើ $f''(x) > 0$
- កោងចុះក្រោម៖ បើ $f''(x) < 0$

សន្និដ្ឋាន៖ បើ $f''(x)$ ប្តូរសញ្ញាពី $+$ ទៅ $-$ ឬពី $-$ ទៅ $+$ នោះ x_0 គឺជាចំណុចរេត ។

ជំហានក្នុងការអនុវត្ត៖

- រកដេរីវេទី ២៖ គណនា $f''(x)$ ។
- រក ចំណុច សំខាន់៖ ដោះស្រាយ $f''(x) = 0$ ឬ រក ចំណុច ដែល $f''(x)$ មិនកំណត់ ។
- សិក្សាសញ្ញានៃ $f''(x)$ ៖ បង្កើតតារាងសញ្ញា ដើម្បីពិនិត្យការផ្លាស់ប្តូរពី $(+)$ ទៅ $(-)$ ឬ $(-)$ ទៅ $(+)$ ។

គំរូនៃកំណត់ត្រាអប្បបរមា

- កំណត់ អញ្ញាត៖ ជ្រើសរើស អញ្ញាត (ឧទាហរណ៍ x) តាមសំណួរ រួច កំណត់ ដែលកំណត់របស់វា ។
- សរសេរ សមីការ៖ បង្កើត អនុគមន៍គោលដៅ $f(x)$ ដែលត្រូវរកអតិបរមា ឬអប្បបរមា ។
- សម្រួល អនុគមន៍៖ សរសេរ $f(x)$ ឱ្យនៅសល់តែអញ្ញាតតែមួយ ។
- អនុវត្តដេរីវេ៖
 - រកដេរីវេ $f'(x)$ និងដោះស្រាយ $f'(x) = 0$ ។
 - ប្រើតេស្តដេរីវេទី ១ ឬទី ២ ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ។

មេរៀនទី៤ អថេរភាពនៃអនុគមន៍

អនុគមន៍ពហុធានីក្រេទី៣ $ax^3 + bx^2 + cx + d$ ដែល $a, b, c, d \neq 0$

ក. ដែនកំណត់ $D_f = \mathbb{R}$ ឬ $-\infty, +\infty$

ខ. ដេរីវេ $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$

គ. អតិបរមាធៀប និងអប្បបរមាធៀប
 $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 3ax^2 + 2bx + c = 0$
យើងបាន៖

- បើសមីការ $f'(x) = 0$ មានឫសពិតចំនួន ២ ផ្សេងគ្នា៖
- អនុគមន៍មានតម្លៃអតិបរមាធៀប ១ និង អប្បបរមាធៀប ១ ។

ឃ. លីមីត

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \begin{cases} -\infty & ; a > 0 \\ +\infty & ; a < 0 \end{cases}$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \begin{cases} +\infty & ; a > 0 \\ -\infty & ; a < 0 \end{cases}$

ង. តារាងអថេរភាព

- $\Delta > 0$ មានឫសពីរផ្សេងគ្នា x_1, x_2

$a > 0$					
x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	$f(x_1)$	$f(x_2)$	$+\infty$	

$a < 0$					
x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$	$f(x_1)$	$f(x_2)$	$-\infty$	

- $\Delta = 0$ មានឫសត្រង់ $x_1 = x_2 = x_0$

$a > 0$		
x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	$+$
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$

$a < 0$		
x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	$-$
$f(x)$	$+\infty$	$-\infty$

- $\Delta < 0$ គ្មានឫសពិត

$a > 0$		
x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	$+$
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$



$a < 0$		
x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	$-$
$f(x)$	$+\infty$	$-\infty$

ច. ចំណុចរេត និងផ្ចិតឆ្លុះ



ដោយ $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$ នោះ
 $f''(x) = 6ax + 2b$ បើ $f''(x) = 0$
 $\Leftrightarrow 6ax + 2b = 0$
 $\Rightarrow x = -\frac{b}{3a}$
 យើងបាន $I\left(-\frac{b}{3a}, f\left(-\frac{b}{3a}\right)\right)$ ។

ឆ. សំណង់ក្រាប



☛ $f'(x) = 0$ មានឫសពីរផ្សេងគ្នា



☛ $f'(x) = 0$ មានឫសខ្ទប់



☛ $f'(x) = 0$ មានគ្មានឫស



អនុគមន៍បីការៈ $ax^4 + bx^2 + c$, $a, b, c \in \mathbb{R}$
ដែល $a \neq 0$

ក. ដែនកំណត់ $D_f = \mathbb{R}$ ឬ $-\infty, +\infty$

ខ. ទិសដៅអថេរភាព
ដេរីវេនៃ $f(x)$ កំណត់ដោយ៖

$$f'(x) = 4ax^3 + 2bx = 2x(2ax^2 + b)$$

• បើ $\frac{b}{a} \geq 0 \Rightarrow f'(x) = 0$
មានឫសតែមួយគឺ $x = 0$ ។

• បើ $\frac{b}{a} < 0 \Rightarrow f'(x) = 0$
មានឫសបីផ្សេងគ្នាគឺ $x = 0$,
 $x = \pm \sqrt{-\frac{b}{2a}}$ ។

គ. លីមីត

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \begin{cases} +\infty & \text{បើ } a > 0 \\ -\infty & \text{បើ } a < 0 \end{cases}$$

ឃ. ចំណុចរបត់

ដេរីវេទី២នៃដេរីវេទី១គឺ៖

$$f''(x) = (4ax^3 + 2bx)' = 12x + 2b$$

- បើ $\frac{b}{a} \geq 0 \Rightarrow f''(x) = 0$
គ្មានឫស ឬ មានឫសខ្ទប់ នោះ
ក្រាបគ្មានចំណុចរបត់ ។
- បើ $\frac{b}{a} < 0 \Rightarrow f''(x) = 0$
មានឫសពីរផ្សេងគ្នាហើយក្រាប
មានចំណុចរបត់ពីរ ។

ង. តារាងអថេរភាព

☛ $f'(x) = 0$ មានឫស $x = 0$
តែមួយគត់

$a > 0$			
x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$	$f(0)$	$+\infty$

$a < 0$			
x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$
$f(x)$	$-\infty$	$f(0)$	$-\infty$

☛ $f'(x) = 0$ មានឫសបីផ្សេងគ្នាជា
ចំនួនពិត



$a > 0$					
x	$-\infty$	x_1	x_2	x_3	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$	$f(x_1)$	$f(x_2)$	$f(x_3)$	$+\infty$

$a < 0$					
x	$-\infty$	x_1	x_2	x_3	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	$f(x_1)$	$f(x_2)$	$f(x_3)$	$-\infty$


ច. សំណង់ក្រាបនៃអនុគមន៍

ក្រាបនៃ អនុគមន៍បីការៈ មានអ័ក្ស
អរដោនេជាអ័ក្សឆ្លុះ ។


☛ $f'(x) = 0$ មានឫស $x = 0$
តែមួយគត់ $\left(\frac{b}{a} \geq 0\right)$



☛ $f'(x) = 0$ មានឫសបីផ្សេងគ្នាជា
ចំនួនពិត $\left(\frac{b}{a} < 0\right)$



$$a < 0$$



អនុគមន៍សនិទាន $\frac{ax+b}{cx+d}$, $c \neq 0$, $ad - bc \neq 0$

ក. ដែនកំណត់ $D_f = \mathbb{R} - \{-\frac{d}{c}\}$

ខ. លីមីត និងអាស៊ីមតូត

- អាស៊ីមតូតឈរ៖ បន្ទាត់ (L) : $x = x_0$ ជាអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប (C) : $y = f(x)$ កាលណា៖ $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \pm\infty$
- អាស៊ីមតូតដេក៖ បន្ទាត់ (L) : $y = y_0$ ជាអាស៊ីមតូតដេកនៃក្រាប (C) កាលណា៖ $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = y_0$

គ. ទិសដៅអថេរភាព

$$\begin{aligned} & \text{ដេរីវេ } f'(x) = \left(\frac{ax+b}{cx+d} \right)' \\ &= \frac{a(cx+d) - c(ax+b)}{(cx+d)^2} \\ &= \frac{ad-bc}{(cx+d)^2} \end{aligned}$$

សញ្ញា នៃ $f'(x)$ អាស្រ័យលើកន្សោម $ad - bc$ ។

- ករណី $ad - bc > 0$ ៖ $f'(x) > 0$ សម្រាប់គ្រប់ x ក្នុងដែនកំណត់ D ។ ដូចនេះអនុគមន៍ជាអនុគមន៍កើនលើ D ហើយពុំមានចំណុចបរិមាទេ។

- ករណី $ad - bc < 0$ ៖ $f'(x) < 0$ សម្រាប់គ្រប់ x ក្នុងដែនកំណត់ D ។ ដូចនេះអនុគមន៍ជាអនុគមន៍ចុះលើ D ហើយពុំមានចំណុចបរិមាទេ។

ឃ. តារាងអថេរភាព



$$ad - bc > 0$$

x	$-\infty$	x_0	$+\infty$
$f'(x)$	+		+
$f(x)$	$\frac{a}{c}$	$+\infty$	$-\infty$

$$ad - bc < 0$$

x	$-\infty$	x_0	$+\infty$
$f'(x)$	-		-
$f(x)$	$\frac{a}{c}$	$+\infty$	$-\infty$

ង. សំណង់ក្រាប



អនុគមន៍សនិទាន $\frac{ax^2+bx+c}{px+q}$, $a \neq 0$, $p \neq 0$

ក. ដែនកំណត់ $D_f = \mathbb{R} - \{-\frac{q}{p}\}$

ខ. ទិសដៅអថេរភាព

- ដេរីវេ y' : $y' = \frac{apx^2 + 2aqx + bq - cp}{(px+q)^2}$
- បើ $y' = 0$ មានឫសពីរដាច់គ្នា នោះអនុគមន៍មានចំណុចអតិបរិមា និងអប្បបរមា
- បើ $y' = 0$ មានឫសមុះ នោះអនុគមន៍គ្មានតម្លៃបរិមាទេ
- បើ $y' = 0$ គ្មានឫស នោះអនុគមន៍គ្មានតម្លៃបរិមាឡើយ។

គ. លីមីត និងអាស៊ីមតូត

លីមីតចុងដែនកំណត់

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (ax+b) = \pm\infty$$

លីមីតត្រង់អាស៊ីមតូតឈរ

$$\lim_{x \rightarrow -\frac{q}{p}} f(x) = \mp\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\frac{q}{p}+} f(x) = \pm\infty$$

អាស៊ីមតូតឈរ និងទ្រូត

- បន្ទាត់ $x = -\frac{q}{p}$ ជាអាស៊ីមតូតឈរ
- អនុគមន៍ $y = ax+b + \frac{k}{px+q}$ មានបន្ទាត់ $y = ax+b$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រូត។

ឃ. តារាងអថេរភាព

$f'(x) = 0$ មានឫសពីរផ្សេងគ្នា

$$a < 0$$

x	$-\infty$	x_1	$-q/p$	x_2	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	$+$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$	$+\infty$	$f(x_1)$	$f(x_2)$	$-\infty$	$-\infty$

$$a > 0$$

x	$-\infty$	x_1	$-q/p$	x_2	$+\infty$
$f'(x)$		+	0	-	
$f(x)$					
			</		

$f'(x) = 0$ គ្មានឫស



$$a > 0$$

x	$-\infty$	$-q/p$	$+\infty$
$f'(x)$	$+$		$+$
$f(x)$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$



	$a < 0$		
x	$-\infty$	$-q/p$	$+\infty$
$f'(x)$	-		-
$f(x)$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$
		$+\infty$	$-\infty$

ង. សំណង់ក្រាប

☛ $f'(x) = 0$ មានឫសពីរផ្សេងគ្នា



☛ $f'(x) = 0$ គ្មានឫស



ជំពូកទី ៥

ប្រូបាប

មេរៀនទី១ ចម្លង

• គោលការណ៍ផលបូក

ជាទូទៅទី១

គេមានព្រឹត្តិការណ៍ A និងព្រឹត្តិការណ៍ B
 $n(A)$ ជាចំនួនលទ្ធផលកើតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ A
 $n(B)$ ជាចំនួនលទ្ធផលកើតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ B ។

- បើ A និង B ជាព្រឹត្តិការណ៍ពីរមិនចុះសម្រុងគ្នា (គ្មានលទ្ធផលណាមួយរួមទេ) នោះចំនួនលទ្ធផលដែលកើតឡើងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ “ A ឬ B ” គឺ

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) \quad \text{។}$$

- បើ A និង B ជាព្រឹត្តិការណ៍ពីរចុះសម្រុងគ្នា (មានលទ្ធផលរួមគ្នា) នោះ ចំនួនលទ្ធផលដែលកើតឡើងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ “ A ឬ B ” គឺ

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) \quad \text{។}$$

• គោលការណ៍ផលគុណ

ជាទូទៅទី២

គេមានព្រឹត្តិការណ៍ A កើតឡើង m របៀប ហើយមានព្រឹត្តិការណ៍ B កើតឡើង n របៀប នោះ ចំនួនលទ្ធផលដែលព្រឹត្តិការណ៍ A កើតឡើង ហើយ B កើតឡើងបន្ទាប់ស្មើនឹង $m \times n$ ។

• ចម្លង n ធាតុ

ជាទូទៅទី៣

ចម្លងនៃ n ធាតុ គឺជាគ្រឿងប្រយោជន៍នៃ n វត្ថុខុសៗគ្នាជាជួរដេក $n \in \mathbb{N}$ ។ ចំនួនចម្លងនៃ n ធាតុស្មើនឹង $n!$ ។
 $n!$ អាចជា n ហ្វាក់តូរ្យែល
 $n! = n(n-1)(n-2) \times \dots \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$

• ចម្លងនៃ r ធាតុយកចេញពី n ធាតុ

ជាទូទៅទី៤

ចម្លងនៃ r ធាតុយកចេញពី n ធាតុ គឺជាគ្រឿងប្រយោជន៍នៃ r ធាតុខុសៗគ្នាដែលធាតុនីមួយៗយកចេញពី n ធាតុខុសៗគ្នា ។

($n \in \mathbb{N}, r \in \mathbb{N}, r \leq n$) ។ ចំនួនចម្លងនៃ r ធាតុយកចេញពី n ធាតុគឺ
 $nP_r = n(n-1)(n-2) \dots (n-r+1)$
 ឬ $nP_r = \frac{n!}{(n-r)!}$ ។
 គេអាចប្រើនិមិត្តសញ្ញា $P(n, r)$ ។

• ចម្លងច្រើនដែល

ជាទូទៅទី៥

ចម្លងច្រើនដែលនៃ r ធាតុយកចេញពី n ធាតុ គឺជាគ្រឿងប្រយោជន៍នៃ r ធាតុដែលធាតុនីមួយៗអាចជាធាតុដែលយកចេញពី n ធាតុខុសគ្នា ។ ចំនួនចម្លងច្រើនដែលនៃ r ធាតុយកចេញពី n ធាតុស្មើនឹង n^r ។

• ចម្លងរង

ជាទូទៅទី៦

ចំនួនចម្លងរងនៃ n ធាតុគឺ $\frac{n!}{n} = (n-1)!$

• ចម្លងបែងចែកបាន

ជាទូទៅទី៧

ច្បាប់នៃ n វត្ថុដែលក្នុងនោះមានវត្ថុប្រភេទទី 1, ប្រភេទទី 2, ..., ប្រភេទទី k ហើយវត្ថុប្រភេទទី i មួយមានចំនួន $r_1, r_2, \dots, r_k$ រៀងគ្នា ($r_1 + r_2 + \dots + r_k = n$) ហៅថា ច្បាប់នៃវត្ថុដូចគ្នា ។

ចំនួនច្បាប់នៃវត្ថុដូចគ្នា កំណត់ដោយ

$$\frac{n!}{r_1!r_2!\dots r_k!}$$

មេរៀនទី២ បន្សំ

• បន្សំនៃ r ធាតុយកចេញពី n ធាតុ

ជាទូទៅទី១

បន្សំនៃ r ធាតុយកពី n ធាតុ គឺជាការយក ព្រមគ្នា នូវ r ធាតុចេញពី n ធាតុខុសៗគ្នា ដោយមិនគិតពីលំដាប់នៃការយកចេញ ។ ចំពោះគ្រប់ $r \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, r \leq n$ ចំនួនបន្សំនៃ r ធាតុយកពី n ធាតុ គឺ

$${}_nC_r = \frac{{}_nP_r}{r!} = \frac{n!}{(n-r)!r!} \text{ ។}$$

គេអាចសរសេរនិមិត្តសញ្ញាបន្សំដោយ

$$C(n, r), C_r^n \text{ ឬ } \binom{n}{r} \text{ ។}$$

• លក្ខណៈនៃបន្សំ

លក្ខណៈនៃបន្សំ

ចំពោះ n ជាចំនួនគត់ធម្មជាតិ គេបាន៖

- ក. $C(n, 1) = n$
- ខ. $C(n, n-1) = n \quad (n > 1)$
- គ. $C(n, n) = 1$

• ការពន្លាតទ្វេធានៃ $(1+a)^n$

ជាទូទៅទី១

ក្នុងការពន្លាតទ្វេធានៃ $(1+a)^n$ ដែល $n \in \mathbb{N}$ គេបាន

$$(1+a)^n = {}_nC_0 + {}_nC_1 \times a + {}_nC_2 \times a^2 + \dots + {}_nC_r \times a^r + \dots + {}_nC_n \times a^n$$

ក្នុងការពន្លាតទ្វេធានៃ $(1+a)^n$ គេបានមេគុណនៃ a^k ស្មើនឹង ${}_nC_k$ ។

• ទ្រឹស្តីបទទ្វេធាន

ជាទូទៅទី២

ទ្រឹស្តីបទទ្វេធាន៖ បើ $n \in \mathbb{N}$ នោះ

$$(a+b)^n = {}_nC_0 \times a^n + {}_nC_1 \times a^{n-1}b + {}_nC_2 \times a^{n-2}b^2 + {}_nC_3 \times a^{n-3}b^3 + \dots + {}_nC_n \times b^n$$

មេរៀនទី៣ ប្រូបាប

• ពិសោធន៍ចៃដន្យ-វិញ្ញាសា

ពិសោធន៍ចៃដន្យ-វិញ្ញាសា

ពិសោធន៍មួយដែលគេធ្វើដោយមិនបានដឹងជាមុនថាមានលទ្ធផលអ្វីមួយប្រាកដកើតឡើងនោះហៅថា **ពិសោធន៍ចៃដន្យ** ។

ពិសោធន៍មួយដែលគេកំណត់ធ្វើដោយដាក់លាក់ក្នុងពិសោធន៍ចៃដន្យ មួយហៅថា **វិញ្ញាសា** ។

• លំហសំណាក

និយមន័យ

លំហសំណាក គឺជាសំណុំនៃលទ្ធផលទាំងអស់ដែលអាចកើតឡើងនៅក្នុងវិញ្ញាសា មួយនៃពិសោធន៍ចៃដន្យ ។ ចំនួនលទ្ធផលក្នុងលំហសំណាកតាងដោយ $n(S)$ ។

និយមន័យ៖ ព្រឹត្តិការណ៍សហស

ព្រឹត្តិការណ៍ផលគុណនៃ A និង B ជាប្រសព្វនៃព្រឹត្តិការណ៍ A និងព្រឹត្តិការណ៍ B ។ គេកំណត់សរសេរ A និង B មានន័យថា $A \cap B$ ។

ព្រឹត្តិការណ៍ផលបូកនៃ A និង B ជាប្រជុំនៃព្រឹត្តិការណ៍ A និងព្រឹត្តិការណ៍ B ។ គេកំណត់សរសេរ A ឬ B មានន័យថា $A \cup B$ ។

ព្រឹត្តិការណ៍ B និងព្រឹត្តិការណ៍ D ជាព្រឹត្តិការណ៍មិនចុះសម្រុងគ្នា កាលណាព្រឹត្តិការណ៍ផលគុណនៃ B និង D ជាព្រឹត្តិការណ៍មិនអាចមាន៖ $B \cap D = \emptyset$ (មិនមានធាតុរួម) ។ គេបាន $n(B \cap D) = 0$ ។

និយមន័យ៖ ប្រូបាប

ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ A មួយ ជាផលធៀបនៃចំនួនករណីស្រប $n(A)$ និងចំនួនករណីអាច $n(S)$ គឺ

$$P(A) = \frac{\text{ចំនួនករណីស្រប}}{\text{ចំនួនករណីអាច}} = \frac{n(A)}{n(S)}$$

គន្លឹះដោះស្រាយមេរៀនប្រូបាប

- លំហសំណាក (S): រកចំនួនលទ្ធផលសរុបដែលអាចកើតឡើង ។ $n(S) =$ ករណីអាច
- កំណត់ ព្រឹត្តិការណ៍ (A): រកចំនួនករណីតាមបំណងប្រាថ្នា ។ $n(A) =$ ករណីស្រប
- ប្រើរូបមន្ត៖ ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ A គឺ៖
$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} \text{ ចំណាំ៖ } 0 \leq P(A) \leq 1$$
- ពាក្យគន្លឹះដែលត្រូវចាំ៖
 - ពាក្យថា "ឬ" ($A \cup B$): ប្រើការបូក $P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
 - ពាក្យថា "និង" ($A \cap B$): ប្រើការគុណ $P(A) \times P(B)$

ជំពូកទី ៦

វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ

មេរៀនទី១ វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ

វ៉ិចទ័រឯកតា

វ៉ិចទ័រឯកតា គឺជាវ៉ិចទ័រដែលមានប្រវែងស្មើនឹង 1 ។

វ៉ិចទ័រពីរស្របគ្នា

ពីរវ៉ិចទ័រ $\vec{a} \neq \vec{0}$ និង $\vec{b} \neq \vec{0}$ ជាវ៉ិចទ័រស្របគ្នាលុះត្រាតែ $\vec{a} = m\vec{b}$ ដែល m ជាចំនួនពិត បានន័យថា $\vec{a} \parallel \vec{b}$ សមមូលនឹង $\vec{a} = m\vec{b}$ ។


លក្ខណៈ៖ ប្រមាណវិធី បូក និង គុណ វ៉ិចទ័រ និង ចំនួនពិត

បើប្រើវ៉ិចទ័រ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ និង $\vec{c}$ នៅក្នុងលំហ ហើយពីរចំនួនពិត m និង n នោះគេបាន៖

- $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$
- $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$
- $(mn)\vec{a} = m(n\vec{a})$
- $(m+n)\vec{a} = m\vec{a} + n\vec{a}$
- $m(\vec{a} + \vec{b}) = m\vec{a} + m\vec{b}$
- បើ $m\vec{a} = \vec{0}$ គេបាន $m = 0$ ឬ $\vec{a} = \vec{0}$

កូអរដោនេក្នុងលំហ

គេហៅតម្រុយក្នុងលំហ គឺ គ្រាប់ ចតុ ធាតុ $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, O ជាចំណុចមួយក្នុងលំហ និង $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ ជាវ៉ិចទ័រមិនស្ថិតនៅក្នុងប្លង់តែមួយ ។ ចំណុច O ហៅថា គល់តម្រុយ៖



- វ៉ិចទ័រ $\vec{i}$ ហៅថា វ៉ិចទ័រឯកតានៃអ័ក្សអាប់ស៊ីស $(x'x)$
- វ៉ិចទ័រ $\vec{j}$ ហៅថា វ៉ិចទ័រឯកតានៃអ័ក្សអរដោនេ $(y'y)$
- វ៉ិចទ័រ $\vec{k}$ ហៅថា វ៉ិចទ័រឯកតានៃអ័ក្សកម្ពស់ $(z'z)$

ហើយ $(x'x), (y'y), (z'z)$ ហៅថាអ័ក្ស ។

លក្ខណៈកូអរដោនេ

ក. បើ $P(x, y, z)$ និង $Q(x', y', z')$ ជាពីរចំណុចនៃលំហប្រដាប់ដោយតម្រុយ $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេបាន៖


- $P(x, y, z) = Q(x', y', z')$ សមមូល $x = x'$ និង $y = y'$ និង $z = z'$ ។
- $P(x, y, z) \neq Q(x', y', z')$ សមមូល $x \neq x'$ ឬ $y \neq y'$ ឬ $z \neq z'$ ។
- $\vec{PQ} = (x' - x, y' - y, z' - z)$
- ចំណុចកណ្តាលនៃ PP' គឺ $\left(\frac{x+x'}{2}, \frac{y+y'}{2}, \frac{z+z'}{2}\right)$

ខ. បើ $\vec{u} = (x, y, z), \vec{v} = (x', y', z')$

ជាពីរវ៉ិចទ័រក្នុងលំហប្រដាប់ដោយគោល $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេបាន៖

- $\vec{u} = \vec{v}$ សមមូល $x = x'$ និង $y = y'$ និង $z = z'$
- $\vec{u} \neq \vec{v}$ សមមូល $x \neq x'$ ឬ $y \neq y'$ ឬ $z \neq z'$
- វ៉ិចទ័រ $\vec{u} + \vec{v} = (x+x', y+y', z+z')$
- វ៉ិចទ័រ $\vec{u} - \vec{v} = (x-x', y-y', z-z')$
- គ្រប់ $k \in \mathbb{R}, k\vec{u} = (kx, ky, kz)$
- គ្រប់ $(k, k') \in \mathbb{R}^2$ វ៉ិចទ័រ $k\vec{u} + k'\vec{v} = (kx + k'x', ky + k'y', kz + k'z')$

ទិសដៅកូស៊ីនុស




ក្នុងត្រីកោណកែង គេបាន៖

- $\cos \alpha = \frac{x}{|\vec{OP}|}$ ឬ $x = |\vec{OP}| \cos \alpha$
- $\cos \beta = \frac{y}{|\vec{OP}|}$ ឬ $y = |\vec{OP}| \cos \beta$
- $\cos \gamma = \frac{z}{|\vec{OP}|}$ ឬ $z = |\vec{OP}| \cos \gamma$

និយមន័យ៖ ផលគុណស្កាលែ

ផលគុណស្កាលែនៃពីរវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ក្នុងលំហ គឺជាចំនួនពិត k មួយ ដែលកំណត់ដោយ៖

- $k = \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ បើ $\vec{u} = \vec{0}$ ឬ $\vec{v} = \vec{0}$ ។
- $k = \vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| |\vec{v}| \cos \theta$ បើ $\vec{u} \neq \vec{0}$ និង $\vec{v} \neq \vec{0}$ ហើយ θ ជាមុំធ្វើឡើងដោយវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ដែល $(0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ)$ ។



លក្ខណៈ៖ ប្រមាណវិធីនៃផលគុណស្កាលែក្នុងលំហ

☛ ចំពោះគ្រប់វ៉ិចទ័រ $\vec{u}, \vec{v}$ និង $\vec{w}$ ៖

1. $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$ លក្ខណៈបំបែក I ។
2. $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot \vec{w} = \vec{u} \cdot \vec{w} + \vec{v} \cdot \vec{w}$ លក្ខណៈបំបែក II ។
3. $(k\vec{u}) \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot (k\vec{v}) = k(\vec{u} \cdot \vec{v})$ លក្ខណៈផ្គុំ
4. $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$ លក្ខណៈត្រឡប់

☛ ផលគុណស្កាលែនៃពីរវ៉ិចទ័រអត្តកូណាល់គ្នា ឬកែងគ្នា៖

$$\vec{u} \perp \vec{v} \text{ សមមូល } \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$

ដែល $(\vec{u} \neq \vec{0}, \vec{v} \neq \vec{0})$

ផលគុណស្កាលែក្នុងគោលអត្តកូណាល់

ពីរវ៉ិចទ័រ $\vec{u} = (x, y, z)$ និង $\vec{v} = (x', y', z')$ ស្ថិតក្នុងគោលអត្តកូណាល់នៃលំហ គេបាន៖

- $\vec{u} = (x, y, z) = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'$
- $\vec{u} // \vec{v} \iff \vec{u} = k \cdot \vec{v} \iff \frac{x}{x'} = \frac{y}{y'} = \frac{z}{z'} = k$
- $\vec{u} \perp \vec{v} \iff xx' + yy' + zz' = 0$
- $|\vec{u}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cos \theta \implies \cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|} = \frac{xx' + yy' + zz'}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \sqrt{x'^2 + y'^2 + z'^2}}$

ចម្ងាយរវាងពីរចំណុចក្នុងលំហ

គេមានចំណុច $A(x_1, y_1, z_1), B(x_2, y_2, z_2)$


គេបានចម្ងាយពី A ទៅ B គឺកំណត់ដោយ៖

$$d(A, B) = AB = |\vec{AB}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

សមីការស្វ៊ែរ

សមីការនៃស្វ៊ែរដែលមានផ្ចិតក្រុងចំណុច (a, b, c) និងកាំ r គឺ៖

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = r^2$$



មេរៀនទី២៖ បន្ទាត់ ប្លង់ និង ផ្ទៃ

- សមីការបន្ទាត់ក្នុងលំហ

បន្ទាត់កាត់តាមចំណុច $P(x_0, y_0, z_0)$

បើបន្ទាត់ L ស្របនឹងវ៉ិចទ័រ $\vec{u} = (a, b, c)$ នោះ

$$\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases}$$

បើ $abc \neq 0$ នោះសមីការឆ្លុះកំណត់ដោយ៖


$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}$$

- ចម្ងាយពីចំណុចទៅបន្ទាត់

រូបមន្តចម្ងាយ

បើ P ជាចំណុចមួយលើ L និង $\vec{u}$ ជាវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិសនៃ L នោះ

$$d(M, L) = \frac{|\overrightarrow{PM} \times \vec{u}|}{|\vec{u}|}$$



- សមីការប្លង់ និងចម្ងាយពីចំណុចទៅប្លង់


ប្លង់មានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n} = (a, b, c)$

បើប្លង់ (α) កាត់តាម $P(x_0, y_0, z_0)$ នោះ

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

សមីការទូទៅ៖ $ax + by + cz + d = 0$

$$d(M, \alpha) = \frac{|ax_M + by_M + cz_M + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$




- មុំរវាងប្លង់ពីរ


រូបមន្តមុំ

បើប្លង់ពីរមានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}_1$ និង $\vec{n}_2$ នោះ

$$\cos \theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|}$$



- សមីការផ្ទៃ



បើផ្ទៃរ(S) មានផ្ចិត $I = (a, b, c)$ និងកាំ R នោះ៖

- សមីការស្តង់ដា

$$(S) : (x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$$

- សមីការទូទៅ


$$(S) : x^2 + y^2 + z^2 + Ax + By + Cz + D = 0$$

- បើផ្ទៃរ(S) មានអង្កត់ផ្ចិត $[AB]$ នោះ (S) មានផ្ចិត $I = \left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}, \frac{z_A + z_B}{2} \right)$ និងមានកាំ $R = \frac{1}{2}AB$

ទីតាំងនោះផ្ទៃ (S) និងប្លង់ (P)

បើផ្ទៃរ(S) មានផ្ចិត $I(x_0, y_0, z_0)$ និងកាំ R និងប្លង់ $(\alpha) : ax + by + cz + d = 0$

- បើ $d(I, \alpha) > R$ នោះប្លង់ α មិនកាត់ផ្ទៃទេ
- បើ $d(I, \alpha) = R$ នោះប្លង់ α ប៉ះផ្ទៃត្រង់មួយចំណុច
- បើ $d(I, \alpha) < R$ នោះប្លង់ α កាត់ផ្ទៃបានរង្វង់មួយ



- ចម្ងាយរវាងបន្ទាត់ពីរ

រូបមន្តចម្ងាយ

បន្ទាត់ L_1 កាត់តាម M_1 មានទិស $\vec{u}_1$ និង L_2 កាត់តាម M_2 មានទិស $\vec{u}_2$

- បើបន្ទាត់ស្របគ្នា៖

$$d(L_1, L_2) = \frac{|\overrightarrow{M_1 M_2} \times \vec{u}_1|}{|\vec{u}_1|}$$


- បើបន្ទាត់មិនស្របគ្នា៖

$$d(L_1, L_2) = \frac{|\overrightarrow{M_1 M_2} \cdot (\vec{u}_1 \times \vec{u}_2)|}{|\vec{u}_1 \times \vec{u}_2|}$$

មេរៀនទី៣៖ គន្លឹះបង្ហាញរូបធរណីមាត្រ


ប្រភេទត្រីកោណ និងចតុកោណ

- វិធីទី១៖ $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$ ($\perp A$)



- វិធីទី២៖ ប្រើទ្រឹស្តីបទពីតាគរ៖ $BC^2 = AC^2 + AB^2$


- គណនាប្រវែងជ្រុងទាំងបី៖ $|\overrightarrow{AB}|, |\overrightarrow{BC}|, |\overrightarrow{AC}|$



- មានប្រវែងពីរស្មើគ្នា

A ត្រីកោណសមបាត B


- បង្ហាញថាជ្រុងពីរស្មើគ្នា



- បង្ហាញថាមានមុំកែងមួយ


- វិធីទី២៖ គណនាប្រវែងជ្រុងទាំងបី

- $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{BC}| = |\overrightarrow{AC}|$



- វិធីទី២៖ រកមុំទាំងបីឲ្យមានរង្វាស់ស្មើ 60° ដូចគ្នា


- រក $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{DC}$ និង $\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{BC}$



- វ៉ិចទ័រឈមស្មើគ្នា $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ និង $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$

បង្ហាញថាជាចតុកោណកែង៖


- ជាប្រលេឡូក្រាម ($\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$)



- មុំកែងមួយ៖ $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 0$


បង្ហាញថា កាវេ

- ជាប្រលេឡូក្រាម $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$
- ជ្រុងជាប់គ្នាស្មើគ្នា $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{AD}|$
- មានមុំកែងមួយ៖ $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 0$
- (សិស្សអាចបង្ហាញជ្រុងទាំង ៤ ស្មើគ្នា និង មានមុំកែងមួយ)



បង្ហាញថា ចតុកោណស្មើ

- ជ្រុងទាំងបួនមានប្រវែងស្មើគ្នា៖
 $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{BC}| = |\overrightarrow{CD}| = |\overrightarrow{DA}|$
- ឬបង្ហាញថាអង្កត់ទ្រូងទាំងពីរកែងគ្នា៖ $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD} = 0$



មេរៀនទី១ ចំនួនកុំផ្លិចប្រចាំជីវគសិក

កុំផ្លិចឆ្លាស់ និងកុំផ្លិចផ្ទុយ

- បើគេមានចំនួនកុំផ្លិច $z = a + bi$ នោះចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់ $\bar{z}$ តាងដោយ $\bar{z} = a - bi$ ។
- ចំនួនកុំផ្លិចផ្ទុយនៃចំនួនកុំផ្លិច $z = a + bi$ តាងដោយ $-z = -a - bi$ ។

ប្រមាណវិធីលើកុំផ្លិច

- វិធីបូកចំនួនកុំផ្លិច
 $(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$
- វិធីដកចំនួនកុំផ្លិច
 $(a + bi) - (c + di) = (a - c) + (b - d)i$
- វិធីគុណចំនួនកុំផ្លិច
 $(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$
- វិធីចែកចំនួនកុំផ្លិច

$$\frac{(a + bi)}{(c + di)} = \frac{(a + bi)(c - di)}{(c + di)(c - di)} = \frac{ac + bd}{c^2 + d^2} + \frac{bc - ad}{c^2 + d^2}i$$

ចំពោះ $c + di \neq 0$

លក្ខណៈនៃចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់

- កុំផ្លិចឆ្លាស់នៃបូកដកកុំផ្លិចពីរ
គេបាន $\overline{z_1 \pm z_2} = \bar{z}_1 \pm \bar{z}_2$ ។
- កុំផ្លិចឆ្លាស់នៃផលគុណកុំផ្លិចពីរ
គេបាន $\overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$ ។
- កុំផ្លិចឆ្លាស់នៃផលចែកកុំផ្លិចពីរ
គេបាន $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}$ ។

មេរៀនទី២ ចំនួនកុំផ្លិចប្រចាំត្រីកោណមាត្រ

ម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច

គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z = a + bi$ គេតាងម៉ូឌុលនៃ z ដោយ $|z|$ កំណត់សរសេរដោយ $r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ ។

កាវេ នៃ ម៉ូឌុល គឺជា ផលគុណ រវាង ចំនួនកុំផ្លិច z និងកុំផ្លិចឆ្លាស់របស់វា

បើ z ជាចំនួនកុំផ្លិច នោះ $|z|^2 = z \cdot \bar{z}$ ។

ម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច

បើ z ជាចំនួនកុំផ្លិច នោះ $|z| = |\bar{z}| = |-z|$ ។

ម៉ូឌុលនៃផលគុណស្មើនឹងផលគុណនៃម៉ូឌុល

បើ z ជាចំនួនកុំផ្លិច នោះ $|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$ ។

ម៉ូឌុលនៃផលចែកស្មើនឹងផលចែកនៃម៉ូឌុល

បើ z ជាចំនួនកុំផ្លិច នោះ $\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$ ។

គន្លឹះដោះស្រាយ

ដើម្បីរកអត្ថន័យម៉ង់នៃ z យើងត្រូវដោះស្រាយ

ប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases} \cos \varphi = \frac{a}{r} \\ \sin \varphi = \frac{b}{r} \end{cases}$ ដែល $r = \sqrt{a^2 + b^2}$ និង φ ជាអត្ថន័យម៉ង់នៃ z ។

ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិច

ចំនួនកុំផ្លិច $z = a + bi$ អាចសរសេរជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ ។

ផលគុណកុំផ្លិចក្នុងទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

បើ $z_1 = r_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1)$ និង $z_2 = r_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2)$ នឹង
 $z_1 \cdot z_2 = r_1 r_2 [\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2)]$

ផលចែកនៃចំនួនកុំផ្លិចក្នុងទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

បើ គេ មាន ចំនួន កុំផ្លិច $z_1 = r_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1)$ និង $z_2 = r_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2)$ ដែល $z_2 \neq 0$
 $\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} [\cos(\theta_1 - \theta_2) + i \sin(\theta_1 - \theta_2)]$

មេរៀន ទី៣ ស្វ័យគុណ ទី n នៃ ចំនួនកុំផ្លិច

ស្វ័យគុណទី n នៃចំនួនកុំផ្លិច

បើ $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ នោះ $z^n = [r(\cos \theta + i \sin \theta)]^n = r^n(\cos n\theta + i \sin n\theta)$ គ្រប់ n ជាចំនួនគត់វិជ្ជមាន ។
គេ អាច ទាញ បាន $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$ ហៅថាប្រមូលដឺម៉រ ។

ប្រូសទី n នៃចំនួនកុំផ្លិច

បើ $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ ជា ចំនួនកុំផ្លិច មិន សូន្យ ហើយ n ជា ចំនួនគត់វិជ្ជមាន នោះ z មាន n ប្រូសទី n កំណត់ដោយ $w_k = \sqrt[n]{r} \left[\cos \left(\frac{\theta + 2k\pi}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\theta + 2k\pi}{n} \right) \right]$ ដែល $k = 0, 1, 2, 3, \dots, n - 1$ ។

ជំពូកទី ៧

ចំនួនកុំផ្លិច