



១ មេរៀន ចំណូលសមិទ្ធាន

១. មូលការ (Square Root)

ជាទូទៅ

បើ $a > 0$ និង $x^2 = a$ គេបាន $x = \sqrt{a}$ និង $x = -\sqrt{a}$ ។

២. មូលគូប (Cube Root)

ជាទូទៅ

បើ $x^3 = a$ គេបាន $x = \sqrt[3]{a}$ ដែល a អាចជាចំនួនគតិក្នុងចំនោមចំនួនពិត។

៣. ប្រមាណវិធីគុណកិច្ចការ (Multiplication of Radicals)

៣.១. វិធីគុណកិច្ចការ (Multiplication of Radicals)

ជាទូទៅ

ផលគុណនៃរ៉ាឌីកាល់ដែលមានសន្ទស្សន៍ដូចគ្នាស្មើនឹងរ៉ាឌីកាល់នៃផលគុណ៖

$$\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab} \quad a \geq 0, b \geq 0$$
$$\sqrt[3]{a} \times \sqrt[3]{b} = \sqrt[3]{ab} \quad a, b \text{ អាចជាចំនួនគតិក្នុងចំនោមចំនួនពិត}$$

៣.២. វិធីចែកកិច្ចការ (Division of Radicals)

ជាទូទៅ

ផលចែកនៃរ៉ាឌីកាល់ដែលមានសន្ទស្សន៍ដូចគ្នាស្មើនឹងរ៉ាឌីកាល់នៃផលចែក៖

$$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}} \quad a \geq 0, b > 0$$
$$\frac{\sqrt[3]{a}}{\sqrt[3]{b}} = \sqrt[3]{\frac{a}{b}} \quad b \neq 0$$

៣.៣. ការបញ្ចូលមូលចំនួនកិច្ចការ

ជាទូទៅ

ដើម្បីបញ្ចូលមូលចំនួនកិច្ចការ គេត្រូវបំបែកវាជាស្វ័យគុណដែលមាននិស្សន្ទស្សន៍ស្មើនឹងសន្ទស្សន៍នៃរ៉ាឌីកាល់។

ចំពោះរ៉ាឌីកាល់ជាអថេរ

$$\sqrt{x^2} = |x| = \begin{cases} x, & \text{បើ } x \geq 0 \\ -x, & \text{បើ } x < 0 \end{cases} \quad \sqrt[3]{x^3} = x$$

៣.៤. ការបញ្ចូលមូលចំនួនកិច្ចការ

ជាទូទៅ

ដើម្បីបញ្ចូលមូលចំនួនកិច្ចការ គេត្រូវបំបែកវាជាស្វ័យគុណដែលមាននិស្សន្ទស្សន៍ស្មើនឹងសន្ទស្សន៍នៃរ៉ាឌីកាល់។

$$x\sqrt{y} = \sqrt{x^2y} \quad x \geq 0, y \geq 0$$
$$x\sqrt[3]{y} = \sqrt[3]{x^3y} \quad x, y \text{ អាចជាចំនួនគតិក្នុងចំនោមចំនួនពិត}$$

៣.៥. វិធីបូក និងវិធីដកនៃរ៉ាឌីកាល់

ជាទូទៅ

ដើម្បីគណនាផលបូកនិងផលដករ៉ាឌីកាល់ដែលមានសន្ទស្សន៍ដូចគ្នា គេត្រូវបំបែកវាជាស្វ័យគុណ។

ដើម្បីគណនាផលបូកនិងផលដករ៉ាឌីកាល់ដែលមានរ៉ាឌីកាល់ដូចគ្នានិងមានសន្ទស្សន៍ដូចគ្នា គេបូក-ដកមេគុណនិងមេគុណ ហើយរ៉ាឌីកាល់ទុកដដែល។

$$a\sqrt{x} \pm b\sqrt{x} = (a \pm b)\sqrt{x} \quad x \geq 0$$

៣.៦. វិធីបំបាត់រ៉ាឌីកាល់ពីភាគបែង

ជាទូទៅគេមិនទុកឱ្យចំនួនដែលមានរ៉ាឌីកាល់នៅភាគបែងទេ ។ ខាងក្រោមនេះជារឿងបំបាត់រ៉ាឌីកាល់ពីភាគបែង ។

• ករណីភាគបែងមានមូលគូប (មូលគូប)

ជាទូទៅ

ដើម្បីបំបាត់រ៉ាឌីកាល់ពីភាគបែងដែលមានមូលគូបនិងសន្ទស្សន៍ពីរ គេត្រូវគុណទាំងភាគយកនិងភាគបែង និងរ៉ាឌីកាល់នៃភាគបែងនោះ ។

$$\frac{c}{\sqrt{a}} = \frac{c \times \sqrt{a}}{\sqrt{a} \times \sqrt{a}} = \frac{c\sqrt{a}}{a} \quad a > 0$$

• ករណីភាគបែងមានមូលគូប (មូលគូប)

ជាទូទៅ

ដើម្បីបំបាត់រ៉ាឌីកាល់ពីភាគបែងដែលមានមូលគូបនិងសន្ទស្សន៍ពីរ (មូលគូប) គេត្រូវគុណទាំងភាគយកនិងភាគបែង និង រ៉ាឌីកាល់បំបែកនៃភាគបែងនោះ ។

$$\frac{c}{\sqrt[3]{a}} = \frac{c \times \sqrt[3]{a^2}}{\sqrt[3]{a} \times \sqrt[3]{a^2}} = \frac{c\sqrt[3]{a^2}}{a} \quad a \neq 0$$
$$\frac{c}{\sqrt[3]{a^2}} = \frac{c \times \sqrt[3]{a}}{\sqrt[3]{a^2} \times \sqrt[3]{a}} = \frac{c\sqrt[3]{a}}{a} \quad a \neq 0$$

• ករណីភាគបែងមាន ២ តួ (មូលគូប)

ជាទូទៅ

ដើម្បីបំបាត់រ៉ាឌីកាល់ពីភាគបែងដែលមាន ២ តួ (មូលគូប) គេត្រូវគុណទាំងភាគយក និងភាគបែង និង ករណីភាគបែងនៃភាគបែងនោះ ។

$$\frac{A}{\sqrt{a} - \sqrt{b}} = \frac{A(\sqrt{a} + \sqrt{b})}{(\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a} + \sqrt{b})} = \frac{A(\sqrt{a} + \sqrt{b})}{a - b}$$
$$\frac{A}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} = \frac{A(\sqrt{a} - \sqrt{b})}{(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b})} = \frac{A(\sqrt{a} - \sqrt{b})}{a - b}$$

សន្ទស្សន៍ n រ៉ាឌីកាល់ $\sqrt[n]{a^m}$ រ៉ាឌីកាល់

• ករណីភាគបែងមាន ២ តួ (មូលគូប)

ជាទូទៅ

ដើម្បីបំបាត់រ៉ាឌីកាល់ពីភាគបែងដែលមាន ២ តួ (មូលគូប) គេត្រូវគុណទាំងភាគយក និងភាគបែង និង ករណីភាគបែងនៃភាគបែងនោះ ។

$$\frac{A}{\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b}} = \frac{A(\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2})}{(\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b})(\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2})}$$
$$= \frac{A(\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2})}{a - b}$$
$$\frac{A}{\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b}} = \frac{A(\sqrt[3]{a^2} - \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2})}{(\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b})(\sqrt[3]{a^2} - \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2})}$$
$$= \frac{A(\sqrt[3]{a^2} - \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2})}{a + b}$$

២ មេរៀន សមាមាត្រ

១. ទំនាក់ទំនងរវាងសមាមាត្រ (Proportions)

ជាទូទៅ

ក្នុងសមាមាត្រ $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ នោះគេទាញបាន $a \times d = b \times c$ ។

• ខ្នាតទ្វារស្របគ្នាអន្តរជាតិ (International Measurement Units)

1 mile (ម៉ាយ) $\approx$ 1.609 km
1 inch (អ៊ីញ) $\approx$ 2.54 cm
1 foot (ហ្វីត) $\approx$ 0.3048 m
1 lb (ផោន) $\approx$ 0.453 kg



២. ទំនាក់ទំនងរវាងភាគរយ (Percentages)

ជាទូទៅ

ភាគរយនៃ a ធៀបនឹង b កំណត់ដោយ៖ $\frac{a}{b} \times 100\%$

៣. ទំនាក់ទំនងរវាងភាគរយកើន ឬ ថយ

ជាទូទៅ

- បើគេបង្កើនពី a ទៅ b នោះភាគរយកើនកំណត់ដោយ៖ $\frac{b-a}{a} \times 100\%$
- បើគេបន្ថយពី b មក a នោះភាគរយថយកំណត់ដោយ៖ $\frac{b-a}{b} \times 100\%$

៤. ការប្រើប្រាស់សមាស (Compound Interest)

ជាទូទៅ

បើ P_0 ជាប្រាក់ដើម r ជាអត្រាការប្រាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ ហើយ t ជាពេលវេលាដែលបានដាក់ប្រាក់ គេបាន៖

ប្រាក់ឆ្នាំទី ១៖ $P_1 = P_0(1 + r)$

ប្រាក់ឆ្នាំទី ២៖ $P_2 = P_0(1 + r)^2$

ប្រាក់ឆ្នាំទី ៣៖ $P_3 = P_0(1 + r)^3$

... ប្រាក់ឆ្នាំទី t គឺ៖ $P_t = P_0(1 + r)^t$

៣ មេរៀន ករណីបំបែកកិច្ចការ

១. ផលគុណនៃករណីបំបែកកិច្ចការ

ដើម្បីបំបែកផលគុណនៃករណីបំបែកកិច្ចការ យើងយកក្រុមបំបែកនៃករណីទី១ គុណនឹងក្រុមបំបែកនៃករណីទី២ រួចបញ្ចូលមូលដ្ឋាន៖

$$a(b \pm c) = ab \pm ac$$

រូបមន្ត សមាហរណកម្ម

- ការបំបែក $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

- ការបំបែក $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

- ផលសងការ $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$

- ផលសងគូប $(a - b)(a^2 + ab + b^2) = a^3 - b^3$

- ផលបូកគូប $(a + b)(a^2 - ab + b^2) = a^3 + b^3$

២. ការបំបែកករណីបំបែកកិច្ចការ (Factoring Expressions)

២.១. ការបំបែកករណីបំបែកកិច្ចការ

គេប្រើរូបមន្ត $ka \pm kb = k(a \pm b)$ ដែល k ជាកត្តារួម ។

២.២. ការបំបែកករណីបំបែកកិច្ចការ

$$a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$$
$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

២.៣. វិធីគុណកិច្ចការ (AC Method)

ដាក់ជាផលគុណកត្តា $Ax^2 + Bx + C$

$$A = x^2 + 5x + 6$$

- បំបែក A និង C ជាផលគុណកត្តា រួចរៀបជាជួរឈរ។

- គុណ ខ្ទង់ ណាមួយ រួច បូក លទ្ធផលចូលគ្នា មើលថាតើវាស្មើនឹងកត្តាណាមួយ B ដែរឬទេ?

- បើស្មើ នោះចម្លើយគឺការយកកត្តាមកជួរដេក មួយៗមកផ្គុំគ្នា។

$$\begin{array}{cc} x & 3 \\ & \times \\ x & 2 \\ \hline 2x + 3x = 5x \end{array}$$

២.៤. វិធីបំពេញការងារបញ្ចប់ការបំពេញ (Completing the Square)

ដាក់ជាផលគុណក្នុង $x^2 + Bx + C$

- យកមេគុណនៃ x ចែកនឹង ២ រួចលើកជាការេ $\left(\frac{B}{2}\right)^2$ ដើម្បីបាន «តួបំពេញ» ។
- បូកតួបំពេញនេះ រួចដកវាចេញវិញ ហើយផ្គុំពាក្យដំបូងចូលរួបរួមគ្នាបាននៃទ្វេធា $(x + \frac{B}{2})^2$ ។
- បូកដកលេខដែលសល់ រួចប្រើរូបមន្តផលសងការេ $a^2 - b^2$ បើអាច ។

ចំណាំ

- ករណី $Ax^2 + Bx + C$ ($A \neq 1$): ត្រូវទាញ A ជាកត្តារួមពីពាក្យដំបូងសិន $A \left(x^2 + \frac{B}{A}x\right) + C$ ទើបរកតួបំពេញ ។
- ករណីមេគុណ B ជាចំនួនសេស: គប្បីរក $\frac{B}{2}$ ជាប្រភាគដែល កុំបំបែកជាទសភាគ ដើម្បីងាយស្រួលផ្គុំចូលរួបរួមគ្នា ។

៣. ប្រមាណវិធីលើកកម្ពស់សមីការ

៣.១. វិធីប្រើប្រាស់កម្រិតសមីការ

ជាទូទៅ ដើម្បីប្រើប្រាស់កម្រិតសមីការ

- ដាក់ភាគយកនិងភាគបែងនៃប្រភាគជាផលគុណនៃកត្តា
- សម្រួលប្រភាគនីមួយៗបើអាច
- កម្រិតភាគបែងរួម
- បូកឬដកភាគយកដោយរក្សាទុកភាគបែងរួម
- សម្រួលលទ្ធផលបើអាច ។ (ដោយឱ្យកត្តាសម្រួលខុសពីសូន្យ) ។

$$\frac{A}{B} \pm \frac{C}{D} = \frac{A \times D \pm B \times C}{B \times D}$$

សម្គាល់

យើងចាត់ទុកកត្តាដែលត្រូវសម្រួលជាកត្តាមិនសូន្យ ហេតុនេះយើងមិនគប្បីឱ្យមានការបញ្ជាក់តម្លៃដល់កត្តាដែលឱ្យកត្តានោះស្មើនឹងសូន្យឡើយ ។

៣.២. វិធីគណនាចំនួនចែកកម្រិតសមីការ

ជាទូទៅ ដើម្បីគណនាចំនួនចែកកម្រិតសមីការ

- ដាក់ភាគយកនិងភាគបែងនៃប្រភាគជាផលគុណនៃកត្តា
- ចំពោះវិធីគណនាគេគណនាភាគយកនិងភាគបែង ភាគបែងនិងភាគបែង $\frac{A}{B} \times \frac{C}{D} = \frac{A \times C}{B \times D}$
- ចំពោះវិធីចែកគេគណនាប្រភាគតំណាងចែកនិងចម្រាស់នៃប្រភាគតូចក ហើយសម្រួលលទ្ធផលបើអាច ។

$$\frac{A}{B} \div \frac{C}{D} = \frac{A}{B} \times \frac{D}{C} = \frac{A \times D}{B \times C}$$

៤. មេរៀន សមីការដឺក្រេទី១មានមួយអន្តរាគមន៍

១. សមីការដឺក្រេទី១មានមួយអន្តរាគមន៍

- វិធាននៃការប្តូរអន្តរាគមន៍ (Rules of Transposition)

ក្នុងប្រតិបត្តិ គេអាចលើកតួមានអន្តរាគមន៍ទៅអង្គម្ខាងនិងតួគ្មានអន្តរាគមន៍ទៅអង្គម្ខាងទៀត ។ តួណាត្រូវប្តូរអង្គត្រូវប្តូរសញ្ញារួចធ្វើប្រមាណវិធី (ពីបូកទៅដក, ពីដកទៅបូក, ពីគុណទៅចែក, ពីចែកទៅគុណ) ។ x

ប្រមាណ

$$\begin{aligned} ax &= b \Rightarrow x = \frac{b}{a} \quad (a \neq 0) \\ ax &= 0 \Rightarrow x = 0 \quad (a \neq 0) \\ 0x &= 0 \Rightarrow x \text{ មានតម្លៃគ្រប់ចំនួន} \\ 0x &= b \Rightarrow \text{គ្មានចម្លើយ} \quad (b \neq 0) \end{aligned}$$

២. សមីការដឺក្រេទី១មានមួយអន្តរាគមន៍

វិធាន

- ដើម្បីដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី១ មានមួយអន្តរាគមន៍ដែលមានភាគបែងជាលេខ គេត្រូវ៖
- តម្រូវភាគបែងរួមនៃអង្គទាំងពីរបស់សមីការរួចលុបភាគបែងរួមចោល ។
- លើកតួមានអន្តរាគមន៍ទៅអង្គម្ខាងនិងតួគ្មានអន្តរាគមន៍ទៅអង្គម្ខាងទៀត ។
- តួណាត្រូវប្តូរអង្គត្រូវប្តូរសញ្ញារួចធ្វើប្រមាណវិធី ។

៣. សមីការដឺក្រេទី១មានមួយអន្តរាគមន៍

វិធាន

វិធាន ដើម្បីដោះស្រាយសមីការមានមួយអន្តរាគមន៍ដែលអង្គទី១មានអន្តរាគមន៍ជាដឺក្រេទី២ គេត្រូវសរសេរអង្គទី១ជាផលគុណក្នុងដឺក្រេទី១ ។

ប្រមាណ

បើ $A \times B = 0$ នោះ គេបាន $A = 0$ ឬ $B = 0$ ។

តាមវិធីសមីការដឺក្រេទី១ Δ (Using Discriminant Δ)

ជាទូទៅ

ចំពោះសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអន្តរាគមន៍ទៅ $ax^2 + bx + c = 0$ (ដែល $a \neq 0$) តាមវិធីសមីការដឺក្រេទី១ $\Delta = b^2 - 4ac$ យោងតាមតម្លៃនៃ Δ មាន ៣ ករណី៖

- បើ $\Delta > 0$: សមីការមានមូលដឺក្រេទី១ពីរផ្សេងគ្នា គឺ $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ និង $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$ ។
- បើ $\Delta = 0$: សមីការមានមូលដឺក្រេទី១ គឺ $x_1 = x_2 = \frac{-b}{2a}$ ។
- បើ $\Delta < 0$: សមីការគ្មានមូលដឺក្រេទី១ពិតទេ ។

៤. មេរៀនសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអន្តរាគមន៍

ជាទូទៅ

១. សមីការដឺក្រេទី១មានមួយអន្តរាគមន៍ តើប្រធានប្រាប់អ្វីខ្លះ? តើគេសួរអ្វី?
២. តាងអន្តរាគមន៍សមីការដឺក្រេទី១ដែលគេសួរ (កុំភ្លេចដាក់លក្ខខណ្ឌ) ។
៣. សរសេរសមីការ៖ បកប្រែប្រធានចំណោទទៅជាសមីការគណិតវិទ្យា ។
៤. ដោះស្រាយសមីការ៖ គណនាកត់តម្លៃនៃអន្តរាគមន៍នោះ ។
៥. រៀងផ្ទាត់ និង សន្និដ្ឋាន៖ យកចម្លើយទៅរៀងផ្ទាត់ រួចសរសេរឆ្លើយ ។

៤. មេរៀន វិធីសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអន្តរាគមន៍

១. លក្ខណៈនៃវិសមភាព

១.១. ប្រមាណវិធីប្រើប្រាស់

ជាទូទៅ

បើគេប្រើប្រាស់ ឬដកចំនួនតែមួយលើអង្គទាំងពីរនៃវិសមភាព គេបានវិសមភាពថ្មីដែលមានទិសដៅដូចវិសមភាពដើម ។

$$\begin{aligned} \text{បើ } a > b \text{ នោះ: } & a + c > b + c \\ & a - c > b - c \end{aligned}$$

១.២. ប្រមាណវិធីប្រើប្រាស់

ជាទូទៅ

- បើគេគុណ ឬចែកអង្គទាំងពីរនៃវិសមភាពនឹងចំនួនវិជ្ជមានតែមួយ គេបានវិសមភាពថ្មីដែលមានទិសដៅដូចវិសមភាពដើម ។


$$a > b \begin{cases} ac > bc \\ a \div c > b \div c \end{cases} \quad \text{បើ } c > 0$$

- បើគេគុណ ឬចែកអង្គទាំងពីរនៃវិសមភាពនឹងចំនួនអវិជ្ជមានតែមួយ គេបានវិសមភាពថ្មីដែលមានទិសដៅផ្ទុយពីវិសមភាពដើម ។


$$a > b \begin{cases} ac < bc \\ a \div c < b \div c \end{cases} \quad \text{បើ } c < 0$$

២. វិធីសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអន្តរាគមន៍

- សញ្ញា $< ឬ >$ មិនយកតម្លៃត្រង់នោះ ប្រើ រង់ក្រចកបើក (ឬ រង់ក្រចកបិទ) ។



- សញ្ញា $\leq$ ឬ $\geq$ យកតម្លៃត្រង់នោះ ប្រើ ដង្កៀបបើក (ឬ ដង្កៀបបិទ) ។




- ចំណាំ៖ រង់ក្រចក និងដង្កៀប ត្រូវតែហាមឃាត់ឆ្ពោះទៅរកបន្ទាត់ដិត (បន្ទាត់ចម្លើយ) ជានិច្ច!

ចំណាំ

$$0x \leq 0$$

ទោះ x យកតម្លៃណាក៏អង្គទី ១ នៅតែស្មើនឹងអង្គទី ២ ដែល ។

ចម្លើយជាគ្រាប់




ដូចនេះ វិសមីការមានចម្លើយចំពោះគ្រប់តម្លៃនៃ x

៣. ប្រមាណវិធីសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអន្តរាគមន៍

ការដោះស្រាយប្រព័ន្ធវិសមីការគឺ៖

១. ដោះស្រាយវិសមីការនីមួយៗដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ។
២. យកចម្លើយទាំងពីរមកតូសត្រួតស៊ីគ្នាដោយលើក្រាបតែមួយ ។
៣. តំបន់ណាដែលជាប្រសព្វគ្នា នោះហើយជាចម្លើយរួមរបស់វា ។

គន្លឹះ៖ ទម្លាក់ខ្សែបន្ទាត់ឈរពីចំណុចព្រំដែលចុះមកក្រោម តំបន់ណាដែលមាន បន្ទាត់ដិតទាំងពីរជាប់គ្នា ទីនោះជាចម្លើយរួម!



៤. មេរៀន

ជាទូទៅ

ដើម្បីដោះស្រាយចំណោទវិសមីការ គេត្រូវ

១. តាងអន្តរាគមន៍៖ ជ្រើសរើសអន្តរាគមន៍និងដាក់លក្ខខណ្ឌ ។
២. សរសេរវិសមីការ៖ សរសេរតាមប្រាប់ប្រធាន ទៅជាវិសមីការ ឬប្រព័ន្ធវិសមីការ ។
៣. ដោះស្រាយ៖ គណនាកត់តម្លៃនៃវិសមីការនោះ ។
៤. រៀងផ្ទាត់ និង សន្និដ្ឋាន៖ រៀងផ្ទាត់លទ្ធផល រួចសរសេរឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរ ។

៦. មេរៀន ប្រេកង់

១. ការផ្តុំនិងយ៉ាងប្រេកង់ (Relative Frequency)

ជាទូទៅ

ផលធៀបរវាងប្រេកង់ និងប្រេកង់សរុបហៅថា ប្រេកង់ធៀប ។ គេតែងតែគិតប្រេកង់ធៀបជាភាគរយ ។

$$\text{ប្រេកង់ធៀប} = \frac{\text{ប្រេកង់}}{\text{ប្រេកង់សរុប}} \times 100\%$$

២. ការផ្តល់ទិន្នន័យជាប្រភេទកើន និង ថយ


ជាទូទៅ

- **ប្រេកង់កើន** (Cumulative Frequency): ជា ប្រេកង់ ដែល បាន ដោយ **បូក** ប្រេកង់បន្តបន្ទាប់ពីលើចុះក្រោម ។
- **ប្រេកង់ថយ** (Descending Frequency): ជា ប្រេកង់ ដែល បាន ដោយ **ដក** ប្រេកង់សរុបនិងប្រេកង់បន្តបន្ទាប់ពីលើចុះក្រោម ។


ចំណាំ

- គេប្រើ ប្រេកង់កើន សម្រាប់ឆ្លើយសំណួររកចំនួន «**យ៉ាងតិច**» ។
- គេប្រើ ប្រេកង់ថយ សម្រាប់ឆ្លើយសំណួររកចំនួន «**យ៉ាងតិច**» ។

ក្រាបប្រេកង់កើន



ក្រាបប្រេកង់ថយ



៣. ការផ្តល់ទិន្នន័យជាប្រភេទ (Grouped Data)

នៅពេលទិន្នន័យមានច្រើន និងរាយប៉ាយ គេត្រូវផ្តុំវាជាថ្នាក់ៗ (ឧទាហរណ៍ 30 – 40) ។


ផ្ចិតនៃថ្នាក់ (Class Center): ជាតម្លៃកណ្តាល ឬមធ្យមនៃចុងទាំងពីរនៃថ្នាក់ ។ គេប្រើវាជាតំណាងឱ្យថ្នាក់ទាំងមូលដើម្បីគណនាមធ្យមភាគ ។

$$\text{ផ្ចិតនៃថ្នាក់ } a - b \text{ គឺ } \frac{a+b}{2}$$

ការបកស្រាយទិន្នន័យជាប្រភេទ (Graphical Representation of Data)

ចំណាំ

- **ក្រាបសរសៃ** (Bar Chart): ប្រើសម្រាប់ទិន្នន័យទាល ។
- **អ៊ីស្តូក្រាម** (Histogram): ប្រើសម្រាប់ទិន្នន័យដែលផ្តុំជាថ្នាក់ ។
- **ហ្វោណេប្រេកង់**: ប្រើសម្រាប់ក្រាបប្រេកង់កើន ឬ ប្រេកង់ថយ ។ គេប្រើចំណុចប្រសព្វរបស់វាសម្រាប់រក **មេដ្យាន** ។



៤. មេដ្យាន មធ្យមស្ថិតិ

១. មធ្យម $\bar{x}$ (Mean)

ជាទូទៅ

- **មធ្យមនៃទិន្នន័យគ្មានប្រេកង់**: ផលបូកទិន្នន័យចែកនឹងចំនួនទិន្នន័យ ។

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

- **មធ្យមនៃទិន្នន័យមានប្រេកង់**: ផលបូក(ទិន្នន័យ $\times$ ប្រេកង់)ចែកនឹងផលបូកប្រេកង់ ។

$$\bar{x} = \frac{x_1 f_1 + x_2 f_2 + \dots + x_n f_n}{f_1 + f_2 + \dots + f_n} = \frac{\sum x_i f_i}{\sum f_i}$$

ចំណាំ

បើទិន្នន័យជាថ្នាក់ ត្រូវរក «ផ្ចិតនៃថ្នាក់» ធ្វើជាតំណាង x_i និង រួចអនុវត្តរូបមន្តមានប្រេកង់ខាងលើ ។

២. មេដ្យាន m_e (Median)

ជាទូទៅ

បើទិន្នន័យមួយមាន n តួ មេដ្យាននៃទិន្នន័យមួយដែលបានរៀបតាមលំដាប់ មានទីតាំងស្ថិតនៅតួទី $\frac{n+1}{2}$ ។

- បើ n ជាចំនួនសេស មេដ្យានជាតម្លៃនៃតួកណ្តាល
- បើ n ជាចំនួនគូ មេដ្យានជាមធ្យមនៃតម្លៃកណ្តាលទាំងពីរ ។

ចំណាំ

គេប្រើប្រេកង់កើន ដើម្បីរកមេដ្យាននៃទិន្នន័យដែលបានរៀបតាមលំដាប់ ដោយរកចំណុចប្រសព្វរបស់វាសម្រាប់រក **មេដ្យាន** ។

៣. ម៉ូដ m_o (Mode)

ជាទូទៅ

នៅក្នុងទិន្នន័យមួយ **ម៉ូដ** ជាតម្លៃនៃទិន្នន័យដែលមានប្រេកង់ធំជាងគេ ។

ការបកស្រាយទិន្នន័យជាប្រភេទ មេដ្យាន និង ម៉ូដ?

- **មធ្យម** ($\bar{x}$): ល្អបំផុតពេលទិន្នន័យមានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលគ្នា (គ្មានតម្លៃណាមួយខុសគេណាស់) ។
- **មេដ្យាន** (m_e): ល្អបំផុតពេលទិន្នន័យមានចំណុចកណ្តាល ឬចំណុចខុសគេ (ព្រោះវាគឺជាតម្លៃកណ្តាល) ។
- **ម៉ូដ** (m_o): ល្អបំផុតពេលទិន្នន័យមានចំណុចកណ្តាល ឬចំណុចខុសគេ (ព្រោះវាគឺជាតម្លៃកណ្តាល) ។

៥. ប្រូបាប ប្រូបាប

១. ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ (Probability of an Event)

ជាទូទៅ

ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ A ណាមួយ ជាផលធៀបរវាងចំនួនករណីស្របនិងព្រឹត្តិការណ៍ A នោះនិងចំនួនករណីសរុប ។

$$\text{ប្រូបាប } P(A) = \frac{\text{ចំនួនករណីស្រប}}{\text{ចំនួនករណីសរុប}}$$

ចំណាំ

ប្រូបាបតែងតែនៅចន្លោះ 0 និង 1 ($0 \leq P \leq 1$) ។

២. ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍បំពេញ (Complementary Probability)

ជាទូទៅ

ផលបូកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយ និងព្រឹត្តិការណ៍បំពេញរបស់វាមានតម្លៃស្មើនឹង 1 ។

បើ $P(A)$ ជាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ A និង $P(\bar{A})$ ជាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍បំពេញនៃ A នោះគេបាន :

$$P(A) + P(\bar{A}) = 1$$

៣. គោលការណ៍បូកប្រូបាប (Addition Rule of Probability)

ជាទូទៅ

ព្រឹត្តិការណ៍ពីរ A និង B មិនកើតឡើងព្រមគ្នា ឬមិនកើតរួមហៅថា ព្រឹត្តិការណ៍ដាច់គ្នា ។

$$P(A \text{ ឬ } B) = P(A) + P(B)$$

ចំណាំ

ផលបូកនៃប្រូបាបទាំងអស់ក្នុងវិញ្ញាសាតែមួយ ត្រូវស្មើនឹង 1 ។

៤. គោលការណ៍គុណប្រូបាប (Multiplication Rule of Probability)

ជាទូទៅ

ព្រឹត្តិការណ៍ពីរ A និង B មិនទាក់ទងគ្នា កាលណាព្រឹត្តិការណ៍មួយកើតឡើង ឬមិនកើតឡើងមិនមានឥទ្ធិពលទៅលើព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀត ។

$$P(A \text{ និង } B) = P(A) \times P(B)$$

ព្រឹត្តិការណ៍ទាក់ទងគ្នា (Dependent Events): ជាការពិសោធន៍ដែលធ្វើឡើងច្រើនដង ហើយលទ្ធផលនៃការពិសោធន៍ម្តង មានឥទ្ធិពលធ្វើឱ្យប្រែប្រួល «ចំនួនករណីស្រប» នៃការពិសោធន៍បន្ទាប់ ។

$$P(A \text{ និង } B) = P(A) \times P(B/A)$$

៥. ប្រូបាបពិសោធន៍ និងការសង្ខេបនៃទិន្នន័យ

ការធ្វើពិសោធន៍ច្រើនដង អាចជួយយើងទស្សន៍ទាយរកចំនួនពិតប្រាកដនៃវត្ថុណាមួយបាន (ឧទាហរណ៍: ទាយចំនួនឃ្លីក្នុងថង់) ។

ទំនាក់ទំនងរវាងប្រូបាបពិសោធន៍ និងប្រូបាបពិសោធន៍

$$\frac{\text{ចំនួនពិសោធន៍ជោគជ័យ}}{\text{ចំនួនសរុបពិសោធន៍}} \approx \frac{\text{ចំនួនដងកើតក្នុងការពិសោធន៍}}{\text{ចំនួនដងពិសោធន៍សរុប}}$$

សន្និដ្ឋាន

ឱ្យតែដឹងចំនួនឃ្លីសរុប គេអាចដឹងចំនួនឃ្លីនៃពិសោធន៍មួយៗដោយពិសោធន៍ចាប់ផ្តើមចេញពីថង់ច្រើនដង ។


៦. មេដ្យាន ចម្ងាយរវាងពីរចំណុច

១. ចម្ងាយរវាងពីរចំណុច (Distance Between Two Points)

ជាទូទៅ

ចម្ងាយរវាងពីរចំណុច $A(x_1, y_1)$ និង $B(x_2, y_2)$ ក្នុងប្លង់កូអរដោនេកំណត់ដោយ :

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$




២. កូអរដោនេនៃចំណុចកណ្តាល (Midpoint Coordinates)

ជាទូទៅ

បើ M ជា ចំណុចកណ្តាល នៃ អង្កត់ AB ដែល $A(x_A, y_A)$ និង $B(x_B, y_B)$ នោះកូអរដោនេនៃចំណុច $M(x_M, y_M)$ កំណត់ដោយ :

$$x_M = \frac{x_A + x_B}{2}, y_M = \frac{y_A + y_B}{2}$$




០០ មេរៀន សមីការបន្ទាត់

១. មេគុណរូបធុន (Slope)

ជាទូទៅ

- បន្ទាត់មានសមីការ $y = ax + b$ ដែល a ជាមេគុណប្រាប់ទិស
- មេគុណប្រាប់ទិស នៃ បន្ទាត់កាត់ តាម ពីរ ចំណុច $A(x_1, y_1)$ និង $B(x_2, y_2)$ គឺ៖

$$a = \frac{\text{បម្រែបម្រួលនៃ } y}{\text{បម្រែបម្រួលនៃ } x} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$



២. សមីការបន្ទាត់ (Equation of a Line)

ជាទូទៅ

សមីការ នៃ បន្ទាត់ ដែលកាត់ តាម ចំណុច $A(x_A, y_A)$ និង មាន មេគុណប្រាប់ទិស a កំណត់ដោយ៖

$$y - y_A = a(x - x_A)$$

៣. ប្រភេទបន្ទាត់

ក. បន្ទាត់ទ្រួត

ជាទូទៅ


- បន្ទាត់មានសមីការ $y = ax + b$ កាត់អ័ក្ស x' និង y' ។
- បន្ទាត់មានសមីការ $y = ax$ កាត់តាមគល់ O ។

ខ. បន្ទាត់ដេក និងបន្ទាត់ឈរ

ជាទូទៅ

បន្ទាត់ដេក៖ $y = k$ (បន្ទាត់ស្របអ័ក្ស ox)

បន្ទាត់ឈរ៖ $x = h$ (បន្ទាត់ស្របអ័ក្ស oy)



៤. បន្ទាត់ស្របគ្នា (Parallel Lines)

ជាទូទៅ

បើបន្ទាត់ d_1 មានសមីការ $y = ax + b$ និង d_2 មានសមីការ $y = a'x + b'$ នោះ៖

$$d_1 \parallel d_2 \text{ លុះត្រាតែ } a = a'$$

៥. បន្ទាត់កែច្នៃគ្នា (Perpendicular Lines)

ជាទូទៅ

បើបន្ទាត់ d_1 មានសមីការ $y = ax + b$ និង d_2 មានសមីការ $y = a'x + b'$ នោះ៖

$$d_1 \perp d_2 \text{ លុះត្រាតែ } a \times a' = -1$$

០១ មេរៀន ប្រព័ន្ធសមីការដឺក្រេទី១មានពីរអញ្ញាត

និមិត្តរូបទូទៅ (General Form)

ប្រព័ន្ធសមីការដឺក្រេទី១មានពីរអញ្ញាតមានទម្រង់៖ $\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$

១. ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការតាមរូបភាព

ឧទាហរណ៍៖ ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ


$$\begin{cases} x - y = 4 & (1) \\ 2x + y = 2 & (2) \end{cases}$$

ចំពោះសមីការ $x - y = 4$ (1)

$$\frac{x}{y} \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ -4 & 0 \end{vmatrix}$$

ចំពោះសមីការ $2x + y = 2$ (2)


$$\frac{x}{y} \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix}$$




ដូចនេះ $(2, -2)$ ជាកូដឆ្នើយនៃប្រព័ន្ធសមីការ

វិធាន


- សង់បន្ទាត់ទាំងពីរនៅលើតម្រុយតែមួយ (រកចំណុចសម្រាប់បន្ទាត់នីមួយៗ) ។
- ចំណុចប្រសព្វនៃបន្ទាត់ទាំងពីរគឺជាកូដឆ្នើយ (x, y) នៃប្រព័ន្ធសមីការ ។



មានកូដឆ្នើយតែមួយគត់



គ្មានកូដឆ្នើយ



មានកូដឆ្នើយរាប់មិនអស់

២. ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការតាមវិធីជំនួស

ឧទាហរណ៍៖ ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ

$$\begin{cases} y = 7 - 3x & (1) \\ 2x - 3y = 12 & (2) \end{cases}$$

ជំនួសតម្លៃ $y = 7 - 3x$ ក្នុងសមីការ (2)

$$\begin{aligned} 2x - 3(7 - 3x) &= 12 \\ 2x - 21 + 9x &= 12 \\ 11x &= 12 + 21 \\ 11x &= 33 \\ \Rightarrow x &= 3 \end{aligned}$$

ជំនួសតម្លៃ $x = 3$ ក្នុងសមីការ (1)

$$y = 7 - 3(3) = 7 - 9 = -2$$

ដូចនេះ $(3, -2)$ ជាកូដឆ្នើយនៃប្រព័ន្ធសមីការ ។

វិធាន

- ទាញអញ្ញាតមួយពីសមីការណាមួយ (រើសអញ្ញាត មានមេគុណតូច រឺជួរមាត់) ។
- យកកន្លោះនោះទៅជំនួសក្នុងសមីការមួយទៀត ដើម្បីរកអញ្ញាតទី១ ។
- យកតម្លៃដែលរកឃើញ ទៅជំនួសក្នុងសមីការដើម ដើម្បីរកអញ្ញាតទី២ ។

៣. ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការតាមវិធីបូក

ឧទាហរណ៍៖ ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ

$$\begin{cases} -2x + y = -11 & (1) \\ 5x - y = 26 & (2) \end{cases}$$
$$\begin{aligned} 3x &= 15 \\ \Rightarrow x &= 5 \end{aligned}$$

ជំនួស $x = 5$ ក្នុងសមីការ (1)

$$\begin{aligned} -2(5) + y &= -11 \\ -10 + y &= -11 \\ y &= -11 + 10 = -1 \end{aligned}$$

ដូចនេះ $(5, -1)$ ជាកូដឆ្នើយនៃប្រព័ន្ធសមីការ ។

វិធាន

- គុណសមីការ ដើម្បីឱ្យមេគុណនៃអញ្ញាតណាមួយមានលេខផ្ទុយ ឬដូចគ្នា ។
- បូកឬដកសមីការទាំងពីរ ដើម្បីបំបាត់អញ្ញាតនោះ រួចដោះស្រាយរកអញ្ញាតទី១ ។
- យកតម្លៃដែលរកឃើញ ទៅជំនួសក្នុងសមីការដើម ដើម្បីរកអញ្ញាតទី២ ។

៤. វិធីដេតេរមីនង់ (Determinant Method)

ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$

$$D = \begin{vmatrix} a & b \\ a' & b' \end{vmatrix} = ab' - a'b$$

$$D_x = \begin{vmatrix} c & b \\ c' & b' \end{vmatrix} = cb' - c'b$$

$$D_y = \begin{vmatrix} a & c \\ a' & c' \end{vmatrix} = ac' - a'c$$

$$\text{បើ } D \neq 0 \Rightarrow x = \frac{D_x}{D}, \quad y = \frac{D_y}{D}$$

មិនគួបភ័យនៃប្រព័ន្ធសមីការ

ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$

- ប្រព័ន្ធសមីការ មានកូដឆ្នើយតែមួយគត់៖ $\frac{a}{a'} \neq \frac{b}{b'}$
- ប្រព័ន្ធសមីការ គ្មានកូដឆ្នើយ៖ $\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} \neq \frac{c}{c'}$
- ប្រព័ន្ធសមីការ មានកូដឆ្នើយរាប់មិនអស់៖ $\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'}$

០២ មេរៀន ទ្រឹស្តីបទពីតាក័រ

១. ទ្រឹស្តីបទពីតាក័រ (Pythagorean Theorem)

ទ្រឹស្តីបទ

ក្នុងត្រីកោណកែង ការ៉េនៃអ៊ីប៉ូតេនុស ស្មើនឹងផលបូកការ៉េនៃជ្រុងមុំកែង ។

ប្រែប្រួល


បើ $\triangle ABC$ កែងត្រង់ A

នោះ $BC^2 = AB^2 + AC^2$

ឬ

$$a^2 = b^2 + c^2$$

ទំនាក់ទំនងរវាងរង្វាស់ជ្រុងនៃត្រីកោណកែងហៅថា ទ្រឹស្តីបទពីតាក័រ ។



ទាញរករង្វាស់ជ្រុងមុំកែង៖

$$\Rightarrow b = \sqrt{a^2 - c^2} \quad \text{និង} \quad c = \sqrt{a^2 - b^2}$$


២. ទ្រឹស្តីបទប្រាស់ពីតាក៏រ (Converse of Pythagorean Theorem)

ទ្រឹស្តីបទ

បើ $\triangle ABC$ មានរង្វាស់ជ្រុងផ្ទៀងផ្ទាត់ទំនាក់ទំនង


$$BC^2 = AB^2 + AC^2$$

នោះវាជា ត្រីកោណកែងត្រង់ A ។




៣. អនុប្បត្តិទ្រឹស្តីបទពីតាក៏រ (Applications of Pythagorean Theorem)

១. អង្កត់ទ្រូងការេ




$$d = a\sqrt{2}$$

២. កម្ពស់ត្រីកោណសម័ង្ស




$$h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

៣. អង្កត់ទ្រូងចតុកោណកែង



$$d = \sqrt{l^2 + w^2}$$

៤. អង្កត់ទ្រូងប្រលេពីប៉ែកកែង



$$d = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

១៣ មេរៀន រង្វង់ និងបន្ទាត់


១. លក្ខណៈនៃអន្តតំបន់ (Properties of Chords)

១.១. បន្ទាត់កែងទៅនឹងចំណុចកណ្តាលនៃអន្តតំបន់

ជំនួយ

- បន្ទាត់ដែល គូស ចេញពី ផ្ចិត នៃ រង្វង់ ហើយ កែង និង អង្កត់ធ្នូ ត្រូវ កាត់ ចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ធ្នូ ។

- ប្រាសមកវិញ:** បន្ទាត់ដែល កែង ទៅនឹង ចំណុចកណ្តាលនៃ អង្កត់ធ្នូ ត្រូវ កាត់តាមផ្ចិតនៃរង្វង់ ។




បើបន្ទាត់ $L \perp AB$ ត្រង់ M នោះ $AM = BM$

១.២. អន្តតំបន់ស្មើគ្នា

ជំនួយ

- អង្កត់ធ្នូពីរមានប្រវែងស្មើគ្នានៅក្នុងរង្វង់មួយ ត្រូវមានចម្ងាយស្មើគ្នាពីផ្ចិតនៃរង្វង់នោះ ។
- ប្រាសមកវិញ:** អង្កត់ធ្នូក្នុងរង្វង់មួយដែលមានចម្ងាយស្មើគ្នាពីផ្ចិតនៃរង្វង់ជាអង្កត់ធ្នូស្មើគ្នា ។




បើអង្កត់ធ្នូ $AB = A'B'$ នោះ ចម្ងាយ $OM = OM'$

២. បន្ទាត់ប៉ះ (Tangent Lines)

ជំនួយ

បន្ទាត់ប៉ះនៃរង្វង់ត្រូវកែងទៅនឹងកាំឬអង្កត់ផ្ចិតនៃរង្វង់ត្រង់ចំណុចប៉ះ ។




បន្ទាត់ l ហៅថា បន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងរង្វង់ ឬ បន្ទាត់ប៉ះ ។ ម្យ៉ាងទៀតចំណុច M នៃបន្ទាត់ប៉ះប្រសព្វនឹងរង្វង់ហៅថា ចំណុចប៉ះ ។

៣. លក្ខណៈនៃបន្ទាត់ប៉ះ (Properties of Tangent Lines)

៣.១. បន្ទាត់ប៉ះស្របនឹងអន្តតំបន់

ជំនួយ

បើបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ស្របទៅនឹងអង្កត់ធ្នូមួយនោះ ចំណុចប៉ះចែកផ្ចិតនៃខាងពាក់កណ្តាលប៉ុនគ្នា ។




បើបន្ទាត់ $EF \parallel AB$ និង $OC \perp EF$ នោះ $\widehat{AC} = \widehat{BC}$ ។

៣.២. បន្ទាត់ប៉ះគូសពីចំណុចក្រៅរង្វង់

ជំនួយ

បើបន្ទាត់ប៉ះពីរគូសពីចំណុច A ក្រៅរង្វង់ ហើយប៉ះរង្វង់ត្រង់ B និង C

- បន្ទាត់ប៉ះទាំងពីរមានប្រវែងស្មើគ្នា $AB = AC$
- AO ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំ $\angle BAC$ និង $\angle BOC$




៤. អនុប្បត្តិនៃកន្លះប្លង់នៃចតុកោណចារឹកក្រៅរង្វង់

និយមន័យ

ចតុកោណចារឹកក្រៅរង្វង់ គឺជាចតុកោណដែលមានជ្រុងទាំងបួនប៉ះរង្វង់តែមួយ ។

ជំនួយ

ក្នុងចតុកោណចារឹកក្រៅរង្វង់ ផលបូករង្វាស់ជ្រុងឈមមានរង្វាស់ស្មើគ្នា ។



$$AB + CD = AD + BC$$

៥. ទីតាំងរង្វង់ (Positions of Circles)

ជំនួយ

តាង r និង r' ជាកាំរង្វង់, d ជាចម្ងាយរវាងផ្ចិតទាំងពីរ ($r > r'$):

- $d > r + r'$: រង្វង់គ្មានចំណុចរួម (នៅក្រៅគ្នា)
- $d = r + r'$: រង្វង់ប៉ះគ្នាខ្រៅ
- $r - r' < d < r + r'$: រង្វង់កាត់គ្នាពីរចំណុច
- $d = r - r'$: រង្វង់ប៉ះគ្នាក្នុង
- $d < r - r'$: រង្វង់គ្មានចំណុចរួម (រង្វង់តូចនៅក្នុងរង្វង់ធំ)

៦. បន្ទាត់ប៉ះរួម (Common Tangents)

ជំនួយ

ចំនួនបន្ទាត់ប៉ះរួមនៃរង្វង់ពីរអាស្រ័យលើទីតាំងរបស់វា៖


- រង្វង់នៅក្រៅគ្នា ($d > r + r'$): មានបន្ទាត់ប៉ះរួមចំនួន ៤ (ខាងក្រៅ ២ និងខាងក្នុង ២) ។
- រង្វង់ប៉ះគ្នាខ្រៅ ($d = r + r'$): មានបន្ទាត់ប៉ះរួមចំនួន ៣ (ខាងក្រៅ ២ និងត្រង់ចំណុចប៉ះ ១) ។
- រង្វង់កាត់គ្នា ($r - r' < d < r + r'$): មានបន្ទាត់ប៉ះរួមចំនួន ២ (ខាងក្រៅ ២) ។
- រង្វង់ប៉ះគ្នាក្នុង ($d = r - r'$): មានបន្ទាត់ប៉ះរួមចំនួន ១ (ត្រង់ចំណុចប៉ះ) ។
- រង្វង់តូចក្នុងរង្វង់ធំ ($d < r - r'$): គ្មានបន្ទាត់ប៉ះរួម (០) ។

១៤ មេរៀន លក្ខណៈមុំនៃរង្វង់

១. មុំផ្ចិត (Central Angles)


និយមន័យ

មុំផ្ចិត គឺជាមុំដែលមានកំពូលនៅផ្ចិតរង្វង់ ហើយជ្រុងទាំងពីរជាកាំ ។



ជំនួយ

- ក្នុងរង្វង់មួយផ្ទុកពីរប៉ុនគ្នា ស្គាត់ដោយមុំផ្ចិតពីរប៉ុនគ្នា ។
- ប្រាសមកវិញ:** កាលណាមុំផ្ចិតពីរប៉ុនគ្នានោះផ្ទុកស្គាត់ទាំងពីរក៏ប៉ុនគ្នា ។




$$\widehat{AB} = \widehat{CD} \Leftrightarrow \angle AOB = \angle COD$$

២. មុំចារឹកក្នុងរង្វង់

២.១. និយមន័យ

និយមន័យ

មុំចារឹកក្នុងរង្វង់ គឺជាមុំដែលមានកំពូលស្ថិតនៅលើរង្វង់ ហើយមានជ្រុងទាំងពីរកាត់រង្វង់ជាអង្កត់ធ្នូ ។




$\angle ACB$ ជាមុំចារឹកក្នុងរង្វង់ស្ថិតនៅលើរង្វង់ $\widehat{AC}$

២.២. មុំចារឹកក្នុងរង្វង់ និងផ្ទៃ

ជំនួស

គ្រប់មុំចារឹកក្នុងរង្វង់មានរង្វាស់ស្មើនឹងកន្លះ រង្វាស់ផ្ទៃដែលស្ថិតនៅក្នុងមុំនោះ ។




$$\angle ACB = \frac{1}{2} \widehat{AB}$$

២.៣. មុំផ្គិត និងមុំចារឹកក្នុងរង្វង់ស្ថិតនៅលើរង្វង់

ជំនួស

មុំផ្គិតនៃរង្វង់មួយមានរង្វាស់ស្មើនឹងពីរដងមុំចារឹកក្នុងរង្វង់ដែលស្ថិតនៅលើរង្វង់នោះ ។




$$\angle AOB = 2\angle ACB$$

២.៤. មុំចារឹកក្នុងរង្វង់ស្ថិតនៅលើរង្វង់

ជំនួស

គ្រប់មុំចារឹកក្នុងរង្វង់ដែលស្ថិតនៅលើរង្វង់ មានរង្វាស់ស្មើគ្នា ។




$$\angle APB = \angle AQB \text{ (មុំចារឹកក្នុងរង្វង់ស្ថិតនៅលើរង្វង់ } \widehat{AB} \text{ តែមួយ)}$$

៣. មុំចារឹកក្នុងរង្វង់

ជំនួស

គ្រប់មុំចារឹកក្នុងរង្វង់ដែលស្ថិតនៅលើរង្វង់ មានរង្វាស់ស្មើគ្នា ។




$$\text{បើ } AB \text{ ជាអង្កត់ផ្ចិត នោះ } \angle ACB = 90^\circ$$

៤. មុំចារឹកក្នុងរង្វង់ស្ថិតនៅលើរង្វង់

៤.១. និយមន័យ

និយមន័យ


ចតុកោណដែលមានកំពូលទាំងបួនស្ថិតនៅលើរង្វង់តែមួយ ហៅថា **ចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់** ។ រង្វង់នេះហៅថា **រង្វង់ចារឹកក្នុងរង្វង់** ។ ក្នុងចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់ $ABCD$ ។ គេមាន $\angle A$ និង $\angle C$ ជាមុំឈមនឹងគ្នាហើយ $\angle B$ និង $\angle D$ ក៏ជាមុំឈមនឹងគ្នាដែរ ។



៤.២. លក្ខណៈមុំឈម

ជំនួស

មុំឈមក្នុងចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់មួយជាមុំបន្ថែមគ្នា ។




$$\angle A + \angle C = 180^\circ, \quad \angle B + \angle D = 180^\circ$$

៥. មុំចារឹកក្នុងរង្វង់ស្ថិតនៅលើរង្វង់

ជំនួស

មុំចារឹកក្នុងរង្វង់ស្ថិតនៅលើរង្វង់ មានរង្វាស់ស្មើនឹងមុំឈមវា នៅខាងក្នុងចតុកោណនោះ ។




$$\angle DCE = \angle A$$

៦. មុំដែលមានកំពូលស្ថិតនៅលើរង្វង់

៦.១. មុំក្នុងរង្វង់ (Interior Angles of a Circle)

ជំនួស

- មុំក្នុងរង្វង់ គឺជាមុំដែលមានកំពូលស្ថិតនៅលើរង្វង់ ។
- មុំក្នុងរង្វង់មានរង្វាស់ស្មើនឹង កន្លះផលបូករង្វាស់ផ្ទៃស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់នោះ ។




$$\angle APD = \frac{1}{2} (\widehat{AD} + \widehat{BC})$$

៦.២. មុំក្រៅរង្វង់ (Exterior Angles of a Circle)

ជំនួស

- មុំក្រៅរង្វង់ គឺជាមុំដែលមានកំពូលស្ថិតនៅក្រៅរង្វង់ ហើយមានជ្រុងទាំងពីរកាត់រង្វង់ ។
- មុំក្រៅរង្វង់មានរង្វាស់ស្មើនឹង កន្លះផលបូករង្វាស់ផ្ទៃស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់នោះ ។




$$\angle P = \frac{1}{2} (\widehat{AB} - \widehat{CD})$$

៧. មុំដែលមានកំពូលស្ថិតនៅលើរង្វង់

ជំនួស

មុំដែលមានកំពូលស្ថិតនៅលើរង្វង់ មានរង្វាស់ស្មើនឹងមុំចារឹកក្នុងរង្វង់ដែលមានអង្កត់ធ្នូនៅក្នុងរង្វង់នោះ ។



$$\angle TAB = \angle ACB = \frac{1}{2} \widehat{AB}$$


រូបមន្ត

• ផ្ទៃក្រឡាចម្រៀកថាស :

$$S_{AOB} = \pi r^2 \times \frac{\alpha^\circ}{360^\circ}$$

• ប្រវែងធ្នូ :

$$\widehat{AB} = 2\pi r \times \frac{\alpha^\circ}{360^\circ}$$




១៥ មេរៀន ទ្រឹស្តីបទសាសន៍

១. បន្ទាត់ស្រប និងខ្នាត

ជំនួញ

បើបន្ទាត់ស្របកំណត់នៅលើខ្នាតមួយបានអង្កត់ប៉ុនគ្នា នោះវាកំណត់នៅលើខ្នាតផ្សេងទៀតក៏បានអង្កត់ប៉ុនគ្នាដែរ ។



បន្ទាត់ $AA' \parallel BB' \parallel CC' \parallel DD'$ ហៅថា **បន្ទាត់ស្របស្មើមួយ** ។
បើនៅលើខ្នាត d កំណត់បានអង្កត់

$$AB = BC = CD$$


នោះ កំណត់លើខ្នាត d' បានអង្កត់

$$A'B' = B'C' = C'D'$$

២. ទ្រឹស្តីបទសាសន៍

ទ្រឹស្តីបទសាសន៍

ទ្រឹស្តីបទសាសន៍ : បើបន្ទាត់ច្រើនស្របគ្នានៅលើខ្នាតពីរកំណត់បានអង្កត់សមាមាត្រគ្នា ។



- ផលធៀបខ្នាតកែង៖ $\frac{AB}{BC} = \frac{A'B'}{B'C'}$

- ផលធៀបខ្នាត d : $\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'} = \frac{AC}{A'C'}$

៣. អនុវត្តក្នុងត្រីកោណ និងចតុកោណ


៣.១. អនុវត្តក្នុងត្រីកោណ

ជំនួញ

បើបន្ទាត់ស្របទៅនឹងជ្រុងមួយនៃត្រីកោណផ្គុំជាមួយជ្រុងពីរទៀត បានត្រីកោណថ្មីមួយដែលត្រីកោណទាំងពីរនោះមានជ្រុងសមាមាត្រគ្នា ។

ក្នុង $\triangle ABC$ បើ $E \in AB$, $F \in AC$ និង $EF \parallel BC$ នោះ

$$\frac{\text{ជ្រុងត្រីកោណថ្មី}}{\text{ជ្រុងត្រីកោណដើម}} : \frac{AE}{AB} = \frac{AF}{AC} = \frac{EF}{BC}$$



- ផលធៀបបន្ថែម :


$$\frac{AE}{EB} = \frac{AF}{FC}, \quad \frac{AB}{AE} = \frac{AC}{AF} = \frac{BC}{EF}$$

• ទ្រឹស្តីបទប្រាសាទសាសន៍

ក្នុង $\triangle ABC$ បើ $E \in AB$ និង $F \in AC$ ហើយ

$$\frac{AE}{AB} = \frac{AF}{AC} \quad \text{ឬ} \quad \frac{AE}{EB} = \frac{AF}{FC}$$


នោះ គេបាន $EF \parallel BC$ ។



ទ្រឹស្តីបទប៉ូឡូនីយ៉ា

• ក្នុងត្រីកោណ ABC

$EF \parallel BC$, E កណ្តាល AB និង F កណ្តាល AC




EF ហៅថា **បាតមធ្យមនៃត្រីកោណ** នោះ $EF = \frac{BC}{2}$

៣.២. អនុវត្តក្នុងចតុកោណ

ជំនួញ

• បើបន្ទាត់មួយស្របទៅនឹងបាតនៃចតុកោណក្លាយជាបន្ទាត់ស្របកំណត់បានអង្កត់សមាមាត្រគ្នា ។

• **ប្រាសាទសាសន៍** : បើបន្ទាត់មួយកាត់ជ្រុងមិនស្រប ឬបន្ទាត់នៃជ្រុងមិនស្របនៃចតុកោណក្លាយជាបន្ទាត់ស្របកំណត់បានអង្កត់សមាមាត្រគ្នា បន្ទាត់នោះត្រូវស្របនឹងបាតទាំងពីរ ។



ក្នុងចតុកោណក្លាយ $ABCD$ បើ $AB \parallel EF \parallel DC$ នោះ

$$\frac{AE}{AD} = \frac{BF}{BC}, \quad \frac{DE}{AD} = \frac{CF}{BC}$$

$$\frac{AE}{DE} = \frac{BF}{FC}, \quad \frac{AD}{AE} = \frac{BC}{BF}$$

១៦ មេរៀន ត្រីកោណដូចគ្នា

១. ត្រីកោណដូចគ្នា

១.១. សញ្ញាណ

និយមន័យ

ត្រីកោណពីរជាត្រីកោណដូចគ្នាកាលណាវាមាន

- មុំទាំងបីប៉ុនគ្នារៀងគ្នា
- ជ្រុងទាំងបីសមាមាត្ររៀងគ្នា
- ផលធៀបសមាមាត្រហៅថា **ផលធៀបដំណូច** ។

• គំនិតសម្គាល់



មើល

- គេកំណត់ត្រីកោណពីរដូចគ្នាដោយ

$$\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$$


- បើ $\triangle ABC$ និង $\triangle A'B'C'$ ជាត្រីកោណដូចគ្នាតាមផលធៀបដំណូច គេសរសេរផលធៀបសមាមាត្រនៃជ្រុងទាំងបីដោយរៀបកំពូលទៅតាមលំដាប់នៃមុំប៉ុនគ្នា ។

$$\triangle A'B'C' \sim \triangle ABC \quad \left| \Rightarrow \frac{A'B'}{AB} = \frac{A'C'}{AC} = \frac{B'C'}{BC} = k \right.$$



• ត្រីកោណដូចគ្នា តាមទ្រឹស្តីបទសាសន៍

ក្នុង $\triangle ABC$, $D \in AB$, $E \in AC$



បើ $DE \parallel BC$ នោះ $\triangle ADE \sim \triangle ABC$

១.២. ករណីដំណូច

ដើម្បីឱ្យត្រីកោណពីរដូចគ្នា គេគ្រាន់តែរកឱ្យឃើញមុំខ្លះៗប៉ុនគ្នា ឬជ្រុងទាំងបីសមាមាត្ររៀងគ្នា តាមករណីដូចខាងក្រោម ។


• ក. ករណីដំណូចទី១ (ម.ម)

ជំនួញ

ត្រីកោណពីរជាត្រីកោណដូចគ្នា កាលណាវាមានមុំពីរតូចប៉ុនគ្នារៀងគ្នា ។

មើល

បើ $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$ គេអាចទាញបាន



សម្មតិកម្ម	សន្និដ្ឋាន	វិបាក
$\angle A = \angle A'$ $\angle B = \angle B'$	$\triangle ABC$ $\sim$ $\triangle A'B'C'$	$\angle C = \angle C'$ $\frac{AB}{A'B'} = \frac{AC}{A'C'} = \frac{BC}{B'C'}$


• ខ. ករណីដំណូចទី២ (ម.ម.ជ)

ជំនួញ

ត្រីកោណពីរដូចគ្នា កាលណាមានមុំមួយប៉ុនគ្នារៀងគ្នា អមដោយជ្រុងពីរសមាមាត្រ ។

មើល

បើ $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$ គេអាចទាញបាន




សម្មតិកម្ម	សន្និដ្ឋាន	វិបាក
$\angle A = \angle A'$ $\frac{AB}{A'B'} = \frac{AC}{A'C'} = k$	$\triangle ABC$ $\sim$ $\triangle A'B'C'$	$\angle B = \angle B'$ $\angle C = \angle C'$ $\frac{BC}{B'C'} = k$

ជំនួយ

ត្រីកោណពីរដូចគ្នា កាលណាវាមានជ្រុងទាំងបីសមមាត្រទៀងគ្នា។

ចំណាំ


បើ $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$ គេអាចទាញបាន



សម្មតិកម្ម	សន្និដ្ឋាន	វិបាក
$\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'} = \frac{CA}{C'A'}$	$\triangle ABC$	$\angle A = \angle A'$
	$\sim$	$\angle B = \angle B'$
	$\triangle A'B'C'$	$\angle C = \angle C'$

២. ទំនាក់ទំនងរវាងត្រីកោណកែង

ប្រើប្រាស់



- ក្នុងត្រីកោណកែង រង្វាស់ជ្រុងមួយនៃមុំកែងជាផលធៀបសមមាត្ររវាងអ៊ីប៉ូតេនុស និងចំណោលកែងរបស់វាលើអ៊ីប៉ូតេនុស។

$$AC^2 = BC \times HC \quad \text{ឬ} \quad AB^2 = BC \times HB$$

- ក្នុងត្រីកោណកែង រង្វាស់កម្ពស់ត្រូវនឹងអ៊ីប៉ូតេនុសជាផលធៀបសមមាត្ររវាងអង្កត់ដែលវាកំណត់បានលើអ៊ីប៉ូតេនុស។

$$HA^2 = HB \times HC$$

- ក្នុងត្រីកោណកែង ផលគុណរវាងជ្រុងមុំកែងទាំងពីរស្មើនឹងផលគុណរវាងអ៊ីប៉ូតេនុស និងកម្ពស់ត្រូវនឹងអ៊ីប៉ូតេនុស។

$$AB \times AC = BC \times AH$$

- ក្នុងត្រីកោណកែង ការអ៊ីប៉ូតេនុសស្មើនឹងផលបូកការនែនៃជ្រុងមុំកែង។


$$BC^2 = AB^2 + AC^2$$

- ក្នុងត្រីកោណកែង ផលបូកច្រហានការនែនៃជ្រុងមុំកែងស្មើនឹងច្រហានការនែនៃកម្ពស់ចំពោះអ៊ីប៉ូតេនុស។

$$\frac{1}{AC^2} + \frac{1}{BA^2} = \frac{1}{HA^2}$$

តារាងទំនាក់ទំនងរវាងត្រីកោណកែង

ក្នុង $\triangle \perp ABC$ មានកម្ពស់ AH
តាម ទំនាក់ទំនងរវាងត្រីកោណកែង



- $AC^2 = BC \times HC$ ឬ $c^2 = an$
 $AB^2 = BC \times HB$ ឬ $b^2 = am$
- $HA^2 = HC \times HB$ ឬ $h^2 = nm$
- $AB \times AC = BC \times AH$ ឬ $bc = ah$
- $BC^2 = AB^2 + AC^2$ ឬ $a^2 = b^2 + c^2$
- $\frac{1}{AC^2} + \frac{1}{BA^2} = \frac{1}{HA^2}$ ឬ $\frac{1}{c^2} + \frac{1}{b^2} = \frac{1}{h^2}$

១៧ មេរៀន ពហុកោណ

១. និយមន័យ

គេកំណត់ឈ្មោះពហុកោណប៉ោង ទៅតាមចំនួនជ្រុងរបស់វា។

ឈ្មោះពហុកោណ	ចំនួនជ្រុង	រូប
ត្រីកោណ	៣	
ចតុកោណ	៤	
បញ្ចកោណ	៥	
ឆកោណ	៦	
សប្តកោណ	៧	
អដ្ឋកោណ	៨	
នវកោណ	៩	
ទសកោណ	១០	

២. ផលបូកមុំក្នុងនៃពហុកោណ

និយមន័យ

ផលបូករង្វាស់មុំក្នុងនៃពហុកោណដែលមាន n ជ្រុងស្មើនឹង

$$(n - 2) \times 180^\circ$$

៣. ផលបូករង្វាស់មុំក្រៅនៃពហុកោណ

ជំនួយ

ផលបូករង្វាស់មុំក្រៅនៃពហុកោណប៉ោង មានរង្វាស់ស្មើ 360° ។

សំគាល់

ផលបូករង្វាស់មុំក្រៅនេះ មិនអាស្រ័យនឹងចំនួនជ្រុងពហុកោណទេ ។


៤. រង្វាស់មុំក្រៅនៃពហុកោណនិយ័ត

ជំនួយ

- ពហុកោណនិយ័តជាពហុកោណដែលមុំមានរង្វាស់ស្មើគ្នា ហើយជ្រុងទាំងអស់ប៉ុន្មានគ្នា។
- មុំក្នុងមួយនៃពហុកោណនិយ័ត ដែលមាន n ជ្រុងមានរង្វាស់មុំស្មើ

$$\frac{(n - 2)180^\circ}{n}$$

ឧទាហរណ៍: គេមាន ការេ បញ្ចកោណនិយ័តដូចរូបខាងក្រោម



ពហុកោណនីមួយៗខាងលើមានមុំទាំងអស់ស្មើគ្នា និងជ្រុងទាំងអស់ប៉ុន្មានគ្នា ហៅថា **ពហុកោណនិយ័ត** ។


• នគរន្តរៈផ្សេងៗ

- ចំនួនអង្កត់ទ្រូងទាំងអស់ នៃពហុកោណដែលមាន n ជ្រុង ស្មើនឹង

$$d = \frac{n(n - 3)}{2}$$

- ចំណាំ:** អង្កត់ទ្រូងពហុកោណជាអង្កត់ភ្ជាប់កំពូលពីរមិនជាប់គ្នា ។

ផ្ទៃក្រឡាពហុកោណនិយ័ត: $S = \frac{1}{2}ap$
(ដែល a ជាអាប៉ូតែម និង p ជាបរិមាត្រ)




១៨ មេរៀន សូលីត


១. ផ្ទៃក្រឡាខាង និងមាននៃសូលីត

- ធាតុសំខាន់ៗនៃសូលីត

ធាតុសំខាន់ៗ នៃកោណ



ធាតុសំខាន់ៗ នៃពិវាមិតនិយ័ត



និយមន័យ

សូលីត គឺជាប្រភេទរាងកាយដែលស្ថិតនៅក្នុងលំហ និងមានវិមាត្រ៣ គឺ បណ្តោយ ទទឹង និងកម្ពស់។ សូលីតមានបាត ហើយអាចមានផ្ទៃក្រឡាខាង និងផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់។

ឧទាហរណ៍: ព្រិស ពិវាមិត ស៊ីឡាំង កោណ និងស្វែរ។

អាប៉ូតែម ជាកម្ពស់ជ្រុងនៃមុខចំហៀងរបស់ពិវាមិតនិយ័ត ដែលគូសពីកំពូលទៅកាន់ចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុងបាត។

ជនេត្រ ជាអង្កត់ត្រង់ដែលភ្ជាប់ពីកំពូលកោណទៅកាន់ចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុងបាត។

១.១. ផ្ទៃក្រឡាខាងនៃសូលីត

ជំនួយ

ផ្ទៃក្រឡាខាងនៃពិវាមិតនិយ័តស្មើនឹងផលគុណរវាង **កន្លះបរិមាត្របាត** និង **អាប៉ូតែម**


$$S_L = \frac{1}{2} \times p \times a$$

(p : បរិមាត្រពហុកោណនិយ័តបាត, a : អាប៉ូតែម) ។

សម្រាយ

បើបំបែកពីរ៉ាមីតនីយ៍តចេញ នោះមុខចំហៀងជាត្រីកោណប៉ុន្មាន។

$$\begin{aligned} S_L &= 4 \times S_{\triangle CDS} \\ &= 4 \times \frac{1}{2} DC \times HS \\ &= \frac{1}{2} \times \underbrace{4DC}_{\text{បរិមាត្របាត}} \times \underbrace{HS}_{\text{អម្ពិកែត}} \end{aligned}$$



ផ្ទៃក្រឡាខាងកោណ

ជំនួស


- ផ្ទៃក្រឡាខាងកោណគឺ $S_L = \pi R a$ (R កាំបាត, a ជនេត្រ)
- ផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់គឺ $S_T = \pi R a + \pi R^2 = \pi R(a + R)$

សម្រាយ

ផ្ទៃក្រឡាខាងកោណ ជាផ្ទៃក្រឡាដែលមានកាំ a និងប្រវែងធ្នូ $2\pi R$ ។ ផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់គឺ πa^2 និងបរិមាត្រទាំងអស់គឺ $2\pi a$ ។

$$\frac{\pi a^2}{S} = \frac{2\pi a}{2\pi R}$$


$$S = \frac{2\pi^2 R a^2}{2\pi a} = \pi R a$$



១.២. មាឌនៃសូលីត

• មាឌនៃពិព័រ័ត

ជំនួស




$$V = \frac{1}{3} S_B \times h$$

(h : កម្ពស់, S_B : ផ្ទៃក្រឡាបាត)។

• មាឌនៃកោណ

ជំនួស




$$V = \frac{1}{3} \pi R^2 h$$

(h : កម្ពស់, R : កាំបាត)។

• មាឌនៃស្វៀរ / មូល

ជំនួស



$$\begin{aligned} \text{មាឌ } V &= \frac{4}{3} \pi R^3 \\ \text{ផ្ទៃក្រឡាខាង } S &= 4\pi R^2 \end{aligned}$$


២. ផលធៀបផ្ទៃក្រឡា និងមាឌនៃរូបធម្មតា

២.១. ផលធៀបផ្ទៃក្រឡានៃរូបធម្មតា

ជំនួស

កាលណារូបពីរដូចគ្នា ផលធៀបរវាងផ្ទៃក្រឡា ស្មើនឹងផលធៀប រវាងធាតុត្រូវគ្នាពីរ។

ប្រមូល



ចតុកោណកែងទី១ ចតុកោណកែងទី២

$$\frac{S_A}{S_B} = \left(\frac{a_1}{a_2}\right)^2 = \left(\frac{b_1}{b_2}\right)^2 = k^2$$


(k : ផលធៀបរវាងជ្រុង)។

២.២. ផលធៀបមាឌនៃសូលីតដូចគ្នា

ជំនួស

កាលណាសូលីតពីរដូចគ្នា ផលធៀបរវាងមាឌ ស្មើនឹងផលធៀប រវាងធាតុត្រូវគ្នាពីរ។

ប្រមូល



ប្រលេពីប៉ែតកែងទី១ ប្រលេពីប៉ែតកែងទី២

$$\frac{V_1}{V_2} = \left(\frac{a_1}{a_2}\right)^3 = \left(\frac{b_1}{b_2}\right)^3 = \left(\frac{c_1}{c_2}\right)^3 = k^3$$

(k : ផលធៀបរវាងជ្រុង)។

ម៉ាស់មាឌ:

$$\mu = \frac{m}{V} \Rightarrow m = \mu \times V$$

(m : ម៉ាស់, V : មាឌ, μ : ម៉ាស់មាឌ)

៦៩ មេរៀន ផលធៀបត្រីកោណមាត្រ

១. ផលធៀបត្រីកោណមាត្រ

ជំនួស


ក្នុងត្រីកោណ ABC កែងត្រង់ C បើ A ជាមុំស្រួច

$$\sin A = \frac{\text{ឈម}}{\text{អ៊ីប៉ូតេនុស}} = \frac{a}{c}$$

$$\cos A = \frac{\text{ជាប់}}{\text{អ៊ីប៉ូតេនុស}} = \frac{b}{c}$$

$$\tan A = \frac{\text{ឈម}}{\text{ជាប់}} = \frac{a}{b}$$

$$\cot A = \frac{\text{ជាប់}}{\text{ឈម}} = \frac{b}{a}$$




ប្រមូលក្រដាស

$$a = c \sin A = b \tan A, \quad b = c \cos A = \frac{a}{\tan A}$$

$$c = \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\cos A}, \quad \tan A = \frac{\sin A}{\cos A}$$


២. តម្លៃមុំនៃត្រីកោណនិស្ស

ត្រីកោណកន្លះសម័ង្ស



ជ្រុងឈម 30° : ជ្រុងឈម 60° : អ៊ីប៉ូតេនុស
= $1 : \sqrt{3} : 2$

ត្រីកោណកែងសមបាត



ជ្រុងកែង: ជ្រុងកែង: អ៊ីប៉ូតេនុស
= $1 : 1 : \sqrt{2}$

៣. តម្លៃមុំនៃមុំនិស្ស

តម្លៃមុំនៃមុំនិស្ស

មុំ	30°	45°	60°	90°	120°	180°
sin	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	0
cos	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	-1
tan	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$		$-\sqrt{3}$	0
cot	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	