



ជំពូកទី១ ពហុធា

១. ពហុធា

- ▶ **ពហុធា** គឺជាកន្សោមដែលមានតែវិធីគុណនិងស្វ័យគុណ ហើយមាននិទស្សន្តជាចំនួនគត់ឬសូន្យ។
- ▶ **ពហុធាបូកគ្នា** គឺជាពហុធាដែលមានផ្នែកអថេរដូចគ្នា។
- ▶ **បីក្រេពហុធា** គឺជាពហុធាដែលមាននិមួយៗ។
- បូកឬផលដកពហុធាដូចគ្នា គេបូក ឬដកតែមេគុណ។
- គុណពហុធាគឺគុណមេគុណនិងមេគុណ អថេរនិងអថេរ។

- ▶ **ពហុធា** គឺជាពហុធាដែលមានមេគុណដូចគ្នា។
- ▶ **បីក្រេពហុធា** គឺជាពហុធាដែលមានមេគុណដូចគ្នា។
- បូកឬផលដកពហុធា គេត្រូវបូក ឬដកពហុធាដែលដូចគ្នា។
- គុណពហុធានិងពហុធា គេយកតួនីមួយៗនៃពហុធាទី១ គុណគ្រប់តួនៃពហុធាទី២ រួចបង្រួមលទ្ធផល។

២. តួបែករួមធំបំផុត(GCD) និង ពហុគុណរួមតូចបំផុត (LCM)នៃពហុធា

- ▶ **តួបែករួមធំបំផុត** នៃកត្តា A និង B គឺជាផលគុណកត្តារួមដែលមាននិទស្សន្តតូចជាងគេ។
- ▶ **ពហុគុណរួមតូចបំផុត** នៃកន្សោម A និង B គឺជាផលគុណកត្តារួមដែលមាននិទស្សន្តធំជាងគេ ជាមួយកត្តាមិនរួមទាំងអស់។

៣. រូបមន្តពន្លាតកន្សោម

ការទ្វេដា និងក្នុងទ្វេដា

$$\begin{aligned} (a+b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2 \\ (a-b)^2 &= a^2 - 2ab + b^2 \\ a^2 - b^2 &= (a-b)(a+b) \\ a^2 + b^2 &= (a-b)^2 + 2ab = (a+b)^2 - 2ab \\ (a+b+c)^2 &= a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab+ac+bc) \\ (a+b)^3 &= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 \\ (a-b)^3 &= a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3 \\ a^3 - b^3 &= (a-b)(a^2 + ab + b^2) \\ a^3 + b^3 &= (a+b)(a^2 - ab + b^2) \\ a^4 - b^4 &= (a-b)(a+b)(a^2 + b^2) \\ a^n - b^n &= (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + b^{n-1}) \end{aligned}$$

បើ m និង n ជាចំនួនគត់វិជ្ជមាន ហើយ $a \neq 0$ នោះគេបាន៖

$$\begin{aligned} a^m \times a^n &= a^{m+n} & (a^m)^n &= a^{mn} \\ (ab)^n &= a^n b^n & \frac{a^m}{a^n} &= a^{m-n} \end{aligned}$$

៤. ការដាក់ផលគុណកត្តា

$$ab + ac - ad = a(b + c - d)$$

$$acx^2 + (ad + bc)x + bd = (ax + b)(cx + d)$$

៥. ប្រមាណវិធីលើប្រភាគសនិទាន

$$\begin{aligned} \text{▶ } \frac{A \times C}{B \times C} &= \frac{A}{B} \text{ ដែល } B \neq 0, C \neq 0 \\ \text{▶ } \frac{A}{C} \pm \frac{B}{C} &= \frac{A \pm B}{C} \text{ ដែល } C \neq 0 \\ \text{▶ } \frac{A}{B} \times \frac{C}{D} &= \frac{A \times C}{B \times D} \text{ ដែល } C \neq 0, D \neq 0 \\ \text{▶ } \frac{A}{B} \div \frac{C}{D} &= \frac{A}{B} \times \frac{D}{C} = \frac{A \times D}{B \times C} \end{aligned}$$

ជំពូកទី២ កក្កដា សំណុំ និងចំនួន

១. និយមន័យនិងតម្លៃភាពពិតនៃសំណើ

និយមន័យ

- ▶ **សំណើ** គឺជា អំណះអំណាង ទាំងឡាយ ណាដែលគេអាចសម្រេចបានថា ពិត ឬ មិនពិតតែមិនអាចពិត ផង មិនពិត ផង ក្នុង ពេល តែមួយឡើយ។ គេតាងសំណើដោយអក្សរតូច $p, q, r, \dots$ ។
- បើ p ជាសំណើពិត នោះ ត. (p)=1
- បើ p ជាសំណើមិនពិត នោះ ត. (p)=0

២. តារាងតម្លៃភាពពិតនៃល្បាប់កក្កដា

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \Rightarrow q$	$p \Leftrightarrow q$	$\bar{p}$
1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	1	0	1
0	0	0	0	1	1	1

៣. ល្បាប់ និងលក្ខណៈដឺម៉ូឌេន (De Morgan)

- ▶ $p \wedge q$ ពិត បើសំណើទាំងពីរពិតព្រមគ្នា
- ▶ $p \vee q$ មិនពិត បើសំណើទាំងពីរមិនពិតព្រមគ្នា

សំណើ $p \Rightarrow q$ មិនពិតតែក្នុងករណីសំណើ p ពិត ហើយសំណើ q មិនពិត

$$p \Leftrightarrow q = (p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$$


លក្ខណៈដឺម៉ូឌេន

$$\overline{p \wedge q} = \bar{p} \vee \bar{q} \quad \overline{p \vee q} = \bar{p} \wedge \bar{q}$$

៤. សំណុំ (Set)


▶ ប្រសព្វនៃសំណុំ

សំណុំ $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ និង } x \in B\}$



▶ ប្រជុំនៃសំណុំ

- សំណុំ $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ ឬ } x \in B\}$
- $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$



▶ លក្ខណៈដឺម៉ូឌេន លក្ខណៈផ្គុំនិងបំបែក


$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B} \quad \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C \quad A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) \quad A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

៥. សំណុំនៃចំនួន និងបំណែកថ្នាក់របស់វា

តារាងបំណែងចែកថ្នាក់



- ចំនួនគត់ធម្មជាតិ: $N = \{1, 2, 3, \dots\}$
- ចំនួនគត់វិជ្ជាទីប: $Z = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- ចំនួនសនិទាន: $Q = \{\frac{a}{b} \mid a \in Z, b \in Z^*\}$
- ចំនួនពិត: R (រួមមានចំនួនសនិទាន និងអសនិទាន)
- សំណុំចំនួនកុំផ្លិច: $C = \{x \mid x \text{ ចំនួនពិត, និម្មិត}\}$
- ទំនាក់ទំនងសំណុំចំនួន: $N \subset Z \subset Q \subset R \subset C$

៦. ប្រព័ន្ធនាប៉េ

ទម្រង់ពន្លាត

$$abcd_{10} = a \times 10^3 + b \times 10^2 + c \times 10 + d$$

$$abcd_2 = a \times 2^3 + b \times 2^2 + c \times 2 + d$$

របៀបបង្កើនចំនួនគោល ១០ ទៅគោល ២

- យកចំនួនគោល ១០ នោះមកចែកនឹង ២
- គត់ត្រាស់ណាស់ទុក (សំណល់អាចជា ០ ឬ ១)
- យកផលចែកដែលបាន មកចែកនឹង ២ បន្ត
- ធ្វើបែបនេះរហូតទាល់តែផលចែកស្មើ ០
- យកសំណល់ទាំងអស់មកសរសេរតម្រៀបគ្នាពីសំណល់ចុងក្រោយគេ បញ្ជាក់សមកលើវិញ។

របៀបបង្កើនចំនួនគោល ២ ទៅគោល ១០

- សរសេរលេខគោល ២ នោះពង្រាយមក។
 - ដាក់ស្វ័យគុណនៃ ២ ទៅឱ្យខ្ទង់នីមួយៗដោយចាប់ផ្តើមរាប់ពីស្តាំទៅឆ្វេង គឺចាប់ពី $2^0, 2^1, 2^2, 2^3, \dots$ ជាដើម។
 - យកលេខខ្ទង់នីមួយៗ (០ ឬ ១) ទៅគុណនឹងតម្លៃស្វ័យគុណនៃ ២ ត្រង់ខ្ទង់របស់វា។
 - ធ្វើផលបូកលទ្ធផលទាំងអស់បញ្ចូលគ្នា នោះនឹងទទួលបានចំនួនក្នុងគោល ១០ ។
- ចំណាំ:** ខ្ទង់ណាដែលមានលេខ ០ មិនបាច់បូកបញ្ចូលក៏បាន ព្រោះគុណទៅស្មើ ០ ដែរ។

ជំពូកទី៣ សមីការនិមិត្តសមីការ

១. សញ្ញានៃចំនួនកុំផ្លិច

ឯកតានិមិត្ត

- ឯកតានិមិត្ត i ដែល $i^2 = -1, i = \sqrt{-1}$
- បើ $a > 0$ នោះគេបាន: $\sqrt{-a} = \sqrt{a} \cdot i$
- ទម្រង់ស្តង់ដារនៃចំនួនកុំផ្លិច: $z = a + bi$ ដែល a ជាផ្នែកពិត និង b ជាផ្នែកនិមិត្ត។

ប្រមាណវិធីបើចំនួនកុំផ្លិច

- $(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$
- $(a + bi) - (c + di) = (a - c) + (b - d)i$
- $(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$
- $\frac{a + bi}{c + di} = \frac{(a + bi)(c - di)}{(c + di)(c - di)} = \frac{ac + bd}{c^2 + d^2} + \frac{bc - ad}{c^2 + d^2}i$

២. សមីការដឺក្រេទី២ $ax^2 + bx + c = 0 \quad (a \neq 0)$

តាមផលគុណកត្តា និងបំពេញការងារ

- ចំពោះ $A \times B = 0$ នោះ $A = 0$, $B = 0$
- ចំពោះ $ax^2 + bx + \left(\frac{b}{2}\right)^2 = \left(x + \frac{b}{2}\right)^2$

ករណីពិសេស

- រាង $a + b + c = 0$ នោះ $x = 1$ និង $x = -\frac{c}{a}$
- រាង $a + c = b$ នោះ $x = -1$ និង $x = -\frac{c}{a}$

រូបមន្តឌីសក្រីមីណង់: $\Delta = b^2 - 4ac$

- បើ $\Delta > 0$: មានឫសពីរ $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$
- បើ $\Delta = 0$: មានឫសឌុប $x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a}$
- បើ $\Delta < 0$: សមីការមានឫសជាចំនួនកុំផ្លិចស្លាប់គ្នាពីរ $x = \frac{-b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}$

រូបមន្ត: $\Delta' = (b')^2 - ac$ ដែល $b' = \frac{b}{2}$

- បើ $\Delta' > 0$ មានឫសពីរ $x = \frac{-b' \pm \sqrt{\Delta'}}{a}$
- បើ $\Delta' = 0$ មានឫសឌុប $x_1 = x_2 = -\frac{b'}{a}$
- បើ $\Delta' < 0$ សមីការមានឫសជាចំនួនកុំផ្លិចស្លាប់គ្នាពីរ $x = \frac{-b' \pm i\sqrt{-\Delta'}}{a}$

ត្រីស្តីបទអ៊ីក

- ផលបូកឫស $S = x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$
- ផលបូកគុណ $P = x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$
- បង្កើតសមីការដឺក្រេទី២ តាមផលបូក S និងផលគុណ P គឺ $x^2 - Sx + P = 0$

៣. ត្រីស្តីបទសំណល់និងត្រីស្តីបទផលគុណកត្តា

- ▶ **ត្រីស្តីបទ សំណល់:** បើ ពហុធា $f(x)$ ចែកនឹង $(x - \alpha)$ នោះ សំណល់ នៃ ការចែក គឺ $R = f(\alpha)$ ។
- ▶ **ត្រីស្តីបទ កត្តា:** បើ α ជា ឫស នៃ សមីការ $f(x) = 0$ គេបាន $f(\alpha) = 0$ នោះ $(x - \alpha)$ គឺជា កត្តាមួយនៃពហុធា $f(x)$ ។

៤. វិសមីការ

លក្ខណៈវិសមភាព

- បើ $a > b \Leftrightarrow a + c > b + c$ និង $a - c > b - c$
- ចំពោះ $c > 0$: បើ $a > b \Leftrightarrow ac > bc$ និង $\frac{a}{c} > \frac{b}{c}$
- ចំពោះ $c < 0$: បើ $a > b \Leftrightarrow ac < bc$ និង $\frac{a}{c} < \frac{b}{c}$ (ប្តូរទិសដៅ)

ចំណាំ: គុណប្រែកម្រិតវិសមីការនិងចំនួនអវិជ្ជមាននោះវិសមីការត្រូវប្តូរទិសដៅនិច្ច។

៤. សញ្ញានៃទ្វេធា $f(x) = ax + b \quad (a \neq 0)$

x	$-\infty$	$\frac{b}{a}$	$+\infty$
$f(x)$	សញ្ញាផ្ទុយ a	០	សញ្ញាដូច a

៥. សញ្ញានៃត្រីធា $f(x) = ax^2 + bx + c \quad (a \neq 0)$

▶ ករណី $\Delta > 0$: មានឫសពីរ x_1 និង x_2

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$
$f(x)$	សញ្ញាដូច a		ផ្ទុយ a	សញ្ញាដូច a

▶ ករណី $\Delta = 0$: $f(x)$ មានឫសឌុប

x	$-\infty$	x_0	$+\infty$
$f(x)$	សញ្ញាដូច a	០	សញ្ញាដូច a

▶ ករណី $\Delta < 0$: $f(x)$ គ្មានឫស

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	សញ្ញាដូច a ជានិច្ច	

៦. វិសមីការតម្លៃដាច់ខាត (ចំពោះ $C > 0$)

ចំណាំ

$$\begin{aligned} |Ax + B| &= C \Leftrightarrow Ax + B = \pm C \\ |Ax + B| < C &\Leftrightarrow -C < Ax + B < C \\ |Ax + B| > C &\Leftrightarrow Ax + B > C \\ &\text{ឬ } Ax + B < -C \end{aligned}$$

៧. បង្ហាញនៃវិសមីការដឺក្រេទី២

វិសមីការដឺក្រេទី២ទម្រង់ $ax^2 + bx + c \square 0$

តាង $f(x) = ax^2 + bx + c$

► ឱ្យ $ax^2 + bx + c = 0$ រកឫសតាម Δ

► បើ $\Delta > 0$ និង $a > 0$ មានឫសពីរ $\alpha < \beta$

- ចម្លើយ $f(x) > 0$ គឺ $x < \alpha$, $\beta < x$
- ចម្លើយ $f(x) < 0$ គឺ $\alpha < x < \beta$
- ចម្លើយ $f(x) \geq 0$ គឺ $x \leq \alpha$, $\beta \leq x$
- ចម្លើយ $f(x) \leq 0$ គឺ $\alpha \leq x \leq \beta$

► បើ $\Delta = 0$ និង $a > 0$ មានឫសឌុប α

- វិសមីការ $f(x) > 0$ ចម្លើយគ្រប់ចំនួនពិតលើកលែង α
- វិសមីការ $f(x) < 0$ គ្មានចម្លើយ
- វិសមីការ $f(x) \geq 0$ ចម្លើយគ្រប់ចំនួនពិត
- វិសមីការ $f(x) \leq 0$ មានចម្លើយ $x = \alpha$

► បើ $\Delta < 0$ និង $a > 0$ គ្មានឫសពិត

- វិសមីការ $f(x) > 0$ ចម្លើយគ្រប់ចំនួនពិត
- វិសមីការ $f(x) < 0$ គ្មានចម្លើយ
- វិសមីការ $f(x) \geq 0$ ចម្លើយគ្រប់ចំនួនពិត
- វិសមីការ $f(x) \leq 0$ គ្មានចម្លើយ

៨. វិសមភាពកូស៊ី ពីរតួ និងបីតួ

- ពីរតួ $a, b \geq 0$

គេបាន $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$

- បីតួ $a, b, c \geq 0$

គេបាន $\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}$

ជំពូកទី៤ បរិមាណក្នុងត្រីកោណ

១. កូអរដោនេនៃចំណុចលើបន្ទាត់ចំនួន

ចម្ងាយ និង ចែកអង្កត់

- ចម្ងាយរវាងចំណុច $A(a)$ និង $B(b)$ នៅលើបន្ទាត់ចំនួនគឺ $AB = |b - a|$
- ចំណុច $P(x)$ ចែកក្នុងតាមផលធៀប $m : n$

គឺ $x = \frac{mb + na}{m + n}$

- ចំណុច $Q(x)$ ចែកក្រៅតាមផលធៀប $m : n$
- គឺ $x = \frac{mb - na}{m - n}$

២. កូអរដោនេនៃចំណុចនៅក្នុងត្រីកោណ

បើចំណុច $A(x_1, y_1)$ និង $B(x_2, y_2)$

- ចម្ងាយពីចំណុច A ទៅ B កំណត់ដោយ

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

- ចំណុចកណ្តាលអង្កត់ AB គឺ

$$I \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

- ចំណុចចែកក្នុង AB តាមផលធៀប $m : n$

គឺ $P \left(\frac{mx_b + nx_a}{m + n}, \frac{my_b + ny_a}{m + n} \right)$

- ចំណុចចែកក្រៅ AB តាមផលធៀប $m : n$

គឺ $Q \left(\frac{mx_b - nx_a}{m - n}, \frac{my_b - ny_a}{m - n} \right)$

៣. សមីការបន្ទាត់

បន្ទាត់កាត់ តាម ចំណុច (x_1, y_1) និង មានមេគុណប្រាប់ទិស m គឺ $y = m(x - x_1) + y_1$

- សមីការបន្ទាត់កាត់តាមពីរចំណុច $A(x_1, y_1)$ និង $B(x_2, y_2)$ គឺ $\frac{y - y_1}{x - x_1} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$

ដែល $(x_1 \neq x_2)$ ។

- ទម្រង់ទូទៅនៃសមីការបន្ទាត់: $y = ax + b$

៤. បន្ទាត់ស្រប និងបន្ទាត់កែង

ចំពោះបន្ទាត់ $D : y = mx + n$

និង $D' : y = m'x + n'$

- បើ $D \parallel D' \Leftrightarrow m = m'$
- បើ $D \perp D' \Leftrightarrow m \cdot m' = -1$

៥. ចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅបន្ទាត់មួយ

ចម្ងាយចំណុច (x_1, y_1) ទៅបន្ទាត់ $y = ax + b$

គឺ $d = \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$

៦. សមីការរង្វង់

- ផ្ចិត $O(0, 0)$ កាំ r គឺ $x^2 + y^2 = r^2$
- ផ្ចិត $I(a, b)$ កាំ r : $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$

- ទម្រង់ទូទៅ: $x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$


► សមីការបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ត្រង់ចំណុច (x_0, y_0) :

- ចំពោះរង្វង់ផ្ចិត $O(0, 0)$: $x_0x + y_0y = r^2$
- ចំពោះរង្វង់ផ្ចិត $I(a, b)$: $(x_0 - a)(x - a) + (y_0 - b)(y - b) = r^2$

ជំពូកទី៥ ផលធៀបត្រីកោណមាត្រ

១. និយមន័យក្នុងត្រីកោណកែង


ក្នុងត្រីកោណកែង



ទ្រឹស្តីបទពីតាករ: $AB^2 + BC^2 = AC^2$

$$\begin{aligned} \sin A &= \frac{\text{ជ្រុងឈរ}}{\text{ជ្រុងទិញ}}, \cos A = \frac{\text{ជ្រុងជាប់}}{\text{ជ្រុងទិញ}} \\ \tan A &= \frac{\text{ជ្រុងឈរ}}{\text{ជ្រុងជាប់}}, \cot A = \frac{\text{ជ្រុងជាប់}}{\text{ជ្រុងឈរ}} \end{aligned}$$

២. រង្វង់ត្រីកោណមាត្រ



សម្គាល់

- អ័ក្សអាប៉ូស៊ីស ហៅថា អ័ក្សត្រីកោណមាត្រ
- អ័ក្សអរដោនេ ហៅថា អ័ក្សស៊ីនុស
- អ័ក្សដែលប៉ះរង្វង់ខាងស្តាំ ហើយស្របនឹងអ័ក្សអរដោនេហៅថា អ័ក្សតង់សង់

៣. តម្លៃមុំពិសេស

α -ដឺក្រេ	0°	30°	45°	60°	90°
α -រ៉ាដ្យង់	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan \alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	
$\cot \alpha$		$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0


៤. ទំនាក់ទំនងត្រីកោណមាត្រ

- $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ និង $\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$
- $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$
- $\tan x \cdot \cot x = 1$ ឬ $\tan x = \frac{1}{\cot x}$

- $1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$
- $1 + \cot^2 x = \frac{1}{\sin^2 x}$


៥. មុំបំពេញ និងមុំបន្ថែម

មុំបំពេញ ($90^\circ - A$)



$$\begin{aligned}\sin(90^\circ - A) &= \cos A \\ \cos(90^\circ - A) &= \sin A \\ \tan(90^\circ - A) &= \cot A \\ \cot(90^\circ - A) &= \tan A\end{aligned}$$


មុំបន្ថែម ($180^\circ - \alpha$)



$$\begin{aligned}\sin(180^\circ - \alpha) &= \sin \alpha \\ \cos(180^\circ - \alpha) &= -\cos \alpha \\ \tan(180^\circ - \alpha) &= -\tan \alpha \\ \cot(180^\circ - \alpha) &= -\cot \alpha\end{aligned}$$

៦. ទ្រឹស្តីបទស៊ីនុស និងកូស៊ីនុស ($\triangle ABC$)

ទ្រឹស្តីបទស៊ីនុស



ចំពោះ $\triangle ABC$ ចារឹកក្នុងរង្វង់កាំ R គេបាន

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

ទ្រឹស្តីបទកូស៊ីនុស

$$\begin{aligned}a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A \\ b^2 &= a^2 + c^2 - 2ac \cdot \cos B \\ c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos C\end{aligned}$$

៧. រូបមន្តផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ

រូបមន្តផ្ទៃក្រឡា

- $S = \frac{1}{2}bc \cdot \sin A = \frac{1}{2}ac \cdot \sin B = \frac{1}{2}ab \cdot \sin C$
- គេបាន $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = \frac{abc}{2S}$

រូបមន្តហេរ៉ុង (Heron's Formula):

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

(ដែល $p = \frac{a+b+c}{2}$ ជាកន្លះបរិមាត្រ) ។

ជំពូកទី៦ អនុគមន៍និងក្រាបនៃអនុគមន៍

១. ដែនកំណត់នៃអនុគមន៍

របៀបរកដែនកំណត់នៃ

- ទម្រង់ $y=p(x)$ ដែល $p(x)$ ជាពហុធា កំណត់បានចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត ។
- ទម្រង់ $y=\frac{f(x)}{g(x)}$ ដែនកំណត់ $g(x) \neq 0$
- ទម្រង់ $y=\sqrt{f(x)}$ ដែនកំណត់ $f(x) \geq 0$


- អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល $y=e^{f(x)}$ មានន័យចំពោះ $\forall x \in \mathbb{R}$
- អនុគមន៍លោការីតនេព័រ $y=\ln[f(x)]$ មានន័យចំពោះ $f(x) > 0$

២. ទិសដៅអថេរភាព

អនុគមន៍កើន និងអនុគមន៍ថុះ

- ចំពោះ $x_2 > x_1$ គេកំណត់
- ▶ កំណើនអថេរ $\Delta x = x_2 - x_1$
 - ▶ កំណើនអនុគមន៍ $\Delta y = f(x_2) - f(x_1)$
 - បើ $\frac{\Delta y}{\Delta x} > 0$ នោះ f ជាអនុគមន៍កើន ។
 - បើ $\frac{\Delta y}{\Delta x} < 0$ នោះ f ជាអនុគមន៍ថុះ ។

៣. អនុគមន៍ច្រាស់ $f^{-1}(x)$




របៀបរកអនុគមន៍ច្រាស់

- ជំនួស $f(x)$ ដោយ y
- ប្តូរអថេរ x ទៅជា y និង y ទៅជា x
- រួចទាញរក y ថ្មី ។
- លក្ខណៈ: ក្រាប: ក្រាបនៃអនុគមន៍ $f(x)$ និងអនុគមន៍ច្រាស់ $f^{-1}(x)$ ឆ្លុះគ្នាជ្រៀបនឹងបន្ទាត់ពុះទីមួយ $y=x$ ។


៤. ក្រាបអនុគមន៍ជីក្រេទី២ (ប៉ារ៉ាបូល)

អនុគមន៍ $y=ax^2$




- ចំពោះ $a > 0$ នោះក្រាបនៃ $y=ax^2$ បែរផតឡើងលើ ។
- ចំពោះ $a < 0$ នោះក្រាបនៃ $y=ax^2$ បែរផតឡើងក្រោម ។

អនុគមន៍ $y=a(x-p)^2$



- ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y=a(x-p)^2+q$ បានពីការរីកិលក្រាបរបស់ $y=ax^2$ ចំនួន p ឯកតា ស្របអ័ក្ស x' ។
- បើ $p > 0$ រីកិលទៅស្តាំ ។
 - បើ $p < 0$ រីកិលទៅស្តាំ ។

អនុគមន៍ $y=a(x-p)^2+q$



- អាចសរសេរជាទម្រង់ $y=a(x-p)^2+q$ ដែល $p=-\frac{b}{2a}$ និង $q=-\frac{b^2-4ac}{4a}$
- មានកំពូល $S(p, q)$ និងអ័ក្សឆ្លុះ $x=-\frac{b}{2a}$ ។

ចំណាំ

ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y=ax^2+bx+c$ មានកំពូលនៅត្រង់ $(-\frac{b}{2a}, -\frac{b^2-4ac}{4a})$

៥. អតិបរមា និងអប្បបរមា


តម្លៃអតិបរមា និងអប្បបរមានៃអនុគមន៍ដឺក្រេទី២៖ $y=ax^2+bx+c$

- បើ $a > 0$ អនុគមន៍មានតម្លៃអប្បបរមាស្មើ $y=-\frac{b^2-4ac}{4a}$ ត្រង់ $x=-\frac{b}{2a}$ ហើយអនុគមន៍គ្មានអតិបរមាទេ ។
- បើ $a < 0$ នោះអនុគមន៍មានតម្លៃអតិបរមាស្មើ $y=-\frac{b^2-4ac}{4a}$ ត្រង់ $x=-\frac{b}{2a}$ ហើយអនុគមន៍គ្មានអប្បបរមាទេ ។


៦. ក្រាបអនុគមន៍សនិទាន

ទម្រង់ $y=\frac{a}{x}$

- អាស៊ីមតូតឈរគឺ $x=0$
- អាស៊ីមតូតដេកគឺ $y=0$




ទម្រង់ $y=\frac{ax+b}{cx+d}=\frac{a}{x-p}+q$




- អាស៊ីមតូតឈរគឺ $x=-\frac{d}{c}$
- អាស៊ីមតូតដេកគឺ $y=\frac{a}{c}$
- ប្រើក្រាបរបស់ $y=\frac{a}{x}$ រកិលចំនួន p ឯកតាស្របអ័ក្ស ($x'ox$) និង q ឯកតាស្រប ($y'oy$) ។

៧. ក្រាបអនុគមន៍សនិទាន


ទម្រង់ $y=\sqrt{ax}$



ទម្រង់ $y=-\sqrt{ax}$



ទម្រង់ $y=\sqrt{ax+b}=\sqrt{a(x-p)}$



ជំពូកទី៧ ស្ថិតិ

១. ទិន្នន័យមិនផ្គុំជាផ្ទាំង

► តារាងចំណែងចែកប្រភេទ


អថេរ	x_1	x_2	$\cdots$	x_n
ប្រេកង់	f_1	f_2	$\cdots$	f_n

- ក្រាបសសរ៖ ក្នុងតម្រុយកូអរដោនេ ដោយតម្លៃអថេរ (x_i) លើអ័ក្សអាប់ស៊ីស និងប្រេកង់ (f_i) លើអ័ក្សអរដោនេ រួចសងសសរដែលមានកម្ពស់ជាប្រេកង់ ។
- មុំផ្ចិតនៃក្រាបផ្ចិត (Pie Chart):
មុំផ្ចិត $= \frac{360^\circ \times f_i}{N}$ (ដែល f_i ជាប្រេកង់ថ្នាក់ និង N ជាប្រេកង់សរុប) ។
- ប្រេកង់កើន ($f^\uparrow$): ជាផលបូកប្រេកង់បន្តបន្ទាប់ពីលើចុះក្រោម ។
- ប្រេកង់ថយ ($f^\downarrow$): បានមកពីការដកប្រេកង់សរុប និងប្រេកង់បន្តបន្ទាប់ពីលើចុះក្រោម ។

២. ទិន្នន័យផ្គុំជាផ្ទាំង


► អ៊ីស្តូក្រាម

នៅលើអ័ក្សអាប់ស៊ីស ដោយចន្លោះថ្នាក់ និងតាងប្រេកង់ នៅលើអ័ក្សអរដោនេ សង់ចតុកោណកែងដែលមានបាតជាចន្លោះថ្នាក់ និងប្រេកង់ជាកម្ពស់ ។



► ពហុកោណប្រេកង់

- ដើម្បីសង់ពហុកោណកោណប្រេកង់ គេត្រូវស្គាល់ចំណុចកណ្តាលនៃថ្នាក់នីមួយៗហៅផ្ចិតនៃថ្នាក់ ។ ផ្ចិតនៃថ្នាក់គឺ $x_i = \frac{c_{i-1} + c_i}{2}$



▶ តារាងប្រេកង់កើន ប្រេកង់ថយ

ចន្លោះថ្នាក់	ប្រេកង់ f_i	ប្រេកង់កើន F_i	ប្រេកង់ថយ G_i
$c_0 - c_1$	f_1	f_1	$f_1 + \dots + f_n$
$c_1 - c_2$	f_2	$f_1 + f_2$	$f_2 + \dots + f_n$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$c_{n-1} - c_n$	f_n	$f_1 + \dots + f_n$	f_n

- **ប្រេកង់កើន** ជាប្រេកង់បូកចំនួនដែលបានដោយបូកប្រេកង់ បន្តបន្ទាប់ពីលើ ចុះក្រោម ។
- **ប្រេកង់ថយ** ជាចំនួនដែលបានដោយការដកប្រេកង់សរុបនិងប្រេកង់ បន្តបន្ទាប់ ។

៣. រូបមន្តរកមធ្យម ($\bar{x}$)

- ទិន្នន័យមិនផ្គុំជាថ្នាក់:
$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_N}{N} \text{ ឬ } \bar{x} = \frac{\sum x_i}{N}$$
- ទិន្នន័យផ្គុំជាថ្នាក់ (មាន x_i ជាផ្ចិតថ្នាក់ និង f_i ជាប្រេកង់):
$$\bar{x} = \frac{x_1 f_1 + x_2 f_2 + \dots + x_n f_n}{f_1 + f_2 + \dots + f_n} = \frac{\sum f_i x_i}{N}$$

៤. មេដ្យាន (M_e) និងម៉ូត (M_o)

- ▶ **មេដ្យាន** គឺជា តម្លៃ ចំ កណ្តាល នៃ ទិន្នន័យ (តាមលំដាប់កើន)។ ទីតាំងមេដ្យានគឺ $\frac{N+1}{2}$
 - បើ N សេស: $M_e = x_{\frac{N+1}{2}}$
 - បើ N គូ: $M_e = \frac{1}{2} \left(x_{\frac{N}{2}} + x_{\frac{N}{2}+1} \right)$
- ▶ **ម៉ូត** ជាតម្លៃទិន្នន័យប្រេកង់ខ្ពស់ជាងគេ ។

ជំពូកទី៨ ទីបង្អស់ក្នុងប្លង់

១. សញ្ញាណទីបង្អស់

វ៉ិចទ័រ ឡឺញ៉ា មាន ទិសដៅ ដូចគ្នា និង ប្រវែង ស្មើគ្នា ។

វ៉ិចទ័រផ្ទុយគ្នា ទិសដៅផ្ទុយគ្នា ប្រវែងស្មើគ្នា ។
វ៉ិចទ័រកូលីនេអ៊ែរ ជាវ៉ិចទ័រពីរដែលស្របគ្នានិងបន្ទាត់តែមួយ (មិនគិតពីទិសដៅ ឬប្រវែង) ។

២. ប្រមាណវិធីលើទីបង្អស់

- វិធានប្រលេឡូក្រាម: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD}$
- វិធីដកវ៉ិចទ័រ: $\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{OQ} - \overrightarrow{OP}$

៣. កូអរដោនេ និងប្រភេទទីបង្អស់

- បើ $A(x_1, y_1)$ និង $B(x_2, y_2)$ នោះគេបាន៖
- កូអរដោនេ $\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$
- $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

៤. ផលគុណស្កាលែ ($Scalar Product$)

- ចំពោះ $\vec{u} = (x, y, z)$ និង $\vec{v} = (x', y', z')$
- ផលគុណស្កាលែ $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'$
- ផលគុណស្កាលែ $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos \theta$
- គេទាញបាន $\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|} = \frac{xx' + yy' + zz'}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \cdot \sqrt{x'^2 + y'^2 + z'^2}}$
- កែងគ្នា: $\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \Leftrightarrow xx' + yy' = 0$

៥. សមីការបន្ទាត់ ឬ សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រ

បន្ទាត់(L)កាត់ចំណុច (x_0, y_0) ហើយស្របនឹង $\vec{u}(a, b)$ កំណត់ដោយ៖
$$(L) : \begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}$$

៦. ទ្រឹស្តីបទមេដ្យាន

AI ជាមេដ្យាននៃ $\triangle ABC$ គេបាន
$$AB^2 + AC^2 = 2AI^2 + \frac{BC^2}{2}$$

ទីប្រជុំទម្ងន់

ទីប្រជុំទម្ងន់ G នៃត្រីកោណ ABC គឺ
$$\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$$

ជំពូកទី៩ បំលែងរូបក្នុងប្លង់

១. បំលែងអឺគ្លីដ

រូបភាពចំណុច M តាមបំលែងក្លិននៃវ៉ិចទ័រ $\vec{p}$ គឺចំណុច M' ដែល $\overrightarrow{MM'} = \vec{p}$ ។ កំណត់ដោយ៖
$$M' = t_{\vec{p}}(M) \text{ ឬ } M \xrightarrow{t_{\vec{p}}} M'$$

រូបភាព ចំណុច $M(x, y)$ ទៅ $M'(x', y')$ តាម បំលែង ក្លិន នៃ វ៉ិចទ័រ $\vec{p} = (a, b)$ កំណត់ដោយ៖ $M(x, y) \xrightarrow{t_{\vec{p}}} M'(x + a, y + b)$

២. បំលែងឆ្លុះ

▶ បំលែងឆ្លុះ $M \xrightarrow{S} M'$ គឺ

- $(x, y) \xrightarrow{S_x} (x, -y)$ ធៀបនឹងអ័ក្ស x'
- $(x, y) \xrightarrow{S_y} (-x, y)$ ធៀបនឹងអ័ក្ស y'

▶ តារាងបំលែងឆ្លុះទូទៅ

អ័ក្សបំលែងឆ្លុះ	រូបភាព
អ័ក្សអាប់ស៊ីស $x'ox$	$(a, b) \rightarrow (a, -b)$
អ័ក្សអរដោនេ $y'oy$	$(a, b) \rightarrow (-a, b)$
$y=k$	$(a, b) \rightarrow (a, 2k - b)$
$x=h$	$(a, b) \rightarrow (2h - a, b)$
$y=x$	$(a, b) \rightarrow (b, a)$
$y = -x$	$(a, b) \rightarrow (-b, -a)$

៣. បំលែងទិស

បើចំណុច M តាមការវិលមុំ α ជុំវិញផ្ចិត A គឺ ចំណុច M' នោះ $AM = AM'$ និង $\angle MAM' = |\alpha|$ មានពីរករណី៖

- បើ $\alpha > 0$ ទិសដៅប្រាសទ្រនិចនាឡិកា
- បើ $\alpha < 0$ ទិសដៅដូចទ្រនិចនាឡិកា

បំលែងវិលផ្ចិតគល់តម្រុយ $O(0, 0)$ និងមុំ θ

- មុំ $\theta = 90^\circ$: $P(x, y) \rightarrow P'(-y, x)$
- មុំ $\theta = 180^\circ$: $P(x, y) \rightarrow P'(-x, -y)$
- មុំ $\theta = 270^\circ$: $P(x, y) \rightarrow P'(y, -x)$

៤. បំលែងចង្វា

▶ រូបភាពចំណុច M តាមបំលែងចង្វាផ្ចិត P ផលធៀប c គឺ M' ដែល $\overrightarrow{PM'} = c\overrightarrow{PM}$ គេសរសេរ $A \xrightarrow{h} A'$ ឬ $A' = h(A)$

- បើ $c > 0$: រូបភាពនិងរូបពិតនៅខាងតែមួយនៃផ្ចិតបំលែង ។
- បើ $c < 0$: រូបភាពនិងរូបពិតនៅម្នាក់ខាងនៃផ្ចិតបំលែង ។

▶ បើផ្ចិតជាគល់តម្រុយ $O(0, 0)$ លទ្ធផលគឺ:

$$(x, y) \xrightarrow{h} (cx, cy)$$