



១ ស៊ីត

មេរៀនទី១. ស៊ីតចំនួនពិត

- ស៊ីតនៃចំនួនពិតគឺជាអនុគមន៍លេខដែលកំណត់ពី $\mathbb{N}$ ទៅ $\mathbb{R}$ ។

មេរៀនទី២. ស៊ីតនព្វន្ត

- ស៊ីតនព្វន្ត គឺជាស៊ីតនៃចំនួនពិតដែលមានតួនីមួយៗ (ក្រៅពីតួទី ១) ស្មើនឹងតួមុនបន្ទាប់បូកចំនួនថេរ d មួយ (ហៅថាផលសងរួម $d = U_{n+1} - U_n$) ។

រូបមន្តតួទូទៅនៃស៊ីតនព្វន្ត

$$U_n = U_1 + (n - 1) \times d$$

ផលបូក n តួនៃស៊ីតនព្វន្ត

$$S_n = \frac{(U_1 + U_n) \times n}{2}$$

មេរៀនទី៣. ស៊ីតធរណីមាត្រ

- ស៊ីតធរណីមាត្រគឺជាស៊ីតចំនួនពិតដែលតួនីមួយៗ (ក្រៅពីតួទី ១) ស្មើនឹងតួមុនបន្ទាប់គុណនឹងចំនួនថេរ q ដែល $q \neq 0$ ។ ចំនួនថេរ q នេះហៅថាផលធៀបរួមស៊ីតធរណីមាត្រ ។

រូបមន្តតួទូទៅនៃស៊ីតធរណីមាត្រ

$$U_{n+1} = U_n \times q, U_n = U_1 \times q^{n-1}$$

ផលបូក n តួដំបូងនៃស៊ីតធរណីមាត្រ

$$S_n = \frac{U_1(q^n - 1)}{q - 1} \text{ ដែល } q \neq 1$$

ផលបូកស៊ីតធរណីមាត្រអនន្ត

$$S_n = \frac{U_1}{1 - q} \text{ បើ } |q| < 1$$

មេរៀនទី៤. ផលបូកតួនៃស៊ីតផ្សេងៗ

- លក្ខណៈនៃស៊ីតម៉ា

លក្ខណៈនៃស៊ីតម៉ា

$$\text{ក. } \sum_{k=1}^n c = nc$$

$$\text{ខ. } \sum_{k=1}^n ca_k = c \sum_{k=1}^n a_k$$

$$\text{គ. } \sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k$$

$$\text{ឃ. } \sum_{k=1}^n (a_k - b_k) = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^n b_k$$

$$\text{ង. } \sum_{k=1}^n (a_k + b_k)^2 = \sum_{k=1}^n a_k^2 + 2 \sum_{k=1}^n a_k b_k + \sum_{k=1}^n b_k^2$$

- រូបមន្តផលបូកសំខាន់ៗ

រូបមន្តផលបូកនៃស៊ីតលំដាប់ខ្ពស់

$$\text{ក. } \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\text{ខ. } \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\text{គ. } \sum_{k=1}^n k^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2$$

$$\text{ឃ. } \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \frac{n}{n+1}$$

$$\text{ង. } \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \frac{n(n+3)}{4(n+1)(n+2)}$$

- ផលសងលំដាប់ទី១ នៃស៊ីត

ជាទូទៅទី១៖ ផលសងលំដាប់ទី១ នៃស៊ីត

- គេមានស៊ីត (a_n) : $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ ហើយ $b_1 = a_2 - a_1, b_2 = a_3 - a_2, b_3 = a_4 - a_3, \dots, b_{n-1} = a_n - a_{n-1}$ ។ ស៊ីត (b_n) : $b_1, b_2, b_3, \dots, b_{n-1}$ ហៅថាផលសងតួលំដាប់ទី ១ នៃស៊ីត (a_n) ។

- គេមានស៊ីត (a_n) និងស៊ីត (b_n) ដែលកំណត់ដោយ $b_n = a_{n+1} - a_n, n = 1, 2, 3, \dots$ តួទី n នៃស៊ីត (a_n) កំណត់ដោយ $a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k$ ចំពោះ $n \geq 2$ ។

- ផលសងលំដាប់ទី២ នៃស៊ីត

ជាទូទៅទី២៖ ផលសងក្នុងលំដាប់ទី២ នៃស្វ៊ីត

• គេមានស្វ៊ីត (a_n) ។ ស្វ៊ីត (b_n) កំណត់ដោយ $b_n = a_{n+1} - a_n, n = 1, 2, 3, \dots$ ហៅថា ផលសងក្នុងលំដាប់ទី 1 នៃស្វ៊ីត (a_n) ដែលមានតួ

ទី n កំណត់ដោយ $a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k$ ចំពោះ $n \geq 2$ ។

• ស្វ៊ីត (c_n) ជាផលសងក្នុងលំដាប់ទី 2 នៃស្វ៊ីត (a_n) គឺជាផលសងក្នុងលំដាប់ទី 1 នៃស្វ៊ីត (b_n) កំណត់ដោយ $c_n = b_{n+1} - b_n, n = 1, 2, 3, \dots$ ដែលមានតួទី n នៃស្វ៊ីត (b_n)

កំណត់ដោយ $b_n = b_1 + \sum_{k=1}^{n-1} c_k$ ចំពោះ $n \geq 2$ ។

បេរ៉ូនីស៊ី. ទំនាក់ទំនងនៃស្វ៊ីត

- កំណត់តួទី n ដោយប្រើស្វ៊ីតជំនួយ

ជាទូទៅទី១៖ កំណត់តួទី n ដោយប្រើស្វ៊ីតជំនួយ

គេប្រើស្វ៊ីតជំនួយ (r_n) ដែល $r_n = \alpha \cdot n + \beta$ (α, β ថេរ) ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ទំនាក់ទំនងនៃស្វ៊ីត ។ ក្នុងករណីនេះ គេជំនួស (r_n) ក្នុងទំនាក់ទំនងនៃស្វ៊ីត រួចគណនាតម្លៃ α និង β បន្ទាប់មកកំណត់បានស្វ៊ីត (r_n) គេនឹងធ្វើផលសង $a_{n+1} - r_n$ ។

- ទំនាក់ទំនងរវាង a_n និង S_n

កំណត់តួទី n ដោយប្រើទំនាក់ទំនង a_n និង S_n

ចំពោះ $n \geq 2$ គេបាន $S_n - S_{n-1} = a_n$ និង $S_1 = a_1$ ។

- ទំនាក់ទំនងកំណត់កំណើន $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$

កំណត់តួទី n ដោយប្រើ ទំនាក់ទំនង កំណត់កំណើន $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$

ដោះស្រាយ $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$ បើទំនាក់ទំនងនៃស្វ៊ីត (a_n) មានទម្រង់ $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$ គេពិចារណាពីចំនួន α និង β ដែលបំពេញលក្ខខណ្ឌ $\alpha + \beta = -p, \alpha\beta = q$ នោះគេបាន $a_{n+2} - (\alpha + \beta)a_{n+1} + \alpha\beta a_n = 0$ ។

ទំនាក់ទំនង នេះ អាច បម្លែង តាមរបៀប ពីរ យ៉ាងដូចខាងក្រោម ៖

$$a_{n+2} - \alpha a_{n+1} = \beta(a_{n+1} - \alpha a_n)$$

$$a_{n+2} - \beta a_{n+1} = \alpha(a_{n+1} - \beta a_n)$$

ទំនាក់ទំនង ទាំង 2 ខាងលើ នេះ គឺ ជា ស្វ៊ីតធរណីមាត្រអាថឱ្យគេរក a_n បាន ។ គេអាចរក α និង β ដោយដោះស្រាយសមីការ $x^2 + px + q = 0$ ព្រោះគេស្គាល់ផលបូកនិងផលគុណវា ។ សមីការ $x^2 + px + q = 0$ ហៅថា "សមីការសម្ពាល់នៃ $a_{n+2} - (\alpha + \beta)a_{n+1} + \alpha\beta a_n = 0$ " ។

មេរៀនទី៤. អនុ.អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

និយមន័យទី ១

ស្វ៊ីយគុណ n នៃចំនួន a ជាផលគុណនៃ n កត្តាដែលកត្តានីមួយៗស្មើនឹង a ។ (មានន័យថា a គុណនឹងខ្លួនឯងចំនួន n ដង) ។ កំណត់ដោយ

$$\underbrace{a \times a \times a \times \cdots \times a}_n = a^n \text{ ដែល } n \in \mathbb{N} \text{ ។}$$

បើ a និង b ជាចំនួនពិត ហើយ m និង n ជាចំនួនគត់ គេបាន៖

$$\begin{aligned} \text{ក. } a^m \times a^n &= a^{m+n} & \text{ខ. } (a^m)^n &= a^{mn} \\ \text{គ. } (ab)^n &= a^n b^n & \text{ឃ. } a^0 &= 1, (a \neq 0) \\ \text{ង. } \frac{a^m}{a^n} &= a^{m-n}, (a \neq 0) \\ \text{ច. } \left(\frac{a}{b}\right)^n &= \frac{a^n}{b^n}, (b \neq 0) \\ \text{ន. } \frac{1}{a^n} &= a^{-n}, (a \neq 0), n \in \mathbb{N} \end{aligned}$$

• ឫសទី n

បើ a ជាចំនួនពិត

$$\begin{aligned} \text{ក. } \sqrt[n]{a^n} &= |a| \text{ បើ } n \text{ គូ} \\ \text{ខ. } \sqrt[n]{a^n} &= a \text{ បើ } n \text{ សេស} \end{aligned}$$

លក្ខណៈឫសទី n

$$\begin{aligned} \text{ក. } \sqrt[n]{a} \times \sqrt[n]{b} &= \sqrt[n]{ab} \\ \text{ខ. } \sqrt[n]{\frac{a}{b}} &= \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}, b \neq 0 \\ \text{គ. } \sqrt[n]{a^m} &= a^{\frac{m}{n}} & \text{ឃ. } \sqrt[n]{\sqrt[k]{a}} &= \sqrt[nk]{a} \\ \text{ង. } \sqrt[nk]{a^{mk}} &= \sqrt[n]{a^m} \end{aligned}$$

• អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល


និយមន័យទី ២

អនុគមន៍ អិចស្ប៉ូណង់ស្យែលគឺជា អនុគមន៍កំណត់ដោយ $f(x) = a^x$ ដែល $x \in \mathbb{R}$ ហើយ a ជាចំនួនពិតវិជ្ជមានខុសពី 1 ។


$$\text{មានន័យថា } \begin{cases} f(x) \\ x \in \mathbb{R} \\ a > 0 \\ a \neq 1 \end{cases} = a^x \text{ ដែល } \begin{cases} x \in \mathbb{R} \\ a > 0 \\ a \neq 1 \end{cases} \text{ ។}$$

ក្រាបនៃអនុ.អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល $y = a^x$ ៖

• $a > 1, y = a^x$ កើនជាដាច់ខាត



• $0 < a < 1, y = a^x$ ចុះជាដាច់ខាត



• សមីការអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

សមីការ អនុគមន៍ អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល ចំពោះគ្រប់ $a > 0; a \neq 1; x \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} \text{ក. } a^x &= a^y \iff x = y \\ \text{ខ. } a^{u(x)} &= a^{v(x)} \iff u(x) = v(x) \\ \text{គ. } [f(x)]^{u(x)} &= [f(x)]^{v(x)} \\ &\iff \begin{cases} f(x) > 0 \\ [f(x) - 1][u(x) - v(x)] = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

• វិសមីការអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

វិសមីការអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែលចំពោះគ្រប់ $a > 0; a \neq 1; x \in \mathbb{R}$

១. បើ $a > 1$

$$\begin{aligned} \text{ក. } a^x &\geq a^y \iff x \geq y & \text{ខ. } a^x > a^y &\iff x > y \\ \text{គ. } a^x &\leq a^y \iff x \leq y & \text{ង. } a^x < a^y &\iff x < y \end{aligned}$$

២. បើ $0 < a < 1$

$$\begin{aligned} \text{ក. } a^x &\geq a^y \iff x \leq y & \text{ខ. } a^x > a^y &\iff x < y \\ \text{គ. } a^x &\leq a^y \iff x \geq y & \text{ង. } a^x < a^y &\iff x > y \end{aligned}$$

៣. ទំនាក់ទំនង $f(x)$ និង $u(x)$ ឬ $v(x)$ ៖

$$\begin{aligned} \text{ក. } [f(x)]^{u(x)} &> [f(x)]^{v(x)} \iff \begin{cases} f(x) > 0 \\ [f(x) - 1][u(x) - v(x)] > 0 \end{cases} \\ \text{ខ. } [f(x)]^{u(x)} &< [f(x)]^{v(x)} \iff \begin{cases} f(x) > 0 \\ [f(x) - 1][u(x) - v(x)] < 0 \end{cases} \end{aligned}$$

• អនុវត្តអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

អនុវត្តន៍ អនុគមន៍ អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល (ប្រាក់សរុប)៖

$$\text{១. } A = P(1 + i)^t \text{ (ទូទាត់ ១ ឆ្នាំម្តង)}$$

$$\text{២. បើ ទូទាត់ } n \text{ ដង ក្នុង មួយឆ្នាំ ៖ } A = P \left(1 + \frac{i}{n}\right)^{nt} \text{ ។}$$

មេរៀនទី៥. អនុគមន៍លោការីត

• អនុគមន៍ប្រាស

និយមន័យទី ១

បើ (a, b) ផ្ទៀងផ្ទាត់ $y = f(x)$ ហើយ (b, a) ផ្ទៀងផ្ទាត់ $f^{-1}(x)$ នោះ $f^{-1}(x)$ ជាអនុគមន៍ប្រាសនៃអនុគមន៍ $f(x)$

របៀបរកអនុគមន៍ប្រាស

- ជំនួស $f(x)$ ដោយ y ។
- ប្តូរ x ទៅជា y និង ប្តូរ y ទៅជា x គេបានសមីការថ្មីរួចចេញរកតម្លៃ y ។
- បើសមីការថ្មីនេះមិនមាន y ជាអនុគមន៍នៃ x ទេ នោះអនុគមន៍ f គ្មានអនុគមន៍ប្រាសទេ ។
- ជំនួស y ដោយ $f^{-1}(x)$ ។

• អនុគមន៍លោការីត

និយមន័យទី ២

បើ $y = a^x$ នោះគេបាន $x = \log_a y$, $y > 0$, $a > 0$, $a \neq 1$ ហើយ $f(x) = a^x$ មានអនុគមន៍ប្រាស $f^{-1}(x) = \log_a x$ ជាអនុគមន៍លោការីតគោល a នៃ x ។

- ករណី $a = 10 \Rightarrow \log_{10} x$ ហៅថា លោការីតទសភាគ ($\log x$) ។
- ករណី $a = e \Rightarrow \log_e x$ ហៅថា លោការីតធម្មជាតិ ឬ នេពែ ($\ln x$) ។

• លក្ខណៈនៃលោការីត

លក្ខណៈលោការីត ($x, y, n, a, b > 0$; $a, b \neq 1$)

- បើ $a^x = n \Rightarrow x = \log_a n$
- $\log_a b \times \log_b c \times \log_c d \times \log_d a = 1$
- $\log_a 1 = 0$
- $\log_b a = \frac{\log_m a}{\log_m b}$ ($m \neq 1, m > 0$)
- $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$
- $\log_a a = 1$
- $\log_{a^\alpha} b = \frac{1}{\alpha} \log_a b$
- $a^{\log_a x} = x$
- $\log_a b \times \log_b a = 1$


• ក្រាបនៃអនុគមន៍លោការីត

អនុគមន៍ $y = a^x$ និង $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)

បើ $a > 1$ នោះក្រាប $y = \log_a x$ កើនពីឆ្វេងទៅស្តាំ ។

$$0 < x < 1 \Rightarrow y = \log_a x < 0$$

$$x > 1 \Rightarrow y = \log_a x > 0$$




អនុគមន៍ $y = a^x$ និង $y = \log_a x$ ($0 < a < 1$)

បើ $0 < a < 1$ នោះក្រាប $y = \log_a x$ ចុះពីឆ្វេងទៅស្តាំ ។

$$0 < x < 1 \Rightarrow y = \log_a x > 0$$

$$x > 1 \Rightarrow y = \log_a x < 0$$



សង្ខេប

- អនុគមន៍ $y = \log_a x$ កាត់តាម ចំណុច $(1, 0)$ ជានិច្ច ។
- អនុគមន៍ $y = \log_a x$ មានន័យចំពោះ $x > 0$ ជានិច្ច ។
- អនុគមន៍ $y = \log_a x$ និង $y = a^x$ មានក្រាបឆ្លុះគ្នាជ្រៀបនឹងបន្ទាត់ $y = x$ ។


• សមីការលោការីត

ជាទូទៅ

បើ $a > 0, a \neq 1$ នោះសមីការ $\log_a x = \log_a y \Rightarrow x = y$ ។


បើ $a > 1$ នោះក្រាប $y = \log_a x$ កើនពីឆ្វេងទៅស្តាំ ៖

- បើ $\log_a x_1 < \log_a x_2 \Rightarrow x_1 < x_2$
- បើ $\log_a x_1 > \log_a x_2 \Rightarrow x_1 > x_2$
- បើ $\log_a x_1 \leq \log_a x_2 \Rightarrow x_1 \leq x_2$
- បើ $\log_a x_1 \geq \log_a x_2 \Rightarrow x_1 \geq x_2$



បើ $0 < a < 1$ នោះក្រាប $y = \log_a x$ ចុះពីឆ្វេងទៅស្តាំ ($x_1, x_2 > 0$) ៖

- បើ $\log_a x_1 < \log_a x_2 \Rightarrow x_1 > x_2$
- បើ $\log_a x_1 > \log_a x_2 \Rightarrow x_1 < x_2$
- បើ $\log_a x_1 \leq \log_a x_2 \Rightarrow x_1 \geq x_2$
- បើ $\log_a x_1 \geq \log_a x_2 \Rightarrow x_1 \leq x_2$



• អនុវត្តលើអនុគមន៍លោការីត

អនុវត្តន៍ការប្រាក់សរុប ៖

☛ $A = P(1 + i)^t$ (ទូទាត់ ១ ឆ្នាំម្តង)

☛ $A = P \left(1 + \frac{i}{n}\right)^{nt}$ (n ដងក្នុងមួយឆ្នាំ)
។

៣ អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

មេរៀនទី១. អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

- ការកំណត់មុំមានទិសដៅ

ជាទូទៅ


☛ $\overrightarrow{OP_0}$ និង $\overrightarrow{OP}$ កំណត់បានមុំ $\alpha + k \times 360^\circ$, $k \in \mathbb{Z}$ (k ជាចំនួនជុំ) ។

☛ មុំ α និង $\alpha + 360^\circ$ មានរង្វាស់ខុសគ្នា តែមានវ៉ិចទ័រគល់ និងចុងដូចគ្នា ។

- រង្វាស់មុំគិតជា រ៉ាដ្យង់

និយមន័យទី១

1 រ៉ាដ្យង់ គឺជា វាស់មុំដែលស្លាក់ធ្នូមួយមានប្រវែងស្មើនឹងកាំនៃរង្វង់ កំណត់សរសេរដោយ 1 rd ។



ជាទូទៅទី១

☛ $360^\circ = 2\pi \text{ rd}$ និង $180^\circ = \pi \text{ rd}$ ។

☛ $1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ rd}$ និង $1 \text{ rd} = \left(\frac{180^\circ}{\pi}\right)$ ។

ជាទូទៅទី២

$(\overrightarrow{OP_0}, \overrightarrow{OP}) = \alpha + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ (k ជាចំនួនជុំ) ។

វិធាននៃការបំប្លែង

☛ ពីដឺក្រេទៅរ៉ាដ្យង់ ៖ គុណនឹង $\frac{\pi}{180}$ ។

☛ ពីរ៉ាដ្យង់ទៅដឺក្រេ ៖ គុណនឹង $\frac{180}{\pi}$ ។

- ស៊ីនុស កូស៊ីនុស តង់សង់ និងកូតង់សង់


ផលធៀបត្រីកោណមាត្រ

☛ $\sin \alpha = \frac{\text{ជ្រុងឈម}}{\text{អ៊ីប៉ូតេនុស}} = \frac{BC}{AC}$

☛ $\cos \alpha = \frac{\text{ជ្រុងជាប់}}{\text{អ៊ីប៉ូតេនុស}} = \frac{AB}{AC}$

☛ $\tan \alpha = \frac{\text{ជ្រុងឈម}}{\text{ជ្រុងជាប់}} = \frac{BC}{AB}$


☛ $\cot \alpha = \frac{\text{ជ្រុងជាប់}}{\text{ជ្រុងឈម}} = \frac{AB}{BC}$



ក្នុងរង្វង់ ត្រីកោណមាត្រ $P(x, y)$ និង $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OP}) = \theta$ ៖

☛ $\sin \theta = \frac{y}{r}$ ☛ $\cos \theta = \frac{x}{r}$

☛ $\tan \theta = \frac{y}{x}$ ☛ $\cot \theta = \frac{x}{y}$



ឈ្មោះអ័ក្ស៖

☛ អ័ក្ស xy' ៖ អ័ក្សស៊ីនុស
អ័ក្សតង់សង់

☛ អ័ក្ស uv' ៖

☛ អ័ក្ស xx' ៖ អ័ក្សកូស៊ីនុស
អ័ក្សកូតង់សង់

☛ អ័ក្ស vv' ៖

តារាងតម្លៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ៖

កាដ្រង់	ដឺក្រេ	រ៉ាដ្យង់	sin	cos	tan	cot
I	0°	0	0	1	0	∞
	30°	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\sqrt{3}$
	45°	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	1
	60°	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
	90°	$\frac{\pi}{2}$	1	0	∞	0
II	120°	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\sqrt{3}$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$
	135°	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1	-1
	150°	$\frac{5\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	$-\sqrt{3}$
	180°	π	0	-1	0	∞
III	210°	$\frac{7\pi}{6}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$-\sqrt{3}$
	225°	$\frac{5\pi}{4}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	1
	240°	$\frac{4\pi}{3}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
	270°	$\frac{3\pi}{2}$	-1	0	∞	0
IV	300°	$\frac{5\pi}{3}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\sqrt{3}$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$
	315°	$\frac{7\pi}{4}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1	-1
	330°	$\frac{11\pi}{6}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	$-\sqrt{3}$

- សញ្ញា នៃ អនុគមន៍ ត្រីកោណមាត្រ

	កាដ្រង់ទី I	កាដ្រង់ទី II	កាដ្រង់ទី III	កាដ្រង់ទី IV
sin	+	+	-	-
cos	+	-	-	+
tan	+	-	+	-
cot	+	-	+	-