



សន្លឹករូបមន្តសង្ខេប៖ គណិតវិទ្យា


រៀបចំដោយ៖ គ្រូបង្រៀនវិទ្យាសាលារៀនជំនាន់ថ្មី (NGS) ភ្នំពេញ

ថ្នាក់ទី ៨


១. ចំនួនសនិទាន

និយមន័យ៖ ចំនួន សនិទាន គឺជា ចំនួន ដែល អាច សរសេរជា រាងប្រភាគ $\frac{a}{b}$ ដែល $a, b \in \mathbb{Z}$ (ចំនួនគត់ វិជ្ជាទីប) និង $b \neq 0$ ។ ចំនួនសនិទានអាចជាចំនួនគត់ ឬ ទសភាគខួប ។

ដូចគ្នាទៅនឹងទំនាក់ទំនងសំណុំចំនួន៖



ការដៅចំណុចនៅលើបន្ទាត់ចំនួន៖



ប្រមាណវិធីលើចំនួនសនិទាន៖

- បូក និង ដក៖ ត្រូវតម្រូវភាគបែងរួម

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{ad \pm bc}{bd}$$

- គុណ៖ $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$

- ចែក៖ $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}$

ចំណាំ

+ សញ្ញាប្រភាគ៖ $\frac{-a}{b} = \frac{a}{-b} = -\frac{a}{b}$

+ ចម្រាស់នៃ $\frac{a}{b}$ គឺ $\frac{b}{a}$

+ ចំនួនផ្ទុយនៃ $\frac{a}{b}$ គឺ $-\frac{a}{b}$

២. ស្វ័យគុណ

១. និយមន័យ និង វាក្យស័ព្ទ

ស្វ័យគុណ n នៃ a គឺជាផលគុណនៃកត្តា a ចំនួន n ដង ។

a^n ← និស្សន្ទ = $\underbrace{a \times a \times \dots \times a}_n$
↑
គោល

២. រូបមន្តគ្រឹះ ($a, b \neq 0$)

- ផលគុណ និងផលចែក (គោលដូចគ្នា)៖

$$a^m \times a^n = a^{m+n} \quad \text{និង} \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

- ស្វ័យគុណនៃស្វ័យគុណ៖

$$(a^m)^n = a^{m \times n}$$

- ស្វ័យគុណនៃផលគុណ និងផលចែក៖

$$(a \times b)^n = a^n \times b^n \quad \text{និង} \quad \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

៣. ស្វ័យគុណជាប្រភាគ (វ៉ាឌីកាល់/ឫស)

- $a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$ (ឧ. $25^{\frac{1}{2}} = \sqrt{25} = 5$)

- $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$

ករណីពិសេស និងការប្រុងប្រយ័ត្ន!

- $a^0 = 1$ និង $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

- ប្រយ័ត្នទីតាំងសញ្ញាដក៖ $-3^2 \neq (-3)^2$

$$-3^2 = -(3 \times 3) = -9$$

(និស្សន្ទមិនគ្របដណ្តប់សញ្ញាដក)

$$(-3)^2 = (-3) \times (-3) = 9$$

(និស្សន្ទគ្របដណ្តប់ទាំងសញ្ញាដក)

- បើគោលអវិជ្ជមាន៖ និស្សន្ទគូ

$$\Rightarrow (+), \text{និស្សន្ទសេស} \Rightarrow (-)$$

៤. សមីការស្វ័យគុណ (Exponential Eqs)

បើគោលសងខាងដូចគ្នា គេអាចផ្ទេរនិស្សន្ទបាន ។

ទ្រឹស្តីបទ៖ បើ $a^x = a^y$ នោះ គេ ទាញ បាន $x=y$

(លុះត្រាតែ $a \neq -1, 0, 1$) ។

$$\text{ឧទាហរណ៍៖ } 2^x = 8 \Rightarrow 2^x = 2^3 \Rightarrow x=3$$

៥. ទម្រង់ស្តង់ដារ (ទម្រង់វិទ្យាសាស្ត្រ)

ការសរសេរចំនួនធំពេក ឬតូចពេក ជា រាង $A \times 10^n$

ដែល $1 \leq A < 10$ និង n ជាចំនួនគត់ ។

$$35000 = 3.5 \times 10^4$$

រំកិលឆ្វេង 4 ខ្ទង់ $\Rightarrow n = +4$

$$0.0072 = 7.2 \times 10^{-3}$$

រំកិលស្តាំ 3 ខ្ទង់ $\Rightarrow n = -3$

៣. ទំហំសមាមាត្រ និងភាគរយ

សមាមាត្រ៖ ជាភាពស្មើគ្នានៃផលធៀបពីរ ។ បើ $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$
នោះគេបានផលគុណខ្វែង $ad=bc$ ។

បច្ចេកទេសទាញរកអញ្ញាត (Algebraic Manipulation)

សម្រាប់សមីការសមាមាត្រ $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ ៖

- a. ផលគុណខ្វែង៖ យកភាគយកនៃភាគទី១ គុណនឹង ភាគបែងនៃភាគទី២ ស្មើនឹង ភាគយកនៃភាគទី២ គុណនឹងភាគបែងនៃភាគទី១ ។

$$ad=bc$$


- b. ការទាញរកអញ្ញាត (ឧ. រក b)៖

- ជំហានទី ១៖ រៀបចំសមីការឱ្យបាន $bc=ad$ (ប្តូរអង្គ)

- ជំហានទី ២៖ ចែកអង្គទាំងពីរនឹង c ដើម្បីទុក b នៅម្នាក់ឯង៖ $\frac{bc}{c} = \frac{ad}{c}$

- លទ្ធផល៖ $b = \frac{ad}{c}$

១. ក្រាបសមាមាត្រត្រង់ (Direct Proportion)



ច្បាប់៖ នៅពេល x កើន k ដង y ក៏កើន k ដងដែរ (k ហៅថា មេគុណសមាមាត្រ) ។

២. ភាគរយ និងផលប្រយោជន៍

- ភាគរយចំណេញ៖ $\frac{\text{ប្រាក់ចំណេញ}}{\text{ប្រាក់ដើម}} \times 100\%$
- ភាគរយខាត៖ $\frac{\text{ប្រាក់ខាត}}{\text{ប្រាក់ដើម}} \times 100\%$
- តម្លៃ លក់ ក្រោយ បញ្ចុះ៖ តម្លៃលក់ $\times (1 - \text{អត្រាបញ្ចុះ})$

▶ ៣. ការប្រាក់ សាមញ្ញ (Simple Interest) រូបមន្ត៖ $I=P \times R \times T$

- I : ការប្រាក់ដែលទទួលបាន (Interest)
- P : ប្រាក់ដើម (Principal)
- R : អត្រា ការប្រាក់គិតជា ភាគរយ (Rate) - (ត្រូវ ប្តូរ ជា លេខទសភាគ ឧ. $5\%=0.05$)
- T : ពេលវេលាគិតជាឆ្នាំ (Time)

គន្លឹះដោះស្រាយការប្រាក់

ប្រសិនបើពេល (T) គិតជាខែ ត្រូវប្តូរទៅជាឆ្នាំ
ដោយចែកនឹង ១២ ។

ឧ. ៦ ខែ $= \frac{6}{12} = 0.5$ ឆ្នាំ ។

៤. ទ្វារសំន្ទាត់

ល្បឿន ចម្ងាយ និង ពេល៖

$d=v \times t$
 $v=\frac{d}{t}$
 $t=\frac{d}{v}$

ម៉ាស់មាឌ៖ $D=\frac{m}{V}$
(D : ម៉ាស់មាឌ, m : ម៉ាស់, V : មាឌ)

ទំនាក់ទំនងមាឌ និង ចំណុះ៖
 $1 \text{ m}^3=1000 \text{ dm}^3=1000 \text{ L}$
 $1 \text{ dm}^3=1 \text{ L}, \quad 1 \text{ cm}^3=1 \text{ mL}=1 \text{ cc}$


៥. កន្សោមពិសេស

▶ ១. ឯកលក្ខណៈភាពសំខាន់ៗ

- ដឺក្រេទី ២៖
 - $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$
 - $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$
 - $a^2-b^2=(a-b)(a+b)$

- ដឺក្រេទី ៣៖
 - $(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$
 - $(a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$
 - $a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$
 - $a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$

▶ ២. ការបកស្រាយ $a^2-b^2=(a-b)(a+b)$ តាម ធរណីមាត្រ



- រូបទី១៖ ផ្ទៃសរុប មានរាងជា អក្សរ L (ពណ៌ខៀវ + បៃតង) គឺស្មើនឹង ការ៉េធំ a^2 ដក ការ៉េតូច b^2 ចេញ
 $\Rightarrow$ ផ្ទៃដែលនៅសល់ $=a^2-b^2$ ។
- រូបទី២៖ គេកាត់ផ្ទៃពណ៌បៃតងយកទៅផ្គុំពីលើផ្ទៃពណ៌ខៀវ បង្កើតបានជាចតុកោណកែងថ្មីមួយ ។
- ចតុកោណកែងថ្មីនេះ មានបណ្តោយ $(a+b)$ និងទទឹង $(a-b) \Rightarrow$ ផ្ទៃសរុប $=(a-b)(a+b)$ ។
- សន្និដ្ឋាន៖ ដោយសារផ្ទៃទាំងពីរជារូបតែមួយ គេទាញបាន $a^2-b^2=(a-b)(a+b)$ ។

▶ ៣. វិធីសាស្ត្រដាក់ជាផលគុណកត្តា

- ចាប់កត្តារួម៖ $ax+ay=a(x+y)$ (ឧ. $4x^2-6x=2x(2x-3)$)
- ប្រើឯកលក្ខណៈភាព៖ សង្កេតមើលរាងការ៉េ។ (ឧ. $x^2-25=x^2-5^2=(x-5)(x+5)$)
- ផ្គុំគ្នា៖ ប្រើពេលមាន ៤ តួឡើងទៅ។ (ឧ. $ax+ay+bx+by=a(x+y)+b(x+y)=(x+y)(a+b)$)

ការបំបែកកត្តាកណ្តាល (ត្រីធា ax^2+bx+c)

ត្រូវរកពីរចំនួន p និង q ដែល៖ ផលបូក $p+q=b$ និង ផលគុណ $p \times q=a \times c$ ។

ឧទាហរណ៍៖ x^2+5x+6
មាន $p+q=5$ និង $p \times q=6$ នោះទាញបាន $p=2, q=3$ ។
 $\Rightarrow x^2+5x+6=(x+2)(x+3)$ ។

៦. កន្សោមសនិទាន

▶ ១. និយមន័យ និង លក្ខខណ្ឌមានន័យ

កន្សោមសនិទានជា រាងប្រភាគ $\frac{A}{B}$ ដែល A និង B ជា ពហុធា ។

លក្ខខណ្ឌមានន័យ៖ ភាគបែង ត្រូវតែខុសពី សូន្យ ($B \neq 0$) ។

ឧទាហរណ៍៖ $F=\frac{x+3}{x-2}$ មានន័យ កាលណា $x-2 \neq 0 \Rightarrow x \neq 2$ ។

▶ ២. ជំហានសម្រួលកន្សោមសនិទាន



▶ ៣. ប្រមាណវិធីលើកកន្សោមសនិទាន


- វិធីបូក និងដក៖
 - ភាគបែងដូចគ្នា៖ $\frac{A}{D} \pm \frac{B}{D} = \frac{A \pm B}{D}$
 - ភាគបែងខុសគ្នា៖ ត្រូវតម្រូវភាគបែងរួម (រក LCM) មុននឹងបូកដកភាគយក ។
- វិធីគុណ៖
 - គុណភាគយកនិងភាគយក, ភាគបែងនិងភាគបែង ។
 $\frac{A}{B} \times \frac{C}{D} = \frac{A \times C}{B \times D}$ (ត្រូវ សម្រួល មុននឹង គុណបញ្ចូល)
- វិធីចែក៖
 - ប្តូរ ការចែកទៅជា ការគុណនឹងចម្រាស់នៃប្រភាគទី២ ។
 $\frac{A}{B} \div \frac{C}{D} = \frac{A}{B} \times \frac{D}{C}$ (ដែល $C \neq 0$)

៧. សមីការដឺក្រេទី១ មាន១អញ្ញាត

ទម្រង់ទូទៅ៖ $ax+b=0$ ($a \neq 0$) មានឫស $x=-\frac{b}{a}$ ។

វិធាននៃការដោះស្រាយ៖

បោះតួមានអញ្ញាតទៅអង្គទី១ និងតួលេខទៅអង្គទី២ ដោយត្រូវប្តូរសញ្ញាពេលឆ្លងកាត់សញ្ញាស្មើ (=) ។



$$2x + 1 = 5 \Rightarrow 2x = 4 \Rightarrow x = 2$$

ករណីពិសេស (ពេលអញ្ញាត x ស៊ីសងអស់)៖

- បើទាញបានទម្រង់ $0x=0 \Rightarrow$ សមីការមានឫសរាប់មិនអស់ ($x \in \mathbb{R}$) ។
- បើទាញបានទម្រង់ $0x=c$ (ដែល $c \neq 0$) $\Rightarrow$ សមីការគ្មានឫសទេ ។


វិធីសាស្ត្រដោះស្រាយចំណោទ (៤ជំហាន)៖

1. ជ្រើសរើសអញ្ញាត៖ តាង x ជាអ្វីដែលប្រធានសួររកព្រមទាំងដាក់លក្ខខណ្ឌខ្នាត ។
2. បង្កើត សមីការ៖ បកប្រែ បម្រាប់ ប្រធាន ទៅជាប្រយោគករណីតវិទ្យា ។
3. ដោះស្រាយសមីការ៖ រកតម្លៃ x តាមវិធានខាងលើ ។
4. ផ្ទៀងផ្ទាត់ និង ឆ្លើយ៖ យក ចម្លើយ ទៅ ផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌ និងប្រធាន រួចសន្និដ្ឋាន ។

៨. វិសមីការដឺក្រេទី១ មាន១អញ្ញាត

ទម្រង់ទូទៅ៖ $ax + b > 0, ax + b < 0, ax + b \geq 0, ax + b \leq 0$ (ដែល $a \neq 0$) ។

ក្រាបតំណាងចម្លើយ និងការសរសេរជាចន្លោះ៖



ការប្រើប្រាស់រង្វង់ក្រចក និងឃ្លាប៖

- សញ្ញា $>$ ឬ $<$ (ដាច់ខាត) $\Rightarrow$ ប្រើរង្វង់ក្រចក (និង) ឃ្លាបបែរចេញពីរលកចម្លើយ (មានន័យថាមិនយកតម្លៃត្រង់ចំណុចនោះទេ) ។
- សញ្ញា $\geq$ ឬ $\leq$ (ឬស្មើ) $\Rightarrow$ ប្រើឃ្លាប [និង] បែរចូលតំបន់ចម្លើយ (មានន័យថាយកតម្លៃត្រង់ចំណុចនោះ) ។


ប្រុងប្រយ័ត្នបំផុត

វិសមីការ មានលក្ខណៈដូចសមីការដែរ (អាចបោះតួបូកដកបានធម្មតា) ប៉ុន្តែ៖ នៅពេលដែលអ្នក គុណ ឬ ចែក អង្គទាំងពីរនៃវិសមីការនឹង ចំនួនអវិជ្ជមាន ($-ve$) អ្នកត្រូវតែប្តូរទិសដៅ វិសមភាពភ្លាមៗ ។

$$\begin{aligned} \text{ឧទាហរណ៍៖ } & -2x > 4 \\ \Rightarrow & x < \frac{4}{-2} \\ \Rightarrow & x < -2 \text{ (ផ្លូវពី } > \text{ ទៅ } < \text{)} \end{aligned}$$

៩. ប្លង់កូអរដោនេ និង ប្រាម

ប្រព័ន្ធកូអរដោនេអរតូណរមេ៖ ផ្សំឡើងដោយអ័ក្សកែងគ្នាពីរ គឺអ័ក្សដេក (អាបស៊ីស $x'Ox$) និងអ័ក្សឈរ (អរដោនេ $y'Oy$) កាត់គ្នាត្រង់គល់តម្រុយ O ។



► រូបមន្តសំខាន់ៗរវាងពីរចំណុច A និង B ៖

- ប្រវែង ឬចម្ងាយ AB (តាមទ្រឹស្តីបទពីតាក្លរ)៖

$$d = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

- កូអរដោនេចំណុចកណ្តាល I នៃអង្កត់ $[AB]$ ៖

$$I \left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2} \right)$$

- មេគុណប្រាប់ទិស (Slope) នៃបន្ទាត់ (AB) ៖


$$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

១០. ស្ថិតិ


រង្វាស់ទីតាំងកណ្តាល៖

- មធ្យម ($\bar{x}$)៖ $\bar{x} = \frac{\text{ផលបូកទិន្នន័យសរុប}}{\text{ចំនួនទិន្នន័យ (n)}}$
- មេដ្យាន (Me)៖ ជាតម្លៃ ដែល នៅ ចំ កណ្តាល គេ បន្ទាប់ពីរៀបទិន្នន័យតាមលំដាប់ ។
 $SD + \text{ទីតាំងមេដ្យាន} = \frac{n+1}{2}$
 + បើ n សេស៖ Me គឺតួទី $\frac{n+1}{2}$ ។
 + បើ n គូ៖ Me ជាមធ្យមនៃពីរតួកណ្តាល ។
- ម៉ូត (Mo)៖ ជាតម្លៃទិន្នន័យ ដែល មាន ប្រេកង់ខ្ពស់ជាងគេ (អាចមានមួយ ច្រើន ឬគ្មានម៉ូត) ។


ក្រាបសសរ៖ បង្ហាញទិន្នន័យដាច់ៗពីគ្នា ។



អ៊ីស្តូក្រាម៖ បង្ហាញទិន្នន័យជាប់គ្នាជាថ្នាក់ ។



ក្រាបផ្ចិត (តំណាងទិន្នន័យជាភាគរយ)៖



មុំផ្ចិត នៃ ក្រាប ផ្ចិត៖ មុំ = ប្រេកង់រ៉ឺឡាទីប $\times 360^\circ$ ឬ ភាគរយ $\times 3.6^\circ$ ។


១១. ប្រូបាប

ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ A ៖

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{\text{ករណីស្រប}}{\text{ករណីអាច}}$$

($n(S)$ គឺជាចំនួនធាតុនៃលំហសំណាកសរុប)

ឧទាហរណ៍ កង់រិល (Spinner)៖



ក្នុងកង់រិលនេះ៖ លំហសំណាកមាន ៤ ចំណែក ។


$$P(A) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}, \quad P(B) = \frac{1}{4}, \quad P(C) = \frac{1}{4} \text{ ។}$$

លក្ខណៈគ្រឹះ៖

- $0 \leq P(A) \leq 1$ (មិនអាចតូចជាង ០ ឬធំជាង ១)
- ព្រឹត្តិការណ៍ប្រាកដ $P(A)=1$
- ព្រឹត្តិការណ៍មិនអាច $P(A)=0$
- ព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទុយ $\bar{A}$ គឺ $P(\bar{A})=1 - P(A)$

១២. ទ្រឹស្តីបទពីតាករ

ទ្រឹស្តីបទពីតាករ៖ ក្នុងត្រីកោណកែង ការ៉េនៃរង្វាស់អ៊ីប៉ូតេនុស ស្មើនឹងផលបូកការ៉េនៃរង្វាស់ជ្រុងមុំកែង ។



$$\text{រូបមន្ត៖ } a^2 = b^2 + c^2 \Rightarrow a = \sqrt{b^2 + c^2}$$


ប្រាសទ្រឹស្តីបទពីតាករ៖ បើ $a^2 = b^2 + c^2$ នោះត្រីកោណនោះជា ត្រីកោណកែង ។

ចំនួនពីតាករញឹកញាប់៖ (3, 4, 5), (5, 12, 13), (6, 8, 10), (8, 15, 17) ។


១៣. ការរៀបរៀងត្រីកោណ

ពីរត្រីកោណប៉ុនគ្នា ($\cong$) កាលណាវាមានជ្រុងត្រូវគ្នា និងមុំត្រូវគ្នាប៉ុនគ្នា ។ គេចែកករណីប៉ុនគ្នាជា ២ ផ្នែក៖

► ១. ករណីត្រីកោណទូទៅ



► ២. ករណីត្រីកោណកែង



ចំណាំ៖ ត្រីកោណដូចគ្នា (~)


មិនត្រូវច្រឡំនឹងត្រីកោណដូចគ្នាទេ! ត្រីកោណដូចគ្នាគឺមានរាងដូចគ្នា តែទំហំអាចខុសគ្នា។ ករណីដូចគ្នាមាន៖ ម.ម (មុំ-មុំ), ៨.ម.៨ (ជ្រុងសមាមាត្រ និងមុំមួយប៉ុនគ្នា), និង ៨.៨.៨ (ជ្រុងទាំង៣ សមាមាត្រគ្នា)។

១៤. ចតុកោណ

និយមន័យ៖ ជាពហុកោណដែលមានជ្រុងបួន និងមុំបួន។ យើងចែកប្រភេទចតុកោណតាមលក្ខណៈស្របនៃជ្រុងរបស់វា៖

► ១. ប្រលេឡូក្រាម (Parallelogram)

និយមន័យ៖ ជាចតុកោណដែលមានជ្រុងឈមស្របគ្នាពីរគូ។




លក្ខណៈ៖

- ជ្រុងឈមស្របគ្នា ($AD \parallel BC, AB \parallel DC$) និងប៉ុនគ្នា ($AD=BC, AB=DC$)។
- មុំឈមប៉ុនគ្នា ($\angle A=\angle C, \angle B=\angle D$)។
- មុំជាប់គ្នាមានផលបូក 180° ($\angle A + \angle B=180^\circ$, ជាដើម)។
- អង្កត់ទ្រូងទាំងពីរកាត់ពុះគ្នាត្រង់ចំណុចកណ្តាល ($AO=CO, BO=DO$)។

► ២. ចតុកោណកែង (Rectangle)


និយមន័យ៖ ជាប្រលេឡូក្រាមដែលមានមុំកែង។



លក្ខណៈ៖ មានមុំទាំងបួនជាមុំកែង និងអង្កត់ទ្រូងទាំងពីរមានប្រវែងប៉ុនគ្នា ($AC=BD$ និង $AO=BO=CO=DO$)។

► ៣. ចតុកោណស្មើ (Rhombus)


និយមន័យ៖ ជាប្រលេឡូក្រាមដែលមានជ្រុងទាំងបួនប៉ុនគ្នា។



លក្ខណៈ៖ មានជ្រុងទាំងបួនប៉ុនគ្នា ($AB=BC=CD=DA$) អង្កត់ទ្រូងទាំងពីរកែងគ្នា ($AC \perp BD$) និងកាត់ពុះមុំ។

► ៤. ការ៉េ (Square)


និយមន័យ៖ ជាចតុកោណដែលមានជ្រុងទាំងបួនប៉ុនគ្នា និងមុំទាំងបួនជាមុំកែង។ (វាមានលក្ខណៈជាចតុកោណកែង និងស្មើ)។



លក្ខណៈ៖ មានគ្រប់លក្ខណៈនៃចតុកោណកែង និងចតុកោណស្មើ។ (ជ្រុងប៉ុនគ្នា, មុំកែង, អង្កត់ទ្រូងកែងគ្នា និងប៉ុនគ្នា $AC=BD$ និង $AO=BO=CO=DO$)។

► ៥. ចតុកោណញ្ជាយ (Trapezoid)


និយមន័យ៖ ជាចតុកោណដែលមានជ្រុងឈមពីរស្របគ្នា (ហៅថាបាត)។




លក្ខណៈ៖ មានជ្រុងពីរស្របគ្នា ($AB \parallel DC$)។ មុំនៅបាតទាំងពីរស្របគ្នា $\angle A + \angle D=180^\circ, \angle B + \angle C=180^\circ$ ។ (ចតុកោណញ្ជាយសមបាតមានមុំបាតប៉ុនគ្នា $\angle A=\angle B, \angle C=\angle D$ និងអង្កត់ទ្រូងប៉ុនគ្នា $AC=BD$)។

១៥. ផ្ទៃក្រឡាពហុកោណ


► ១. ត្រីកោណ និង ការ៉េ



► ២. ចតុកោណកែង និង ប្រលេឡូក្រាម



► ៣. ចតុកោណស្មើ និង ចតុកោណញ្ជាយ




បរិមាត្រ (Perimeter)

បើចង់រកបរិមាត្រនៃពហុកោណណាមួយ អ្នកគ្រាន់តែយកប្រវែងជ្រុងទាំងអស់នៅជុំវិញខាងក្រៅ បូកបញ្ចូលគ្នាជាការស្រេច។

១៦. រង្វង់


រង្វង់ $C(O, R)$ ជាសំណុំចំណុចនៅក្នុងប្លង់ ដែលមានចម្ងាយស្មើគ្នា R (កាំ) ពីចំណុចនិងមួយ O (ផ្ចិត) ។

► ១. រូបមន្តគ្រឹះ និង ផ្នែកផ្សេងៗនៃរង្វង់



- អង្កត់ធ្នូ (Diameter)៖ $D=2R$
- បរិមាត្រ (Circumference)៖ $C=2\pi R=\pi D$
- ផ្ទៃក្រឡា (Area)៖ $S=\pi R^2$ ($\pi \approx 3.14$ ឬ $\frac{22}{7}$)


► ២. ចម្រៀករង្វង់ និង ប្រវែងធ្នូ



បើមុំផ្ចិត α គិតជាដឺក្រេ ($^{\circ}$) នោះគេបាន៖

- ប្រវែងធ្នូ L ៖ $L=\frac{\pi R \alpha}{180^{\circ}}$
- ផ្ទៃក្រឡាចម្រៀករង្វង់៖ $S_{ចម្រៀក}=\frac{\pi R^2 \alpha}{360^{\circ}}$


► ៣. ការកំណត់រង្វង់



- តាម ចំណុច A មួយ៖ គេ អាច គូស បាន រង្វង់ ច្រើន រាប់មិនអស់ ។ ផ្ចិត នៃ រង្វង់ ទាំងនេះ ស្ថិត នៅ ក្នុង ប្លង់ នៃ រូប របស់ វា ។

- តាម ពីរ ចំណុច A និង B ៖ គេ អាច គូស បាន រង្វង់ ច្រើន រាប់មិនអស់ ។ ផ្ចិត នៃ រង្វង់ ទាំងនេះ ស្ថិត នៅ លើ មេ ដ្យាទ័រ នៃ អង្កត់ AB ។

► ៤. លក្ខណៈមុំផ្ចិត និង ធ្នូ



មុំផ្ចិត ជាមុំដែលមានកំពូលនៅត្រង់ផ្ចិត O នៃរង្វង់ ។

- ក្នុងរង្វង់មួយ ប្រវែងធ្នូប៉ុនគ្នា បើមុំផ្ចិតប៉ុនគ្នា នោះធ្នូស្មើគ្នា ក៏ប៉ុនគ្នាដែរ ។


$$\text{បើ } \angle AOB = \angle COD \Rightarrow \text{ធ្នូ } AB = \text{ធ្នូ } CD$$

- ប្រាសមកវិញ៖ បើផ្ចិតមានរង្វាស់ប៉ុនគ្នា នោះវានឹងបង្កើតបានមុំផ្ចិតប៉ុនគ្នាដែរ ។

១៧. បន្ទាត់ពិសេសក្នុងត្រីកោណ


ក្នុងត្រីកោណមានបន្ទាត់ពិសេសចំនួន ៤ ប្រភេទ ដែលបន្ទាត់នីមួយៗមានតួនាទី លក្ខណៈ និងចំណុចប្រសព្វ (Intersection) ខុសៗគ្នាទាំងស្រុង៖

► ១. មេដ្យាន (Median)




- និយមន័យ៖ ភ្ជាប់ពីកំពូលទៅចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុងឈម ។
- ចំណុចប្រសព្វ៖ ហៅថា ទីប្រជុំទម្ងន់ (G) (Centroid) ដែលជាផ្ចិតទម្ងន់នៃត្រីកោណ ។
- លក្ខណៈ ពិសេស៖ មេដ្យាន ចែក ត្រីកោណ ជាពីរ មានផ្ទៃ ក្រឡា ប៉ុនគ្នា ។ ទំនាក់ទំនង ប្រវែង៖ $AG=\frac{2}{3}AM$ ។

► ២. កម្ពស់ (Altitude)




- និយមន័យ៖ គូសចេញពីកំពូលកែងទៅនឹងជ្រុងឈម (ឬបន្តាយជ្រុងឈម) ។
- ចំណុចប្រសព្វ៖ ហៅថា អរតូសង់ (H) (Orthocenter) ។
- លក្ខណៈ ពិសេស៖ ប្រើ សម្រាប់ គណនា ផ្ទៃក្រឡា ត្រីកោណ $S=\frac{1}{2}bh$ ។

► ៣. ពុំមុំ (Angle Bisector)



- និយមន័យ៖ បន្ទាត់ដែលពុំមុំក្នុងត្រីកោណជាពីរមុំប៉ុនៗគ្នា ។
- ចំណុចប្រសព្វ៖ ហៅថា ផ្ចិតរង្វង់ចារឹកក្នុង (I) ។
- លក្ខណៈពិសេស៖ ចំណុច I មានចម្ងាយស្មើគ្នាទៅនឹងជ្រុងទាំងបីនៃត្រីកោណ (r =កាំរង្វង់ចារឹកក្នុង) ។


► ៤. មេដ្យាទ័រ (Perp. Bisector)



- និយមន័យ៖ បន្ទាត់កែងនឹងជ្រុងត្រង់ចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុងនោះ ។
- ចំណុចប្រសព្វ៖ ហៅថា ផ្ចិតរង្វង់ចារឹកក្រៅ (O) ។
- លក្ខណៈពិសេស៖ ចំណុច O មានចម្ងាយស្មើគ្នាទៅនឹងកំពូលទាំងបីនៃត្រីកោណ ($OA=OB=OC=R$) ។

▶ ១. ព្រិស និង ស៊ីឡាំង

លក្ខណៈរួម៖ មានបាតពីរស្របគ្នា និងប៉ុនគ្នា។ កម្ពស់ h ជាចម្ងាយរវាងបាតទាំងពីរ។




រូបមន្តទូទៅ (ស៊ីឡាំង & ព្រិស)៖
តាង $S_{\text{បាត}}$ ជាផ្ទៃក្រឡាបាត និង $P_{\text{បាត}}$ ជាបរិមាត្របាត៖

- មាឌ៖ $V = S_{\text{បាត}} \times h$
- ផ្ទៃខាង៖ $S_{\text{ខាង}} = P_{\text{បាត}} \times h$
- ផ្ទៃសរុប៖ $S_{\text{សរុប}} = S_{\text{ខាង}} + 2S_{\text{បាត}}$

▶ ២. កោន និង ពីរ៉ាមីត

លក្ខណៈរួម៖ មានបាតតែមួយ និងកំពូលស្របចម្ងាយ។




រូបមន្តទូទៅ (កោន & ពីរ៉ាមីត)៖

- មាឌ៖ $V = \frac{1}{3} S_{\text{បាត}} \times h$
- ផ្ទៃខាង៖ $S_{\text{ខាង}} = \frac{1}{2} P_{\text{បាត}} \times l$
- ផ្ទៃសរុប៖ $S_{\text{សរុប}} = S_{\text{ខាង}} + S_{\text{បាត}}$

បញ្ជាក់៖ l ហៅថា ជនេត្រ សម្រាប់កោន និងហៅថា អ័ប្ស័តេស សម្រាប់ពីរ៉ាមីត។

▶ ៣. ស្វ័រ (Sphere)




មាឌ៖ $V = \frac{4}{3} \pi R^3$ | ផ្ទៃសរុប៖ $S = 4\pi R^2$

រំលឹកផ្ទៃក្រឡាបាត ($S_{\text{បាត}}$) និង ការប្តូរឯកតា

- រង្វង់ (បាតស៊ីឡាំង/កោន)៖ $S = \pi r^2$ និង បរិមាត្រ $P = 2\pi r$
- ការ៉េ៖ $S = a^2$ | ចតុកោណកែង៖ $S = \text{បណ្តោយ} \times \text{ទទឹង}$
- ត្រីកោណ៖ $S = \frac{1}{2} \times \text{បាត} \times \text{កម្ពស់}$

ឯកតា មាឌ ចំណុះ៖ $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ លីត្រ}$,
 $1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ លីត្រ}$, $1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ mL}$ ។

និយមន័យ៖ មាត្រដ្ឋាន (S) ជាផលធៀបរវាងប្រវែងនៅលើប្លង់ ឬ គំនូសផែនទី (d) និង ប្រវែងពិតប្រាកដ (D) ដោយប្រវែងទាំងពីរត្រូវគិតជា ឯកតាដូចគ្នា។



រូបមន្ត៖

$$\text{មាត្រដ្ឋាន} = \frac{\text{ប្រវែងលើប្លង់}}{\text{ប្រវែងពិត}} \Rightarrow S = \frac{d}{D}$$

គន្លឹះឯកតា និងការទាញរូបមន្ត

១. ការប្តូរឯកតា៖ ជាទូទៅ គេទម្លាប់ប្តូរឯកតាទៅជាសង់ទីម៉ែត្រ (cm) ជានិច្ច មុននឹងគណនាមាត្រដ្ឋាន។ អ្នកត្រូវចាំថា៖

- $1 \text{ km} = 1,000 \text{ m} = 100,000 \text{ cm}$
- $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$

២. ការទាញរូបមន្តប្រវែងផ្សេងទៀត៖

- ចង់រកប្រវែងលើប្លង់៖ $d = S \times D$
- ចង់រកប្រវែងពិត៖ $D = \frac{d}{S}$

▶ ឧទាហរណ៍អនុវត្តន៍៖

ចម្ងាយលើផែនទីពីផ្ទះទៅសាលារៀនគឺ $d = 1 \text{ cm}$ ដែលវាតំណាងឱ្យចម្ងាយពិតប្រាកដ $D = 5 \text{ km}$ ។ ចូររកមាត្រដ្ឋាននៃផែនទីនេះ។

ដំណោះស្រាយ៖

- ជំហានទី១៖ ប្តូរឯកតាជាមុនសិន


$$D = 5 \text{ km} = 5 \times 100,000 \text{ cm} = 500,000 \text{ cm}$$

- ជំហានទី២៖ គណនាផលធៀប

$$\text{មាត្រដ្ឋាន } S = \frac{d}{D} = \frac{1 \text{ cm}}{500,000 \text{ cm}} = \frac{1}{500,000}$$

- ចម្លើយ៖ គេច្រើនសរសេរមាត្រដ្ឋានជាវាងផលធៀប $1 : 500,000$ ។

នៅពេលបន្ទាត់ស្របពីរ ($L_1 \parallel L_2$) ត្រូវកាត់ដោយបន្ទាត់ទី៣ (T) ហៅថាខ្សែកាត់ វានឹងបង្កើតបានមុំ ៨ ដែលមានលក្ខណៈពិសេសដូចខាងក្រោម៖



លក្ខណៈនៃមុំមុំនីមួយៗ៖

- មុំទល់កំពូល (ប៉ុនគ្នា)៖ $\angle 1 = \angle 3, \angle 2 = \angle 4 \dots$
- មុំស្លាស់ក្នុង (ប៉ុនគ្នា)៖ $\angle 3 = \angle 5$ និង $\angle 4 = \angle 6$
- មុំស្លាស់ក្រៅ (ប៉ុនគ្នា)៖ $\angle 1 = \angle 7$ និង $\angle 2 = \angle 8$
- មុំត្រូវគ្នា (ប៉ុនគ្នា)៖ $\angle 1 = \angle 5, \angle 2 = \angle 6, \angle 3 = \angle 7, \angle 4 = \angle 8$
- មុំក្នុងរួមខាង (ផលបូក 180°)៖ $\angle 3 + \angle 6 = 180^\circ$ និង $\angle 4 + \angle 5 = 180^\circ$

២១. ការបំប្លែងកូអរដោនេ

១. បំប្លែងឆ្លុះ (Reflection)៖


ចំណុច $M(x, y)$ ឆ្លុះធៀបនឹង៖

- អ័ក្ស Ox ៖ បានរូបភាព $M'(x, -y)$
- អ័ក្ស Oy ៖ បានរូបភាព $M'(-x, y)$
- គល់តម្រុយ O ៖ បានរូបភាព $M'(-x, -y)$

២. បំប្លែងកិល (Translation)៖


ការរកិល ចំណុច $A(x, y)$ តាមវ៉ិចទ័រ $\vec{u}(a, b)$ ទៅជា ចំណុចថ្មី A' កំណត់ដោយ៖

$$A'(x + a, y + b)$$



២២. ពហុកោណ

ពហុកោណ គឺជាខ្សែបិទជិតដែលមានជ្រុងជាអង្កត់។ បើ ពហុកោណមាន n ជ្រុង នោះវាមាន n កំពូល និង n មុំ។



រូបមន្តសំខាន់ៗ (សម្រាប់ពហុកោណប៉ោង n ជ្រុង)៖


- ផលបូករង្វាស់មុំក្នុង៖ $S_i = (n - 2) \times 180^\circ$
- ផលបូករង្វាស់មុំក្រៅ៖ $S_e = 360^\circ$
- ចំនួនអង្កត់ទ្រូងសរុប៖ $d = \frac{n(n - 3)}{2}$

ពហុកោណ និយ័ត (Regular Polygon)៖ ជា ពហុកោណ ដែលមានជ្រុងទាំងអស់ប៉ុនគ្នា និងមុំទាំងអស់ប៉ុនគ្នា។

- រង្វាស់មុំក្នុងមួយ៖ $i = \frac{(n - 2) \times 180^\circ}{n}$
- រង្វាស់មុំក្រៅមួយ៖ $e = \frac{360^\circ}{n}$

២៣. វិសមភាពត្រីកោណ

ទ្រឹស្តីបទ៖ ក្នុង ត្រីកោណ មួយ ផលបូក រង្វាស់ ជ្រុង ពីរ ត្រូវតែធំជាង រង្វាស់ ជ្រុង ទីបី ជានិច្ច។ ម្យ៉ាងទៀត ផលសងរង្វាស់ជ្រុងពីរ ត្រូវតូចជាងជ្រុងទីបីជានិច្ច។



បើ a, b, c ជាជ្រុងនៃត្រីកោណ

- វិសមភាពផលបូក៖
 $a + b > c$
 $a + c > b$
 $b + c > a$
- វិសមភាពផលសង៖
 $|b - c| < a < b + c$