

Base e dimensione di $\ker(f)$ e $\text{Im}(f)$:

$$\begin{cases} -3x_1 + 6x_2 + 5x_3 = 0 \\ -2x_1 + 4x_2 + 3x_3 = 0 \\ -x_1 + 2x_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} -3 & 6 & 5 & 0 \\ -2 & 4 & 3 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\text{Gauss}} \left[\begin{array}{ccc|c} -3 & 6 & 5 & \\ 0 & 0 & -1 & \\ 0 & 0 & 0 & \end{array} \right]$$

$$x_3 = 0 \Rightarrow -3x_1 + 6x_2 + 5 \cdot 0 = 0 \Rightarrow -3x_1 + 6x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = 2x_2 \Rightarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = x_2 \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \ker(f) = \text{Span} \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

$$\dim(\ker(f)) = n - \text{numero di righe non nulle dopo la gradinizzazione} = 3 - 2 = 1$$

Prendiamo le colonne della matrice originale corrispondenti alle colonne dei pivot $\Rightarrow \text{Im}(f) = \text{Span} \left\{ \begin{bmatrix} -3 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$

$$\dim(\text{Im}(f)) = n - \dim(\ker(f)) = 3 - 1 = 2$$

Verifica appartenenza di un vettore a $\ker(f)$: Condizione: $x_1 + x_3 = 1$, si cerca $x \in \ker(f)$:

$$\ker(f) = \text{Span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} \right\} \Rightarrow x = t \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t \\ 2t \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow x_1 + x_3 = 1 \Rightarrow t + 0 = 1 \Rightarrow t = 1 \Rightarrow x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Verifica appartenenza a $\text{Im}(f)$: Condizione: $x_2 + x_3 = 1$.

$$\text{Im}(f) = \text{Span} \left\{ \begin{bmatrix} -3 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} \right\} \Rightarrow x = a \cdot \begin{bmatrix} -3 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} + b \cdot \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3a + 5b \\ -2a + 3b \\ a + 2b \end{bmatrix}$$

$$x_2 + x_3 = (-2a + 3b) + (a + 2b) = -a + 5b = 1 \Rightarrow \text{equazione in } a, b \text{ con infinite soluzioni}$$

Scrivere un vettore in $\ker(f) \cap \text{Im}(f)$:

$$\ker(f) = \text{Span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}, \text{Im}(f) = \text{Span} \left\{ \begin{bmatrix} -3 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$$

$$\exists a, b \in \mathbb{R} \text{ tali che } a \cdot \begin{bmatrix} -3 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} + b \cdot \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -3a + 5b = 1 \\ -2a + 3b = 2 \\ a + 2b = 0 \end{cases} \Rightarrow a = -2b$$

Ora, risolvendo le altre due equazioni si ottengono due valori diversi di $b \Rightarrow$ il vettore $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} \in \ker(f)$ ma $\notin \text{Im}(f) \Rightarrow \ker(f) \cap \text{Im}(f) = \{\mathbf{0}\}$

Verificare la compatibilità del sistema $AX = b$ con $b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \alpha \end{bmatrix}$:

$$(A \mid b(\alpha)) = \left[\begin{array}{ccc|c} -3 & 6 & 5 & 1 \\ -2 & 4 & 3 & 1 \\ 1 & -2 & 2 & \alpha \end{array} \right] \xrightarrow{\text{Gauss}} (A' \mid b'(\alpha)) = \left[\begin{array}{ccc|c} -3 & 6 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \alpha - 4 \end{array} \right] \Rightarrow \begin{cases} \text{ sistema compatibile} & \text{ se } \alpha = -4 \\ \text{ sistema incompatibile} & \text{ se } \alpha \neq -4 \end{cases}$$

Polinomio caratteristico

$$\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) \Rightarrow A - \lambda I = \begin{bmatrix} -5 - \lambda & -2 & 4 \\ 8 & 4 - \lambda & -4 \\ -2 & -1 & 1 - \lambda \end{bmatrix}$$

Applichiamo Sarrus: $\begin{bmatrix} -5 - \lambda & -2 & 4 \\ 8 & 4 - \lambda & -4 \\ -2 & -1 & 1 - \lambda \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} -5 - \lambda & -2 \\ 8 & 4 - \lambda \\ -2 & -1 \end{bmatrix} \Rightarrow [(-5 - \lambda)(4 - \lambda)(1 - \lambda) - 16 - 32] - [(-16)(1 - \lambda) + 4(-5 - \lambda) - 8(4 - \lambda)] = 0$

Risolvendo l'equazione si trovano: $\lambda_1 = -1, \quad \lambda_2 = 0, \quad \lambda_3 = 1 \Rightarrow \text{Sp}(L_A) = \{-1, 0, 1\}$

Base di autovettori per L_A

Prendiamo λ ; se negativo $(A + I)$, se positivo $(A - I)$.

$$\lambda = -1 \Rightarrow A + I = \begin{bmatrix} -4 & -2 & 4 \\ 8 & 5 & -4 \\ -2 & -1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{Gauss}} \begin{bmatrix} -2 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow x_2 = 4x_3$$

$$X_1 = 3X_3, \quad X_3 = t \Rightarrow x = t \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}$$

Calcolare la matrice di cambio di base

Prendiamo gli autovettori calcolati precedentemente:

$$v_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad v_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad v_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ -4 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow P = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 2 \\ -4 & -3 & -4 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Matrice diagonale

$$v_1 \Rightarrow \lambda = -1, \quad v_2 \Rightarrow \lambda = 0, \quad v_3 \Rightarrow \lambda = 1 \Rightarrow D = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Studio della posizione tra una retta e un piano $r : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - t \\ z = 3 + 2t \end{cases} \quad \Pi : z + y - z = 0$

sostituiamo x, y, z del piano con i valori della retta: $1 + t + 2 - t - 3 - 2t = 0 \Rightarrow -2t = 0 \Rightarrow t = 0$

- Se abbiamo un solo t , significa che è incidente, quindi mettiamo t nella retta e troviamo il punto di intersezione
- Se non troviamo nessun t , significa che la retta è parallela al piano, (costruiamo un piano conenente r e parallelo a Π)

$$\text{Sia } r : \begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases} \quad \text{e sia } \Pi : Ax + By + Cz + D = 0 \text{ Allora } K \text{ ha equazione: } A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

- Se t sempre vera \rightarrow la retta è contenuta nel piano, questo vuol dire che è sgheмба (troviamo una retta che interseca r e Π)

$$\text{Sia } r : \begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases} \quad \text{Scegliamo un punto } P = (x_0, y_0, z_0) \text{ su } r \text{ prendendo ad esempio } t = 0. \text{ Sia il piano } \Pi \text{ definito da: } \Pi : Ax + By + Cz + D = 0$$

Risolvendolo, troviamo un punto $Q = (x_1, y_1, z_1)$ sul piano Π scegliendo arbitrariamente due coordinate e calcolando la terza con l'equazione del piano.

$$\text{La retta } s \text{ che interseca sia } r \text{ che } \Pi \text{ è quella che passa per } P \text{ e } Q, \text{ e ha equazioni parametriche: } s : \begin{cases} x = x_0 + (x_1 - x_0)\lambda \\ y = y_0 + (y_1 - y_0)\lambda \\ z = z_0 + (z_1 - z_0)\lambda \end{cases} \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

$$\text{Studio della posizione tra due rette nello spazio } \mathbb{R}^3 \quad r_1 : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - t \\ z = 3 + 2t \end{cases} \quad r_2 : \begin{cases} x = 3 + s \\ y = 1 + 2s \\ z = 4 + s \end{cases}$$

- Confrontiamo i vettori di direzione: $v_1 = (1, -1, 2)$, $v_2 = (1, 2, 1)$.
Non sono multipli \Rightarrow le rette non sono parallele. (Costruiamo un piano su cui stanno r_1 e r_2)

Troviamo il vettore direttore delle due rette (uguali in entrambe le rette): $\vec{v} = (x, y, z)$. Prendiamo un punto $P = (x_1, y_1, z_1)$ su r_1 e $Q = (x_2, y_2, z_2)$ su r_2 .
Calcoliamo $\overrightarrow{PQ} = Q - P$ ed infine calcoliamo $\vec{n} = \vec{v} \times \overrightarrow{PQ}$. L'equazione del piano è $\Pi : A(x - x_1) + B(y - y_1) + C(z - z_1) = 0$ dove $\vec{n} = (A, B, C)$

- Verifichiamo se le rette si intersecano risolvendo il sistema:
$$\begin{cases} 1 + t = 3 + s \\ 2 - t = 1 + 2s \\ 3 + 2t = 4 + s \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t = s + 2 \\ 2 - (s + 2) = 1 + 2s \Rightarrow s = -\frac{1}{3} \Rightarrow t = \frac{5}{3} \\ \text{Verifica: } 3 + 2t = 4 + s \Rightarrow \frac{19}{3} \neq \frac{11}{3} \end{cases}$$

Il sistema è incompatibile \Rightarrow le rette non si incontrano.

Se invece troviamo una coppia (t, s) li inseriamo in una delle due rette e troviamo le coordinate d'intersezione

- Se non sono ne secanti ne parallele, allora sono sghembe (costruiamo una retta r che intersechi entrambe)

Prendiamo un punto P su r_1 : con $t = 0 \Rightarrow P = (1, 2, 3)$ Prendiamo un punto Q su r_2 : con $s = 0 \Rightarrow Q = (3, 1, 4)$ Direzione $\overrightarrow{PQ} = Q - P = (2, -1, 1)$

$$\text{La retta } t \text{ che interseca sia } r_1 \text{ che } r_2 \text{ ha equazioni parametriche: } \begin{cases} x = x_1 + x_2\lambda \\ y = y_1 + y_2\lambda \\ z = z_1 + z_2\lambda \end{cases} \rightarrow (x_1, y_1, z_1) = P, (x_2, y_2, z_2) = \overrightarrow{PQ} \rightarrow t : \begin{cases} x = 1 + 2\lambda \\ y = 2 - \lambda \\ z = 3 + \lambda \end{cases} \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

$$\text{Costruire un piano che contiene una retta per un punto } r : \begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = -t \\ z = 1 + t \end{cases} \quad \text{e passa per il punto } P = (0, 1, -2)$$

Leggendo i coefficienti di t otteniamo il vettore direttore della retta: $\vec{v} = (2, -1, 1)$. Prendiamo $t \in \mathbb{R}$, ad esempio $t = 0$, e ricaviamo un punto sulla retta: $P_0 = (-1, 0, 1)$. Costruiamo il vettore tra i due punti: $\vec{w} = P - P_0 = \overrightarrow{P_0P} = (1, 1, -3)$

$$\begin{cases} x = x_0 + x_1s + x_2t \\ y = y_0 + y_1s + y_2t \\ z = z_0 + z_1s + z_2t \end{cases} \rightarrow (x_0, y_0, z_0) \text{ dati da } P_0, (x_1, y_1, z_1) \text{ dati da } \vec{v}, (x_2, y_2, z_2) \text{ dati da } \vec{w} \rightarrow \begin{cases} x = -1 + 2s + t \\ y = -s + t \\ z = 1 + s - 3t \end{cases}$$

$$\text{Verificare se un punto appartiene alla retta } r : \begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = -t \\ z = 1 + t \end{cases} \rightarrow t \in \mathbb{R}, P = (3, -2, 2)$$

$$\text{Ricaviamo } t \text{ dal sistema inserendo le coordinate del punto } \begin{cases} 3 = -1 + 2t \Rightarrow t = 2 \\ -2 = -t \Rightarrow t = 2 \\ 2 = 1 + t \Rightarrow t = 1 \end{cases} \quad \text{Non esiste valore } t \text{ che soddisfi tutte le equazioni quindi il punto non appartiene}$$

alla retta

Trovare una retta contenuta in un piano e passante per un punto $\Pi : x + 2y - z = 3 \quad P = (1, 1, 0)$

Inseriamo le coordinate di P nell'equazione del piano: $1 + (2 \cdot 1) - 0 = 3 \rightarrow P \in \Pi$

troviamo una soluzione al sistema $x + 2y - z = 0$, ad esempio $v_1 = (-2, 1, 0)$

$$\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases} \rightarrow \text{con } (a, b, c) \text{ di } v_1 \text{ e } (x_0, y_0, z_0) \text{ di } P \rightarrow r : \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 1 + t \\ z = 0 \end{cases}$$

Determinare un piano parallelo a un altro e passante per un punto $\Pi : 2x - y + z = 4 \quad P = (1, -2, 3)$

Il vettore \vec{n} è dato dai coefficienti: $n = (2, -1, 1)$

$2x - y + z = 0 \rightarrow$ cerchiamo due soluzioni: $v_1 = (-\frac{1}{2}, 0, 1)$ e $v_2 = (\frac{1}{2}, 1, 0)$

$$\begin{cases} x = x_0 + x_1s + x_2t \\ y = y_0 + y_1s + y_2t \\ z = z_0 + z_1s + z_2t \end{cases} \rightarrow (x_0, x_1, x_2) \text{ dati da } P, (y_0, y_1, y_2) \text{ dati da } v_1 \text{ e } (z_0, z_1, z_2) \text{ dati da } v_2 \rightarrow \begin{cases} x = 1 - \frac{1}{2}s + \frac{1}{2}t \\ y = -2 + t \\ z = 3 + s \end{cases} \quad \text{con } s, t \in \mathbb{R}$$

Determinare una retta passante per due punti $A = (1, 0, -2) \quad B = (3, 4, 1)$

Calcoliamo il vettore direzionale: $\overrightarrow{AB} = B - A = (3 - 1, 4 - 0, 1 - (-2)) = (2, 4, 3)$

$$\begin{cases} x = x_0 + x_1t \\ y = y_0 + y_1t \\ z = z_0 + z_1t \end{cases} \rightarrow (x_0, y_0, z_0) \text{ dati da } A \text{ o } B, (x_1, y_1, z_1) \text{ dati da } \overrightarrow{AB} \rightarrow A : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 4t \\ z = -2 + 3t \end{cases} \quad B : \begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = 4 + 4t \\ z = 1 + 3t \end{cases} \Rightarrow \text{le rette sono equivalenti}$$

Trasformare una retta da parametrica a cartesiana

$$r : \begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = 4 + 4t \\ z = 1 + 3t \end{cases} \quad \begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases} \rightarrow t = \frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c} \rightarrow t = \frac{x-3}{2} \quad y = 4 + 4t \Rightarrow 2x - y - 2 = 0 \quad z = 1 + 3t \Rightarrow 3x - 2z + 7 = 0$$

Trasformare una retta da cartesiana a parametrica

$$r : \begin{cases} x + y - 2 = 0 \\ 2x - z = 0 \end{cases} \rightarrow \text{prendiamo ad esempio } z = t \text{ e ricaviamo: } \begin{cases} x = \frac{t}{2} \\ y = 2 - \frac{t}{2} \\ z = t \end{cases}$$

Trasformare unun piano parametrico in cartesiano

Isoliamo un parametro da una delle equazioni lo sostituiamo nelle altre finché non troviamo la nostra forma senza parametri