Estudio de Fragilidad del cromosoma X

Método

Análisis de la región (CGG)n que mapea en el exón 1 no codificante del gen FMR-1 localizado en el cromosoma X por PCR y/o por TP-PCR (kit Asuragen). Se estima el tamaño por electroforesis capilar en un analizador genético ABI 3500.
Esta metodología permite precisar el estado de expansión del gen mencionado hasta 200 repeticiones. Superado este número no es posible cuantificar de forma precisa, pero si observar y reportar la presencia de una expansión completa del gen.
En el presente estudio no se analizan mutaciones puntuales o deleciones a nivel del gen.
Tipo de muestra utilizada: Sangre entera con EDTA

Valores de referencia:

- Alelos normales: 6 a 55 repeticiones del triplete (zona gris 45 a 55).
- Alelos pre-mutados: 55 a 200 repeticiones (en general no presentan alteraciones del patrón de metilación).
- Alelos full mutados: > 200 repeticiones.

Resultado

Número de repeticiones CGG: 31.

Conclusión

Con la técnica utilizada se detectó un alelo dentro del rango normal de repeticiones.

Nota

Este protocolo fue validado y firmado electrónicamente por:

PILAR IGARRETA
DRA. EN CIENCIAS
UBA M.N. 10544