GUÍA ANTI-ESTANCAMIENTO KETO

Reduce la frustración y evita abandonar: qué hacer cuando no bajas peso en keto.

quedarse sin ver cambios es la principal razón por la que las personas abandonan. Esta guía te da un sistema ordenado –revisa, prueba ajustes simples y mide señales de progreso reales– para salir del estancamiento sin perder la cabeza.

Cómo usar esta guía (visión rápida)

01

Paso 1

Revisa las posibles causas (lista de verificación).

02

Paso 2

Aplica un protocolo estructurado de 2 semanas con ajustes concretos.

03

Paso 3

Evalúa con métricas reales (no solo la báscula).

04

Paso 4

Si no funciona, revisa causas médicas o consulta profesional.

Lista rápida de comprobación (qué revisar primero)

- ¿Estás realmente en déficit calórico? (consumo vs gasto)
- ¿Carbohidratos netos diarios? (aprox. <20-30 g para keto estricto)
- ¿Proteína adecuada? (≈1.0-1.6 g/kg de peso corporal/día)
- ¿Consumo oculto de carbohidratos (salsas, bebidas, "bajas en azúcar")?
- ¿Alcohol frecuente?
- ¿Nivel de actividad (NEAT + ejercicio)?
- ¿Sueño y gestión del estrés (⩾7 h, control del cortisol)?
- ¿Medicamentos o condiciones médicas (tiroides, anticonceptivos, antidepresivos, etc.)?
- ¿Retención de agua (sal, ciclo menstrual, sodio)?
- ¿Método de medición correcto (peso vs medidas vs fotos)?
- ¿Has usado cetonas o tiras para confirmar cetosis (opcional)?

Por qué NO bajas — causas comunes explicadas (y qué hacer)

1

Consumo oculto de carbohidratos o calorías excesivas

Qué pasa: salsas, aderezos, bebidas o "keto-snacks" pueden sumar.

Acción: durante 7 días registra todo lo que ingieres (incluye aceite, frutos secos). Elimina bebidas y aderezos no necesarios.

2

Proteína insuficiente o excesiva

Qué pasa: poca proteína → pérdida muscular; demasiada → posible gluconeogénesis (en algunos casos) o calorías altas.

Acción: establece proteína objetivo ≈1.0 - 1.6 g/kg de peso (ajusta según actividad). Usa la mitad-superior del rango si haces fuerza.

3

Exceso de calorías por grasas añadidas

Qué pasa: la grasa es densa en calorías; comer "hasta saciedad" puede no producir déficit.

Acción: reduce grasas añadidas ligeramente (ej. 1 cda menos de aceite al día) durante 2 semanas.

4

Actividad (NEAT y ejercicio) baja

Qué pasa: metabolismo más bajo por inactividad.

Acción: aumenta NEAT (caminar, subir escaleras), añade 2 - 3 sesiones de fuerza a la semana.

1

Sueño pobre y estrés crónico

Qué pasa: cortisol elevado bloquea pérdida de grasa.

Acción: prioriza 7 - 8 h de sueño, técnicas de respiración 5 - 10 min diarias.

2

Retención de agua (ciclo menstrual, sodio, inflamación)

Qué pasa: la balanza sube aunque haya pérdida de grasa.

Acción: mide cinturas/ropa; ajusta sodio si procede; espera 7 - 10 días para estabilizar.

3

Condiciones médicas o fármacos

Qué pasa: hipotiroidismo, síndrome de ovario poliquístico, antidepresivos o anticonceptivos pueden alterar ritmo.

Acción: consulta con médico si sospechas; pide análisis si procede.

4

Adaptación metabólica por déficit prolongado

Qué pasa: el cuerpo "se adapta" y frena pérdida.

Acción: considera una semana de mantenimiento calórico o un refeed controlado (carbohidratos limitados y planificados).

Ajustes simples y seguros (protocolos concretos)

Protocolo rápido (si llevas ≥2 semanas sin progreso): aplicar durante 14 días

- **Registro estricto 7-14 días:** anota todo (comida, aceite, bebidas, suplementos).
- **Reducir carbs netos si no estás <20-30 g:** bajar a <20 g netos diarios por 7-10 días.
- **Ajuste de proteína:** calcula 1.2-1.6 g/kg; si haces fuerza, apúntate al 1.4-1.6 g/kg.
- **Reducir grasas añadidas:** quita 1 cucharada de aceite o 1 porción de frutos secos al día (≈120-150 kcal).
- **Aumentar actividad:** +2000 pasos/día o 2 sesiones de fuerza por semana.
- **Mejorar sueño:** plan de higiene del sueño 7 noches seguidas (apagar pantallas 30 min antes, hora fija).
- **Controlar alcohol/sabores líquidos:** eliminar alcohol 14 días.
- **Comprobar medicamentos / salud:** habla con médico si sospechas interferencia.

Si tras 14 días hay mejora, continúa. Si no, pasa al plan de 4 semanas (ver abajo) o consulta profesional.

Plan de 4 semanas (si el protocolo rápido no funciona)

Semana 1–2

aplicar el protocolo rápido (registro + ajustes de macros + actividad + sueño).

Semana 3

introducir una ligera reducción calórica adicional (≈10% del total diario) si aún sin progreso, sin bajar proteína.

Semana 4

evalúa posibilidad de 1 día de "re-feed moderado" (carbohidratos controlados en una comida para regular hormonas), seguido de retorno a kcal objetivo y observar 7 días.

Notas:

Evitar reducciones calóricas extremas; objetivo realista **0.25-0.5 kg/semana pérdida de grasa**. Si objetivo es recomposición o sólo mejorar composición corporal, prioriza fuerza y proteína.

Señales de progreso real (más allá de la báscula)

Mide por lo menos 2 - 4 de estas señales para juzgar progreso:

Medidas corporales

Disminución de medidas (cintura, caderas) – mide con cinta métrica semanalmente.

Ropa

Ropa queda más suelta (cinturón, pantalones).

Energía

Mejor energía diaria y menos antojos.

Rendimiento

Mejora en rendimiento (más fuerza o más repeticiones).

Sueño y ánimo

Mejor sueño y ánimo.

Fotos

Fotos semanales/ quincenales comparadas (misma luz y ropa).

Inflamación

Reducción de inflamación/retención (menos hinchazón abdominal).

Si solo la báscula baja y estas señales no aparecen, revisa composición (puedes estar perdiendo agua o masa muscular).

Errores emocionales y cómo combatirlos

Error: "Si no baja la báscula me castigo con ayunos extremos."

→ Acción: evita medidas extremas; aplica protocolo estructurado.

Error: "Lo intento todo a la vez."

→ Acción: cambia una o dos variables a la vez y prueba 14 días.

Error: comparar con otros

→ Acción: usa tu línea base y mejora tus propias métricas.

Checklist imprimible (para seguir paso a paso)

- 7-14 días de registro completo de alimentos.
- Calcular proteína objetivo (1.0-1.6 g/kg).
- Objetivo carbohidratos netos (si corresponde <20-30 g).
- Reducir 1 cda grasa añadida diaria (si aplica).
- +2000 pasos/día o +2 sesiones de fuerza/semana.
- 7 noches de higiene del sueño.
- Eliminar alcohol durante 14 días.
- Revisar medicamentos/condiciones con profesional si procede.
- Evaluar señales de progreso (medidas/fotos/energía).

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Cuánto tiempo debo esperar antes de ajustar?

Aplica cambios durante 14 días y evalúa. Para cambios metabólicos importantes, espera 4 - 6 semanas para ver tendencia.

¿Debo contar calorías siempre?

No siempre necesario en keto, pero si te estancas, un registro estricto de 7 días suele mostrar fugas calóricas.

¿Es normal perder peso y luego estancarse?

Sí – el cuerpo se adapta. Usa las estrategias de esta guía para salir del estancamiento.

¿Y si tengo PCOS, tiroides o tomo medicación?

Consulta a tu médico. Este protocolo es general; condiciones médicas requieren supervisión.

¿Puedo reintroducir carbohidratos?

Sí, pero hazlo como transición (mejor fuera de fase estricta de cetosis) y controlando porciones.

Protocolos especiales (si quieres un enfoque más agresivo o suave)

1. Enfoque conservador

(para quienes se sienten débiles al ajustar)

Prioriza sueño y NEAT + pequeños ajustes: 1 cda menos grasa y +1000 pasos/día. Mantén proteína.

2. Enfoque más activo

(si te sientes con energía)

Reduce carbs a <15 - 20 g netos, aumenta fuerza 3×/semana, déficit calórico moderado (300 - 500 kcal/día).

3. Refeed controlado

(si llevas >4 semanas estancada y tu estrés es bajo)

1 comida con carbohidratos limpios (fruta mediana o 80 - 100 g de patata) y luego volver a protocolo. Obsérvate 72 h.

Señales para derivar a profesional de salud

Pérdida de peso rápida no intencionada

(>5% peso en 1 mes).

Síntomas preocupantes


desmayos, palpitaciones, mareos persistentes.

Condiciones crónicas sin control

(diabetes tipo 1, enfermedad renal, cardiopatías).

Medicamentos que afecten metabolismo

Si tomas medicamentos que afecten metabolismo hormonal.



Plan de comunicación para clientes (si vendes esto como bono)



PDF imprimible

Incluye un PDF imprimible con la checklist.



Hoja de registro

Ofrece una hoja de registro de 14 días (plantilla para anotar comidas, sueño, pasos, sensación).



Mini-coaching

Incluye "mini-coaching" por email: recomienda aplicar protocolo y revisar al día 14.

Salir del estancamiento es casi siempre posible

con un diagnóstico honesto y ajustes pequeños y sostenibles.

Prioriza la consistencia sobre la perfección: **14 días bien ejecutados valen más que 3 semanas de "a medias"**.

> **NO TE RIDAS Y CREE EN TUS CAPACIDADES, ASI LO LOGRARAS**