$z = \dfrac{\bar{x} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$	$t = \dfrac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}}$	$z = \dfrac{\hat{p} - p}{\sqrt{\dfrac{pq}{n}}}$
$Z = \dfrac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$	$t = \dfrac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{s^2\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$ $s^2 = \dfrac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$	$Z = \dfrac{(\hat{p_1} - \hat{p_2}) - (p_1 - p_2)}{\sqrt{\hat{p}\hat{q}\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$ $\hat{p} = \dfrac{x_1 + x_2}{n_1 + n_2}$
$t = \dfrac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - d_0}{\sqrt{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)}}$ $gl = \dfrac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{[(s_1^2/n_1)^2/(n_1 - 1)] + [(s_2^2/n_2)^2/(n_2 - 1)]}$	$\chi^2 = \dfrac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$	$F_0 = \dfrac{S_1^2}{S_2^2}$
$t = \dfrac{\bar{d} - d_0}{s_d/\sqrt{n}}$		

Cuadro 1: Fórmulas