

# GUÍA DE COSECHA Y REUTILIZACIÓN DE LEVADURAS

*La Bruja Beer — Manejo de Slurry, Viabilidad y Repitching*

## 1. Importancia del Manejo de Levadura (Yeast Repitching)

La cosecha y reutilización de crema de levadura (slurry) permite una notable reducción de costos operativos en La Bruja Beer y una adaptación enzimática progresiva que mejora la velocidad de arranque y atenua en tiempos más cortos.

## 2. Criterios de Selección y Cosecha

- **Momento Óptimo:** Cosechar entre 24 y 48 horas post-terminal gravity (densidad final estable), antes o al inicio del cold crash. NUNCA cosechar de cervezas con más de 6.5% ABV o altamente lupuladas en dry hopping (los residuos de lúpulo dañan la pared celular).
- **Estratificación en Cono:** El cono del fermentador se divide en tres capas: la primera fracción expulsada contiene células muertas y turbio proteico (descartar 100%); la fracción media contiene células jóvenes, sanas y altamente viables (cosechar con instrumental sanitizado); la capa superior contiene células poco floculantes (descartar).

## 3. Conservación y Control de Calidad

- **Temperatura de Guarda:** Conservar entre 1°C y 3°C en envase de acero inoxidable estéril o frascos sanitizados con venteo de CO<sub>2</sub> para evitar sobrepresión.
- **Tiempo Máximo de Almacenamiento:** Utilizar idealmente dentro de los primeros 7 días. Cada semana de guarda reduce la viabilidad entre 10% y 15%. Descartar si supera los 14 días.
- **Número Máximo de Generaciones:** Reutilizar entre 4 y 6 generaciones consecutivas. A partir de la 6ta generación aumenta el riesgo de mutación genética (atenuación alterada) y contaminación cruzada.