



Anatomia Y Fisiologia 1 Examen Final 2024

Anatomía y Fisiología 1 (Universidad Nacional de Tres de Febrero Virtual)



messages.pdf_cover_qr_code_label

[Contenido](#) > [Unidad](#) > Evaluación

EXAMEN FINAL

EXAMEN FINAL 08/07/24 19HS.

EXAMEN FINAL ANATOMIA Y FISILOGÍA I

- Puntaje total: 100.00
- Puntaje de aprobación: 60.00
- Incorrectas restan: No
- Abierta: desde 08/07/2024 19:00 hasta 08/07/2024 21:00

Realización

- Fecha: 08/07/2024 19:03:20
- Tiempo realización: 01:18:01
- Cantidad de veces realizada: 1
- Cantidad de respuestas correctas: 39 / 50

 Aprobada - 78.00**El tendón de aquiles:**

- ☐ Pertenece al cuádriceps
- ☐ Corresponde a la inserción del triceps sural en el calcáneo
- ☒ Es el principal flexor del pie sobre la pierna
- ☐ No contribuye a la bipedestación
- ☐ Resulta de la inserción de un músculo bíceps en el astrágalo

Respuesta incorrecta**La respuesta correcta es:**

- ☐ Pertenece al cuádriceps
- ☒ Corresponde a la inserción del triceps sural en el calcáneo
- ☐ Es el principal flexor del pie sobre la pierna
- ☐ No contribuye a la bipedestación
- ☐ Resulta de la inserción de un músculo bíceps en el astrágalo

Explicación: El tendón de aquiles corresponde a la inserción de los 2 gemelos y el sóleo (tríceps sural) en el calcáneo, representando un tendón fundamental en la bipedestación.

Cuál de las siguientes características no corresponden a la anatomía del colon:

- ☐ Presencia de bandeletas o tenias
- ☐ Poseer un mesenterio
- ☐ Presentar abollonaduras
- ☒ Disponerse en forma de marco conteniendo al intestino delgado
- ☐ Originarse a nivel de la válvula ileocecal

Respuesta incorrecta

La respuesta correcta es:

- ☐ Presencia de bandeletas o tenias
- ☒ Poseer un mesenterio
- ☐ Presentar abollonaduras
- ☐ Disponerse en forma de marco conteniendo al intestino delgado
- ☐ Originarse a nivel de la válvula ileocecal

Explicación: El mesenterio es el meso del intestino delgado. El meso del colon se denomina mesocolon.

El segundo ruido cardíaco se origina por:

- ☐ La apertura de la válvula mitral
- ☒ Cierre de las válvulas sigmoideas
- ☐ Cierre de las válvulas aurículo ventriculares
- ☐ La apertura de las válvulas sigmoideas
- ☐ La expulsión sanguínea por la sístole ventricular

Respuesta correcta

Explicación: Los ruidos cardíacos se ocasionan por el cierre brusco de las válvulas cardíacas. El primer ruido se produce por el cierre de las válvulas aurículo ventriculares, mientras que el segundo por las válvulas sigmoideas.

La sangre retorna al corazón por el sistema venoso:

- ☐ Por la presión remanente (vis a tergo)
- ☐ Por la presencia de válvulas
- ☐ Por la contracción muscular
- ☐ Por la presión negativa del tórax

- ☒ Todos los anteriores

Respuesta correcta

Explicación: La presencia de válvulas en las venas de los miembros es un factor fundamental para el retorno venoso a través de los 5 mecanismos mencionados.

La serosa que recubre al corazón se denomina:

- ☐ Peritoneo
- ☒ Pericardio
- ☐ Pleura
- ☐ Serosa

Respuesta correcta

Explicación: El pericardio es la serosa que recubre al corazón. Se divide en pericardio fibroso o parietal y pericardio visceral dejando entre ambas hojas un espacio virtual, el espacio pericárdico.

Cuál de las siguientes enterohormonas actúa sobre el estómago facilitando la liberación de ácido clorhídrico.

- ☐ Colecistoquinina

- ☐ Secretina

- ☐ Pancreozimina
- ☒ Gastrina
- ☐ Pepsina

Respuesta correcta

Se denomina transcripción:

- ☐ A la duplicación del ADN durante la mitosis
- ☒ A la copia del ADN en ARNm
- ☐ A la síntesis de proteínas
- ☐ A la separación de las cadenas de ADN durante la división celular

Respuesta correcta

Explicación: La transcripción del ADN es el primer proceso de la expresión genética, mediante el cual se transfiere la información contenida en la secuencia del ADN hacia la secuencia de proteína utilizando diversos ARN como intermediarios. Durante la transcripción genética, las secuencias de ADN son copiadas a ARN mediante una enzima llamada ARN polimerasa la cual sintetiza un ARN mensajero que mantiene la información de la secuencia del ADN. De esta manera, la transcripción del ADN también podría llamarse síntesis del ARN mensajero.

Qué diferencia la absorción de las grasas respecto del resto de los nutrientes?

- ☐ Que las grasas se absorben solo en el duodeno por la bilis
- ☐ Que se realiza solo a través de la vena porta
- ☐ Que requiere de hormonas digestivas para su absorción
- ☒ Que se absorbe por vía linfática
- ☐ Que no requiere ácido clorhídrico para su absorción

Respuesta correcta

Explicación: Los ácidos grasos y el glicerol se reconstruyen dentro de las células de la mucosa intestinal nuevamente en triglicéridos y estos se agrupan para formar quilomicrones. Estos son de un tamaño tal que no pueden ingresar a los capilares sanguíneos debiendo hacerlo a través del sistema linfático.

La glotis se define como el espacio entre:

- ☐ Las cuerdas vocales superiores e inferiores
- ☐ Las cuerdas vocales superiores o falsas
- ☐ Las cuerdas inferiores o verdaderas
- ☒ La faringe y la laringe
- ☐ La epiglotis y la cuerda vocal

Respuesta incorrecta

La respuesta correcta es:

- ☐ Las cuerdas vocales superiores e inferiores
- ☐ Las cuerdas vocales superiores o falsas
- ☒ Las cuerdas inferiores o verdaderas
- ☐ La faringe y la laringe
- ☐ La epiglotis y la cuerda vocal

Explicación: Abertura superior de la laringe, delimitada por las dos cuerdas vocales verdaderas.

La onda QRS del electrocardiograma muestra:

- ☒ La despolarización ventricular
- ☐ La repolarización ventricular
- ☐ La despolarización auricular
- ☐ La repolarización auricular

Respuesta correcta

Explicación: El estímulo eléctrico originado en el nódulo sinusal se propaga a las aurículas generando una onda eléctrica llamada P. El estímulo pasa al nodo AV en donde sufre un retardo eléctrico que se expresa como segmento P-R. El ingreso del estímulo eléctrico a los ventrículos genera una despolarización que se inscribe en el ECG como onda QRS.

La faringe es un canal muscular que le falta la pared:

- ☐ Lateral

- ☐ Medial
- ☐ Anterior
- ☒ Posterior

Respuesta incorrecta

La respuesta correcta es:

- ☐ Lateral
- ☐ Medial
- ☒ Anterior
- ☐ Posterior

Explicación: La pared anterior se encuentra abierta hacia las fosas nasales, la boca y la laringe

El plano que divide el cuerpo en derecho e izquierdo se denomina:

- ☐ Frontal
- ☒ Sagital
- ☐ Transversal
- ☐ Horizontal
- ☐ Coronal

Respuesta correcta

La serosa que rodea a las vísceras abdominales se denomina:

- ☐ Pleura
- ☐ Pericardio
- ☒ Peritoneo

Respuesta correcta

El sector del esternón que se articula con la clavícula se denomina:

- ☐ Clavicular
- ☒ Manubrio
- ☐ Cuerpo
- ☐ Xifoideo

Respuesta correcta

Explicación: El esternón posee 3 sectores denominados manubrio, cuerpo y apéndice xifoides. La clavícula se vincula con el esternón a través de la articulación esternocostoclavicular, pilar principal de la fijación de la cintura escapular al tronco.

El plexo nervioso encargado de inervar al miembro superior se denomina:

- ☐ Cervical
- ☒ Braquial
- ☐ Dorsal
- ☐ Lumbar
- ☐ Sacro

Respuesta correcta

Explicación: El plexo braquial originado en las raíces nerviosas C5, C6, C7, C8 y T1, emerge de la columna cervical hacia el espacio supraclavicular en donde forma los troncos primarios. Posteriormente ingresa a la axila formando los troncos secundarios desde donde parten sus ramas terminales.

La articulación de la rodilla:

- ☐ Presenta ligamentos cruzados que contribuyen a mantener la flexión
- ☐ Los cóndilos humerales se desplazan sobre la tibia adaptados por los meniscos
- ☐ La rótula no cumple función
- ☒ Los meniscos contribuyen a adaptar mejor los cóndilos femorales a la meseta tibial
- ☐ Realiza partiendo de la posición anatómica solo movimientos de extensión

Respuesta correcta

Explicación: La articulación de la rodilla es una trocleartrosis que une el fémur a la tibia y la rótula. Presenta ligamentos cruzados que impiden la extensión favoreciendo

la bipedestación. Los meniscos mejoran la concordancia articular. La rótula estabiliza la articulación.

Cuál de las siguientes articulaciones pertenece a una enartrosis?

- ☐ Acromioclavicular
- ☐ Esternocostoclavicular
- ☐ Húmerocubital
- ☒ Coxofemoral
- ☐ Trapeciometacarpiana

Respuesta correcta

Respecto de la articulación coxofemoral:

- ☐ Es una articulación del tipo de las condíleas
- ☐ Presenta un importante ligamento intra articular
- ☐ La cavidad cotiloidea se encuentra ampliada por un rodete
- ☐ Presenta un menisco para adaptar las superficies articulares
- ☒ Forma parte de la cintura pelviana

Respuesta incorrecta

La respuesta correcta es:

- ☐ Es una articulación del tipo de las condíleas
- ☒ Presenta un importante ligamento intra articular
- ☐ La cavidad cotiloidea se encuentra ampliada por un rodete
- ☐ Presenta un menisco para adaptar las superficies articulares
- ☐ Forma parte de la cintura pelviana

Explicación: La articulación coxo femoral o de la cadera pertenece al tipo de las enartrosis. Une el miembro inferior a la cintura pelviana. Presenta un importante ligamento intraarticular que une firmemente el fémur a la cavidad acetabular.

El ADN está formado por una secuencia ordenada de:

- ☐ Bases cíclicas nitrogenadas
- ☐ Codones
- ☐ Ribosomas
- ☒ Nucleótidos
- ☐ Aminoácidos

Respuesta correcta

Explicación: El ADN se compone de dos cadenas, cada una formada por nucleótidos. Cada nucleótido, a su vez, está compuesto por un azúcar (desoxirribosa), un grupo fosfato y una base nitrogenada.

Señale la opción correcta respecto al esófago:

- ☐ Presenta 2 porciones torácica y abdominal
- ☐ Secreta enzimas digestivas
- ☒ Conecta la Farínge con el estómago
- ☐ Se caracteriza por presentar capa serosa externa .
- ☐ En su interior se digieren las proteínas a expensas de la amilasa salival

Respuesta correcta

Explicación: El esófago es un órgano del tubo digestivo que vincula la farínge con el estómago. Recorre 3 regiones anatómicas, la cervical, torácica y abdominal. Se caracteriza por no poseer capa serosa externa dejando a la vista la capa muscular.

Cuál de las siguientes características es exclusiva de una vértebra dorsal:

- ☐ Presencia de agujero transversario
- ☐ Apófisis espinosa bifurcada
- ☐ Cuerpo vertebral voluminoso
- ☐ Apófisis transversas cortas

- ☒ Carillas articulares costales

Respuesta correcta

Explicación: Las costillas se articulan con las vértebra dorsales a través de sus cuerpos y apófisis transversas.

Cuál de las opciones es incorrecta respecto a los glóbulos rojos o eritrocitos:

- ☐ Presentan una forma bicóncava
- ☐ No poseen núcleo
- ☐ Se forman en la médula ósea
- ☒ Contribuyen a la defensa contra las infecciones
- ☐ Posee un pigmento llamado hemoglobina

Respuesta correcta

En la membrana plasmática:

- ☐ La porción hidrofílica de los lípidos se dirige hacia adentro
- ☐ Las proteínas se localizan entre las 2 capas de lípidos
- ☐ Existen poros para el ingreso y egreso del citoplasma
- ☒ Existen canales iónicos a través de las proteínas para el pasaje de sodio y potasio
- ☐ Está formada por una bicapa proteica con lípidos incorporados

Respuesta correcta

Explicación: El modelo de mosaico fluido es un modelo de la estructura de la membrana plasmática propuesto en 1972 por S. J. Singer y Garth Nicolson gracias a los avances en microscopía electrónica. En la membrana plasmática, los fosfolípidos se disponen formando una bicapa, situados con sus cabezas hidrófilas hacia el medio externo o hacia el citosol, y sus colas hidrófobas dispuestas en empalizada. Las proteínas se intercalan en esa bicapa de lípidos dependiendo de las interacciones con las regiones de la zona lipídica. Presenta canales iónicos para el pasaje de sodio y potasio que generan una carga eléctrica en la membrana.

En la mitosis se produce:

- ☐ Duplicación del citoplasma sin duplicación del ADN
- ☒ Duplicación del ADN y partición del citoplasma
- ☐ Duplicación del ADN y del Citoplasma
- ☐ Partición del citoplasma con separación de cromosomas
- ☐ Reducción del material genético y del N° de cromosomas

Respuesta correcta

Explicación: La mitosis es un proceso que ocurre en el núcleo de las células eucariotas y que procede inmediatamente a la división celular. Consiste en el reparto equitativo del material hereditario (ADN) característico y la partición del citoplasma.

La hematosis es un proceso mediante el cual:

- ☐ El aire ingresa a los pulmones
- ☒ Se produce el intercambio de O₂ y Co₂ a nivel alveolar
- ☐ Se renueva el aire de los alvéolos
- ☐ El aire ingresa y egresa por la vía aérea
- ☐ Se entrega oxígeno a la célula.

Respuesta correcta

Explicación: Intercambio de gases que se produce entre el aire de los alveolos pulmonares y la sangre venosa, que pasa a ser arterial por fijación del oxígeno y eliminación del dióxido de carbono.

Cuál de las siguientes afirmaciones No corresponde a la arteria aorta:

- ☒ Se origina del ventrículo derecho
- ☐ Presenta un cayado
- ☐ Finaliza dividiéndose en arterias ilíacas primitivas
- ☐ Su primera rama es el tronco arterial braquiocefálico
- ☐ Presenta una porción torácica y otra abdominal

Respuesta correcta

Explicación: Se origina del ventrículo izquierdo desde donde expulsa la sangre hacia

la circulación mayor

La absorción de los aminoácidos se realiza hacia:

- ☐ Vena cava
- ☐ Vena porta
- ☒ Linfáticos
- ☐ Luz intestinal
- ☐ Arterias mesentéricas

Respuesta incorrecta

La respuesta correcta es:

- ☐ Vena cava
- ☒ Vena porta
- ☐ Linfáticos
- ☐ Luz intestinal
- ☐ Arterias mesentéricas

Explicación: Los aminoácidos son absorbidos mediante cotransporte con sodio y por difusión facilitada. En el citosol del enterocito los oligopéptidos se terminan de hidrolizar de forma tal que solo pasan aminoácidos a la vena porta.

Los cornetes:

- ☐ Se encuentran en la pared interna de las fosas nasales
- ☐ Pertenecen al esfenoides
- ☒ El superior y medio pertenecen al etmoides mientras que el inferior es un hueso independiente
- ☐ Calientan el aire
- ☐ Forman los senos paranasales

Respuesta correcta

Explicación: Los cornetes nasales se dividen en cornete inferior, medio y superior, donde el cornete superior y medio pertenecen al hueso del etmoides, y el cornete inferior es un hueso independiente que se va a insertar en el hueso palatino.

La vía aérea :

- ☐ Es la encargada de realizar la hematosis
- ☒ Comienza en la laringe y continúa en tráquea y bronquios.
- ☐ Transporta el aire a los pulmones sin realizar hematosis
- ☐ Su diámetro máximo se encuentra en la glotis
- ☐ Es la encargada de humidificar y calentar el aire.

Respuesta incorrecta

La respuesta correcta es:

- ☐ Es la encargada de realizar la hematosis
- ☐ Comienza en la laringe y continúa en tráquea y bronquios.
- ☒ Transporta el aire a los pulmones sin realizar hematosis
- ☐ Su diámetro máximo se encuentra en la glotis
- ☐ Es la encargada de humidificar y calentar el aire.

Explicación: Es la parte por la que discurre el aire en dirección a los pulmones, donde se realizará el intercambio gaseoso.

Las articulaciones radiocubitales contribuyen a realizar:

- ☐ Frexoextensión del antebrazo sobre el brazo
- ☐ Flexión de la muñeca sobre el antebrazo
- ☒ Pronación y supinación de la mano
- ☐ Rotación del antebrazo
- ☐ Rotación del cubito sobre el radio

Respuesta correcta

Explicación: El movimiento de pronación y supinación se realiza gracias a la articulación radiocubital superior del pipo de las trocoides.

El grupo muscular responsable de la abducción del brazo es el correspondiente a :

- ☐ Dorsal ancho – trapecio
- ☐ Biceps – braquial anterior
- ☒ Deltoides –supraespinoso
- ☐ Pectoral- esternocleidomastoideo
- ☐ Triceps braquial – deltoides

Respuesta correcta

Explicación: El músculo deltoides es el principal abductor del miembro superior hasta los 90°. De allí en mas es el supraespinoso quien continúa con la elevación.

Cuál de los siguientes componentes no pertenece a una diartrosis:

- ☐ Sinovial
- ☐ Cápsula
- ☐ Cartílago articular
- ☒ Núcleo pulpos o gelatinoso
- ☐ Meniscos

Respuesta correcta

Explicación: La articulación que posee núcleo pulpos es la Anfiartrosis

La sangre venosa proveniente del abdomen se recoge a través de la vena:

- ☒ Cava inferior
- ☐ Acigos
- ☐ Porta
- ☐ Ilíacas primitivas

Respuesta incorrecta

La respuesta correcta es:

- ☐ Cava inferior
- ☐ Acigos

- ☒ Porta
- ☐ Ilíacas primitivas

El circuito menor o pulmonar:

- ☐ Finaliza en la aurícula derecha
- ☐ Comienza en la aurícula izquierda
- ☐ Finaliza en el ventrículo izquierdo
- ☒ Comienza en el ventrículo derecho
- ☐ Finaliza en el ventrículo derecho

Respuesta correcta

Explicación: El circuito menor o pulmonar se inicia en el ventrículo derecho y finaliza en la aurícula izquierda

El termino sístole hace referencia:

- ☐ A la contracción de las auricular y ventrículos
- ☐ A la relajación de las aurículas y los ventrículos
- ☐ A la re polarización ventricular
- ☒ A la expulsión de la sangre por parte del ventrículo
- ☐ Al pasaje de la sangre de a aurícula al ventrículo

Respuesta incorrecta

La respuesta correcta es:

- ☒ A la contracción de las auricular y ventrículos
- ☐ A la relajación de las aurículas y los ventrículos
- ☐ A la re polarización ventricular
- ☐ A la expulsión de la sangre por parte del ventrículo
- ☐ Al pasaje de la sangre de a aurícula al ventrículo

Explicación: Movimiento de contracción del corazón y de las arterias para empujar la sangre que contienen.

El corazón se localiza en:

- ☐ La cavidad pleural
- ☐ La cavidad pericárdica
- ☐ Entre el pedículo de ambos pulmones
- ☒ En el mediastino
- ☐ En la caja torácica

Respuesta correcta

Explicación: El corazón se encuentra en el mediastino, espacio delimitado por ambos pulmones y sus pleuras

Se denominan costillas falsas:

- ☐ De la 1° a la 6°
- ☒ De la 7° a la 10°
- ☐ A la 11° y la 12°

Respuesta correcta

Explicación: A las primeras 6 costillas se las denomina esternales o verdaderas por unirse a través de un cartílago individual al esternón. Las costillas 7 a 10 se unen al esternón mediante un cartílago común y se denominan falsas. La 11 y 12 costilla no se unen al esternón quedando libres por lo que reciben el nombre de flotantes.

Cuál de los siguientes huesos del cráneo no forma parte solo de la calota y no de la base craneana:

- ☐ Parietal
- ☐ Esfenoides
- ☐ Temporal
- ☒ Occipital
- ☐ Frontal

Respuesta incorrecta

La respuesta correcta es:

- ☒ Parietal
- ☐ Esfenoides
- ☐ Temporal
- ☐ Occipital
- ☐ Frontal

Explicación: Los huesos parietales no contribuyen a formar la base del cráneo

El apéndice cecal se localiza en:

- ☐ Ileon
- ☐ Sigmoideas
- ☐ Recto
- ☒ Ciego
- ☐ Transverso

Respuesta correcta

Se denomina pedículo de una vértebra:

- ☐ Al sector que vincula el cuerpo de las vértebras.
- ☐ Al sector que vincula la apófisis transversa con la espinosa
- ☒ Al que delimita el agujero de conjunción
- ☐ A su saliencia lateral
- ☐ Al orificio que rodea a la médula

Respuesta correcta

Explicación: El agujero de conjunción queda delimitado por los pedículos vertebrales permitiendo la salida de los nervios raquídeos.

La digestión comienza en la boca a través de la enzima:

- ☐ Pepsina
- ☐ Lipasa

- ☒ Pتيالina
- ☐ Tripsina
- ☐ Sacaridasa

Respuesta correcta

Explicación: La ptialina o alfa amilasa salival es una enzima presente en la saliva que hidroliza el almidón y el glucógeno a maltosa.

Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta respecto al músculo diafragma:

- ☐ Presenta una porción central aponeurótica llamada centro frénico
- ☐ Se localiza entre el tórax y el abdomen
- ☒ Es el principal músculo espiratorio
- ☐ Se encuentra inervado por el nervio frénico
- ☐ Presenta hiatos para el pasaje de estructuras

Respuesta correcta

En la papila de la segunda porción del duodeno:

- ☐ Desemboca solo el conducto pancreático de Wirsung
- ☐ Desemboca el conducto cístico de la vesícula biliar
- ☐ Desemboca solo el conducto colédoco vertiendo la bilis del hígado
- ☒ Desembocan juntos el conducto de Wirsung y el colédoco vertiendo la secreción biliar y pancreática.

Respuesta correcta

Explicación: Desembocan juntos el conducto de Wirsung y el colédoco vertiendo la secreción biliar y pancreática regulada por el esfínter de oddi

El hematocrito expresa:

- ☐ La cantidad de glóbulos rojos y blancos por mm³ de sangre
- ☐ La cantidad total de glóbulos rojos
- ☐ La relación porcentual entre glóbulos rojos y blancos

- ☒ La relación porcentual entre plasma y glóbulos
- ☐ La cantidad de hemoglobina dentro de los glóbulos rojos

Respuesta correcta

Explicación: El hematocrito es un método de laboratorio que se realiza colocando una muestra de sangre en una centrifuga que separa el componente liquido de la sangre o sea el plasma de los globulos, el cual se expresa en porcentaje.

La venas cavas :

- ☒ Desembocan en la aurícula derecha
- ☐ Desembocan en la aurícula izquierda
- ☐ Forman parte del sistema porta
- ☐ Drenan los vasos intercostales

Respuesta correcta

Explicación: Las venas cavas superior e inferior traen de regreso la sangre venosa proveniente de la circulación mayor a la aurícula derecha del corazón.

Las mitocondrias:

- ☐ Son organelas que intervienen en la síntesis de proteínas
- ☒ Son las responsables de la producción de ATP mediante la degradación de los hidratos de carbono
- ☐ Se encuentran localizadas en el núcleo
- ☐ Intervienen en el proceso de digestión celular

Respuesta correcta

Explicación: Orgánulo citoplasmático de las células eucariotas, de forma ovoidal, formado por una doble membrana que tiene como principal función la producción de energía mediante el consumo de oxígeno, y la producción de dióxido de carbono y agua como productos de la respiración celular.

El estómago se vincula con el duodeno a través de:

- ☐ Cardias
- ☐ Papila
- ☒ Píloro
- ☐ Colédoco
- ☐ Wirsung

Respuesta correcta

Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la digestión celular:

- ☐ Incorpora nutrientes a través de la síntesis proteica
- ☐ La digestión se realiza gracias al retículo endoplásmico rugoso
- ☒ Los nutrientes se incorporan por fagocitosis y se unen a lisosomas y peroxisomas
- ☐ Los ribosomas poseen enzimas digestivas
- ☐ La digestión se produce en la mitocondria

Respuesta correcta

Explicación: La célula incorpora nutrientes a través de la fagocitosis para ser digeridos por enzimas ubicadas en los lisosomas y peroxisomas

Los músculos masticadores son:

- ☐ Temporal, orbicular de los labios y cigomático mayor.
- ☒ Temporal, Masetero y milohioideo.
- ☐ Masetero, temporal y pterigoideos
- ☐ Pterigoideos, orbicular de los labios y masetero.

Respuesta incorrecta

La respuesta correcta es:

- ☐ Temporal, orbicular de los labios y cigomático mayor.
- ☐ Temporal, Masetero y milohioideo.
- ☒ Masetero, temporal y pterigoideos
- ☐ Pterigoideos, orbicular de los labios y masetero.

La columna cervical presenta:

- ☐ 5 vértebras y una cifosis
- ☒ 7 vértebras y una lordosis
- ☐ 12 vértebras y una cifosis
- ☐ 5 vértebras y una lordosis
- ☐ 7 vértebras y una cifosis

Respuesta correcta

Explicación: La columna cervical está compuesta por 7 vértebras que se flexionan para realizar una incurvación llamada lordosis