



Cuestionario Neuro - anatomia

Prova Era 2, Bases Biologicas (Fundación Barceló)



messages.pdf_cover_qr_code_label

- 1) Ud presencia un accidente de tránsito en donde un motociclista golpea su cabeza sin casco contra el pavimento. Se encuentra lúcido y sus signos vitales son normales. Le inmoviliza el cuello y es trasladado hasta un hospital en donde tras una radiografía diagnostican una fractura sin desplazamiento de la apófisis odontoides. Indique la opción correcta:
- a) La articulación atlanto-odontoidea es una Artrosis
 - b) La articulación atlanto-odontoidea es una Trocoide y se relaciona posteriormente con el bulbo y médula espinal
 - c) La articulación atlanto-odontoidea se da entre la apófisis odontoides y el cuerpo del atlas
 - d) La articulación atlanto-odontoidea está reforzada posteriormente por el ligamento anular
 - e) La articulación atlanto-odontoidea es una Trocoide y se relaciona posteriormente con el tálamo
- 2) Tras una evaluación exhaustiva ud sospecha la posible existencia de un tumor hipofisiario. Solicita un RMN y se corrobora su sospecha. El tumor afecta el seno cavernoso.
- ¿Cuál de los siguientes pares no se verá afectado?
- a) Motor ocular común
 - b) Motor ocular externo
 - c) Nervio Mandibular
 - d) Nervio Maxilar
 - e) Nervio Oftálmico
- 3) La inervación de la Duramadre está dada por lo siguiente EXCEPTO:
- a) Nervio Vago
 - b) Nervio Espinal
 - c) Nervio Trigémino
 - d) Rama recurrente de Arnold, ramo del nervio oftálmico
 - e) Tres primeras raíces cervicales
- 4) El tálamo está irrigado principalmente por:
- a) Art. Cerebral Posterior
 - b) Art. Coroidea Anterior
 - c) Art. Cerebral Media
 - d) Art. Comunicante Posterior
 - e) Arteria Cerebral Posterior
- 5)Cuál de los siguientes nucleos se relaciona con el NEOCEREBELO
- a) Dentado
 - b) Globoso
 - c) Emboliforme
 - d) Fastigio (del techo)
 - e) Interposito (Globoso y Emboliforme)
- 6) Las manchas y estrías acústicas son:
- a) Receptores auditivos
 - b) Neuronas cuyo el soma se localiza en el Bulbo y Protuberancia



- c) **Receptores Vestibulares**
- d) Receptores que transforman la energía química en cinética
- e) Fotorreceptores
- 7) **Cuál NO es un núcleo hipotalámico**
- a) Núcleo ventromedial
- b) Núcleo Arcuato
- c) Núcleo Supraquiasmático
- d) **Núcleo Accumbens**
- e) Nucleo Preoptico
- 8) **Las articulaciones Cigoapofisiarias de las vertebrae torácicas son**
- a) Tipo Anfiartrosis, género Sindesmosis
- b) **Tipo Diartrosis, género Artodia**
- c) Tipo Diartrosis, género Trocoide
- d) Tipo Diartrosis, género Condilea
- e) Tipo Sinartrosis
- 9) **Los Conductos Semicirculares se localizan**
- a) **Oído Interno**
- b) Oído Medio
- c) En el hueso Parietal
- d) Oído Externo
- e) Cóclea
- 10) **¿Qué esperarías encontrar en una persona con una imagen en una RMN cerebral compatible con un tumor en la circunvolución frontal ascendente?**
- a) Falla en la interpretación de imágenes
- b) **Alteración de movimientos voluntarios**
- c) Alteración de la conducta
- d) Alteración de la percepción del gusto
- e) Alteración en la visión
- 11) **Con respecto al núcleo Iridioconstrictor (Edinger Westphal) indique lo correcto.**
- a) Su componente funcional es eferente somático general (ESG)
- b) Tiene información simpática e inerva las fibras circulares del Iris
- c) Tiene información simpática e inerva las fibras radicales del Iris
- d) **Tiene información parasimpática e inerva las fibras circulares del Iris**
- e) Tiene información parasimpática e inerva al músculo recto interno del ojo
- 12) **Con respecto a la vía vestibular indique la opción INCORRECTA**
- a) El órgano de Scarpa constituye la primera neurona de la vía vestibular
- b) **Las estrías acústicas se localizan en la Cóclea**
- c) De los núcleos vestibulares en la información pasa a núcleos oculomotores, cerebelo, vía vestíbulo espinal, corteza cerebral
- d) Los núcleos vestibulares se localizan en protuberancia y bulbo
- e) Las manchas acústicas captan información del equilibrio estático
- 13) **Cuál de los siguientes núcleos analiza y procesa la información del gusto**
- a) Salivar Inferior
- b) **Fascículo Solitario**
- c) Ambiguo



+5555999900820



messages.downloaded_by



@ideal_med1

- d) Lacrimomuconasal
 - e) Dorsal del Vago
- 14) Con cual de los pares craneales siguientes relaciona al Ganglio de Andersch**
- a) VII
 - b) IX**
 - c) XI
 - d) III
 - e) V
- 15) El nervio Mandibular atraviesa el Cráneo por:**
- a) Agujero Oval**
 - b) Agujero Redondo Mayor
 - c) Foramen Yugular
 - d) Agujero Condileo Anterior
 - e) Agujero espinoso
- 16) El colón sigmoideo está innervado parasimpáticamente por**
- a) Nervio Glosofaríngeo
 - b) Nervio Espinal
 - c) Neuronas parasimpáticas de la médula espinal sacra**
 - d) Ninguno es correcto
 - e) Neuronas parasimpáticas de la cadena lateral de la médula espinal
- 17) La innervación secretomotoras de las glándulas salivales excepto la parótida está dada por**
- a) IX
 - b) VII**
 - c) X
 - d) Cadena simpática Cervical
 - e) V
- 18) Cual de las siguientes estructuras NO atraviesan el Foramen Yugular (Rasgado Posterior)**
- a) Par XI
 - b) Vena Yugular Interna
 - c) Par IX
 - d) Par X
 - e) Par XII**
- 19) La corteza entorrinal la encontramos en:**
- a) Lóbulo Occipital
 - b) Corteza prefrontal
 - c) Hipocampo**
 - d) Hipotálamo
 - e) Cerebelo
- 20) Indique la información correcta**
- a) Las Alfa Motoneuronas innervan fibras musculares intrafusales
 - b) Las Gamma Motoneuronas innervan fibras musculares extrafusales
 - c) Las Gamma Motoneuronas innervan fibras musculares Intrafusales**
 - d) Las Gamma Motoneuronas innervan al Otg. Tendinoso de Golgi

- e) Las Gamma Motoneuronas transmiten el impulso sensitivo de la Propiocepción
- 21) Indique lo INCORRECTO con respecto al Tentorio**
- a) Divide la fosa cerebral de la Cerebelosa
 - b) **Está irrigada por la arterias Coroidea Anterior**
 - c) Es una prolongación de la Duramadre
 - d) También llamada Tienda del Cerebelo
 - e) Está inervada por el Nervio V
- 22) Para regular la temperatura corporal Ud necesita de**
- a) Corteza Cerebral
 - b) **Nucleo preoptico y supraquiasmático del Hipotálamo**
 - c) Corteza Cerebelosa
 - d) Glándula Pineal del Epitálamo
 - e) El Tálamo
- 23) Cual de los siguientes son medios de fijación de la Médula Espinal**
- a) Cola de Caballo
 - b) Nervios Raquídeos
 - c) Ligamento Dentado y Nervios Raquideos
 - d) Filum Terminal y Cola de Caballo
 - e) **Ligamento Dentado y Filum Terminal**
- 24) Cuál de los siguientes pares craneales no tienen ninguna función sobre la lengua**
- a) IX
 - b) **XI**
 - c) V
 - d) VII
 - e) XII
- 25) Las Células de Renshaw son:**
- a) Neuronas que estimulan excitatoriamente a los músculos antagonistas frente a un reflejo miotático de huida cuando se quema la mano
 - b) Neuronas cerebelosas que reciben estímulos sensitivos inconscientes
 - c) **Neuronas que inhiben los músculos antagonistas para que un reflejo miotático puede darse**
 - d) Neuronas que están en la Médula Espinal y emiten un axón directamente hacia el músculo efector
 - e) Neuronas de la corteza cerebral que conectan distintos lobulos
- 26) Ud debe aplicarle una maniobra médica para disminuir la frecuencia cardiaca sobre el Seno Carotídeo a una persona con taquicardia.**
Que Está estimulando para obtener dicho efecto:
- a) **El núcleo Dorsal del Vago**
 - b) El nervio Espinal o Accessorio
 - c) El nucleo del Fascículo Solitario
 - d) El nucleo Olivar Superior
 - e) El nucleo Ambiguo
- 27) La glándula Lagrimal se encuentra inervada por:**
- a) **VII Par Craneal**
 - b) III Par Craneal



+5555999900820



messages.downloaded_by



@ideal_med1

- c) IX Par Craneal
- d) I Par Craneal
- e) Por el Sistema Nervioso Simpático

28) Cual de las siguientes funciones NO corresponde al Cerebelo

- a) Regulación de las emociones conjuntamente a otras estructuras
- b) Planificación de secuencia de movimientos
- c) Mantenimiento del Tono Muscular y la Postura Corporal
- d) **Mantener un estado de vigilia durante las distintas fases del sueño**
- e) Regulación de movimientos finos

29) En la circunvolución post central o Post Rolandica tenemos. Indique lo correcto

- a) El área visual primaria
- b) El area gustativa
- c) El area primitiva
- d) El area auditiva primaria
- e) **El area Somatoestesica**

30) Los siguientes son núcleos sensitivos del bulbo raquídeos. EXCEPTO:

- a) Nucleo Delgado y Cuneiforme
- b) **Ambiguo**
- c) Nucleo de Goll y Burdach
- d) Fascículo Solitario
- e) Trigemio Espinal

