



Final Anatomia - Diciembre 2020

Anatomia (Fundación Barceló)



messages.pdf_cover_qr_code_label

1) Paciente de edad avanzada consulta a guardia por palpitations se realiza ECG y se constata bloqueo AV (Trastorno de conducción cardíaca secundario a lesión de Nódulo de Keith y Flack.). Donde se aloja dicho nódulo:

Seleccione una:

- a. Ventrículo Izquierdo.
- b. Aurícula Izquierda (Triángulo de Koch.)
- c. Aurícula Derecha (Triángulo de Koch.)
- d. Orejuela Derecha.
- e. Ninguna es correcta.

2) señale el enunciado correcto

Seleccione una:

- a. el nervio radial inerva al músculos extensor radial del carpo, flexor superficial de los dedos y pronador cuadrado
- b. el nervio radial inerva al musculo supinador, braquioradial y extensor de los dedos
- c. el cubital radial inerva al palmar largo (palmar menor) supinador largo y corto
- d. el nervio mediano inerva al flexor superficial de los dedos, braquial y pronador cuadrado
- e. Ninguna es correcta

3) Paciente deportista de 23 años sufre fractura de cuello de peroné con lesión del Nv. Peroneo Común. ¿Cuál será la sintomatología motora del paciente?:

Seleccione una:

- a. Imposibilidad de Flexión Plantar de pie ya que el nervio inerva músculos posteriores de la pierna.
- b. Imposibilidad de realizar extensión de cadera ya que el nervio inerva músculos glúteos.
- c. Imposibilidad solo para flexión dorsal de pie ya que dicho nervio solo inerva músculos de compartimento anterior exclusivamente.
- d. Imposibilidad de flexión dorsal de pie y eversión de pie ya que el nervio inerva músculos de compartimentos anterior y lateral de la pierna.
- e. Imposibilidad de flexión dorsal de pie e inversión de pie ya que el nervio inerva músculos de compartimentos anterior y lateral de la pierna.

4) Paciente de 35 años trabajador rural ingresa a la guardia por una herida cortante secundaria a machetazo en región Retromaleolar Interna tobillo izquierdo. ¿Qué estructura presenta más riesgo de lesión?

Seleccione una:

- a. Músculo Peroneo Largo.
- b. Músculo Peroneo Corto.
- c. Arteria Pedia.
- d. Nv. Pedio.

e. Arteria Tibial Posterior

5) Durante un procedimiento quirúrgico, un cirujano ha retirado tejido que contiene los restos tímicos y observa una gran estructura venosa cruzada que ingresa a la línea media desde la izquierda y aparentemente vaciando el contenido en la Vena Cava Superior. ¿Cuál de los siguientes estructuras puede ser?

Seleccione una:

- a. Vena braquiocefálica derecha
- b. Vena braquiocefálica izquierda
- c. Vena yugular interna izquierda
- d. Vena subclavia izquierda
- e. Vena acigos

6) Señale el enunciado incorrecto

Seleccione una:

- a. la articulación uncovertebral es exclusiva de la región cervical y son todas planas
- b. el ligamento del diente del axis es un ligamento que me une el axis con el occipital y es parte del ligamento cruciforme.
- c. Las articulaciones de los cuerpos vertebrales a nivel cervical son todas sínfisis
- d. Las articulation atlanto axial media esta constituida por una doble trocoides
- e. Ninguna es correcta

7) Señale lo correcto en relación al foramen yugular

Seleccione una:

- a. Está ubicado a del hueso occipital
- b. Está relacionado exclusivamente con el hueso temporal
- c. Pertenecce exclusivamente al hueso occipital y está relacionado con los pares craneales IX. X Y XI
- d. Pertenecce exclusivamente al hueso temporal y está relacionado con el la vena yugular interna y los pares IX. X y XI
- e. Está formado por la articulación entre el hueso occipital y temporal y está relacionado con estructuras vasculares y nerviosas

8) Señale la respuesta correcta en el siguiente enunciado

Seleccione una:

- a. el musculo flexor radial del carpo (palmar mayor) esta inervado por el mediano y tiene una corredera propia por lo tanto no pasa por el tunel carpiano junto a los demás flexores
- b. el musculo flexor cubital del carpo se inserta en el pisiforme y no presenta ninguna relación con el canal cubital de guyon
- c. el musculo extensor largo del pulgar y extensor corto van juntos en la misma corredera



- d. el flexor profundo de los dedos esta innervado por el mediano y el cubital y su tendón esta perforado por el superficial
- e. Ninguna es correcta

9) SEÑALE EL ENUNCIADO CORRECTO

Seleccione una:

- a. El armazón fibroso del corazón se encuentra ubicado principalmente en las paredes anteriores de las aurículas (ATRIOS) .
- b. Los ventriculos estan formados por un solo tipo de musculo conocido como fibras ventriculares comunes.
- c. El armazón fibroso del corazón se encuentra ubicado principalmente en la base de ambos ventrículos
- d. Los musculos pectoneos son musculos que los encontramos distribuidos en toda la masa cardiaca y estan formados por musculo de 1, 2 y 3 orden
- e. Ninguna es correcta

10) De las siguientes opciones Señale el enunciado incorrecto

Seleccione una:

- a. El musculo omohioideo se inserta en la escapula medialmente a la escotadura superior de la escapula
- b. El musculos suprahiodeos estan conformados por el digastrico, estilohioideo, milohioideo, tirohioideo
- c. El esternocleidomastoideo esta innervado por el nervio espinal tambien conocido accesorio
- d. El musculo trapecio puede realizar la aduccion de escapula, se inserta en la espina de la escapula y esta innervado por el espinal o accesorio.
- e. Ninguna es correcta

11) El uréter derecho en su porción Abdominal presenta las siguientes relaciones (Marque lo correcto):

Seleccione una:

- a. Intra peritoneal, por dentro Aorta Abdominal, por fuera Colon Ascendente y por delante el Músculo Psoas.
- b. Retroperitoneal, por dentro Aorta Abdominal, por fuera Colon Ascendente y por detrás el Músculo Psoas.
- c. Retroperitoneal, por dentro Vena Cava Superior, por fuera Colon Ascendente y por delante el Músculo Psoas.
- d. Retroperitoneal, por dentro Vena Cava Inferior, por fuera Colon Descendente y por detrás Musculo Psoas.
- e. Retroperitoneal, por dentro Vena Cava Inferior, por fuera Colon Ascendente y por detrás Músculo Psoas.



12) Señale el enunciado correcto en relación musculos del cuello

Seleccione una:

- a. Los musculos miltifidos son exclusivos de la region cervical y representan a los intertransversos
- b. El musculo recto lateral es un musculo ubicado superiormente en la region cervical y representa el primer intertransverso
- c. Los musculo escalenos pertenece al plano profundo medio del cuello
- d. El musculo esternocleidomastoideo realiza inclinacion heterolateral (hacia el lado contrario)
- e. Ninguna es correcta

13) Un cardiocirujano pediátrico acaba de dividir el esternón de un niño para reparar una malformación cardíaca. Una estructura similar a una glándula lobulada es visto inmediatamente oscureciendo el corazón. Esto es más probable que sea cual de las siguientes opciones

Seleccione una:

- a. Pulmón
- b. Glándula tiroides
- c. Timo
- d. Ganglios linfáticos
- e. Hígado

14) ¿Como cirujano que explora el tórax, podrá identificar la arteria pulmonar en cuál de las siguientes ubicaciones?

Seleccione una:

- a. Anterior a la aorta ascendente y la VCS
- b. Anterior a la aorta ascendente y posterior a la VCS
- c. Posterior a la aorta descendente y la VCS
- d. Posterior a la aorta ascendente y la VCS
- e. Posterior a la aorta ascendente y anterior a la VCS

15) Paciente de 32 años con diagnóstico de ACV (accidente cerebrovascular) hace un año, presenta como secuela lesión de área 20-21de Brodmann o Área de Wernike, que alteración presentara el paciente:

Seleccione una:

- a. Alteración para la visión de objetos.
- b. Alteración de la Olfación.
- c. Alteración del Tacto Fino.
- d. Alteración para articular palabras.
- e. Alteración para comprender lenguaje escrito y hablado.



16) Señale la respuesta correcta en el siguiente enunciado

Seleccione una:

- a. La fosa axilar tiene como limite anterior al musculo pectoral mayor , subclavio , pectoral menor y serrato anterior
- b. El limite posterior esta dado por el subescapular, dorsal ancho y supraespinoso
- c. El limite anterior tiene al ligamento de gerdy junto al pectoral mayor y menor
- d. El limite anterior tiene a la fascia clavipectoral al subclavio y ambos pectorales
- e. Ninguna es correcta

17) Con respecto a vertebras cervicales señale la opcion correcta

Seleccione una:

- a. Las 7 presentan tuberculos espinosos bifurcados y en sus apofisis articulares superiores la carilla articular se orienta medialmente
- b. El diente del axis presenta dos carillas articulares y en su vertice encuentro a los ligamento alares
- c. El tuberculo carotideo se ubica a nivel de la 5 vertebra cervical en su apofisis transversa
- d. El atlas presenta una carilla articular en su arco anterior y por regla general la mayoría de los agujeros medulares en la vertebras cervicales es triangular
- e. Ninguna es correcta

18) señale el enunciado correcto

Seleccione una:

- a. la articulacion humero cubital es giglimo (troclear) y realiza movimientos de flexo extension en el plano sagital
- b. el movimiento de supinacion del antebrazo se da principalmente en la articulacion humero cubital
- c. el ligamento de bardinet lo puedo encontrar en el codo en el compartimento lateral
- d. el musculo flexor profundo de los dedos pertenece a los epicondileos mediales
- e. Ninguna es correcta

19) En un Paciente de 63 años de edad con antecedentes de ACV (Accidente Cerebrovascular) y lesión permanente en Area 44-45 de Brodmann o de Broca, ud esperaría encontrar:

Seleccione una:

- a. Alteración de la Agudeza Visual.
- b. Alteración de la Audición.
- c. Alteración de la comprensión del Lenguaje escrito.
- d. Alteración de Olfación.
- e. Altercaión para articulación de las Palabras.



20) Como cirujano que realiza una apendicectomía, se encuentra con una arteria y vena en la fascia superficial de la pared abdominal inferior. ¿Se trata de Cuál de las siguientes opciones?

Seleccione una:

- a. Arteria y vena epigástricas superficiales
- b. Arteria y vena circunfleja iliaca superficial
- c. Arteria y vena intercostal
- d. Arteria y vena epigástricas inferiores
- e. Arteria y vena epigástricas superiores

21) Paciente de 23 años ingresa al servicio de emergencia de guardia por accidente en vía pública en regular estado general se realizan estudios de emergencia y se constata en TAC ruptura esplénica, se decide intervención quirúrgica de urgencia. Si usted es el cirujano donde ubicaría el bazo en la intervención:

Seleccione una:

- a. Detrás del Riñón derecho.
- b. Detrás del Estómago.
- c. Delante del Riñón Derecho.
- d. Arriba del Diafragma.
- e. Detrás del Riñón Izquierdo.

22) Señale la respuesta incorrecta en el siguiente enunciado

Seleccione una:

- a. El tronco secundario lateral (anteroexterno) del plexo braquial me da la raíz lateral del mediano y el nervio musculocutáneo
- b. El tronco secundario posterior me da al nervio radial, axilar (circunflejo) y al cutáneo medial del brazo
- c. El tronco secundario medial (antero interno) me da la raíz medial del mediano, cutáneo medial del antebrazo y también al cubital
- d. El nervio toraco dorsal me inerva al músculo dorsal ancho
- e. Ninguna es correcta

23) señale el enunciado incorrecto

Seleccione una:

- a. la articulación del hombro es multiaxial y la flexión la realiza con un eje transversal
- b. la articulación del hombro es una esferoidea y la rotación la realiza a través de un eje longitudinal
- c. la articulación del hombro realiza el movimiento de abducción en el plano frontal o coronal
- d. la articulación del hombro realiza el movimiento de flexión en el plano horizontal



e. Ninguna es correcta

24) De los siguientes enunciados señale la opción correcta

Seleccione una:

- a. Las articulaciones cigapofisarias a nivel cervical son todas planas
- b. El agujero de conjunción a nivel cervical está formado por la pars interarticularis
- c. El ligamento dentado en la región cervical se ensancha a nivel del cuerpo vertebral y se hace más estrecho a nivel del disco
- d. La membrana tectoria se extiende hasta la 6ª vértebra cervical
- e. Ninguna es correcta

25) Paciente de 25 años deportista de alto rendimiento consulta por dolor a la extensión de pulgar y tumefacción en cara radial distal de antebrazo derecho, mediante ecografía se realiza diagnóstico de tendinitis de De Quervain (tendinitis de 1º correa extensora de muñeca). ¿Qué tendones se encuentran involucrados?

Seleccione una:

- a. Extensor Largo del Pulgar y Abductor Largo del Pulgar.
- b. Extensor común de los dedos y Extensor Largo del Pulgar.
- c. Extensor corto del Pulgar y Abductor Largo del Pulgar.
- d. Extensor medio de Pulgar y Extensor Largo del Pulgar.
- e. Ninguna es correcta.

26) En relación al sistema cardionector del corazón señale el enunciado correcto

Seleccione una:

- a. Al nodo sinusal los podemos ubicar en la pared posterior de la aurícula derecha medialmente a la vena cava superior
- b. El nodo sinusal es una estructura que se encuentra ubicada a por encima del pericardio en la pared superior de la aurícula derecha
- c. El nodo A-V se encuentra ubicado en la pared medial de la aurícula izquierda en una región conocida como triángulo de Koch
- d. El nodo sinusal es subpericárdico y se encuentra ubicado en la pared superior de la aurícula derecha lateralmente a la vena cava superior
- e. Ninguna es correcta

27) Lea atentamente los enunciados que figuran a continuación y señale lo correcto

Seleccione una:

- a. La circulación mayor o sistémica comienza en el ventrículo derecho y termina en la pared superior de la aurícula derecha por intermedio de la cava superior y la cava inferior
- b. Una de las principales ramas que presenta el tronco braquicefálico arterial es la arteria intercostal medial

- c. la vena coronaria magna desemboca en la pared medial de la aurícula derecha
- d. **el septo interventricular se encuentra irrigado por la arteria interventricular posterior y anterior**
- e. Ninguna es correcta

28) Señale la respuesta correcta en el siguiente enunciado

Seleccione una:

- a. El músculo braquial tiene un componente supinador y está innervado por el nervio cutáneo
- b. **El músculo bíceps braquial es un músculo supinador, flexor y está innervado por el nervio musculocutáneo**
- c. El músculo tríceps presenta una cabeza que se inserta en el tubérculo supraespalmoideo y está innervado por el radial
- d. Al músculo coracobraquial lo atraviesa el nervio musculocutáneo pero está innervado por el mediano
- e. Ninguna es correcta

29) Señale el enunciado correcto

Seleccione una:

- a. El tronco braquiocefálico arterial es rama de la aorta ascendente y se da a la arteria subclavia y a la carótida común derecha
- b. La arteria vertebral ingresa a nivel del agujero transversario de la 5 y a veces de la 4 vértebra cervical generalmente
- c. **El tronco braquiocefálico venoso izquierdo resulta de la yugular interna y de la vena subclavia y tiene una extensión un poco mayor que el derecho**
- d. El paquete vasculonervioso del cuello está formado por el nervio vago, la carótida común y la yugular externa.
- e. Ninguna es correcta

30) En relación a los músculos del cuello señale la opción correcta

Seleccione una:

- a. El recto posterior mayor va desde el tubérculo posterior del atlas hasta la línea nucal superior y se encuentra lateral al recto menor
- b. El oblicuo inferior va desde la apófisis espinosa del axis hasta la línea nucal superior
- c. El oblicuo inferior es un músculo que participa de manera activa en la flexión y rotación de la cabeza
- d. **El músculo recto posterior menor parte desde el tubérculo posterior del atlas, es principalmente extensor y se encuentra medialmente al recto posterior mayor**
- e. Ninguna es correcta



31) Señale el enunciado correcto

Seleccione una:

- a. El nervio mediano inerva en la mano al musculo flexor corto del pulgar sus dos cabezas, al oponente del pulgar y al aductor del pulgar
- b. El nervio mediano inerva al 1,2, y 4 lumbrical junto con el oponente del pulgar
- c. El nervio cubital inerva al aductor corto del pulgar 3 y 4 lumbrical
- d. El nervio cubital inerva todo los interoseos mas el 1 y 2 lumbrical**
- e. Ninguna es correcta

32) SEÑALE EL ENUNCIADO CORRECTO EN RELACION AL CORAZON

Seleccione una:

- a. La base del corazon esta constituida principalmente por las auriculas y bases venstriculares, y la misma tiene un aspecto muy vascular
- b. El vertice del corazon (APEX) presenta una direccion hacia la izquierda y lo poedemos ubicar normalmente a nivel del 7 espacio intercostal
- c. El corazon presenta en cada ventriculo dos camaras de las cuales una es de entrada (VENOSA) y se relaciona con el orificio atrioventricular.**
- d. El corazon en personas normolineas generalmente muy verticalizados y no tan orientados hacia la izquierdo
- e. Ninguna es correcta

33) señale el enunciado correcto

Seleccione una:

- a. el musculo aductor mayor presenta una cabeza lateral y otra medial de la cual la medial esta inervado por el nervio obturador
- b. el musculo vastointermedio se encuentra inervado por el nervio ciatico
- c. el musculo sartorio corresponde al cuadriceps y se encuentra inervado por una rama del femoral
- d. los musculos gastrocnemios (gemelos) realizan flexion plantar pero tambien pueden flexionar la rodilla**
- e. Ninguna es correcta

34) Como patólogo, está examinando el corazón de una víctima de muerte por trauma y observe un desgarro en la unión de la VCS y la aurícula derecha.¿Este desgarro probablemente dañaría cuál de los siguientes?

Seleccione una:

- a. Nodo SA**
- b. Nodo AV
- c. Paquete AV
- d. Rama derecha del haz de Hiss
- e. Rama izquierda del haz de Hiss



35) Paciente de 30 años consulta al oftalmólogo refiriendo pérdida de visión del campo temporal derecho. Cual región de la retina se encuentra afectada:

Seleccione una:

- a. Retina Temporal izquierda.
- b. Retina Nasal Izquierda.
- c. Retina Nasal Derecha.**
- d. Retina Temporal Derecha.
- e. Ninguna es correcta.

36) Un cirujano torácico ha entrado en la cavidad pleural derecha y ha extirpado dos ganglios linfáticos sospechosos en el hilio del pulmón derecho para estudio patológico. Estos nódulos pertenecen a ¿cuál de los siguientes grupos de ganglios linfáticos?

Seleccione una:

- a. Parasternal
- b. Paratraqueal
- c. Traqueobronquial superior
- d. Traqueobronquial inferior
- e. Broncopulmonar**

37) Paciente deportista de 20 años sufre luxación gleno humeral derecha durante su práctica deportiva, en servicio de emergencia se realiza reducción de luxación glenohumeral derecha. Posterior a esto el paciente refiere a falta de sensibilidad a nivel de muñón del hombro derecho e incapacidad para contraer deltoides. ¿Qué nervio se encarga de innervar sensitivamente el muñón del hombro y motoramente el Deltoides?

Seleccione una:

- a. Inervación sensitiva del Hombro a cargo del Nv. Radial y el Deltoides a cargo del Nv. Mediano.
- b. Inervación sensitiva y motora a cargo del Nv. Mediano.
- c. Inervación sensitiva del Hombro a cargo del Nv. Cubital y motora a cargo del Nv. Mediano.
- d. Inervación sensitiva y motora a cargo del Nv. Circunflejo o Axilar.**
- e. Inervación sensitiva y motora a cargo del Nv. Radial.

38) Paciente de 45 años de edad que sufre accidente en vía pública que le ocasiona fractura espiroidea de tercio medio de diáfisis humeral con sección de Nervio Radial (Fractura de Holstein Lewis.) si Ud. es el Médico que examina al paciente que esperarías encontrar en el Paciente:

Seleccione una:

- a. Falta de función del Braquial Anterior secundario a lesión de Nv. Radial.
- b. Falta de función del Pronador Redondo secundario a lesión de Nv. Radial.



- c. Falta de función de los Interóseos palmares de la mano secundario a lesión de Nv. Radial.
- d. Falta de función del Extensor Cubital del Carpo secundario a lesión del Nv. Radial.
- e. Falta de función de Interóseos dorsales de la mano secundaria a lesión de Nv. Radial.

39) señale el enunciado incorrecto

Seleccione una:

- a. el ligamento cruzado anterior junto con el posterior me limitan los movimientos de rotación medial
- b. el ligamento cruzado anterior se inserta en el condilo lateral y se encuentra acompañado por el ligamento menisco femoral
- c. el ligamento colateral tibial tiene forma acintada y presenta un ligamento accesorio que lo acompaña
- d. la rodilla necesita de estar en flexión para poder realizar los movimientos de rotación lateral y medial
- e. Ninguna es correcta

40) En relación a la vaina del músculo recto del abdomen señale lo correcto

Seleccione una:

- a. en los 2/3 superiores esta formada por detrás por la división posterior de la aponeurosis del músculo oblicuo interno y aponeurosis del transverso del abdomen
- b. en 1/3 inferior está formada por delante por la aponeurosis del oblicuo interno mas superficialmente el transverso y por ultimo el mas superficial de todos el oblicuo externo
- c. en 1/3 inferior está formada por delante por la aponeurosis de todos los musculos anchos y la fascia transversalis
- d. en los 2/3 superiores esta formada por delante por la aponeurosis de los musculos transverso y oblicuo interno
- e. Ninguna es correcta

41) SEÑALE EL ENUNCIADO CORRECTO EN LA SIGUIENTE PREGUNTA

Seleccione una:

- a. la aurícula izquierda presenta seis paredes de las cuales la inferior es en la que desembocan las 4 venas pulmonares transportando sangre oxigenada
- b. el ventriculo izquierdo presenta dos paredes y en su base encontramos el infundíbulo cardiaco relacionándose directamente con la aorta
- c. la aurícula (atrio) derecha presenta en su pared superior el orificio de la vena cava superior son su valvula correspondiente
- d. la aurícula derecha presenta en su pared anterior el orificio correspondiente a la valvula tricuspide
- e. Ninguna es correcta

42) SEÑALE EN ENUNCIADO INCORRECTO EN RELACION AL CORAZON

Seleccione una:

- a. **el ventriculo derecho presenta tres paredes y su miocardio es menos grueso que el izquierdo debido a las presiones con las que debe trabajar y pared anterior representa practicamente la cara anterior del corazon.**
- b. el ventriculo izquierdo presenta dos paredes y su base esta relacionada con el tronco pulmonar el cual transporta sangre carboxigenada hacia los pulmones.
- c. el corazon presenta un esqueleto cartilaginoso ubicado alrededor de los orificios arteriales y atrioventriculares, proyectandose el mismo hasta el inicio de la porcion carnosa del septo interventricular
- d. las auriculas (atrios) presentan un aspecto cavernoso debido a la gran cantidad de musculo de 1 , 2 y 3 orden que tiene.
- e. Ninguna es correcta

43) Ingresa por guardia un paciente de 3 años de vida con obstrucción de la vía aérea superior por cuerpo extraño. Los médicos de guardia no logran desobstrucción de la vía con maniobras manuales, por lo que realizan Cricotiroidotomía de urgencia (apertura en la membrana cricotiroides para establecer una vía respiratoria permeable). Si usted fuera el Medico, ¿Dónde realizaría la incisión?

Seleccione una:

- a. Borde superior del Hueso Hioides.
- b. Borde inferior del Hueso Hioides.
- c. Borde Superior del Cartílago Tiroides.
- d. Borde Inferior del Cartílago Tiroides.**
- e. Triángulo de Beclard.

44) Señale el enunciado correcto en relacion al corazon

Seleccione una:

- a. el endocardio se continua con la tunica adventicia de los vasos relacionados con el corazon
- b. las caras parietales del las valvas semilunares estan revestidas de endocardio
- c. las valvulas atrioventriculares estan revestidas por repliegues del endocardio**
- d. el pericardio fibroso presenta un ahoja conocida como epicardio
- e. Ninguna es correcta

45) Deportista de 30 años se cae de su propia altura con torsión y valgo forzado de rodilla izquierda, es valorado por el médico de urgencia, se constata al examen físico hinchazón severa de rodilla (derrame articular) y traslación hacia anterior de tibia a la maniobra de estrés (test de cajón anterior o Lachmann). ¿Qué ligamento de la rodilla evita la traslación anterior de la tibia en los movimientos de la rodilla?

Seleccione una:

- a. Ligamento Cruzado Posterior.



- b. **Ligamento Cruzado Anterior.**
- c. Ligamento Lateral Interno.
- d. Ligamento Lateral Externo.
- e. Ligamento de Wrisberg.

46) cual de los siguientes musculos no corresponde a un musculo isquitibial

Seleccione una:

- a. semimembranoso
- b. semitendinoso
- c. biceps cabeza femoral larga
- d. biceps femoral cabeza corta**
- e. Ninguna es correcta

47) Llega a su guardia un paciente de 45 años de edad con dolor agudo lumbar asociado a perdida de Sensibilidad y disminución de fuerza que compromete el territorio del Nervio Ciático Derecho. Se realiza RNM (Resonancia Magnética Nuclear) donde se objetiva Hernia discal entre L5 S1 con compresión de dicho foramen. ¿Cuál sería la Raíz Nerviosa ubicada entre L5 y S1 comprometida?:

Seleccione una:

- a. L1.
- b. L2.
- c. L3.
- d. L4
- . e.**
- L5.**

48) señale a la respuesta correcta en el siguiente enunciado

Seleccione una:

- a. la articulacion de chopart corresponde a la medio tarsiana y esta dado por una esferoidea lateralmente y una de encaje reciproco medialmente
- b. la articulación del lisfranc me une el arco tarsiano y el arco metatarsiano entre si**
- c. la articulacion tibioperonea distal es plana
- d. el menisco midial tiene la forma de una letra O muy cerrada a diferencial de lateral que es mucho mas abierta
- e. Ninguna es correcta

49) Señale la respuesta correcta en el siguiente enunciado

Seleccione una:

- a. El musculo serrato anterior se inserta en el borde medial de la escapula, esta inervado por el toracico largo y llega hasta la decima costilla**
- b. El musculo subescapular es rotador medial, esta inervado por el toracodorsal y se inserta en la cara anterior de la escapula

- c. El musculo supraespinoso, es aductor del hombro y esta innervado por el supraescapular
- d. El musculo subclavio esta innervado por el subclavio es un musculo que participa en la flexion del cuello y se inserta en la cara inferior de la clavícula hasta el humero
- e. Ninguna es correcta

50) señale el enunciado correcto

Seleccione una:

- a. la arteria braquial me da como rama a la braquial profunda la cual desciende medialmente junto el nervio mediano en el brazo
- b. la arteria braquial profunda me da como rama a la colateral cubital superior que desciende lateralmente en el humero y se anastomosa con la recurrente radial
- c. la arterial interosea es rama la arteria braquial
- d. la arteria recurrente cubital forma parte del circuito periarteriolar medial (interno) del codo
- e. Ninguna es correcta

