PORADNIK 6 Z 15

Poradnik mnożenia sukulentów

Protokół antyzgnilizowy, 20 gatunków z czasem ukorzenienia i metoda liścia krok po kroku

Biblia Sadzonek

Dlaczego sukulenty to osobny temat

Sukulenty mają inny metabolizm niż rośliny tropikalne. Magazynują wodę w liściach i łodygach — to co ratuje tropikalną sadzonkę (wysoka wilgotność, częste podlewanie) zabija sukulenta. Protokół jest odwrotny.

> **Różnica kluczowa:** Rośliny tropikalne → wilgotność i cień. Sukulenty → sucho, ciepło i dużo słońca. Jeśli zastosujesz protokół tropikalny do sukulenta, zgniją w 3-5 dni.

Protokół antyzgnilizowy — 5 zasad bez wyjątku

Zasusa cięcia lub oderwania: 24-72 godziny
Po oderwaniu liścia lub przycięciu łodygi: połóż na suchym papierze w ciepłym, wentylowanym miejscu. Nie na słońcu, nie w wilgoci. Czekaj aż rana jest sucha i ma "skórkę".

Podłoże: kaktusowe lub perlit 100%
Zwykła ziemia = gwarancja gnicia. Używaj gotowego podłoża kaktusowego lub czystego perlitu. Żadnego torfu, żadnej universal mix.

Pierwsze podlewanie: PO pojawieniu się korzeni, nie przed
Liść lub sadzonka leży na podłożu przez 2-6 tygodni BEZ podlewania. Korzenie "szukają" wody i rosną. Podlewanie przed korzeniami = gnicie.

Dużo jasnego, pośredniego światła
Minimum 4-6 godzin jasnego światła dziennie. Nie bezpośrednie słońce w południe (parzy liście), ale jasne okno południowe lub wschodnie jest idealne.

Temperatura min. 18°C, max. 35°C
Chłód spowalnia ukorzenianie. Zimą możesz użyć maty grzewczej pod tacką z sadzonkami.

Metoda liścia — krok po kroku

Najpopularniejsza metoda dla echeveria, graptoveria, sedum i gatunków rozetowych. Jeden liść → kilka nowych roślin.

Wybierz zdrowy, dojrzały liść
Środkowe liście rozety, pełne, bez plam. Liście zewnętrzne (najstarsze) są mniej skuteczne.

Oderwij ruchem skręcania, nie ciągnięcia
Trzymaj liść blisko łodygi, delikatnie przekręć. Musi odejść z CAŁĄ podstawą (meristem). Liść urwany w połowie nie wypuści korzeni. Jeśli zostaje fragment liścia na łodydze — za duże odrywanie, spróbuj inaczej.

Zasusa 24-48 godzin
Połóż na suchym papierze. Nie na słońcu bezpośrednim. Rana ma być sucha.

Połóż na wilgotnym podłożu kaktusowym
Podstawa (nie cały liść) dotyka podłoża. Nie zakopuj. Możesz położyć płasko. Delikatnie zraszaj podłoże co 3-4 dni — nie liść, tylko ziemię wokół.

Czekaj 2-6 tygodni
Najpierw pojawią się różowe korzenie, potem mała rozeta. Liść stopniowo więdnie — to normalne, odżywia nową roślinę.

Posadź gdy rozeta ma 1-2 cm i własne liście
Odetnij lub oderwij stary liść, który teraz jest pomarszczony. Posadź mała rozetę w doniczce 5-6 cm. Podlewaj skąpo.

20 gatunków — czas ukorzenienia i metoda

GATUNEK	METODA	CZAS (KORZENIE)	TRUDNOŚĆ	UWAGI
Echeveria	Liść / główka	2–4 tyg.	Łatwa ⭐⭐	Klasyk. Wiele odmian kolorystycznych.
Graptoveria	Liść / główka	2–4 tyg.	Łatwa ⭐⭐	Jak echeveria, nieco odporniejsza.
Sedum adolphii	Liść / łodyga	1–3 tyg.	Bardzo łatwa ⭐	Jeden z najszybszych i najpewniejszych.
Sedum rubrotinctum	Liść / łodyga	1–3 tyg.	Bardzo łatwa ⭐	"Jellybean plant" — piękne kolory.
Graptopetalum	Liść / łodyga	2–4 tyg.	Łatwa ⭐⭐	Bardziej tolerancyjny niż echeveria.
Pachyveria	Liść / główka	2–5 tyg.	Łatwa ⭐⭐	Hybryda — łączy odporność obu rodziców.
Aloe Vera	Odrostek/sucker	2–4 tyg.	Bardzo łatwa ⭐	Pobierasz odrostki z boku matki. Brak liści.
Haworthia	Odrostek / liść	3–6 tyg.	Umiarkowana ⭐⭐⭐	Cień toleruje lepiej niż inne sukulenty.
Gasteria	Liść / odrostek	3–6 tyg.	Umiarkowana ⭐⭐⭐	Rzadszy, wyższe ceny. Cień toleruje.
Kalanchoe tomentosa	Liść / łodyga	3–5 tyg.	Łatwa ⭐⭐	"Panda plant". Duży liść = wiele sadzonek.

GATUNEK	METODA	CZAS (KORZENIE)	TRUDNOŚĆ	UWAGI
Kalanchoe diagremontiana	Plantlet (dzieci z liści)	1–2 tyg.	Bardzo łatwa ⭐	Produkuje dzieci na brzegach liści. Zbierasz i sadzisz.
Sempervivum	Różyczki boczne	2–4 tyg.	Bardzo łatwa ⭐	"Wieczna żywotność". Mrozoodporna — sprzedaje się do ogrodów.
Crassula ovata	Liść / łodyga	3–6 tyg.	Łatwa ⭐⭐	"Drzewo jadeitowe". Popularne jako prezent.
Crassula perforata	Łodyga	2–4 tyg.	Łatwa ⭐⭐	Szybki wzrost. Dobra na sprzedaż.
Portulacaria afra	Łodyga	2–4 tyg.	Łatwa ⭐⭐	"Mini-baobab". Modna na bonsai-style.
Aeonium	Łodyga / główka	2–5 tyg.	Umiarkowana ⭐⭐⭐	Lubi chłód (odwrotnie niż inne). Dormancja latem.
Dudleya	Liść / główka	3–6 tyg.	Trudna ⭐⭐⭐⭐	Wyjątkowo wrażliwa na wodę. Dla zaawansowanych.
Cotyledon tomentosa	Liść / łodyga	3–6 tyg.	Umiarkowana ⭐⭐⭐	"Niedźwiedzie łapy". Rzadka, wysokie ceny.
Echeveria laui	Liść / główka	4–8 tyg.	Trudna ⭐⭐⭐⭐	Najdroższa echeveria. Wymaga perfekcyjnych warunków.
Lithops	Nasiona / podział	2–3 lat (!)	Bardzo trudna ⭐⭐⭐⭐⭐	"Kamienie żywotne". Nie dla sprzedaży sadzonek — czas i trudność zbyt duże.

Kiedy i jak ciąć główkę (beheading)

Gdy sukulent jest za wysoki i "rozciągnięty" (etiolacja) lub po prostu chcesz więcej roślin z jednej matki.

Odetnij główkę ze 3-5 cm łodygi
Czyste, zdezynfekowane nożyczki lub nóż. Cięcie w połowie między dwoma węzłami.

Zasusa główkę 2-3 dni
Na suchym papierze. Rana musi zaschnąć zanim włożysz do podłoża.

Zasusa pień matki: wkrótce wyśle boczne pędy

Nie wyrzucaj pnia. Z węzłów pod cięciem wyrosną nowe rozety. Jedna matka → kilka roślin.

Posadź główkę w podłożu kaktusowym

Bez podlewania przez 10-14 dni. Potem skąpo co 7-10 dni.

Próxny krok

Wybierz 3 sukulenty z tej listy, które masz już w domu. Przetestuj metodę liścia na jednym, główkę na innym. Stosuj protokół antyzgnilizowy i zapisz wyniki w **Arkuszu produkcji**.