

# Fundamentos básicos de las matemáticas

por Santi Martínez

October 30, 2025

# Índice

<b>1</b>	<b>Aritmética y álgebra básica</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Ecuaciones y desigualdades</b>	<b>5</b>
2.1	Ecuaciones . . . . .	5
2.2	Desigualdades . . . . .	6
<b>3</b>	<b>Funciones y gráficas</b>	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>Trigonometría</b>	<b>9</b>
<b>5</b>	<b>Geometría analítica</b>	<b>11</b>
<b>6</b>	<b>Límites y continuidad</b>	<b>12</b>
<b>7</b>	<b>Derivadas y aplicaciones</b>	<b>14</b>
<b>8</b>	<b>Integrales</b>	<b>16</b>
<b>9</b>	<b>Matrices y determinantes</b>	<b>17</b>
<b>10</b>	<b>Vectores, espacios vectoriales, álgebra lineal básica</b>	<b>18</b>
<b>11</b>	<b>Lógica matemática y combinatoria</b>	<b>19</b>

# 1 Aritmética y álgebra básica

Es la rama de las matemáticas que trabaja con **números** y las **operaciones básicas** entre ellos.

## Aritmética

### Operaciones fundamentales

$$a + b, a - b, a \times b, \frac{a}{b} \ (b \neq 0)$$

### Principales propiedades

- **Conmutativa.**  $ab = ba$
- **Asociativa.**  $(a + b) + c = a + (b + c)$
- **Distributiva.**  $a(b + c) = ab + ac$

### Potenciación y radicación

$$a^m \times a^n = a^{m+n}, \quad (a^m)^n = a^{mn}, \quad \sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}$$

## Álgebra

### Expresiones algebraicas

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

### Ecuaciones

$$2x + 5 = 11 \longrightarrow x = 3$$

## Identidades y factorización

$$\begin{aligned}(a+b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2 \\ (a-b)^2 &= a^2 - 2ab + b^2 \\ a^2 + b^2 &= (a-b)(a+b)\end{aligned}$$

## Sistemas de ecuaciones lineales

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases} \implies x = \frac{c_1b_2 - c_2b_1}{a_1b_2 - a_2b_1}, \quad y = \frac{a_1c_2 - a_2c_1}{a_1b_2 - a_2b_1}$$

## Funciones

**Función cuadrática:**  $f(x) = ax^2 + bx + c$

**Función lineal:**  $f(x) = mx + b$

## 2 Ecuaciones y desigualdades

### 2.1 Ecuaciones

Una ecuación es una **igualdad** que contienen una o más variables. Resolverla significa hallar los valores que completan dicha igualdad.

Tipos principales:

#### Lineales

$$ax + b + 0 \longrightarrow x = (-b/a)$$

#### Cuadráticas

$$ax^2 + bx + c = 0 \implies x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

#### Polinómicas

$$P(x) = 0 \quad , \quad P(x) \in \mathbb{R}[x]$$

## 2.2 Desigualdades

Una desigualdad **compara dos expresiones algebraicas** mediante los símbolos:

$$<, >, \leq, \geq$$

### Propiedades básicas

Sumar o restar el mismo número no cambia el sentido de la desigualdad:

$$a < b \implies a + c < b + c$$

Multiplicar o dividir por un **número positivo** mantiene el sentido; por un **número negativo**, invierte el sentido:

$$a < b \implies -a > -b$$

### Ejemplo lineal

$$2x - 3 < 5 \implies 2x < 8 \implies x < 4$$

### Desigualdad cuadrática

Resolver:  $2x^2 + bx + c > 0$

1. Hallar raíces de  $ax^2 + bx + c = 0$ .
2. Analizar el signo del trinomio en los intervalos determinados por las raíces.
3. Elegir los intervalos donde la desigualdad se cumple.

### 3 Funciones y gráficas

Una función es una relación entre dos conjuntos, donde cada elemento del dominio se asocia con un único elemento del codominio.

$$f : X \longrightarrow Y \quad , \quad x \mapsto f(x)$$

$\mapsto$ :  $x$  se le asigna  $x^2$

#### Funciones lineales

$$f(x) = mx + b$$

Es una recta que sube o baja según  $m$  y que cruza el eje  $y$  en  $b$ .

#### Funciones cuadráticas

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

Parábola que abre hacia arriba si  $a > 0$  y hacia abajo si  $a < 0$ .

Vértice:  $\left(-\frac{b}{2a}, f\left(-\frac{b}{2a}\right)\right)$

#### Funciones polinómicas

$$f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$$

Comportamiento determinado por grado  $n$  y coeficiente principal  $a_n$ .

## Funciones racionales

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} \quad , \quad Q(x) \neq 0$$

Posibles **asintotas**\* verticales y horizontales

**Asíntota:** Línea recta a la que una curva se acerca cada vez más cuando  $x$  o  $y$  tienden a un valor extremo (muy grande o muy pequeño), pero sin llegar a tocarla.

## Funciones exponenciales y logarítmicas

$$f(x) = a^x \quad , \quad g(x) = \log_a x$$

Exponenciales siempre positivas; logaritmos definidas para  $x > 0$ .

## Gráficas de funciones

- **Dominio:** Conjunto de valores posibles de  $x$ .
- **Rango:** Conjunto de valores posibles de  $f(x)$ .
- **Interceptos:**  
x-intercepto:  $f(x) = 0 \implies x$   
y-intercepto:  $x = 0 \implies f(0)$
- **Crecimiento / Decrecimiento:** Analizar la derivada  $f'(x)$  si aplica.
- **Simetría:**  
Par:  $f(-x) = f(x)$   
Impar:  $f(-x) = -f(x)$



## 4 Trigonometría

Estudia las relaciones entre los ángulos y los lados de un triángulo, y las funciones que describen esas relaciones en el **círculo unitario**.

### Razones trigonométricas en el triángulo rectángulo

Para un triángulo rectángulo con ángulo agudo  $\theta$ \*

$$\sin \theta = \frac{\text{cateto} - \text{opuesto}}{\text{hipotenusa}} \quad , \quad \cos \theta = \frac{\text{cateto} - \text{adyacente}}{\text{hipotenusa}} \quad , \quad \tan \theta = \frac{\text{cateto} - \text{opuesto}}{\text{cateto} - \text{adyacente}}$$

\* $\theta$ : Relación entre ángulos y lados en un triángulo rectángulo.

Otras razones derivadas:

$$\csc \theta = \frac{1}{\sin \theta} \quad , \quad \sec \theta = \frac{1}{\cos \theta} \quad , \quad \cot \theta = \frac{1}{\tan \theta}$$

### Identidades trigonométricas fundamentales

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

$$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$$

$$1 + \cot^2 \theta = \csc^2 \theta$$

### Fórmulas de adición y sustracción

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \pm \sin \alpha \sin \beta$$

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta}$$

## Doble y mitad de ángulo

$$\begin{aligned}\sin(2\theta) &= 2 \sin \theta \cos \theta \\ \cos(2\theta) &= \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = 2 \cos^2 \theta - 1 = 1 - 2 \sin^2 \theta \\ \tan(2\theta) &= \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta}\end{aligned}$$

## Funciones trigonométricas en el círculo unitario

Relacionan los ángulos con las coordenadas de los puntos en un círculo de radio 1 centrado en el origen  $(0,0)$

- Círculo unitario: radio  $r = 1$ , centro en  $(0,0)$
- Ángulo  $\theta$ : medido desde el eje positivo  $x$ , en sentido contrario a las manecillas del reloj
- Coordenadas de un punto:  $(x, y) = (\cos \theta, \sin \theta)$

Funciones principales:

- Seno:  $\sin \theta = y$
- Coseno:  $\cos \theta = x$
- Tangente:  $\tan \theta = \frac{y}{x}$  (si  $x \neq 0$ )
- Cotangente:  $\cot \theta = \frac{x}{y}$  (si  $y \neq 0$ )
- Secante:  $\sec \theta = \frac{1}{x}$  (si  $x \neq 0$ )
- Cosecante:  $\csc \theta = \frac{1}{y}$  (si  $y \neq 0$ )

## 5 Geometría analítica

Combina álgebra y geometría. Sirve para estudiar figuras geométricas usando coordenadas y ecuaciones.

Es decir, en lugar de dibujar solo un triángulo o una línea, podemos respesentarlos con números y fórmulas, lo que permite calcular distancias, pendientes, puntos de insercción, etc.

- Se trabaja normalmente en plano cartesiano.
- Las figuras como líneas, rectas, círculos y parábolas se pueden describir con ecuaciones algebraicas.

En resumen, **traduce la geometría en números y ecuaciones.**

## 6 Límites y continuidad

### Límites

El límite de una función nos dice hacia qué valor se acerca la función cuando la variable  $x$  se acerca a un número específico

**Idea clave:** No importa lo que pase en ese punto, sino hacia qué valor se aproxima la función.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

”El límite de  $f(x)$  cuando  $x$  tiende a  $a$  es  $L$ ”.

Ante  $\frac{0}{0}$ , al ser indeterminada, habría que factorizar.

## Continuidad

Una función es continua en un punto si no tiene saltos, agujeros ni interrupciones.

**Condiciones para que  $f(x)$  sea continua en  $x=a$**

1.  $f(a)$  existe
2.  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  existe
3.  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

Si alguna de estas falla, la función **no es continua** en es punto.

Ejemplo:

$$f(x) = x^2$$

- En  $x = 3$ , tenemos  $f(3) = 9$
- $\lim_{x \rightarrow 3} x^2 = 9$
- Coinciden  $\rightarrow$  La función es continua en  $x = 3$

## 7 Derivadas y aplicaciones

La derivada de una función mide la **velocidad de cambio** de esa función en un punto.

- Qué tan rápido cambia  $y$  y cuando cambia  $x$ .
- En geometría: es la **pendiente de la tangente a la curva** en un punto.

$$f'(x) \quad o \quad \frac{dy}{dx}$$

### Idea clave

Si tenemos una función  $y = f(x)$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

- Este se llama **definición formal de la derivada**
- Básicamente comparamos **el cambio de  $y$  dividido por el cambio de  $x$**  y hacemos que  $x+h$  se acerque a  $x$ .

### Ejemplo

Función:

$$f(x) = x^2$$

Derivada usando la definición:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h}$$

Expandiendo:

$$(x + h)^2 - x^2 = x^2 + 2xh + h^2 - x^2 = 2xh + h^2$$

Dividimos entre  $h$ :

$$\frac{2xh + h^2}{h} = 2x + h$$

Tomamos el límite cuando  $h \rightarrow 0$ :

$$f'(x) = 2x$$

Entonces la derivada de  $x^2$  es  $2x$

## Interpretación

Si  $f(x) = x^2$ , en  $x = 3$

$$f'(x) = 2 \times 3 = 6$$

Esto significa que  $x = 3$ , **la curva sube 6 unidades de  $y$  por cada unidad que avanzamos de  $x$ .**

Geométricamente: **la pendiente de la tangente en  $x = 3$  es 6.**

## 8 Integrales



## 9 Matrices y determinantes

## 10 Vectores, espacios vectoriales, álgebra lineal básica

## 11 Lógica matemática y combinatoria