

# Trabajo Práctico - Probabilidades 2025

Iguaran, Carlos; Olszevicki, Santiago

Se indica a continuación el valor de lambda de la entrega 7a de uno de los integrantes:

```
lambda <- params$lambda  
lambda
```

```
## [1] 3.71
```

1) Calcular la función de densidad de X. ¿A qué familia pertenece?

$$f_X(x) = \int_x^\infty \lambda^2 e^{-\lambda y} dy = \lambda^2 \int_x^\infty e^{-\lambda y} dy = \lambda^2 \left[ -\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda y} \right]_x^\infty = \lambda^2 \left( 0 + \frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x} \right) = \lambda e^{-\lambda x}$$

Dicha densidad indica que la variable X tiene distribución exponencial de parámetro  $\lambda$ .

b) Calcular la función de densidad condicional de  $Y \mid X = x$ . ¿A qué familia pertenece?

Nota: la densidad de Y dado  $X=x$  está definida solo para  $x \geq 0$

$$f_{Y \mid X=x}(y) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_X(x)} = \frac{\lambda^2 e^{-\lambda y}}{\lambda e^{-\lambda x}} = \lambda e^{-\lambda(y-x)} \quad \text{para } y \geq x$$

Se puede apreciar que Y es una exponencial desplazada. Es decir,  $Y \mid X = x \sim W + x$ , donde  $W \sim \text{Exp}(\lambda)$

c) Calcular  $E(X)$ ,  $E(Y)$ ,  $\text{Cov}(X, Y)$

- $E(X) = \frac{1}{\lambda} = 0.2695418$ , dado que  $X \sim \text{Exp}(3.71)$
- $E(Y) = [\text{Integral}] = \frac{2}{\lambda} = 0.5390836$  Ver bien cómo se resuelve esta integral
- $E(X, Y) = [\text{Integral}] = \frac{3}{\lambda^2} = 0.1453055$
- $\text{Cov}(X, Y) = E(X, Y) - E(X).E(Y) = \frac{1}{\lambda^2} = 0.0726528$

d) Calcular la función de distribución acumulada de  $Y \mid X = x$ , para  $x \geq 0$ .

$$P(Y \leq y \mid X = x) = P(W \leq y - x) = 1 - e^{-\lambda(y-x)}$$

Nota para nosotros: Si quisieramos agregar la integral, lo hacemos

e) Simular una muestra de tamaño 100 de la variable  $Y \mid X = 1$  a partir de una Uniforme en  $(0, 1)$ . Para ello, realizar y mostrar los cálculos correspondientes.

```

simulate_y_cond_x <- function(n, lambda = lambda){
  u = runif(n, 0, 1) # Para usar de random generator
  ws <- -log(u) / lambda # Exponenciales de parametro lambda ( $w_1 \dots w_n \sim W(\lambda)$ )
  ys <- ws+1 # Exponencial desplazada  $Y = W + 1$ 
  ys
}
muestra <- simulate_y_cond_x(100, lambda = params$lambda)
muestra[1:5]

```

```
## [1] 1.300108 1.109927 1.235529 1.116326 1.009904
```

- f) Implementar una función generar\_pares que tenga por parámetro a n, donde n denota la cantidad de datos a generar, y devuelva una matriz con un par generado con la distribución de (X, Y) en cada fila.
- g) Generar  $n = 2000$  datos y estimar con ellos  $E(X)$ ,  $E(Y)$ ,  $\text{Cov}(X, Y)$ . ¿Qué se observa?