


# محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية

في قلب هضبة نجد، شمال شرق مدينة الرياض، تمتد محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، حيث تتعانق الرمال الحمراء مع الروضات الخضراء والسهول الحصوية والأودية الموسمية، لترسم لوحة طبيعية تتبدل ألوانها وملامحها مع تعاقب الفصول وهطول الأمطار. ففي هذه البيئة الصحراوية لا تبدو الأرض مجرد مساحات من الرمال والتربة الجافة، بل سجلًا طبيعيًا يروي قصة التفاعل المستمر بين المياه والرياح والصخور والنباتات عبر آلاف وملايين السنين. وتكتسب المحمية أهمية علمية وبيئية خاصة، لأنها تقدم نموذجًا واضحًا لكيفية تشكل التضاريس الصحراوية وتطورها، وكيف تتحول مياه الأمطار من عامل للنحت ونقل الرواسب إلى مصدر للحياة وتجدد الغطاء النباتي.

تقع المحمية في منطقة الرياض، وتبلغ مساحتها نحو 11,300 **كيلومتر مربع**، وقد أُنشئت عام 2018م ضمن منظومة المحميات الملكية في المملكة العربية السعودية، وتخضع لإشراف هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية. وتضم نطاقات طبيعية من أبرزها روضة خريم ومحمية التنهات، إلى جانب بيئات رملية وسهول حصوية وأودية موسمية تتفاوت خصائصها من موقع إلى آخر. ويمنحها قربها النسبي من العاصمة الرياض أهمية إضافية في مجالات البحث العلمي والسياحة البيئية والتوعية الطبيعية، كما يجعلها موقعًا مناسبًا لدراسة العلاقة بين حماية الموارد الطبيعية وتنظيم الأنشطة البشرية في البيئات الصحراوية الحساسة.

ومن الناحية الجيولوجية، تقع المحمية ضمن نطاق الرف العربي الرسوبي الذي يغطي أجزاء واسعة من وسط المملكة وشرقها، حيث تنتشر تكوينات رسوبية تعود إلى فترات

جيولوجية مختلفة، تعلوها رواسب أحدث من الرمال والحصى والطمي. وقد تعاقبت على هذه المنطقة بيئات ترسيبية متعددة، قبل أن تسهم عمليات التجوية والتعرية والنقل والترسيب في تشكيل المظاهر الصحراوية الحالية. وتظهر العلاقة بين طبيعة الصخور والرواسب السطحية في اختلاف أشكال التضاريس وخصائص التربة ونفاذيتها، مما يؤثر في حركة المياه وتوزيع الرطوبة والغطاء النباتي، ويمنح المحمية قيمة علمية لدراسة تطور السطح في البيئات الجافة.

وتُعد **رمال الدهناء** من أبرز المعالم الجيومورفولوجية المرتبطة بالمحمية، حيث تمتد الكثبان الرملية على هيئة أحزمة طولية وتجمعات متتابعة، تتميز بألوانها الحمراء والبرتقالية الناتجة عن وجود أكاسيد الحديد على أسطح حبيبات الرمال. وقد تشكلت هذه الرواسب بفعل عمليات النقل والترسيب الريحي خلال فترات زمنية طويلة، وتختلف أشكال الكثبان وارتفاعاتها واتجاهاتها بحسب سرعة الرياح واتجاهاتها وكمية الرمال المتاحة وطبيعة السطح. وتتحرك الحبيبات الرملية بعمليات القفز والزحف، بينما تنتقل الجسيمات الدقيقة بالتعليق في الهواء، ثم تترسب عندما تنخفض سرعة الرياح أو تعترضها عوائق طبيعية. وتؤدي النباتات الصحراوية دورًا مهمًا في تثبيت أجزاء من الرمال والحد من حركتها، كما تسهم الأمطار في زيادة تماسك الرواسب السطحية بصورة مؤقتة.

وتتميز المحمية بوجود **الروضات الطبيعية** التي تمثل إحدى أهم خصائصها البيئية والهيدرولوجية، وفي مقدمتها روضة خريم، حيث تتجمع مياه الأمطار والسيول القادمة من الأودية والشعاب المحيطة داخل المنخفضات والسهول منخفضة الانحدار. وتحمل هذه المياه معها الرواسب الدقيقة والمواد المغذية، مما يساعد على نمو الأشجار والشجيرات والأعشاب الموسمية، ويحول بعض المواقع بعد الأمطار إلى مساحات خضراء وسط البيئة الصحراوية. ولا تقتصر أهمية الروضات على قيمتها النباتية والجمالية، بل تمثل أنظمة طبيعية تتفاعل فيها المياه والتربة والرواسب بصورة مستمرة، وتكشف عن العلاقة الوثيقة بين تضاريس أحواض التصريف ومعدلات الجريان السطحي وقدرة التربة على الاحتفاظ بالرطوبة.

وتنتشر في المحمية الأودية الموسمية وشبكات التصريف السطحي التي تنشط خلال فترات هطول الأمطار، حيث تنتقل المياه من المناطق المرتفعة نحو السهول والمنخفضات، حاملة معها الرواسب والحصى والمواد الدقيقة. وقد أسهمت هذه العمليات عبر الزمن في تشكيل مجاري الأودية والمراوح الرسوبية الصغيرة وتراكم الرواسب الفيضية داخل الروضات. وتختلف

استجابة السطح للأمطار بحسب طبيعة الصخور ونفاذية التربة ودرجة الانحدار وكثافة الغطاء النباتي، فقد تتسرب المياه بسرعة في بعض المواقع الرملية، بينما تتجمع أو تجري فوق الأسطح الأقل نفاذية. وتوفر هذه الظواهر فرصة علمية لدراسة الهيدرولوجيا الصحراوية، حيث يمكن لأمطار قصيرة وشديدة أن تحدث تغيرات ملحوظة في سطح الأرض رغم محدودية المعدلات السنوية للهطول.

وتنتشر في أجزاء من المحمية سهول حصوية وأسطح صحراوية مكشوفة تشكلت نتيجة إزالة الرواسب الدقيقة بفعل الرياح والجريان السطحي، وبقاء الحصى والمواد الخشنة على السطح فيما يُعرف **بالرصف الصحراوي**. وتمثل هذه الظاهرة إحدى صور تطور السطح في البيئات الجافة، حيث تسهم الطبقة الحصوية في حماية الرواسب الدقيقة الموجودة أسفلها من التعرية المباشرة، كما تؤثر في معدلات تسرب المياه والجريان السطحي. وتختلف خصائص هذه الأسطح عن الكثبان الرملية والروضات الطينية، مما يفسر التباين المكاني في حركة الرواسب وتوزيع النباتات واستجابة التربة للأمطار والرياح.

ويسود المحمية مناخ صحراوي حار وجاف، يتميز بارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف وانخفاضها في الشتاء، مع تفاوت واضح بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا. وتتسم الأمطار بأنها موسمية وغير منتظمة، وقد تؤدي بعض العواصف المطرية إلى جريان السيول وتجمع المياه في الروضات والمنخفضات. كما تؤثر الرياح الشمالية والشمالية الغربية في نقل الرمال والغبار وإعادة توزيع الرواسب السطحية. وتنتشر في المحمية أشجار الطلح والسدر وبعض الشجيرات والأعشاب الموسمية والنباتات المتكيفة مع البيئات الرملية والحصوية، وتزداد كثافتها في المواقع التي تحتفظ بالرطوبة بعد الأمطار. ويسهم هذا الغطاء النباتي في تثبيت التربة والحد من التعرية وتوفير موائل طبيعية للحياة الفطرية، مما يعزز القيمة البيئية للمحمية وأهمية المحافظة على توازنها الطبيعي.

وتكتسب المحمية أهمية علمية خاصة لدراسة العلاقة بين الرمال والمياه والتربة والنباتات، حيث يمكن تتبع التغيرات الموسمية في الغطاء النباتي ورطوبة التربة وحركة الرواسب باستخدام صور الأقمار الصناعية والقياسات الميدانية. كما توفر الروضات الطبيعية فرصة لدراسة دورات الغمر والجفاف وتأثيرها في الخصائص الفيزيائية للتربة وتوزيع النباتات، إلى جانب تحليل الرواسب الحديثة لفهم تاريخ الجريان السطحي والتغيرات البيئية المحلية. وتساعد

هذه الدراسات على تفسير العمليات الطبيعية التي تتحكم في استقرار الأنظمة الصحراوية، وتحديد المواقع الأكثر حساسية للتغيرات المناخية والضغوط البشرية.

**المخاطر الطبيعية في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية**

ترتبط المخاطر الطبيعية في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية بطبيعة تضاريسها التي تجمع بين الأودية الموسمية والروضات والمنخفضات والسهول الحصوية والكثبان الرملية. وتأتي **السيول المفاجئة وتجمع المياه في الروضات وتشبع التربة وفقدان قدرتها على التحمل** في مقدمة المخاطر الرئيسية، تليها **العواصف الرملية والغبارية وحركة الكثبان الرملية وزحف الرمال**. أما المخاطر الفرعية فتشمل التعرية المائية والريحية وتغير الخصائص الرسوبية للتربة، والحرارة الشديدة والجفاف وموجات البرد والصقيع. وتختلف درجة التعرض لهذه المخاطر من موقع إلى آخر بحسب طبيعة السطح وخصائص التربة وشدة الأمطار واتجاهات الرياح وكثافة الغطاء النباتي، مما يجعل التقييم المكاني الدقيق أساسًا مهمًا لفهمها وإدارتها.

وتُعد **السيول المفاجئة وتجمع المياه في الروضات والمنخفضات** من أهم المخاطر الطبيعية المباشرة في المحمية، نظرًا لانتشار الأودية والشعاب التي تنقل مياه الأمطار من المناطق الأعلى نحو السهول منخفضة الانحدار. فعندما تتعرض أحواض التصريف لأمطار غزيرة خلال فترة قصيرة، قد تتدفق المياه بسرعة عبر المجاري الطبيعية، حاملة معها الرواسب الدقيقة والحصى والمواد المفككة. وتتفاوت شدة السيول وسرعة الجريان بحسب مساحة الحوض ودرجة الانحدار ونفاذية التربة وكثافة الغطاء النباتي، وقد تصل المياه إلى بعض المواقع المنخفضة حتى عندما تكون الأمطار قد هطلت في مناطق بعيدة نسبيًا. وتكمن خطورة هذه الظاهرة في سرعة تغير الظروف المائية داخل الأودية والروضات، خصوصًا في المواقع التي تُستخدم للتنزه أو الأنشطة الميدانية.

وتكتسب السيول أهمية خاصة في **روضة خريم والروضات الأخرى**، حيث تمثل هذه المنخفضات مناطق طبيعية لاستقبال المياه وتراكم الرواسب الدقيقة. وقد تتحول بعض أجزائها بعد الأمطار إلى مسطحات مائية مؤقتة قبل أن تتسرب المياه إلى باطن الأرض أو تتبخر تدريجيًا. ورغم أن هذه المياه تمثل أساس ازدهار النباتات وتجدد الغطاء الأخضر، فإن ارتفاع منسوبها قد يؤدي إلى غمر بعض المسارات وصعوبة التنقل داخل المناطق المنخفضة، كما قد تتغير خصائص التربة

نتيجة تراكم الرواسب وتشبعها بالمياه. وتزداد أهمية هذا الخطر عندما تتزامن الأمطار الغزيرة مع وجود الزوار أو المركبات داخل مجاري التصريف، مما يستدعي تحديد مناطق تجمع المياه ومسارات السيول وتوجيه الأنشطة بعيدًا عنها خلال الحالات المطرية.

ويرتبط بالسيول خطر آخر يتمثل في **تشبع التربة بالمياه وفقدان قدرتها على التحمل**، وهو من المخاطر المهمة التي تميز الروضات والمنخفضات ذات الرواسب الدقيقة. فعندما تمتص التربة كميات كبيرة من المياه، تتغير خصائصها الفيزيائية بحسب تركيبها الحبيبي ونسبة المواد الطينية فيها، وقد تصبح بعض المواقع لينة وضعيفة التماسك، مما يزيد احتمالات انغراس إطارات المركبات أو تعثر الحركة فوق الأسطح الرطبة. وتختلف هذه الاستجابة بين التربة الرملية والتربة الغنية بالطمي والطين، كما تتأثر بدرجة التشبع وسمك الطبقات السطحية وطبيعة المواد الموجودة أسفلها. وقد تستمر بعض آثار التشبع حتى بعد انحسار المياه، خصوصًا في المنخفضات التي تحتفظ بالرطوبة لفترات أطول.

وعندما تبدأ التربة بالجفاف بعد فترات الغمر، تتعرض بعض الرواسب الدقيقة للانكماش، وقد تظهر شقوق سطحية في المواقع التي تحتوي على معادن طينية قابلة للانتفاخ والانكماش. كما يمكن أن تتشكل قشور سطحية تؤثر في نفاذية التربة واستجابتها للأمطار اللاحقة، مما يغير أنماط الجريان السطحي وتوزيع الرطوبة. ولا تقتصر أهمية هذه الظواهر على سلامة الحركة، بل تمتد إلى تأثيرها في نمو النباتات الموسمية واستقرار الرواسب وتطور سطح الروضات. وقد يؤدي مرور المركبات فوق التربة المشبعة إلى تكوين أخاديد وآثار عميقة تستمر بعد الجفاف، فتؤثر في طبيعة السطح وتزيد قابليته للتعرية. ولذلك تمثل حماية الروضات خلال فترات التشبع بالمياه ضرورة بيئية ووقائية في الوقت نفسه.

وتأتي **العواصف الرملية والغبارية** ضمن المخاطر المناخية الرئيسية في المحمية، نظرًا لانتشار الرمال والرواسب الدقيقة والأسطح المكشوفة القابلة للتعرية بفعل الرياح. فعندما تشتد الرياح، تتحرك الحبيبات الرملية بالقرب من سطح الأرض بعمليات القفز والزحف، بينما ترتفع الجسيمات الدقيقة إلى الهواء وتنتشر فوق مساحات واسعة، مما يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية وتراجع جودة الهواء وصعوبة التنقل عبر المسارات الصحراوية. وتختلف شدة العواصف ومدتها بحسب سرعة الرياح واتجاهاتها ودرجة جفاف التربة وتماسكها وكثافة الغطاء النباتي. كما قد تؤثر الرواسب المحمولة بالرياح في الأجهزة والمعدات المستخدمة في

الدراسات الميدانية، وتزيد من صعوبة العمل في المواقع المفتوحة خلال فترات النشاط الريحي الشديد.

وتزداد أهمية العواصف الغبارية في المناطق التي يقل فيها الغطاء النباتي أو تتعرض أسطحها للاضطراب، حيث تصبح الرواسب الدقيقة أكثر قابلية للانتقال. وقد تتغير ظروف الرؤية بصورة مفاجئة، مما يزيد مخاطر الحركة بالمركبات، خصوصًا في المسارات غير المعبدة والمناطق البعيدة عن المعالم الثابتة. كما يؤدي تكرار العواصف إلى إزالة بعض المواد الدقيقة من السطح وإعادة ترسيبها في مواقع أخرى، مما يسهم في تغير خصائص التربة وتوزيع الرواسب. وتستدعي مواجهة هذا الخطر متابعة بيانات الأرصاد الجوية واتجاهات الرياح وسرعاتها، والاستفادة من صور الأقمار الصناعية في مراقبة العواصف وتحديد المناطق الأكثر تعرضًا لها، مع تنظيم الزيارات والأنشطة الميدانية وفق الظروف الجوية السائدة.

وتشكل **حركة الكثبان الرملية وزحف الرمال الحمراء** خطرًا جيومورفولوجيًا رئيسيًا آخر يرتبط بالبيئات الرملية المتصلة بنطاق الدهناء. فالكثبان الرملية ليست أجسامًا ثابتة، بل تتغير أشكالها وحوافها نتيجة استمرار عمليات النقل والترسيب الريحي، وقد تتحرك بعض أجزائها تدريجيًا بحسب اتجاهات الرياح وسرعاتها وكمية الرمال المتاحة. وتختلف معدلات الحركة من موقع إلى آخر وفق حجم الكثيب وشكله ودرجة تثبيته بالنباتات، كما يمكن أن تتراكم الرمال حول الشجيرات والعوائق الطبيعية وفي المنخفضات والممرات الصحراوية. وتتميز هذه الظاهرة بطابعها التراكمي، إذ قد تحدث تغيرات محدودة خلال فترات قصيرة، لكنها تصبح أكثر وضوحًا عند مقارنة صور السطح عبر سنوات متعاقبة.

وتتمثل آثار زحف الرمال في احتمال تغير معالم بعض المسارات وتراكم الرواسب فوق المواقع المنخفضة وصعوبة الحركة في المناطق التي تتبدل فيها طبيعة السطح باستمرار. كما قد يؤدي تراكم الرمال إلى تغطية أجزاء من النباتات أو تغيير ظروف نموها، بينما تسهم النباتات نفسها في تثبيت الرواسب وتخفيف حركتها. وتوفر صور الأقمار الصناعية متعددة الأزمنة وسيلة فعالة لمراقبة تغير أشكال الكثبان وقياس اتجاهات انتقالها ومعدلات حركتها، مما يساعد على تحديد المناطق الأكثر نشاطًا وتوجيه المسارات والمرافق بعيدًا عنها. ومن المهم المحافظة على التوازن بين الحد من آثار زحف الرمال على الأنشطة البشرية وبين صون العمليات الطبيعية التي تشكل جزءًا من الهوية الجيومورفولوجية للمحمية.

أما **المخاطر الطبيعية الفرعية**، فتبرز في مقدمتها التعرية المائية وتغير الخصائص الرسوبية للروضات والمنخفضات، حيث تستمر آثار الأمطار والسيول حتى بعد انحسار المياه. فعندما يتحرك الجريان السطحي فوق التربة المكشوفة، قد يزيل الحبيبات الدقيقة وينقلها نحو المناطق الأقل انحدارًا، مما يؤدي إلى تكوين أخاديد صغيرة أو تعميق بعض المجاري السطحية. وفي المقابل، تترسب المواد المنقولة عندما تنخفض سرعة المياه داخل الروضات والمنخفضات، وقد يؤدي تراكم الطمي والرواسب الدقيقة إلى تغيير تركيب الطبقات السطحية ونفاذيتها وقدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة. وتختلف هذه التأثيرات بحسب حجم الحبيبات وشدة الأمطار ودرجة تماسك التربة وكثافة النباتات، مما يجعل الروضات أنظمة رسوبية متغيرة وليست مجرد منخفضات تستقبل المياه.

وترتبط بالتعرية المائية **التعرية الريحية وتغير خصائص الأسطح الصحراوية**، حيث تؤدي الرياح إلى إزالة الحبيبات الدقيقة من بعض المواقع المكشوفة وترك الرواسب الحصوية الأكثر خشونة، مما يسهم في تكوين الأرصفة الصحراوية وتطورها. وقد تتعرض بعض الأسطح الدقيقة لتشكيل قشور سطحية تتغير خصائصها بفعل تعاقب البلل والجفاف، بينما يؤدي اضطراب التربة نتيجة حركة المركبات إلى زيادة قابليتها للتعرية. وتبرز أهمية هذه العمليات في تأثيرها التراكمي على استقرار السطح ونفاذية التربة وتوزيع النباتات، خصوصًا في المواقع الحساسة التي يقل فيها الغطاء النباتي أو تتكرر فيها الأنشطة البشرية. ولذلك فإن المحافظة على التربة الطبيعية وتنظيم الحركة داخل المحمية يمثلان عنصرين أساسيين في الحد من التدهور البيئي.

وتتعرض المحمية كذلك إلى **الحرارة الشديدة والجفاف** خلال فصل الصيف، حيث تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى زيادة معدلات التبخر وانخفاض رطوبة التربة وتراجع نمو النباتات الموسمية خلال فترات انقطاع الأمطار. وقد تزيد هذه الظروف من قابلية بعض الرواسب للتعرية الريحية، كما تمثل تحديًا مباشرًا للزوار والباحثين عند العمل أو التنقل في المناطق المفتوحة، نتيجة احتمالات الإجهاد الحراري ونقص السوائل. وفي المقابل، قد تشهد المحمية خلال الشتاء موجات برد وصقيع تؤثر في النباتات الحساسة وبعض الأنشطة الخارجية. ويسهم التفاوت الحراري اليومي والموسمي، إلى جانب دورات البلل والجفاف، في تغير الخصائص الفيزيائية للتربة والرواسب، مما يعكس الدور المستمر للمناخ في تشكيل سطح الأرض والتأثير في الأنظمة البيئية الصحراوية.

وتتطلب **الإدارة العلمية للمخاطر الطبيعية** في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية إعطاء الأولوية لحماية الروضات وإدارة السيول والمحافظة على استقرار التربة، إلى جانب مراقبة العواصف الرملية وحركة الكثبان. وتبدأ هذه الإدارة بإعداد خرائط دقيقة للأودية وأحواض التصريف ومناطق تجمع المياه والمنخفضات المعرضة للغمر المؤقت، مع دراسة الخصائص الفيزيائية للتربة وتحديد المواقع التي قد تفقد قدرتها على التحمل خلال مواسم الأمطار. ويمكن استخدام نماذج الارتفاعات الرقمية وبيانات الأمطار لتحليل مسارات الجريان السطحي وتقدير مناطق الخطر، إلى جانب توظيف صور الأقمار الصناعية ونظم المعلومات الجغرافية لمراقبة التغيرات الموسمية في الغطاء النباتي ورطوبة التربة وحركة الرمال وتوزيع الرواسب.

وتتيح **تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي** إمكانات متقدمة لتحليل البيانات الجيولوجية والهيدرولوجية والمناخية، وتطوير نماذج مكانية تساعد على تقدير احتمالات تجمع المياه وزحف الرمال والتعرية وتغير خصائص التربة. ويمكن دمج بيانات الأمطار والرياح ونفاذية التربة والتضاريس والغطاء النباتي لإنتاج خرائط متعددة الأخطار تدعم التخطيط الوقائي وتنظيم الأنشطة الميدانية. غير أن دقة هذه النماذج تعتمد على جودة البيانات المستخدمة والتحقق من نتائجها بالقياسات الميدانية، مع ضرورة التمييز بين العمليات الطبيعية المستمرة والمخاطر التي قد تهدد سلامة الزوار أو الموارد البيئية. كما تبرز أهمية تنظيم حركة المركبات، خصوصًا بعد هطول الأمطار، وتحديد المسارات الآمنة بعيدًا عن التربة المشبعة ومجاري السيول والمناطق الرملية النشطة.

وتوفر المحمية فرصًا متميزة **للسياحة البيئية والجيولوجية والتعليم الميداني**، حيث تمنح الروضات والكثبان الرملية والسهول الحصوية والأودية الموسمية الزائر فرصة للتعرف على العلاقة بين المياه والرمال والتربة والنباتات. ويمكن أن تسهم المسارات العلمية واللوحات التفسيرية والبرامج التوعوية في شرح كيفية تشكل الكثبان الرملية وتطور الأرصفة الصحراوية، ودور السيول في نقل الرواسب وتجديد الغطاء النباتي، وأهمية حماية التربة من التدهور. كما تساعد هذه البرامج على تعزيز الوعي بالمخاطر الطبيعية، وتشجيع الزوار على الالتزام بالمسارات المعتمدة وتجنب دخول الأودية أثناء الأمطار أو القيادة فوق الروضات المشبعة بالمياه، بما يحقق التوازن بين الاستمتاع بالطبيعة والمحافظة على مواردها.

وفي الختام، تمثل محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية نموذجًا طبيعيًا فريدًا للعلاقة بين المياه والرمال والتربة في قلب نجد، حيث تعيد الأمطار الحياة إلى الروضات، وتواصل الرياح رسم ملامح الكثبان، وتحفظ الرواسب آثار التحولات البيئية المتعاقبة. وهي ليست مجرد مساحة طبيعية لحماية الحياة الفطرية، بل مختبر مفتوح لفهم العمليات الجيولوجية والهيدرولوجية والمناخية، وإرث وطني يجمع بين جمال الطبيعة وأهمية صونها والوعي بمخاطرها، بما يضمن استدامة ثرواتها للأجيال القادمة.

**https://www.tiktok.com/@iardaksa/video/**7578504842943941908

**رابط الفيديو**

# محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية – البطاقة التعريفية العلمية

| المحور | العنصر | البيانات |
|---|---|---|
| الهوية والموقع | التصنيف | محمية ملكية برية |
| | المنطقة الإدارية | الرياض |
| | الموقع الجغرافي | شمال شرق الرياض؛ نطاق الروضة وخريم والمناطق الطبيعية المتصلة |
| | المساحة | 11,300 كم$^2$ |
| | سنة الاعتماد | 2018م |
| | الاسم السابق | تضم روضة خريم والمناطق الطبيعية المجاورة |
| الجيولوجيا والتضاريس | النطاق الجيولوجي | يتحدد من الخريطة الجيولوجية المحلية |
| | التكوينات الصخرية | الحجر الجيري والصخور الرسوبية ورواسب الأودية |
| | المظاهر الجيومورفولوجية | حافات رسوبية وسهول وأودية وروضات |
| | الخصائص الهيدرولوجية | تجمع مياه الأمطار في الروضات ومجاري السيول الموسمية |
| | المناخ | جاف إلى شديد الجفاف؛ يتباين محليًا مع الارتفاع والقرب من الساحل |
| التنوع الطبيعي | أبرز النباتات | الطلح والسدر والرمث والأعشاب الربيعية |
| | الحياة الفطرية | غزلان ومها عربي في برامج الإكثار وطيور صحراوية |
| | القيمة البيئية | حماية الموائل الطبيعية والأنواع المحلية وتعزيز استعادة النظم البيئية |

| المحور | العنصر | البيانات |
|---|---|---|
| المخاطر الطبيعية | المخاطر الرئيسية | السيول المفاجئة والجفاف والعواصف الغبارية والتعرية |
| | المخاطر الموضعية | تختلف بحسب المنحدرات ومجاري السيول والتكوينات السطحية |
| | العمليات الطبيعية المؤثرة | التجوية والتعرية ونقل الرواسب والتغيرات الموسمية |
| | مستوى الخطورة | متفاوت مكانيًا بحسب التعرض وطبيعة الموقع |
| القيمة العلمية والحماية | الأهمية الجيولوجية | حافات رسوبية وسهول وأودية وروضات |
| | الأهمية الهيدرولوجية | تجمع مياه الأمطار في الروضات ومجاري السيول الموسمية |
| | الأهمية البحثية | دراسة تطور التضاريس والتنوع الأحيائي والاستجابة للتغيرات البيئية |
| | تقنيات الرصد | الاستشعار عن بُعد، ونظم المعلومات الجغرافية، ونماذج الارتفاعات الرقمية |
| | أولويات الحماية | حماية الموائل ومراقبة مجاري السيول ومناطق التعرية والتعديات |
| | السياحة البيئية | التعريف بالتراث الطبيعي والجيولوجي مع مراعاة حساسية الموائل |

**البصمة الجيولوجية: حافات نجد الرسوبية وروضاتها التي تنشط نباتيًا عقب الأمطار**


محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية
( ١١,٣٠٠ كم٢ )
Imam Abdulaziz bin Mohammed Royal Reserve
N
محمية الملك خالد الملكية
شوية
صحراء الدهناء
الرامحية
محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية
( ١١,٣٠٠ كم٢ )
الدهو
الرياض
الدوادمي
الدمام
طريق الرياض - الدمام السريع
مركز الغاط
مفتاح الخريطة
مدينة رئيسية
مدينة / بلدة
طريق رئيسي
حدود المحمية الملكية
منطقة المحمية الملكية
0 10 20 40 60 80
كيلومتر



