

محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية (محازة الصيد)

في قلب غرب المملكة العربية السعودية، حيث تمتد السهول الصحراوية بين الهضاب الصخرية والحرات البركانية القديمة، تقع محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية، المعروفة تاريخيًا باسم محازة الصيد، إحدى أبرز المحميات الطبيعية التي تجمع بين التنوع الجيولوجي والثراء البيئي. ففي هذه الأرض الواسعة تتجاور السهول الحصوية مع الأودية الموسمية والمنخفضات الرسوبية والنتوءات الصخرية المتفرقة، لتروي قصة طويلة من التفاعل بين الصخور والمياه والرياح عبر ملايين السنين. ولا تكمن أهمية المحمية في حماية الحياة الفطرية فحسب، بل في كونها سجلًا طبيعيًا يكشف عن العمليات الجيولوجية والجيومورفولوجية التي شكلت سطح الأرض، وعن قدرة الكائنات الحية على التكيف مع ظروف الصحراء وتحدياتها المناخية.

تقع المحمية في منطقة مكة المكرمة، شمال شرق مدينة الطائف، وتبلغ مساحتها نحو 2,553 **كيلومترًا مربعًا**. وقد أُعلنت محازة الصيد محمية طبيعية عام 1989م، ثم أصبحت ضمن منظومة المحميات الملكية عام 2018م، تحت اسم محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية، وتخضع لإشراف هيئة تطوير المحمية. وتتميز بطبيعتها الصحراوية المفتوحة نسبيًا، التي جعلتها موطنًا مهمًا للحياة الفطرية وموقعًا بارزًا لبرامج إعادة توطين الأنواع الصحراوية. كما تكتسب أهمية علمية خاصة لدراسة العلاقة بين خصائص الأرض والموارد الطبيعية واستقرار الموائل البيئية، ولا سيما في المناطق التي تتعرض لتغيرات موسمية واضحة في الأمطار والغطاء النباتي.

ومن الناحية الجيولوجية، تقع المحمية ضمن نطاق الدرع العربي الذي يشغل أجزاء واسعة من غرب المملكة، ويتميز بانتشار الصخور النارية والمتحولة القديمة، التي تعرضت عبر فترات جيولوجية طويلة لعمليات الرفع والتجوية والتعرية. وتغطي أجزاء من سطح المحمية رواسب حديثة من الحصى والرمال والطمي، نتجت عن تفكك الصخور ونقل المواد بواسطة السيول والرياح وإعادة ترسيبها في السهول والمنخفضات. وتجاور المحمية مناطق بركانية قديمة ضمن نطاق الحرات في غرب المملكة، حيث تشكل الصخور البازلتية الداكنة جزءًا من المشهد الجيولوجي الإقليمي، وإن كان تحديد امتدادها الفعلي داخل حدود المحمية يتطلب الرجوع إلى الخرائط الجيولوجية التفصيلية.

وتُعد **السهول الحصوية والأرصفة الصحراوية** من أبرز المظاهر الجيومورفولوجية التي تميز محازة الصيد، حيث تنتشر مساحات واسعة تغطيها الحصى والحجارة الصغيرة الناتجة عن تفكك الصخور وتعرضها لعمليات النقل والتعرية. وقد أسهمت الرياح والجريان السطحي عبر الزمن في إزالة بعض الرواسب الدقيقة وإعادة توزيعها، بينما بقيت المواد الخشنة على السطح، مكونة طبقة حصوية تساعد على حماية التربة الموجودة أسفلها من التعرية المباشرة. وتختلف خصائص هذه الأسطح من حيث النفاذية والخشونة ودرجة التماسك، مما يؤثر في حركة مياه الأمطار وتوزيع النباتات واستقرار الرواسب. وتمثل هذه الظواهر سجلًا طبيعيًا لتطور سطح الأرض في البيئات الصحراوية الجافة.

وتنتشر في المحمية الأودية الموسمية وشبكات التصريف السطحي التي تنشط خلال فترات هطول الأمطار، حيث تنتقل المياه من المناطق الأعلى نحو السهول والمنخفضات، حاملة معها الرواسب والحصى والمواد الدقيقة. وقد أسهمت هذه العمليات في تشكيل مجارٍ طبيعية ضحلة وتكوين رواسب فيضية ومراوح رسوبية صغيرة عند بعض مخارج الأودية. وتتجمع المياه مؤقتًا في المنخفضات التي تحتفظ بالرطوبة لفترات أطول نسبيًا، مما يهيئ ظروفًا مناسبة لنمو النباتات الموسمية. وتعكس هذه الظواهر العلاقة الوثيقة بين طبيعة التضاريس وخصائص التربة واتجاهات الجريان السطحي، وتوضح كيف يمكن لأمطار محدودة في مجموعها السنوي أن تحدث تغيرات ملحوظة في سطح الأرض عندما تهطل بغزارة خلال فترة قصيرة.

وتتميز المحمية كذلك بتنوع الرواسب السطحية بين المواد الحصوية الخشنة والرمال والرواسب الدقيقة التي تتراكم داخل المنخفضات الطبيعية. وتختلف استجابة هذه الرواسب للأمطار والجفاف بحسب حجم الحبيبات ودرجة تماسكها ونفاذيتها، فقد تتسرب المياه في بعض المواقع بسرعة، بينما تتجمع فوق الأسطح قليلة النفاذية أو المشبعة بالمياه. كما تؤدي دورات الغمر والجفاف إلى تغير الخصائص الفيزيائية للتربة، وقد تتشكل قشور سطحية أو شقوق انكماشية في الرواسب الطينية عندما تفقد رطوبتها. وتوفر هذه العمليات فرصة علمية لدراسة تطور التربة الصحراوية وعلاقتها بالمياه والرياح والغطاء النباتي.

ويسود المحمية مناخ صحراوي جاف، يتميز بارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف وانخفاضها خلال الشتاء، مع تفاوت واضح بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا. وتتسم الأمطار بأنها محدودة وغير منتظمة، وقد تهطل أحيانًا بصورة غزيرة خلال فترات قصيرة، مما يؤدي إلى جريان السيول في الأودية والشعاب. كما تؤثر الرياح في نقل الغبار والرواسب الدقيقة، بينما تسهم الحرارة المرتفعة في زيادة التبخر وانخفاض رطوبة التربة. وتنتشر في المحمية أشجار الطلح وبعض الشجيرات والأعشاب الصحراوية الموسمية التي تنمو عقب الأمطار، وتزداد كثافتها في الأودية والمنخفضات مقارنة بالأسطح الصخرية والحصوية المكشوفة. ويسهم هذا الغطاء النباتي في تثبيت التربة والحد من التعرية وتوفير الغذاء والمأوى للكائنات البرية.

وتكتسب محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية أهمية بيئية خاصة لارتباطها ببرامج حماية الحياة الفطرية وإعادة توطين الأنواع الصحراوية، وفي مقدمتها **المها العربي والظباء والنعام**، التي تمثل جزءًا مهمًا من جهود استعادة التوازن البيئي في المناطق الجافة. وتعتمد قدرة هذه الأنواع على الاستقرار والتكاثر على توافر الموائل المناسبة والغطاء النباتي والموارد المائية والظروف المناخية الملائمة. ومن هنا تتجاوز أهمية المحمية حماية الحيوانات والنباتات إلى فهم العلاقة بين الجيولوجيا والتربة والمياه والمناخ، وكيف تؤثر التغيرات الطبيعية في استقرار الأنظمة البيئية الصحراوية واستدامتها.

وتوفر المحمية فرصًا متميزة للبحث العلمي في مجالات الجيولوجيا والجيومورفولوجيا والهيدرولوجيا الصحراوية، حيث يمكن دراسة تطور الأرصفة الحصوية والتجوية الحرارية والملحية والتعرية الريحية والجريان السطحي وتغير خصائص التربة. كما تتيح صور الأقمار الصناعية متعددة الأزمنة مراقبة التغيرات في الغطاء النباتي وتوزيع الرواسب ومسارات السيول، وربطها بالبيانات المناخية والمشاهدات الميدانية. وتساعد هذه الدراسات على فهم تطور المشهد الطبيعي وتحديد المواقع الأكثر حساسية للتغيرات البيئية، بما يدعم برامج المحافظة على الحياة الفطرية وإدارة الموارد الطبيعية بصورة مستدامة.

المخاطر الطبيعية في محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية

تكتسب دراسة المخاطر الطبيعية في محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية أهمية خاصة، نظرًا لاتساع سهولها الحصوية وتداخلها مع الأودية الموسمية والمنخفضات الرسوبية والنتوءات الصخرية. وتأتي **السيول المفاجئة والجريان السطحي** في مقدمة المخاطر الهيدرولوجية المباشرة، بينما يمثل **الجفاف والحرارة الشديدة** أحد أهم الضغوط المناخية المستمرة على الحياة الفطرية والموائل الطبيعية، تليهما **العواصف الغبارية والتعرية الريحية** التي تؤثر في استقرار التربة والرواسب السطحية. أما المخاطر الفرعية فتشمل التجوية الحرارية والملحية، وتغير خصائص التربة خلال دورات الغمر والجفاف، وسقوط الصخور موضعيًا، إلى جانب المخاطر الزلزالية والبركانية التي تستدعي تقييمًا إقليميًا متخصصًا دون افتراض وجود نشاط مباشر داخل المحمية.

وتُعد **السيول المفاجئة** من أبرز المخاطر الطبيعية التي تستحق الاهتمام في المحمية، رغم طبيعتها الصحراوية وقلة الأمطار السنوية نسبيًا. فعندما تهطل أمطار غزيرة خلال فترة قصيرة، قد تتجاوز شدة الهطول قدرة التربة على امتصاص المياه، مما يؤدي إلى تشكل جريان سطحي سريع فوق السهول الحصوية والأراضي الصخرية. وقد تحتوي بعض هذه الأسطح على قشور دقيقة قليلة النفاذية تحد من تسرب المياه، رغم وجود الحصى فوقها. وتتجمع المياه في الشعاب والأودية الضحلة قبل أن تتجه نحو المنخفضات الطبيعية، حاملة

معها الرمال والحصى والرواسب الدقيقة، وقد تؤدي إلى نحت بعض المجاري وإزالة أجزاء من التربة وإعادة توزيع الرواسب في المواقع المنخفضة.

وتزداد خطورة السيول في المواقع التي تستقبل مياه التصريف من أحواض واسعة أو تتقاطع فيها مجاري المياه مع الطرق الداخلية ومناطق الرصد والمرافق البحثية. ومن الخصائص المهمة للسيول الصحراوية أن المياه قد تصل إلى مواقع لم تشهد هطول أمطار مباشرة، نتيجة انتقال الجريان من الأجزاء العليا لأحواض التصريف. وقد تتسبب هذه السيول في غمر بعض المسارات بصورة مؤقتة أو إضعاف تماسك التربة وإعاقة حركة المركبات والمعدات. ولذلك تبرز أهمية دراسة أحواض التصريف ومجاري الأودية باستخدام نماذج الارتفاعات الرقمية ونظم المعلومات الجغرافية، مع تحديد المناطق التي تتكرر فيها تجمعات المياه أو تتغير فيها مسارات الجريان نتيجة التعرية والترسيب.

ويمثل **الجفاف والحرارة الشديدة** أحد أهم المخاطر المناخية المستمرة في محازة الصيد، حيث تؤدي درجات الحرارة المرتفعة خلال الصيف إلى زيادة معدلات التبخر وانخفاض رطوبة التربة وتراجع نمو النباتات الموسمية خلال فترات انقطاع الأمطار. وقد تمتد آثار الجفاف إلى مواسم متعاقبة، مما يؤدي إلى انخفاض كثافة الغطاء النباتي وتراجع الموارد الطبيعية التي تعتمد عليها الكائنات البرية في غذائها واستقرارها. وتزداد أهمية هذه الظاهرة في المحميات التي تضم برامج لإعادة توطين الأنواع الصحراوية، لأن نجاح هذه البرامج يرتبط بقدرة الموائل على توفير الظروف البيئية المناسبة خلال الفترات الجافة.

ولا يقتصر تأثير الجفاف على نقص المياه والنباتات، بل يمتد إلى تغير الخصائص الفيزيائية للتربة وزيادة قابليتها للتعرية الريحية، نتيجة انخفاض الرطوبة وضعف تماسك الرواسب الدقيقة. كما قد تتغير أنماط حركة الحيوانات وتوزيعها داخل المحمية تبعًا لتوافر الموارد الطبيعية، مما يستدعي مراقبة الغطاء النباتي ورطوبة التربة ومؤشرات الجفاف بصورة منتظمة. أما من ناحية السلامة الميدانية، فإن الحرارة المرتفعة تزيد احتمالات الإجهاد الحراري ونقص السوائل لدى العاملين والباحثين والزوار، خصوصًا أثناء التنقل في المناطق

المفتوحة خلال ساعات النهار. وتبرز هنا أهمية ربط برامج إدارة المحمية ببيانات الأرصاد الجوية ومراقبة التغيرات الموسمية في درجات الحرارة والأمطار.

وتأتي **العواصف الغبارية والرياح الشديدة** ضمن المخاطر المناخية المباشرة في المحمية، نظرًا لاتساع السهول المكشوفة وتوافر الرواسب الدقيقة القابلة للنقل بفعل الرياح. فعندما تشتد الرياح، تبدأ الحبيبات الرملية المفككة بالحركة بالقرب من سطح الأرض، بينما ترتفع الجسيمات الدقيقة إلى الغلاف الجوي، مكونة سحبًا غبارية قد تمتد فوق مساحات واسعة. وقد تؤدي هذه العواصف إلى انخفاض مدى الرؤية وصعوبة الحركة عبر المسارات الصحراوية، كما تؤثر في جودة الهواء وكفاءة أجهزة الرصد والمعدات الميدانية. وتختلف شدة العواصف بحسب سرعة الرياح واتجاهاتها ودرجة جفاف التربة وتماسكها وكثافة الغطاء النباتي.

وترتبط بالعواصف الغبارية **التعرية الريحية وتطور الأرصفة الصحراوية**، حيث تؤدي الرياح عبر الزمن إلى إزالة بعض الحبيبات الدقيقة وإعادة ترسيبها في مواقع أخرى، بينما تبقى المواد الحصوية الأكثر خشونة على السطح. وتساعد هذه الطبقة الحصوية على حماية الرواسب الموجودة أسفلها، غير أن تعرضها للاضطراب نتيجة حركة المركبات أو الأنشطة غير المنظمة قد يكشف المواد الدقيقة ويزيد قابليتها للنقل الريحي. وقد يؤدي استمرار التعرية إلى فقدان أجزاء من التربة السطحية وتراجع قدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة ودعم نمو النباتات، مما يجعل المحافظة على الأرصفة الصحراوية وتنظيم الحركة داخل المحمية من الإجراءات المهمة للحد من تدهور الموائل الطبيعية.

ومن المخاطر الجيومورفولوجية الفرعية **التجوية الحرارية والملحية وتفكك الصخور**، حيث تتعرض الأسطح الصخرية لتغيرات حرارية يومية وموسمية تؤدي إلى تمدد المعادن وانكماشها بمعدلات متفاوتة. وقد تسهم هذه التغيرات، إلى جانب عمليات التجوية الأخرى، في إضعاف بعض الصخور واتساع الفواصل الموجودة فيها. كما يمكن أن تؤدي التجوية الملحية إلى تفكك الصخور المسامية عندما تتسرب المياه المحتوية على الأملاح إلى الشقوق والمسامات، ثم تتبخر المياه وتتبلور الأملاح داخل الفراغات. وتختلف شدة هذه العمليات بحسب طبيعة الصخور

ومساميتها ودرجة رطوبتها وتركيز الأملاح، ولا تمثل في معظم المواقع خطرًا مفاجئًا، لكنها تؤثر تدريجيًا في استقرار بعض التكوينات الصخرية وتطور سطح الأرض.

وتتعرض بعض **المنخفضات الرسوبية إلى تغير خصائص التربة خلال دورات الغمر والجفاف**، حيث ترتفع رطوبة الرواسب الدقيقة عقب الأمطار، وقد تصبح التربة الطينية لينة وضعيفة التحمل عند التشبع بالمياه. وقد يؤدي ذلك إلى صعوبة مرور المركبات والمعدات أو ترك أخاديد وآثار عميقة في السطح. وعندما تجف الرواسب، قد تتشكل قشور سطحية أو شقوق انكماشية بحسب طبيعة المعادن الطينية ونسبة الرطوبة. كما يمكن أن تؤثر دورات الغمر والجفاف المتكررة في نفاذية التربة وتماسكها واستجابتها للأمطار اللاحقة. وتبرز أهمية هذه الظواهر عند اختيار مواقع المرافق والمسارات البحثية، حيث تساعد الدراسات الجيوتقنية على تحديد المناطق الأكثر ملاءمة للاستخدام وتجنب الأسطح الحساسة خلال المواسم المطرية.

وتظهر **مخاطر سقوط الصخور وعدم استقرار النتوءات الصخرية** بصورة موضعية في الأجزاء التي تضم حواف صخرية أو منحدرات مناسبة، ولا تمثل خطرًا عامًا في جميع أنحاء المحمية. فقد يؤدي تسرب مياه الأمطار عبر الفواصل الطبيعية، إلى جانب التجوية الحرارية والملحية، إلى إضعاف بعض الكتل الصخرية وزيادة قابليتها للانفصال والسقوط باتجاه السفوح. وتختلف احتمالات حدوث هذه الظاهرة بحسب طبيعة الصخور ودرجة تشققها وزاوية الانحدار وحجم الكتل غير المستقرة. ولذلك ينبغي التركيز على المواقع التي تضم نتوءات صخرية قريبة من المسارات أو المرافق، وإجراء مسوحات جيولوجية ميدانية لتحديد الفواصل والكتل التي قد تحتاج إلى متابعة أو إجراءات وقائية.

أما **المخاطر الزلزالية والبركانية**، فتُدرس في إطار الموقع الجيولوجي الإقليمي للمحمية ضمن غرب المملكة، حيث تنتشر الحرات البركانية والتراكيب التكتونية المرتبطة بالتاريخ الجيولوجي للدرع العربي وانفتاح البحر الأحمر. غير أن وجود هذه الظواهر في الإقليم لا يعني بالضرورة تعرض المحمية لخطر بركاني مباشر أو نشاط زلزالي مرتفع. ويتطلب التقييم العلمي تحديد مواقع الحقول البركانية وأعمار أحدث تدفقاتها والمسافات الفاصلة بينها وبين المحمية، إلى

جانب مراجعة بيانات الرصد الزلزالي وخرائط الصدوع النشطة والتسارع الأرضي المتوقع. ومن المهم التمييز بين النشاط البركاني القديم الذي أسهم في تشكيل أجزاء من غرب المملكة وبين احتمالات تجدد النشاط في مواقع محددة، وعدم تصوير الظواهر الجيولوجية الإقليمية بوصفها تهديدًا وشيكًا دون أدلة علمية.

وتتطلب **الإدارة العلمية للمخاطر الطبيعية** في محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية منهجًا متكاملًا يربط بين خصائص الصخور والتربة والتضاريس والمناخ والموائل الطبيعية. وتبدأ هذه الإدارة بإعداد خرائط تفصيلية لأحواض التصريف ومجاري السيول والمنخفضات الرسوبية ومناطق التعرية والنتوءات الصخرية، مع مراقبة التغيرات في الغطاء النباتي ورطوبة التربة وتوزيع الرواسب. كما ينبغي تنظيم حركة المركبات داخل المحمية وتجنب المرور فوق التربة الرطبة أو الأرصفة الحصوية الحساسة، والمحافظة على النباتات الطبيعية التي تسهم في تثبيت التربة وتقليل التعرية. وتكتسب هذه الإجراءات أهمية إضافية في دعم برامج حماية الحياة الفطرية وإعادة توطين الأنواع الصحراوية.

وتوفر **تقنيات الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي** أدوات مهمة لتطوير إدارة المخاطر داخل المحمية، حيث يمكن استخدام صور الأقمار الصناعية متعددة الأزمنة لرصد التغيرات في الغطاء النباتي والتربة والرواسب السطحية، والاستفادة من نماذج الارتفاعات الرقمية في تحليل مسارات السيول ومناطق تجمع المياه. كما يمكن توظيف تقنيات التعلم الآلي في دراسة العلاقات بين الأمطار ودرجات الحرارة ورطوبة التربة وكثافة النباتات، وتقدير قابلية بعض المواقع للتعرية أو التغير البيئي. غير أن دقة هذه النماذج تعتمد على جودة البيانات والتحقق الميداني من نتائجها، مع ضرورة التمييز بين المخاطر المحتملة والحوادث الطبيعية التي جرى توثيقها بالفعل.

وتتيح المحمية فرصًا متميزة **للبحث العلمي والتعليم الجيولوجي والتوعية البيئية**، من خلال دراسة تطور السهول الحصوية والأرصفة الصحراوية والتجوية والتعرية والجريان السطحي،

وربط هذه الظواهر بالتغيرات المناخية التي شهدتها المنطقة عبر الزمن. ويمكن أن تسهم البرامج التعليمية والمسارات العلمية المعتمدة في تعريف الزوار بأهمية المحافظة على التربة والغطاء النباتي والموائل الطبيعية، مع توعيتهم بمخاطر السيول والحرارة الشديدة والعواصف الغبارية وضرورة الالتزام بإرشادات السلامة. كما تمثل المحمية نموذجًا علميًا لفهم العلاقة بين حماية الحياة الفطرية وصون التراث الجيولوجي، وإبراز أهمية الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.

وفي الختام، تمثل محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية صفحة حية من تاريخ الأرض في غرب المملكة، حيث تروي السهول الحصوية والأرصفة الصحراوية قصة التعرية والتجوية، وتكشف الأودية والمنخفضات عن دور المياه في تشكيل الصحراء وتجديد الحياة فيها. وهي ليست مجرد موطن للمها العربي والظباء والنعام، بل مختبر طبيعي لفهم العلاقة بين الجيولوجيا والمناخ والحياة الفطرية، ونموذج وطني يجمع بين حماية التنوع الأحيائي وصون التراث الطبيعي وتعزيز المعرفة العلمية واستدامة الموارد للأجيال القادمة.

رابط الفيديو

https://x.com/makkahregion/status/1871275689569390763/video/1

محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية – البطاقة التعريفية العلمية

المحور	العنصر	البيانات
الهوية والموقع	التصنيف	محمية ملكية برية
	المنطقة الإدارية	مكة المكرمة
	الموقع الجغرافي	غرب المملكة؛ ضمن البيئات الجافة في نطاق محازة الصيد
	المساحة	2,550 كم^2
	سنة الاعتماد	2018م
	الاسم السابق	محمية محازة الصيد سابقًا
الجيولوجيا والتضاريس	النطاق الجيولوجي	يتحدد من الخريطة الجيولوجية المحلية
	التكوينات الصخرية	صخور القاعدة المكشوفة ورواسب الأودية والحصى
	المظاهر الجيومورفولوجية	سهول حصوية ومرتفعات منخفضة ومجاري أودية
	الخصائص الهيدرولوجية	أودية قصيرة موسمية وأحواض تجمع محدودة
	المناخ	جاف إلى شديد الجفاف؛ يتباين محليًا مع الارتفاع والقرب من الساحل
التنوع الطبيعي	أبرز النباتات	الطلح والعرفج والشجيرات المتحملة للجفاف
	الحياة الفطرية	المها العربي وغزال الريم والطيور الصحراوية
	القيمة البيئية	حماية الموائل الطبيعية والأنواع المحلية وتعزيز استعادة النظم البيئية

المحور	العنصر	البيانات
المخاطر الطبيعية	المخاطر الرئيسية	الجفاف الشديد والعواصف الغبارية والسيول المفاجئة
	المخاطر الموضعية	تختلف بحسب المنحدرات ومجاري السيول والتكوينات السطحية
	العمليات الطبيعية المؤثرة	التجوية والتعرية ونقل الرواسب والتغيرات الموسمية
	مستوى الخطورة	متفاوت مكانيًا بحسب التعرض وطبيعة الموقع
القيمة العلمية والحماية	الأهمية الجيولوجية	سهول حصوية ومرتفعات منخفضة ومجاري أودية
	الأهمية الهيدرولوجية	أودية قصيرة موسمية وأحواض تجمع محدودة
	الأهمية البحثية	دراسة تطور التضاريس والتنوع الأحيائي والاستجابة للتغيرات البيئية
	تقنيات الرصد	الاستشعار عن بُعد، ونظم المعلومات الجغرافية، ونماذج الارتفاعات الرقمية
	أولويات الحماية	حماية الموائل ومراقبة مجاري السيول ومناطق التعرية والتعديات
	السياحة البيئية	التعريف بالتراث الطبيعي والجيولوجي مع مراعاة حساسية الموائل

البصمة الجيولوجية: سهول محازة الصيد المفتوحة ونظامها البيئي الجاف الملائم لإعادة توطين الأنواع


محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية
(٢,٢٤٠ كم٢)
Imam Saud bin Abdulaziz Royal Reserve
N
الخرمة
حلية
العويه
الجبيل
ظلم
جبل رجم
قرية رجم
حبابان
محمية الإمام سعود
بن عبدالعزيز الملكية
(٢,٢٤٠ كم٢)
مفتاح الخريطة
مدينة رئيسية
مدينة / بلدة
طريق رئيسي
حدود المحمية الملكية
منطقة المحمية الملكية
معلم طبيعي رئيسي
0 5 10 20 30 40
كيلومتر







