

Организационные основы повышения эффективности цитологического скрининга в ранней диагностике рака шейки матки

Чингисова Ж.К., Шибанова А.А., Кайрбаев М.Р., Шалбаева Р.Ш., Кукубасов Е.К. Беломанова Л.Ж.

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы

Қазақстан Республикасының 2005 жылдан бері Мемлекеттік денсаулық сақтаудың реформасы мен дамуының қабылданған бағдарламасы бойынша репродуктивті жастағы әйелдерге алдын ала тексеру өткізілуде. Қазақстан Республикасында әйелдердің қатерлі ісік құрылымында, жатыр мойнының қатерлі ісігі екінші орын алуда, жоғары көрсеткіш, осының қомақты бөлігі соңғы сатыларында анықталады. 2003-2004 жылдардағы ресей зерттеулері бойынша, дұрыс ұйымдастырылған цитологиялық скрининг, жатыр мойнының қатерлі ісігінің соңғы сатысының диагностикасы 10%-ға азайды, осы патологияның бастапқы сатысының түрі мен дисплазия жиілігі 0,12% дейін ұлғайды.

The abstract: Within the limits of the Government program of reforming and public health services development in Republic Kazakhstan since 2005 routine inspections of women of reproductive age are spent. In Republic Kazakhstan the cancer of a neck of a uterus takes the second place in structure of disease of women malignant new growths, and relative density of the patients revealed at late stages, remains high. According to the Russian researchers, for 2003-2004 thanks to the correct organization of cytological screening the indicator of late diagnostics of a cancer of a neck of a uterus has decreased on 10 %, and frequency of revealing дисплазий and early forms of this pathology has increased to 0,12 %.

In the Kazakh scientific research institute of oncology and radiology the program on stage-by-stage carrying out of screening of the female population on revealing of pretumoral diseases and a cancer of a neck of a uterus, since the primary is developed and introduced in all regions. Working out of the given program was included into order МЗРК № on October, 607 15th, 2007 «About perfection of preventive medical inspections of separate categories of adult population» where the instruction on carrying out of preventive medical inspections of separate categories of adult population by selective (screening) inspections is presented. In this instruction separate technologies on carrying out screening inspections of target groups of women on early diagnostics of a cancer of a neck of a uterus are defined.

The basic aspects of stage-by-stage inspection of women by selective researches are:

- *A technique of a correct and qualitative fence of a material.*
- *A correct estimation, interpretation of the received material. All over the world it is applied standard cytological Daddies-tests (with colouring on a method of Papanikolau, Romanovsky-gimza, Gematoksilin-Eozin, Lejgimana, Pappengejma, etc.). The estimation on a method Daddies-tests includes classifications applied by all cytologists (the CART - 1974, Betezda – 2002).*
- *A determinative of efficiency of screening is coverage of the female population.*

Реферат: В рамках Государственной программы реформирования и развития здравоохранения в Республике Казахстан с 2005 года проводятся профилактические осмотры женщин репродуктивного возраста. В Республике Казахстан рак шейки матки занимает второе место в структуре заболеваемости женщин злокачественными новообразованиями, и удельный вес больных, выявляемых на поздних стадиях, остается высоким. По данным российских исследователей, за 2003-2004 годы благодаря правильной организации цитологического скрининга показатель поздней диагностики рака шейки матки снизился на 10%, а частота выявления дисплазий и ранних форм этой патологии увеличилась до 0,12%.

В Казахском НИИ онкологии и радиологии разработана и внедрена во всех регионах программа по поэтапному проведению скрининга женского населения на выявление предопухолевых заболеваний и рака шейки матки, начиная с первичных. Разработка данной программы вошла в приказ МЗРК № 607 15 октября 2007 год «О совершенствовании профилактических медицинских осмотров отдельных категорий взрослого населения», где представлена инструкция по проведению профилактических медицинских осмотров отдельных категорий взрослого населения путем выборочных (скрининговых) обследований. В этой инструкции определены отдельные технологии по проведению скрининговых обследований целевых групп женщин по ранней диагностики рака шейки матки.

Основными аспектами поэтапного обследования женщин путем выборочных исследований является:

- *методика правильного и качественного забора материала.*
- *правильная оценка, интерпретация полученного материала. Во всем мире применяется стандартный цитологический Пап-тест (с окраской по методу Пapanиколau, Романовского-Гимза, Гематоксилин-Эозин, Лейгимана, Паппенгейма и др.). Оценка по методу Пап-тест включает применяемые всеми цитологами классификации (ВОЗ - 1974, Бетезда – 2002).*
- *решающим фактором эффективности скрининга является охват женского населения.*

В рамках Государственной программы реформирования и развития здравоохранения в Республике Казахстан с 2005 года проводятся профилактические осмотры женщин репродуктивного возраста. Анализ результатов обследования женщин свидетельствует о необходимости дальнейшего совершенствования и целенаправленного проведения этих мероприятий. В связи с этим с 2008 года акцентируется внимание на раннее выявление злокачественных новообразований у женщин. В частности рак шейки матки является распространенным онкологическим заболеванием и относится к важнейшим медико-социальным проблемам во всем мире. Ежегодно в мире диагностируется от 370.000 до 500.000 новых случаев рака шейки матки, и ежегодно умирают от него около 231.000 женщин [1].

В Республике Казахстан рак шейки матки занимает второе место в структуре заболеваемости женщин злокачественными новообразованиями, и удельный вес больных, выявляемых на поздних стадиях, остается высоким [2]. Поэтому проведение цитологического скрининга женского населения является приоритетным и надежным тестом, поскольку рак шейки матки распознается этим методом в преклинической стадии.

Опыт работы многих стран в мире свидетельствует о том, что использование цитологического скрининга способствовало снижению запущенности рака шейки матки и увеличению показателей ранних форм этого заболевания. Так, по данным российских исследователей [3], за 2003-2004 годы благодаря правильной организации цитологического скрининга показатель поздней диагностики рака шейки матки снизился на 10%, а частота выявления дисплазий и ранних форм этой патологии увеличилась до 0,12%.

Цитологическое исследование мазков, взятых с эпителиального покрова шейки матки (мазков по Папаниколау, Рар-тест) является основой всех программ, направленных на раннее выявление рака шейки в развитых странах в течение нескольких десятилетий [4]. По данным ВОЗ было показано, что исследования на больших популяциях каждые 3-5 лет снижает заболеваемость и смертность от рака шейки матки. Снижение смертности на 20-60% достигнуто проведением скрининговых программ в Европе и Северной Америке. В тоже время использование и внедрение цитологического скрининга не во всех странах идет столь эффективно [7].

Одной из причин неэффективности скрининга рака шейки матки является отсутствие четкой организации и контроля в его проведении. Решение проблемы раннего выявления рака шейки матки связано с правильной организацией работы, технической оснащенностью смотровых, онкологических кабинетов и цитологических лабораторий, наличием квалифицированных врачей и лаборантов-цитологов.

В Казахском НИИ онкологии и радиологии разработана и внедрена во всех регионах программа по поэтапному проведению скрининга женского населения на выявление предопухолевых заболеваний и рака шейки матки, начиная с первичных звеньев (СУБ, СВА, ФП, ФАП, женские консультации и т.д.). Разработка данной программы вошла в приказ МЗРК № 607 15 октября 2007 год «О совершенствовании профилактических медицинских осмотров отдельных категорий взрослого населения», где представлена инструкция по проведению профилактических медицинских осмотров отдельных категорий взрослого населения путем выборочных (скрининговых) обследований. В этой инструкции определены отдельные технологии по проведению скрининговых обследований целевых групп женщин по ранней диагностики рака шейки матки.

Для эффективного проведения цитологического скрининга в РК в организационном плане не должно быть мелочей, поскольку из-за них возможно снижение результативности проводимых мероприятий.

Одним из важных аспектов поэтапного обследования

женщин путем выборочных исследований является:

- методика правильного и качественного забора материала. При получении материала из шейки матки и шейечного канала качество препарата зависит от характера используемых инструментов. Лучшим методом сбора клеток считается использование комбинации шпателя Эйра и эндоцервикальной щетки типа Cytobrush, Cerver-Brush. Материал, полученный таким способом, расценивается адекватным в 99,8%, в тоже время использование традиционных способов (корцанг, тампоны) не отвечает требованиям; адекватность их составляет примерно 30%.

- вторым моментом является правильная оценка, интерпретация полученного материала. Во всем мире применяется стандартный цитологический Пап-тест (с окраской по методу Папаниколау, Романовского-Гимза, Гематоксилин-Эозин, Лейгимана, Паппенгейма и др.). Оценка по методу Пап-тест включает применяемые всеми цитологами классификации (ВОЗ - 1974, Бетезда – 2002).

- решающим фактором эффективности скрининга является охват женского населения. В странах, где имеются государственные финансируемые скрининговые программы, охват женщин, подлежащих скринингу, составляет 86% [8]. Повышение эффективности скрининга может быть достигнуто за счет активного привлечения женщин, на проходивших обследование. Этот фактор имеет большее значение, чем частота проведения ежегодного скрининга. Эксперты ВОЗ также пришли к выводу, что ежегодные скрининговые мероприятия с охватом женщин широкого возрастного диапазона (от 20 до 65 лет) гораздо менее эффективны, чем целевые обследования в возрастной группе высокого риска (35-49 лет) с применением качественных и высокочувствительных тестов, проводимых 1-2 раза в течение жизни женщин (WHO-2001).

Таким образом: 1) повышение эффективности цитологического скрининга в ранней диагностике рака шейки матки может быть достигнуто при качественном и квалифицированном получении материала из шейки матки и цервикального канала опытными врачами, акушерками, начиная с первичных звеньев обследования; 2) повышение уровня подготовки цитологов-врачей и лаборантов для правильной интерпретации клеточной патологии по современной классификации; 3) качественные целевые обследования женщин в РК на основе Государственной Программы с соответствующим финансированием будут способствовать раннему выявлению рака шейки матки; 4) немаловажным аспектом успешного проведения скрининговых мероприятий является наличие соответствующего оснащения лабораторным оборудованием, реагентами, инструментарием, прочим расходным материалом.

Список литературы

1. Parkin D.M., Bray F.I., Devesa S.S. Cancer burden in the year 2000. The global picture / Eur. J. Cancer – 2001. – Vol. 37. – P. 64-66.
2. Арзыкулов Ж.А., Сейтказина Г.Д., Махатаева А.Ж., Сейсенбаева Г.Т. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2008 (стат.материал). – Алматы, 2009. – 100 с.
3. Кравец Б.Б., Маркова Е.П. Тактика врачей-гинекологов и акушеров смотровых кабинетов при получении результатов цитологического исследования. // Новости кл. цит. России. М., 2002. – Т. 9. – № 1-2. – С. 38-41.
4. Quinn M., Babb P., Iones I., Allen E. – Effect of screening on incidence of and mortality from cancer of cervix in England: evaluation based on routinely collected statistics // BMJ 1999. – 318 : 3 april- gull version only availabb on www. Bmj. Com Accessed 26 June 2006.
5. Sankaranarayanan R., Yaffikin Z., Jacob M., et al A critical assessment of screening methods for cervical neoplasia // Jnt. J. Gynecology Obstet 2005. – 89 : 4-12.
6. Zuiz F., Bleggi Torres, Bettina Werner et al. Cervical cancer screening program of Panama: Cost-effective model in a developing country // diagnostic Cytopathology. – 2003. – Vol. 29. – 1/1 – P. 49-54.