

Применение Тонбиола в лечение больных раком легкого, желудка, молочной железы, толстой и прямой кишки III-IV ст.

Досан Б.О.

Центральная больница г.Жезказган

Лечение препаратом Тонбиол проводится больным раком лёгкого, желудка, молочной железы, раком толстой и прямой кишки, которым не показано проведение спец. методов лечения. Препарат обладает противоопухолевым действием,

Лечение препаратом Тонбиол проводится больным раком лёгкого, желудка, молочной железы, раком толстой и прямой кишки III-IV ст. которым проведение спецметодов лечения не показано, либо в случае отказа больного от предложенных методов лечения (все больные, направленные на симптомическое лечение по месту жительства).

Препарат Тонбиол обладает противоопухолевым действием, зарегистрирован в Республике Казахстан – РК – ЛС – 3 №009186 от 22.10.2004г., и согласно рекомендации Фармакологического Государственного комитета РК от 31.05.2002 г. разрешено его использование в качестве лечебного препарата.

Цель исследования

- получение собственного опыта клинического эффективности Тонбиола.

Материалы

В онкохирургическом отделении 20 пациентов получали лечение Тонбиолом в суммарной дозе 1 гр. в/в на физрастворе, из них женщин -7, мужчин -13, с различной локализацией, представленной в табл. 1.

Возраст больных колебался от 41-72 лет. Средний возраст составил 57 лет. Все больные прошли клинко-рентгенологическое, ультразвуковое, морфологическое обследование. Диагноз во всех случаях подтверждён морфологически. По степени распространённости процесса больные распределились следующим образом:

1. после паллиативной операции – 8

Таблица 1 – Распределение больных по локализации и полу

Локализации	Всего	Муж.	Жен.
Рак легкого	4	4	-
Рак желудка	6	4	2
Рак молочной железы	3		3
Рак толстой и прямой кишки	7	3	4
Итого:	20	11	9

Таблица 2 - Непосредственные результаты лечения Тонбиолом

Локализация	R-графия грудной клетки	УЗИ	ФГДС
Рак легкого	2 (1)		
Рак желудка			6 (2)
Рак молочной железы		3 (2)	
Рак толстой и прямой кишки		7	
Итого:	1	2	2

Цель исследования - получение собственного опыта клинического эффективности Тонбиола.

Материал и методы. 20 пациентов получали лечение Тонбиолом в суммарной дозе 1 г внутривенно на физ. растворе.

Результаты. Эффект препарата начинался через 2-3 дня. У 30% больных отмечалась улучшение, интенсивность болей уменьшилась, улучшилось самочувствие и аппетит. В связи с чем 10 больных получили повторные, до 3-4 курсов лечения, тем самым продлив качество жизни.

Таким образом, очевидно положительное влияние Тонбиола на непосредственные результаты проводимого лечения больным раком легкого, желудка, молочной железы, рак толстой и прямой кишки III-IV заболеваний.

2. без операции – 12 больных.

Оценку непосредственного объективного эффекта терапии проводили по методике предложенной ВОЗ.

1. На контрольном УЗИ – сравнивались размеры опухоли до и после лечения.
2. На контрольном ЭГ ДФС – размеры опухоли до и после лечения.
3. На контрольном рентгенографии легких – размеры опухоли до и после лечения.

Из таблицы видно, что после лечения на R – грамме легких отмечается уменьшение объема опухоли на 30% у 1 больного – 50%.

На УЗИ уменьшение опухоли молочной железы до 35% - у 2-х больных – 40%.

При раке желудка – уменьшение опухоли на ФГДС у 2-х больных – 33%.

Эффект препарата начинался через 2-3 дня. У 30% больных отмечалась улучшение, интенсивность болей уменьшилась, самочувствие улучшилось, улучшился аппетит. В связи с наступлением улучшения, 10 больных получили повторные, до 3-4 курсов лечения, тем самым продлив качество уровня жизни.

Таким образом, можно сказать о положительном влиянии Тонбиола на непосредственные результаты проводимого лечения больным раком легкого, желудка, молочной железы, рак толстой и прямой кишки III-IV заболеваний.

Список использованной литературы

1. Багрова С.Т. Результаты II-ой фазы клинического изучения циклопатана // Вопросы онкологии. – 2001 - №6 – С. – 752-756.
2. Тогандыков Т.Ж., Оспанов Х.К., Гуляев А.Е. Фармакология унитиола и унитиолатных комплексов металлов - Алматы, 2004.