

Результаты маммографического скрининга по данным ГККП «Областной онкологический диспансер» г.Талдыкорган

Бектурсынов С.М., Голованев Г.А., Есимханова С.Н.
ГККП «Областной онкологический диспансер» г.Талдыкорган

Актуальность

Внедрение в практическое здравоохранение эффективной скрининговой диагностики рака молочной железы (РМЖ) - это один из возможных путей уменьшения результатов данной патологии. Эффективность его определяется снижением смертности и уменьшением общих затрат на лечение.

Цель работы

Изучить эффективность маммографического скрининга рака молочной железы (РМЖ) по данным ГККП «Областной онкологический диспансер» г.Талдыкорган (областной онкодиспансер).

Материал и методы

С 2008 года в областном онкодиспансере проводятся маммографические скрининговые обследования женщин в возрастной группе от 50 до 60 лет с интервалом 1 раз в 2 года. Данные обследования проводятся на основании Приказа № 605 Министерства Здравоохранения Республики Казахстан от 15.10.2007 г. Обследования осуществляются на маммографах «Alpha – ST», (Финляндия, 2006г.). Исследование менструирующих женщин выполняются с 5 по 12 день менструального цикла.

Маммографическому исследованию за 2008-2010 года были подвергнуты 43028 женщин (96,4%) из запланированных 44640 женщин. Патологии молочных желез не обнаружено у 25374 (54 %) женщин.

Патологические образования в ткани молочной железы выявлены у 17374 женщин (46%). У 10029 женщин (69,31%) эти образования имели диффузный характер, им требовалось дообследование и рекомендовано диспансерное наблюдение у маммолога. Для уточнения характера патологического процесса в дополнительном обследовании нуж-

Сүт безінің қатерлі ісігін алдын ала қамтау мақсатында Қазақстан Республика Денсаулық сақтау министрлігінің бұйрығымен № 605 15.10.2007 ж. Алматы облысы бойынша 2007 жылдан бастап профилактикалық тексеру жүргізілуде.

Мақсаты-Маммографиялық скринингінің нәтижесін бақылау.

Материалдары және әдістері.Онкология орталығында 2008-2010 жылдары аралығында 50-60 жас аралығындағы 43028 азаматшалары тексерілді.Қатерлі ісіктің I-II сатысымен 53 азаматшадан анықталды.

дались 7305 женщин (37,24%). В областной онкодиспансер для дальнейшего обследования обратились 2529 женщин (34,6%). В результате при дополнительном исследовании диффузные изменения были отмечены у 1533 женщин (62%). Чаще всего они были представлены диффузной фиброзно – кистозной мастопатией. Узловые образования диагностированы у 459 женщин (30%), из них фиброаденома у 313 женщин, узловая мастопатия у 146 женщин.

Секторальная резекция молочной железы проведена 375 женщинам (81,7%), при которой данных, подтверждающих злокачественный процесс не получено.

Подозрение на рак молочной железы на основании маммографического исследования выявлено у 84 женщин (0,8%), из них у 53 (0,1%) женщин диагноз был подтвержден морфологически.

За 3 года в РК конечно же делать выводы еще рано, однако уже сейчас видно, что выявляемость ранних стадий РМЖ стала больше.

Таким образом, проведение маммографического скрининга, несомненно является неотъемлемым мероприятием в борьбе с раком молочной железы.