

Этапные данные скрининга рака молочной железы

Сандыбаев М.Н., Кузнецова Т.В., Кротова А.Г., Уразалин А.М.,

Муздыбаев Р.А., Абылченова А.Р., Манамбаева З.А.

Региональный онкологический диспансер г.Семей

Государственный медицинский университет г.Семей

Как известно в нашей стране введен в действие метод скринингового обнаружения заболеваний молочных желез на ранних стадиях развития.

Данный метод позволяет обнаруживать заболевания молочной железы путем рентгенологического контроля каждой женщины конкретно с интервалами в 2 года. Динамическое наблюдение помогает выявить малейшие изменения в структурах молочных желез, своевременно оценивать их тяжесть и, при необходимости, рекомендовать адекватное лечение, не доводя процесс заболевания до запущенной формы.

Подлежащая осмотру женская часть населения нашего региона насчитывает на 2011 год 16564 человека нечетного года рождения в возрасте от 50-60 лет.

Данное количество людей, в свою очередь, территориально разбито на меньшие группы, каждая из которых приписана к одному из пунктов медико-санитарной помощи, где имеются маммографические кабинеты. Полученные от них сведения и снимки поступают в РОД г. Семей для повторного чтения врачами – рентгенологами, согласно приказа МЗ РК №145 от 16 марта 2011 г., где подтверждается или дополняется первоначальное заключение.

Цель данной работы

- определить эффективность рентгенологической маммографии как основного метода ранней диагностики рака молочной железы.

Материалы и методы исследования

Использовался метод рентгенологического скрининга рака молочной железы.

В процессе работы было использовано следующее оборудование:

1 стационарный маммограф «Alpha-ST» 2006 г/в, производство Финляндия

2 стационарный маммограф «Melody-B» 2004 г/в

3 стационарный цифровой маммограф на передвижной платформе

«Mammomat -1000» 2010 г/в.

Результаты исследования

Данные скрининга по Семейскому региону.

Год	Выполнено	Выявлено всего РМЖ	Выявлено в 1 и 2 стадии
2008	8224	37	15
2009	7405	41	20
2010	8677	33	26
2011	5971	17	3

2008,2009,2010 жылдар және 2011 жылдың жарты жылдығы ішінде Семей қаласы бойынша СБО скринингінсінін анализі жүргізілді. Барлығы 30277 адам тексеруден өткізілді. Оның ішінде 128 әр түрлі даму кезеңіндегі қатерлі ісік анықталды.Ерте кезеңде байқалған қатерлі ісік анықталу жиілігінің өзгеруі жасалған зерттеу жұмысының маңыздылығын көрсетеді.

In our research work analysis of Mammary Glands Cancer screening in Semey Region during 2008,2009,2010, half year of 2011 was done. There are 30277 women had been observed. There were revealed 128 cases of cancer in different stages of development. Analysis of quantity changes, which were revealed on the early stages, makes us able to do conclusion about expediency of this research method.

За прошедшее время нами (РОД) обследовано 30277 женщины. Из числа обследованных выявлено РМЖ - 128 случаев. Жалоб со стороны прошедших обследование не поступало. Все женщины, которым было выставлено заключение РМЖ, были в дальнейшем дообследованы (УЗИ с биопсией, с последующим цитологическим исследованием). После чего РМЖ подтвердился в 113 случаях, что составляет 88 % от числа выявленных РМЖ при маммографии, из них 64 на 1-2 стадии, что составляет 50 % от числа выявленных. В остальных 15 случаях при дообследовании оказалось у 6 женщин - узловая мастопатия (8,2%), у 4 женщин ДФКМ (5,4 %), у 5 женщин фиброаденомы (6,8 %). При анализе 58 подтвержденных РМЖ была выявлена стадийность заболевания:

1-2 стадия- 64

3 стадия - 9

4 стадия - 3

Вышеуказанные данные убедительно подтверждают основную концепцию скрининга – обнаружение РМЖ на самых ранних стадиях, позволяет менять прогноз заболевания и влиять на течение и основные результаты лечения заболевания. Однако приходится отметить, что проведение скрининга не будет достаточно эффективным без последующих дополнительных методов исследований, потому что существуют известные патологии и состояния, при которых рентгенологический метод не может быть основополагающим и достаточно достоверным. В некоторых случаях приходится констатировать тот факт, что двухгодичный интервал между исследованиями слишком долг, и частота возникновения интервальных раков могла бы значительно сократиться, возможно, за счет более гибкого подхода в рассмотрении конкретных случаев. Тем не менее, мы можем быть уверены в правильности выбранного стратегического направления для ранней диагностики РМЖ.