

Результаты целевого маммографического обследования в Семейском регионе Восточно-Казахстанской области

Сандыбаев М.Н., Манамбаева З.А., Байпеисов Д.М., Абылченова А.Р., Карипова М.К., Жабагин К.Т.

Региональный онкологический диспансер г.Семей

Введение

Рак молочной железы на данный момент является актуальной проблемой в современной онкологии. К сожалению, отмечается рост частоты заболеваемости и смертности женщин от данной патологии.

В практику развитых стран прочно вошло понятие скрининг. Скрининг-это массовое периодическое обследование здорового населения с целью выявления онкологического заболевания, в данном случае рака молочной железы. Идея скрининга основана на том факте, что обычное клиническое обследование не обеспечивает выявление рака молочной железы на ранних стадиях. Скрининг должен отвечать следующим требованиям: обладать высокой чувствительностью и специфичностью, приносить минимальный вред здоровью обследуемых; оборудование должно быть простым в эксплуатации и содержании, стоимость затрат должна быть приемлемой. Указанным требованиям соответствует маммографический скрининг, позволяющий выявить значительный спектр новообразований – от микро-фокусов *carcinomae in situ* до крупных инвазивных очагов поражения. Установление размера диагностируемых опухолей является важным критерием оценки качества скрининга и определения возможностей маммографии выявлять не пальпируемые опухоли. Проведение маммографического скрининга показано, с периодичностью один раз в два года, в возрасте 40 и более лет, так как именно в этой возрастной группе отмечена наиболее высокая заболеваемость.

Цель

- изучить эффективность маммографического скрининга в регионе г.Семей Восточно-Казахстанской области.

Материалы и методы

Учитывая высокие показатели заболеваемости и смертности от РМЖ, издан приказ МЗ РК №607 от 15.10.2007 «о совершенствовании профилактических осмотров отдельных категорий взрослого населения». Начиная с 2006 года введен скрининг для раннего выявления предопухолевых и опухолевых заболеваний молочной железы. С 2006 по 2009 года целевой группой являлись женщины в возрасте от 35 до 49 лет, выявлено 23 женщины с РМЖ. С I-II стадией выявлено 17 случаев, с III стадией - 6 случаев. Результаты исследования: в Семейском регионе в разрезе заболеваний среди женского населения РМЖ занимает первое место, а в разрезе общей онкологической патологии второе место. Ежегодно более 150 женщин выявляются со злокачественным заболеванием молочной железы, и среди них около 40% с запущенной формой.

Проведен анализ клинической эффективности целевого маммографического скрининга в регионе г.Семей Восточно-Казахстанской области. Результаты свидетельствуют о повышении числа больных с ранними клиническими стадиями в средней возрастной группе, в тоже время увеличение процента запущенности в старшей возрастной группе.

Шығыс Қазақстан Облысының Семей өңірі бойынша көзделген маммографиялық скринингтің клиникалық тиімділігінің анализі жүргізілді. Жасалған жұмыс қорытындысы орта жастағы науқастар ішінде аурудың ерте клиникалық кезеңі және егде жастағы топтарда аурудың асқындырылған кезеңі пайызының артқанын байқалтады.

In Semey city of East Kazakhstan Region analysis of clinical effectiveness of mammographic screening was done. Results of research work shows us increasing of quantity of middle age patients with early clinical stages, also increasing of percentage of abandonment in old age patients.

Начиная с 2009 года целевой группой по программе скрининга являются женщины в возрасте 50-60 лет. За 2 года выявлено 46 женщин с РМЖ. С I-II стадией -34 случаев, с III стадией - 12 случаев. В 2009 году отмечаются высокие показатели запущенности, это связано с профилактическим осмотром женщин в возрасте от 50-60лет. На сегодняшний день на базе РОД создана мультидисциплинарная группа. В состав группы входят: маммолог, врач рентгенолог, статист, патоморфолог. Целью функционирования настоящей группы является дообследование пациенток с выявленной на маммографии патологией.

Таким образом, данная программа дает возможность выявления рака молочной железы на ранних стадиях, что в свою очередь увеличивает процент выздоровления: в группе женщин, которым проводилась маммография один раз в 2-3 года отмечено достоверное снижение смертности на 24-30%. Причем повышение риска отмечено только у женщин в возрасте старше 50 лет. Результаты свидетельствуют о повышении числа больных с ранними клиническими стадиями в средней возрастной группе, в тоже время увеличение процента запущенности в старшей возрастной группе, так как обследованию подвергается категория женщин пенсионного возраста, которые длительное время не обследовались.