

Организация скрининга рака шейки матки в Республике Казахстан

Шибанова А.И., Каирбаев М.Р., Жилкайдарова А.Ж., Кусаинова Б.Т., Ольшевская Н.В., Якупова Л.М., Мухаметгалиев Н.А., Тюменева Ф.Х., Рубцова Л.Н., Тихонова Т.А.

КазНИИОиР, онкологические диспансеры г. Алматы, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Южно-Казахстанской областей

Введение

В Республике Казахстан рак шейки матки занимает второе место в структуре заболеваемости женщин злокачественными новообразованиями, и удельный вес больных выявляемых на поздних стадиях остается высоким.

Это явилось основанием включения в Государственную программу реформирования и развития Здравоохранения страны, проведение профилактических осмотров женщин в целевой группе от 30 до 60 лет. (Приказы МЗ РК от 15.10.2007 №607; № 164 от 30.03.2009; № 685 от 10.11.2009). В Казахском НИИ онкологии и радиологии разработана и внедрена во всех онкологических диспансерах программа по поэтапному проведению цитологического скрининга женского населения начиная с первичных звеньев (СУБ, СВА, ФП, ФАП, женские консультации и т.д.). Подготовлены методические рекомендации с инструкцией по проведению профилактических медицинских осмотров отдельных категорий взрослого населения путем выборочных (скрининговых) обследований.

Организация выполнения данной программы осуществляется совместной работой гинекологов и цитологов КазНИИОиР, специализированным консультативно-диагностическим отделом, а также областными и городскими онкодиспансерами. Для эффективности скрининга по выявлению ранних форм рака шейки матки в РК внедрен метод Пап-теста с оценкой результатов по современной классификации «Бетesda». Все лаборатории были оснащены необходимыми реактивами и оборудованием. Для обучения цитологов и гинекологов были привлечены ученые из Японии и России, проведены многократные семинары, мастер - классы, конференции и тематические усовершенствования для специалистов всех регионов Республики. Созданы алгоритмы обследования с последующим лечением выявленной патологии.

Результаты исследования

Результаты обследования женщин за период 2009-2011 гг. свидетельствуют, что метод Пап-теста способствует более дифференцированной оценке ранней патологии, фоновых процессов (включая вирусные заболевания) шейки матки.

За 3 года было охвачено цитологическим исследованием 1 487 580 женщин целевой группы, что составило 94,4%. Общереспубликанский показатель цитологических заключений LSIL (CIN I, слабая дисплазия) составил 2,2% (у 33 217 женщин), что соответствует мировым данным. При анализе заключений HSIL (CIN II, CIN III, Ca in situ) был выявлен в 0,6 % (у 8 500 женщин).

Количество выявленных женщин с преинвазивным раком и раком шейки матки I-ой стадий заболевания составило 0,02% (362 человека).

Анализ результатов скрининга свидетельствует о большом разбросе числа выявленной ранней онкопатологии (LSIL, HSIL) по отдельным регионам, что требует более тщательной работы на всех уровнях обследования женщин - начиная с забора, фиксации, доставки и оценки

2009-2011ж.аралығында жатыр мойының қатерлі ісігінің скрининг жұмысының анализдерінің қортындысы жүргізілді. Пап-тест әдісімен тексеру кезінде жатыр мойының ісігі анықталды. Әдістемелен зерттеулер барысында шалғай ауылдарда қыйындықтар туындады.

В работе проведен анализ результатов скрининга рака шейки матки по РК за 2009-2011г.г. Отмечена динамика выявления заболевания шейки матки по методу Пап-тест, выявлены сложности проведения скрининга в отдаленных регионах, определены пути повышения эффективности скрининговых исследований.

Uterine cervix cancer is the most common gynaecological cancer type in Kazakhstan and one of the leading cause of death among female cancer patients. Method of screening – conventional cytology (pap-test) with reporting results according to Bethesda system (2001). The low quality of pap-test affected sensitivity and specificity of screening test, that's why we consider to introduce liquid based cytology together with new methods of personnel motivation at the next step.

цитологического материала.

Дальнейшее повышение эффективности цитологического скрининга в ранней диагностике рака шейки матки, в Республике Казахстан, возможно путем решения следующих задач: это качественное и квалифицированное получение материала из шейки матки и цервикального канала подготовленными акушер-гинекологами, начиная с первичных звеньев обследования, не теряет своей актуальности вопрос по подготовке кадров методике цитологического исследования по Папаниколу с внедрением жидкостной цитологии по РК и интерпретации цитологических данных.

Список литературы

1. Арзыкулов Ж.А., Сейтказина Г.Д., Махатаева А.Ж., Сейсенбаева Г.Т. Показатели онкологической службы Республики Казахстан в 2009-2010 году (статистические материалы). Алматы, 2008-2010г.г.
2. Статистические данные мединформа за период 2009 – 2010г.г. и 6 мес. 2011г.
3. Шибанова А.А. Цитологический метод в выявлении гинекологической патологии при профилактических обследованиях женщин. Алматы, 2009г.
4. Davey E, Barratt A, Irwig et al. Effect of study design and quality on unsatisfactory rates, cytology classifications, and accuracy in liquid-based versus conventional cervical cytology: a systematic review. Lancet 2006; 376: 122–32.
5. Sankaranarayanan R, Gaffikin L, Jacob M et al. A critical assessment of screening methods for cervical neoplasia. Int J Gynecol Obstet 2005; 89: S4–12.
6. Solomon D, Davey D, Kurman R et al. The 2001 Bethesda System. Terminology for reporting results of cervical cytology. JAMA 2002; 287 (16): 2114–8.