

# Результаты маммографического исследования женщин в Кызылординской области

Толеутайұлы К., Байқадамов А.Х., Толеутай У.К., Қайнарбаева Л.К., Ербошаев С.У., Абдикерова А.Е.  
Кызылординский областной онкологический центр, ВШОЗ

## Введение

Ежегодно в мире с 2000 года выявляется более 1 млн. новых случаев рака молочной железы (РМЖ). Из 10 млн. новых случаев злокачественных опухолей различных органов, выявляемых сегодня на земле, 10-12% приходится на молочную железу. Ежегодно умирает – около 410 000 женщин в мире от рака молочной железы.(1)

В рамках выполнения приказа МЗ РК №16 от 11.01.2005 г. «Об утверждении Правил проведения профилактических медицинских осмотров женщин репродуктивного возраста за счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета», №607 от 15.10.2007г. «О совершенствовании профилактических медицинских осмотров отдельных категорий взрослого населения», приказа МЗ РК от 10 ноября 2009 года № 685 «Об утверждении Правил проведения профилактических медицинских осмотров целевых групп населения» и приказа МЗ РК от 16 марта 2011 года № 145 «О внесении изменений в № 685 «Об утверждении Правил проведения профилактических медицинских осмотров целевых групп населения» в области начата профилактическая маммография. Маммографическому скринингу предшествовала активная просветительная работа с использованием СМИ (телевидение, областные и районные газеты, календары женского здоровья).

Маммография наиболее эффективный метод ранней диагностики патологии молочных желез, позволяющий выявлять очаги опухоли от 0,3 см и косвенные признаки начинающего патологического процесса.

## Целью исследования

явилось изучение возможностей маммографического скрининга в ранней диагностике предопухолевых и опухолевых заболеваний молочных желез. При этом приглашались на скрининг женщины в возрасте от 50 до 60 лет, хотя иногда приглашались женщины до 75 лет и моложе 50 лет.

## Материалы и методы

Был проведен анализ 78031 маммографических исследований с 2007-2011 гг.

## Результаты исследований

В области имеются 11 маммографических установок, 3 из них в областном центре. С 2007 по 2011 гг. Запланировано 88630, проведено 78031 (88,0%) маммографических исследований. В условиях областного онкологического центра проведены 11873 маммографических исследований. Среди 78031 маммографических исследований выявлены следующие патологические процессы: подозрение на рак молочной железы у 294 женщин (0,4%), рак у 130 (0,16%), фиброаденома молочной железы у 1669 (2,13%) и другие формы мастопатии у 21573 (27,60%). Из 11873 исследований проведенных в условиях онкологического центра профилактическая маммография проведена 11119 (93,6%), а 754 (6,35%) женщинам - диагностическая маммография.

С второй половины 2011 года начата вторичная читка маммограмм в условиях областного онкологического

## Кызылорда облысында маммографиялық тексерулердің қорытындылары

К. Толеутайұлы, А.Х. Байқадамов, У.К. Толеутай, Л.К. Қайнарбаева, С.У. Ербошаев А.Е. Абдикерова

Кызылорда облыстық онкология орталығы, Жоғарғы қоғамдық денсаулық сақтау мектебі

Соңғы бес жыл көлемінде 78031 әйелге маммографиялық тексеру жүргізілген. Онда мынадай патологиялық өзгерістер анықталған. Атап айтқанда, сүт безі қатерлі ісігіне (сбкі) күдіктену-294 (0,4%) әйелде, сбкі -130 (0,16%), сүт безінің фиброаденомасы - 1669 (2,13%) және басқа мастопатия түрлері - 21573 (27,60%). Осындай жұмыстардың арқасында сүт безі қатерлі ісігін ерте анықтау соңғы бес жылда 63,4 пайыздан 73,5 пайызға жақсарып отыр.

## The results of Kyzylorda oblast mammography tests

K. Toleutaiuly, A.H. Baikadamov, U.K. Toleutai, L.K. Kainarbayev, S.U. Yerboshayev, A.E. Abdikerova

Kyzylorda oblast oncological center; The high school of health protection

Within last five years, carried out 78031 mammography tests. Found out the following pathological changes. Suspicious for neoplasm of mammary gland -294 (0,4%) women, nomg -130 (0,16%), fibroadenoma of mammary gland - 1669 (2,13%) and other types of mastopathy - 21573 (27,60%). Thanks to these testings the percentage of early detected mammary gland neoplasms improved from 63,4 to 73,5 percents.

центра. Вторичная читка маммограмм проведена 2285 женщинам, при этом у 9 (0,4%) было заподозрено рак молочной железы.

Женщины в возрасте от 20 до 49 лет проходили обследование в смотровом кабинете поликлиник (фельдшерско-акушерском пункте, семейной врачебной амбулатории или женской консультации и пр.), которое включает осмотр и пальпацию молочной железы, утвержденной приказом областного управления здравоохранения № 209 1.04. 2005 года «О совершенствовании ранней диагностики патологии молочной железы акушер - гинекологами».

В период с 2007 по 2010 гг. В Кызылординской области заболеваемость раком молочной железы находится почти на одном уровне. Так например, заболеваемость РМЖ на 100 тыс. населения в 2007 году составлял 11,5 то аналогичный показатель в 2010 году составил 11,8. (по РК - 20,6 на 100 тыс. населения).

Хотя показатель РМЖ в Кызылординской области был ниже, чем в РК, однако на протяжении всего периода отмечался интенсивный рост заболеваемости РМЖ в Кызылординской области, особенно после внедрения маммографического скрининга.

Нами проанализированы данные по запущенным стадиям РМЖ в регионе за пятилетний период.

Высокие показатели запущенности в III или IV стадии

заболевания имело место в 2007 году, когда он достигал 36,6% от общего числа выявленных случаев. После внедрения профилактической маммографии процент выявления РМЖ в поздней стадии снизились до 26,5% и улучшились показатели ранней диагностики рака молочной железы с 63,4 до 73,5%.

В стратегии борьбы с РМЖ в настоящее время высока роль вторичной профилактики, т.е. выявления опухолей молочной железы в той стадии, когда она может быть излечена существующими методами лечения. существующая организация, техническая оснащенность и методология обследования не могут обеспечить раннее выявление РМЖ. Внедрение современного маммографического скрининга с 2006 года существенно уменьшил процент запущенности РМЖ. Однако, имеющаяся одиннадцать маммографов в области все еще недостаточно для полноценного обследо-

вания, особенно жителей села. Для дальнейшего улучшения ранней диагностики РМЖ необходимо: адекватное финансирования программы, кадровое обеспечение, достаточное обеспечение современными маммографическими приборами городских поликлиник и пропаганда целесообразности ранней диагностики.

Таким образом, современная технология скрининга рака молочной железы и дообследования успешно реализуется на практике при комплексном использовании клинического, маммографического и цитологического методов исследования.

### Список литературы

1. Рожкова Н.И. *Современные технологии скрининга рака молочной железы. Радиология: наука и практика.* Астана, 2009., 262-269.