

Цитологический скрининг по ранней диагностике рака шейки матки

Л.М. Якупова

Западно-Казахстанский областной онкологический диспансер, г. Уральск

Актуальность

Одной из главных задач практического здравоохранения является профилактика и ранняя диагностика рака шейки матки (РШМ). В этом плане важна эффективная диагностика начальных стадий рака, предопухолевых и фоновых заболеваний ШМ во время скрининга в различные периоды жизни женщины.

Материалы и методы

В 2009 году было проведено цитологическое исследование шейки матки 18 614 женщин ЗКО, в 2010 году - 15 980, за 8 месяцев 2011 г. - 17 061 женщин независимо от анамнестических данных.

Результаты

В 2009 году было выявлено 279 случаев с поражениями ШМ (Д I—III, carcinoma in situ, инвазивный РШМ), что составляет 1,5%. CIN I – 196 (1,05%), CIN II – 40 (0,2%), CIN III – 30 (0,16%), carcinoma in situ, РШМ – 13 (0,06%). Число неинформативного материала составило 615 случаев (3,3%).

Всего в 2009 г. выявлено и взято на учёт с диагнозом рак шейки матки 52 пациентки (из них 13 пациенток скринингового возраста), заболеваемость составила 9,1 на 100 тыс. населения. По стадиям заболевания: I-II ст. - 44 (84,6%), III ст. - 6 (11,5%), IV ст. - 2 (3,8 %).

В 2010 году было выявлено 260 случаев с поражениями ШМ (Д I—III, carcinoma in situ, инвазивный РШМ), что составляет 1,6%. CIN I – 183 (1,1%), CIN II – 30 (0,2%), CIN III – 24 (0,15%), carcinoma in situ, РШМ – 23 (0,14%). Число неинформативного материала составило 1392 случая (8,7%).

Всего в 2010 г. выявлено и взято на учёт с диагнозом рак шейки матки 55 пациенток (из них 23 пациентки скринингового возраста), заболеваемость составила 9,1 на 100 тыс. населения. По стадиям заболевания: I-II ст. - 45 (81,8%), III ст. - 9 (16,4%), IV ст. - 1 (1,8%).

За 8 месяцев 2011 года выявлено 236 случаев с поражениями ШМ (Д I—III, carcinoma in situ, инвазивный РШМ), что составляет 1,4%. CIN I – 154 (1%), CIN II – 50 (0,3%), CIN III – 11 (0,06%), carcinoma in situ, РШМ – 22 (0,12%). Число неинформативного материала составило 1461 случаев (8,5%). Всего выявлено и взято на учёт 52 случая РШМ (из них 22 случая скринингового возраста). Заболеваемость составила 8,5 на 100 тыс. населения. По стадиям заболевания: I-II ст. - 41 (78,8%), III ст. - 8 (5,3%), IV ст. - 1 (1,9%).

За 8 месяцев 2010 года выявлено 232 случая с поражениями ШМ (Д I—III, carcinoma in situ, инвазивный РШМ), что составляет 1,6%. CIN I – 171 (1,2%), CIN II – 29 (0,2%), CIN III – (0,14%), carcinoma in situ, РШМ – 11 (0,07%). Число неинформативного материала составило 1339 случаев (9,3%). Всего за 8 месяцев 2010 г. выявлено и взято на учёт 33 случая РШМ (из них 11 пациенток скринингового возраста). Заболеваемость составила 8,5 на 100 тыс. населения. По стадиям заболевания: I-II ст. - 28 (84,8%), III ст. - 4 (12,1%), IV ст. - 1 (3%). Прирост выявляемости

Жатыр мойны рагін ерте диагностикалаудағы цитологиялық скрининг

Денсаулықсақтау тәжірибесінің ең негізгі міндеті профилактика және жатыр мойны рагін ерте диагностикалау. Бұл жоспарда ракті бастапқы сатыда тиімді диагностикалау маңызды. Скрининг кезінде ісіктен бұрынғы жатыр мойнының айналасындағы ауруларды әйелдердің әр түрлі өмір сүру кезеңінде болғанын анықтайды.

Әдістер мен мәліметтер. 2009-2011 жылдар 51655 әйелдердің жатыр мойнына цитологиялық зерттеулер жүргізілді.

Анамнездік мәліметтерге қарамастан.

Қорытындылар. Барлығы 2010 жылы анықталды және бақылауға жатыр мойны рагі диагнозымен 55 науқас (оның ішінде 23 науқас скрининг жасында) ауру құрады 9,1 100 мың тұрғындарға. Ауру сатысы бойынша: I-2 ст. – 45 (81,8%), III ст. – 9 (16,4%), IV ст. 1 (1,8%).

2009-2010 жж аралығында барлық анықталғандар және бақылауға алынғандар жатыр мойын рагі диагнозы бойынша 140 науқас (олардың 67 науқас скрининг жасында).

Цитологический скрининг по ранней диагностике рака шейки матки

Одной из главных задач практического здравоохранения является профилактика и ранняя диагностика рака шейки матки. В этом плане важна эффективная диагностика начальных стадий рака, предопухолевых и фоновых заболеваний ШМ во время скрининга в различные периоды жизни женщины.

Материалы и методы. За 2009-2011 гг. было проведено цитологическое исследование шейки матки 51655 женщин независимо от анамнестических данных.

Результаты. Всего в 2010 г. выявлено и взято на учёт с диагнозом рак шейки матки 55 пациенток (из них 23 пациентки скринингового возраста), заболеваемость составила 9,1 на 100 тыс. населения. По стадиям заболевания: I-II ст. - 45 (81,8%), III ст. - 9 (16,4%), IV ст. - 1 (1,8%).

Всего за период 2009-2011 гг. выявлено и взято на учёт с диагнозом рак шейки матки 140 пациенток (из них 67 пациенток скринингового возраста).

составил 57,5%.

В 2007 РШМ I-II ст. составлял 62,1%, в 2008 г. - 70,3%, в 2009 – 82,7%, в 2010 - 81,8%. В целом отмечается повышение ранней диагностики РШМ.

Вывод

Результаты анализа диагностики поражений шейки матки у женщин во время скрининга показывают высокую эф-

фективность проводимых исследований. За счёт цитологических исследований возросла ранняя и своевременная диагностика рака шейки матки (рака in situ, I-II ст.). Выявление различных неопухолевых заболеваний важно для активного лечения.

Имеются реальные пути снижения и ликвидации распространенных злокачественных опухолей у женщин. Однако основным критерием цитологического скрининга РШМ является консультативный характер работы врача-цитолога и ответственность гинеколога за качество материала. То есть, заказывая консультацию цитолога, гинеколог несет ответственность за чувствительность теста! Информативность цитологических исследований в значительной степени зависит от адекватности материала. В адекватном материале высока вероятность выявления предопухолевых состояний эпителия шейки матки.

Оптимальная организация всех этапов скрининга и профессиональное выполнение всех процедур и оценок позволит сберечь здоровье женщин и сохранить генофонд нашей страны.

Список использованных источников

1. Подистов Ю.И., Лактионов К.П., Петровичев Н.Н. *Современные диагностические возможности в определении предрака и рака шейки матки (Обзор литературы)* // Научно-практический журнал РФ «Клиническая лабораторная диагностика». - 2003. - №3.
2. Кайрбаев М.Р., Исакова Ж.К., Шибанова А.И., Козбагарова Р.Г., Мухаметгалиев Н.А. *Скрининг рака шейки матки (методические рекомендации)* Методические рекомендации основаны на документе ВОЗ «Comprehensive Cervical Cancer Control: a guide to essential practice», WHO 2006.
3. *Годовые отчёты за 2007-2011 гг. ГККП Западно-Казахстанского областного онкологического диспансера.*