

Заболеваемость раком молочной железы в Южно-Казахстанском регионе

Досанова Р.Е.

Южно-Казахстанский консультативно-диагностический медицинский центр

Введение

Отмечается тенденция к росту заболеваемости рака молочной железы (РМЖ). По данным ВОЗ, в мире ежегодно заболевают около 1 миллиона женщин раком молочной железы. По данным ЮНЕСКО, ведущей причиной смерти среди молодых женщин в 28 индустриальных странах за последние 10 лет является рак молочной железы. По данным экспертов, в общей структуре онкологической заболеваемости рак молочной железы становится все более серьезной проблемой для казахстанских женщин и занимает 2 место в общей структуре онкопатологии. В целом, как и во всем мире, в Казахстане наблюдается устойчивое увеличение случаев этого заболевания в среднем на 1 - 2% в год, ежегодно выявляется более 3 тыс. случаев РМЖ. Распространенность РМЖ убеждает в необходимости внедрения в практику эффективных методов и международных стандартов профилактики, диагностики и лечения доброкачественных и злокачественных заболеваний молочных желез [Биртанов Е.А., 2011].

Материалы и методы исследования

Материалом исследования послужили данные Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии, касающиеся рака молочной железы.

Результаты исследования

Анализ ретроспективных данных показателей заболеваемости раком молочной железы показал рост контингента больных данной категории за изучаемый период. Так с 2004 года отмечается постепенное увеличение количества случаев выявления РМЖ у женщин от 18528 до в 2008 году – 22965.

За изучаемый период в Казахстане впервые зарегистрировано 28 707 случаев рака молочной железы. Распределение женщин по возрастным группам - до 30 лет – 262 (0,9%) больных, 30–39 лет – 2 090 (7,3%), 40–49 – 7 484 (26,1%), 50–59 лет – 7 466 (26,0%), 60–69 лет – 6 306 (22,0%) и в 70 лет и старше – 5 099 (17,8%). Высокий

Казақстан және Оңтүстік Қазақстан облысында әйелдері арасында барлық онкологиялық аурулардың ішінде сүт безі рагі екінші орында. Осы аурудың тұрақты жағдайда көбеюі 4 сатысы және өлімнің жоғарғы көрсеткіші кеш анықтау салдарынан.

Денсаулық сақтау саласының ұйымдастырушыларына қажеттілікке байланысты табысталды.

Аудан орталықтарында нақтылы ұйымдасқан - әдістемелік іс шараларын жүргізу, сүт безі рагін ерте анықтау және профилактикалар жүргізу.

Рак молочной железы занимает второе место среди всех онкологических заболеваний у женщин в Казахстане в Южно-Казахстанской области (ЮКО). Устойчивое увеличение случаев этого заболевания с 4 стадией и высокие показатели смертности вследствие позднего выявления указывают на необходимость организаторам здравоохранения принять обоснованные организационно-методические мероприятия по раннему выявлению и профилактике рака молочной железы в районных центрах.

Breast cancer ranks second among all cancers in women in Kazakhstan, South Kazakhstan region. Steady increase in cases of breast cancer with a 4-stage and high rates of mortality due to late detection, indicate the need for policy-makers to make informed organizational and methodological measures for early detection and prevention of breast cancer.

удельный вес больных приходился на возрастную группу 40–59 лет (52,1%). Среднегодовые возрастные показатели заболеваемости раком молочной железы имели уни-модальный рост с пиком в 60–69 лет – 115,8±3,60/0000.

Показатель заболеваемости в 30–39 лет в 26,4 раза выше показателя до 30 лет, а в 40–49 лет показатель в 3,8 раза выше. Заболеваемость в 50–59 лет в 1,5 раза выше, чем в 40–49 лет. При этом имеющиеся различия в




Рис.1- Заболеваемость РМЖ в РК за период 2004-2008 гг.




Рис.2 - Заболеваемость и смертность от РМЖ в РК

возрастных показателях заболеваемости РМЖ статистически значимы ($p < 0,05$). В возрастных группах старше 50 лет показатели заболеваемости раком молочной железы не имели статистически значимых различий ($p > 0,05$).

В разрезе областей по Казахстану РМЖ высокие показатели определяются в Павлодарской области, г. Алматы, в Восточно-Казахстанской области в сравнении с Южно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской областью. Возможно, это связано с недостаточной диагностикой на раннем этапе заболевания, информированностью населения. Это подтверждают статистические данные по Южно-Казахстанской области. Так, в городе Шымкенте показатели высокие и имеют тенденцию к росту, тогда как в районах данные низкие (рис.5).




Рис. 3 - Удельный вес показателей ранней и поздней диагностики РМЖ в РК

Таблица – Сравнительные данные некоторых показателей по РК и ЮКО за 2008 и 2009 годы

	годы	Заболеваемость РМЖ (на 100 тыс.нас.)	Ранг	Удельн. вес I-II ст., %	Удельн. вес IV ст., %	Смертность от РМЖ, ‰
РК	2008	20,8	2	60,8	6,3	8,5
	2009	20,5	2	71,1	6,4	8,6
ЮКО	2008	9,6	1	73,9	9,0	5,2
	2009	10,7	2	80,5	8,6	5,3

Таким образом, заболеваемость РМЖ в области ниже, чем в республике в 2 раза как в 2008, так и в 2009 году. Удельный вес I-II стадии РМЖ несколько (на 2,2 и 6,6%) выше в ЮКО, чем в республике, IV стадии – также на 2,7 и 2,4% выше, т.е. запущенных форм РМЖ выше в области. Смертность от РМЖ в ЮКО ниже, чем в республике.




Рис. 4 - Заболеваемость РМЖ в разрезе областей РК за 2008г на 100 тыс. нас

Выводы

Статистические данные в разрезе Республики Казахстан и Южно-Казахстанской области позволяют указать на недостаточную информированность и раннюю диагностику рака молочной железы среди населения в районных центрах.

Литература

1. Биртанов Е.А. Мат. круглого стола «Новые разработки и технологии в диагностике и лечении рака молочной железы – европейские стандарты» АО «Национальный медицинский холдинг». - Астана, 2011.
2. Демографический ежегодник Казахстана. Статистический сборник. – Астана, 2009. – 637 с.
3. Применение методов статистического анализа для изучения общественного здоровья и здравоохранения. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004. – 180 с.
4. Харченко В.П., Рожкова Н.И. Маммология. Национальное руководство. – М.: Гэотар-Медиа, 2009.
5. Давыдов М.И., Летагина В.П. Практическая маммология. - М., 2005.
6. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2008, 2009 гг. (статистические материалы). - Алматы, 2009, 2010.




Рис. 5 - Заболеваемость РМЖ в Южно-Казахстанской области по районам за 2007-2009гг.