

Цитологический метод в ранней диагностике рака молочной железы

Якупова Л.М.

Западно-Казахстанский областной онкологический диспансер», г. Уральск, Казахстан

Актуальность

Общеизвестно, что рак молочной железы уверенно лидирует среди заболеваемости и причин смертности женского населения. В настоящее время успехи в обеспечении здоровья населения во многом зависят от проведения массовых профилактических осмотров. Активное выявление и проведение динамического наблюдения и лечения пациенток с изменениями структуры тканей молочной железы не только приводит к снижению числа случаев заболеваемости раком молочной железы, но способствует выявлению рака на более ранних стадиях, что коррелирует со значительным повышением выживаемости от этого заболевания.

Проведение эффективных массовых профилактических осмотров, как показывает опыт многих стран, невозможен без использования цитологического метода, получившего полное признание и широкое распространение в последние годы. На современном уровне цитологическое исследование является одним из эффективных методов диагностики на любом этапе прогрессии опухоли и в этом плане дает возможность: показать характер и степень выраженности пролиферации клеток; диагностировать злокачественные опухоли при любой локализации в любой стадии процесса.

Материалы и методы

По Западно-Казахстанской области (ЗКО) в 2009 году было проведено 16 201 маммографических исследований женщин, в 2010 году - 14843, г. за 8 месяцев 2011 г. - 12011 женщин, с цитологическим исследованием пунктатов выявленных образований молочной железы. Всего с 2009 г. по сентябрь 2011 г. было проведено 6 882 цитологических исследований тонкоигольных пунктатов образований молочной железы амбулаторных больных (1740 женщин).

Результаты

Цитологически установлены ФКМ – у 501 женщины, фиброаденома - 231, киста – 270, мастит - 292, атипическая пролиферация - 26, внутрипротоковая папиллома - 13, РМЖ – 271, из них рак молочной железы скринингового возраста у 67 женщин (22% от общего числа с первично установленным диагнозом РМЖ), саркома – 1, неинформативный материал – 135.

Всего по области выявлено и взято на учёт с диагнозом рак молочной железы в 2009 г. 122 пациентки (22 пациентки скринингового возраста), заболеваемость РМЖ составила 19,7 на 100 тыс. населения. По стадиям заболевания: I-II ст. - 90 (73,8%), III ст. - 28 (23,0%), IV ст. - 4 (3,2%).

В 2010 г. – выявлено и взято на учёт 87 пациенток (25 пациенток скринингового возраста). Заболеваемость составила 13,9 на 100 тыс. населения. По стадиям заболевания: I-II ст. - 77 (88,5%), III ст. - 9 (10,3%), IV ст. - 1 (1,15%). Выявляемость РМЖ I-II ст. возросла на 14,7%.

За 8 месяцев 2011 г. – всего выявлено и взято на учёт 97 пациенток, из них 20 женщин скринингового возраста. Заболеваемость составила 15,9 на 100 тыс. населения. По стадиям заболевания: I-II ст. - 81 (83,5%), III ст. - 13 (13,4%), IV ст. - 3 (3,1%).

Сүт безі рагін ерте диагностикалаудың цитологиялық әдісі

Сүт бездері тіндерінің құрылысында өзгерістері бар науқастарға белсенді анықтаулар жүргізу, динамикалық қозғалыстарын бақылау арқылы емдеу сүт безі рагін бастапқы сатысында анықтауға мүмкіндік береді және өмір суру мүмкіндігін жорғалатады.

Зерттеудің мақсаты - Сүт безі рагін бастапқы сатыда анықтау.

Зерттеудің әдісі мен мәліметтері - Цитологиялық зерттеулердің пунктатарының көмегі арқылы, маммографиялық зерттеудің көмегімен сүт безіндегі өспелер анықталды.

Цитологиялық зерттеулер анғұрлым жоғары сенімді, қатерлі жаңа өспелерді нақты делелдеп, сонымен қатар көп жазғайда гистогенезіде анықтайды (шығу тегі, тиісті тіні) және деңгейі нақтыланған ісік, келесі бақылау және ем жүргізу үшін де өте маңызды. Активное выявление и проведение динамического наблюдения и лечения пациенток с изменениями структуры тканей молочной железы способствует выявлению рака молочной железы на более ранних стадиях и приводит к значительному повышению выживаемости от этого заболевания.

Цель исследования – выявление рака молочной железы в ранней стадии.

Материал и методы исследования - С помощью цитологического исследования пунктатов, выявленных с помощью маммографического исследования образований молочной железы.

Цитологическое исследование позволяет с достаточно высокой достоверностью не только констатировать наличие злокачественного новообразования, но и в большинстве случаев определить гистогенез (происхождение, тканевую принадлежность) и степень дифференцировки опухоли, что весьма важно для проведения последующего лечения и прогноза.

В 2007 год было взято на учёт 132 женщины РМЖ, стадии заболевания: I-II ст. – 82 (62,1%), III ст. – 39 (29,5%), IV ст. - 10 (7,6%), в 2008 г.- 135 женщин: I-II ст. – 95 (70,3%), III ст. – 35 (25,9%), IV ст. - 4 (2,9%). Возросла ранняя диагностика РМЖ - I-II ст. составляет более 80%.

Вывод

Цитологический анализ производится в первую очередь для того, чтобы получить ответ на вопрос о наличии злокачественного новообразования. В процессе дифференциальной диагностики определяется характер патологического процесса и устанавливаются воспалительные, реактивные, пролиферативные или предраковые поражения, а также доброкачественные опухоли. Несравненное преимущества перед другими методами имеет цитологическое исследо-

вание в выявлении рака начальных стадий.

Цитологическое исследование позволяет с достаточно высокой достоверностью не только констатировать наличие злокачественного новообразования, но и в большинстве случаев определить гистогенез (происхождение, тканевую принадлежность) и степень дифференцировки опухоли, что весьма важно для проведения последующего лечения (химио- и лучевое воздействие) и прогноза.

Список использованных источников

1. *Ивашков Е.А., Ефименко М.В. Методы клинической цитологии.* - М., 2003.
2. *Шабалова И.П., Джангирова Т.В., Волченко Н.Н. и соавт. Цитологический атлас «Диагностика заболеваний молочной железы».* - М., 2005.
3. *Н.Н. Волченко МНИОИ им. П.А. Герцена Журнал «Маммология».* - 2006. - №1.
4. *Годовые отчёты за 2007-2011 г. ГККП Западно-Казахстанского областного онкологического диспансера. Цитологический метод в ранней диагностике рака молочной железы.*