

УДК: 616-006.6-036.22(574.11)

Г.Д. Сейтказина, Н.Т. Имангалиева, А.Е. Ажмагамбетова, Ж.К. Чингисова
Казахский НИИ онкологии и радиологии

Эпидемиологические аспекты заболеваемости злокачественными новообразованиями в Западном регионе Казахстана

Аннотация. Эпидемиологические аспекты заболеваемости злокачественными новообразованиями в Западном регионе Казахстана

Проведен анализ заболеваемости ЗН населения Западного региона Республики с 2000 по 2008 годы. За исследуемый период зарегистрировано 35306 больных ЗН. По распространению заболевших ЗН в областях установлено, что наибольший удельный вес ЗН был в Западно-Казахстанской (44,0%) и Актыбинской областях (27,8%), затем - в Атырауской (16,6%) и наименьший - в Мангистауской (11,6%) областях.

Ключевые слова: эпидемиология, заболеваемость, Западный Казахстан.

Рост числа злокачественных новообразований – одна из основных проблем здравоохранения большинства стран мира, поскольку эти заболевания являются одной из главных причин смертности и инвалидности населения [1]. В мире отмечается постоянный рост числа больных злокачественными новообразованиями: 1985 г. – 7,6 млн. новых случаев рака, 1990 – 8,1 млн. Исходя из этих величин, в 2010 году предполагается новая регистрация 13 млн. больных раком [2, 3]. Проблема заболеваемости злокачественными новообразованиями является актуальной и в Казахстане [4]. Особый интерес представляет изучение особенностей распространения злокачественных новообразований по территориальному признаку и временным периодам.

Цель исследования

– анализ заболеваемости злокачественными новообразованиями населения Западного региона в период с 2000 по 2008 годы.

Материалы и методы

Использованы основные медицинские отчетные и учетные формы (Ф. № 7, № 35, № 090/У) и база данных Канцер-регистра (АИС-ОНКО) по злокачественным новообразованиям (ЗН), а также сведения о численности населения четырех областей Западного региона. Интенсивные (ИП) и стандартизованные (СП) показатели рассчитаны по общепринятой методике санитарной статистики [5, 6].

Результаты исследований

Западный регион включает четыре области: Актыбинскую, Западно-Казахстанскую, Атыраускую и Мангистаускую.

В исследованиях проведен анализ заболеваемости злокачественными новообразованиями по областям Республики за период 2000-2008 гг по трехлетним интервалам: первый – 2000-2002 гг., второй – 2003-2005 гг., третий – 2006-2008 гг.

За исследуемый период зарегистрировано 35306 больных онкопатологией. Изучение экстенсивных показателей злокачественных новообразований по областям региона показал, что удельный вес был неодинаковым и колебался в пределах с 6,8% (Западно-Казахстанская область) до 1,8% (Мангистауская область) по отношению к числу заболевших по Республике, и в пределах 44,0% - 11,6% по региону.

Заболеваемость злокачественными новообразованиями по Актыбинской области. За изучаемый период зарегистрировано 9811 больных ЗН в Актыбинской области и составляет 3,9% по отношению данных Республики.

Динамика показателей заболеваемости ЗН населения области за 2000-2008 гг. имела тенденцию роста со 156,2‰ (2000 г) и до 163,7‰ в 2008 году с темпом прироста Тин = 1,2%.

Среднегодовые ИП заболеваемости ЗН населения области за изучаемый период (2000-2008 гг.) составили 159,8‰, СП (мировой) - 182,7‰. Анализ показателей по трехлетним интервалам свидетельствует о росте ЗН со 156,3‰ (2000-2002 гг.), до 163,3‰ в последнем периоде (2006-2008 гг.). Аналогичные изменения отмечены при стандартизации заболеваемости мировым стандартом (рисунок 1): 178,4‰-185,8‰.

У мужского населения области ИП заболеваемости ЗН по периодам характеризовался ростом со 156,3‰ (2000-02гг.) до 163,3‰, т.е. на 4,5% в последнем периоде (2005-08 гг.). Темп прироста ИП был положительным (Тин = 1,7%). Подобные изменения были при стандартизации показателей заболеваемости: со 178,4‰ до 185,8‰, с темпом прироста Т = 1,2% (рисунок 2).

Анализ интенсивных и стандартизованных показателей заболеваемости женского населения по периодам (рисунок 3), показал, что имелся незначительный рост ИП со 160,8‰ до 163,0‰ к 2005-2008 гг. (Тин = 0,4%), СП снизились с 154,0‰ до 152,8‰, (Тст = -7,4%).

Заболеваемость злокачественными новообразованиями по Западно-Казахстанской области За изучаемый период зарегистрировано 11527 больных ЗН в Западно-Казахстанской области и составляет 4,44% по отношению данных республики.

В динамике показатели ЗН населения области за 2000-2008 гг. почти без изменений (208,7‰ - 209,1‰).

Среднегодовые ИП заболеваемости ЗН населения области были равны 278,7‰, СП - 266,1‰. По трехлетним периодам ИП заболеваемости ЗН с тенденцией снижения со 221,1‰ (2000-2002 гг.) до 207,3‰ в

последние годы (2006-2008 гг.). Аналогичные изменения отмечены при стандартизации заболеваемости мировым стандартом (рисунок 4). Так этот показатель сни-

зился со 226,9‰ до 206,2‰, но темпы приростов их были почти одинаковыми (Тин=2,3%, а Тст= -2,6%, соответственно).




Рисунок 1- Динамика показателей заболеваемости ЗН населения Актыбинской области по трехлетним периодам за 2000-2008 гг.

У мужского населения области по периодам отмечается снижение с 226,9‰ (2000-02гг.) до 213,2‰, т.е. на 6,0% в последнем периоде (2005-08 гг.) с темпом прироста Тин = -2,3%. В то же время СП заболеваемости

выросли с 193,3‰ до 246,9‰ с темпом прироста Т= 8,9% (рисунок 5).

За 2000-2008 гг ИП заболеваемости ЗН женского населения составили 271,2‰, СП – 242,3‰. Анализ




Рисунок 2- Динамика показателей заболеваемости ЗН мужского населения Актыбинской области по трехлетним периодам за 2000-2008 гг.

ЗН по периодам показал, что (рис.6) ИП с незначительным ростом с 200,8‰ до 201,9‰ в 2005-08 гг. (Тин= 0,2%), СП с таким же уровнем снижения с 168,6‰ до

165,4‰, (Тст=-0,5%).

Заболеваемость злокачественными новообразованиями по Атырауской области За изучаемый период




Рисунок 3 - Динамика показателей заболеваемости ЗН женского населения Актыбинской области по трехлетним периодам за 2000-2008 гг.

зарегистрировано 5862 больных ЗН в Атырауской области, что составляет 2,3% по отношению данных республики.

Динамика показателей заболеваемости ЗН населения области за 2000-2008 гг. имела тенденцию снижения со 148,5‰ (2000 г) до 134,1‰ в 2008 году.

Уровень ИП заболеваемости ЗН населения области в среднем за изучаемый период составил 140,2‰, СП - 180,6‰ (рисунок 7). По трехлетним периодам ИП заболеваемости ЗН снились со 152,7‰ до 130,1‰, СП- со 191,7‰ до 177,8‰ с разным уровнем темпов (Тин-3,8%, Тст= 2,3%).

По ИП заболеваемости ЗН мужского населения области по периодам отмечено снижение со 152,7‰ (2000-02гг.) до 130,1‰, т.е. на 17,0% в последнем

периоде (2005-08 гг.), по СП со 191,7‰ до 170,9‰. Темпы соответственно составили Тин = -3,8 Тсп= -3,5% (рисунок 8).

Анализ интенсивных и стандартизованных показателей заболеваемости женского населения по периодам (рисунок 9), показал, что ИП снизились со 151,9‰ до 139,0‰, СП - со 184,6‰ до 140,3‰ с различными темпами Тин= -2,2% и Тст= -7,4%.

Заболеваемость злокачественными новообразованиями по Мангистауской области. За изучаемый период зарегистрировано 4106 больных ЗН, что составляет 1,6% по отношению данных республики.

Заболеваемость ЗН населения области за 2000-2008 гг. в динамике имела тенденцию снижения со 136,8‰




Рисунок 4 - Динамика показателей заболеваемости ЗН населения Западно-Казахстанской области по трехлетним периодам за 2000-2008 гг.




Рисунок 5- Динамика показателей заболеваемости ЗН мужского населения Западно-Казахстанской области по трехлетним периодам за 2000-2008 гг.




Рисунок 6 - Динамика показателей заболеваемости ЗН женского населения Западно-Казахстанской области по трехлетним периодам за 2000-2008 гг.

до 117,9‰. В начале исследования ИП выросли до 139,5‰ в 2001 году, затем резко снизились до 120,3‰ в 2004 году, и вновь выросли до 134,1‰ в 2005 г., с последующим снижением до 109,5‰ в 2007 году, с дальнейшим ростом до 117,9‰. В целом темп имел тенденцию снижения (Тин=-2,7%).

При анализе по трехлетним периодам ИП заболеваемости ЗН населения отмечалось снижение со 136,0‰ (2000-2002 гг.), до 118,9‰ (Тин=-2,9%) в последнем трехлетии (2006-2008 гг.). При стандартизации (рисунок 10), показатель почти не изменился (182,2‰ - 182,9‰).

В динамике ИП заболеваемости ЗН мужского населения

по периодам отмечается снижение со 132,8‰ до 112,3‰, т.е. на 18,2% в последнем периоде. При этом темп прироста ИП у мужчин со снижением Тин = -3,4%. Аналогичные изменения отмечаются по СП - 238,9‰ - 207,2‰, соответственно периодам. Темп прироста Т = -5,3% (рисунок 11).

Анализ интенсивных и стандартизованных показателей заболеваемости женского населения Мангистауской области по




Рисунок 7 - Динамика показателей заболеваемости ЗН населения Атырауской области по трехлетним периодам за 2000-2008 гг.

периодам (рис.12), показал, что ИП имеют тенденцию снижения со 139,2‰ до 125,2‰ в 2005-08 гг. (Тин = -2,3%), СП - со 181,3‰ до 158,5‰, (Тст = -3,8%).

Таким образом, анализ данных по распространению заболеваний онкопатологией по Западному региону показал, что наибольший удельный вес ЗН был в Западно-Казахстанской области, составив 44,0%, затем в Актыбинской – 27,8%, третьим определилась Атырауская – 16,7% и наименьшая регистрация первично заболевших ЗН была в Мангистауской области – 11,6%.

Уровень заболеваемости ЗН населения Западно-Казахстанской области за изучаемый период составил -278,7‰ и имел тенденцию роста с 208,7‰ (2000 г) до 209,1‰ в 2008 году, при этом СП – 281,1‰ снизился с 226,9‰ до 206,2‰, ИП заболеваемости ЗН мужского населения области в среднем на уровне 286,4‰, СП – 289,9‰, женского населения - 271,2‰, СП – 242,3‰.

По Актыбинской области заболеваемость ЗН в среднем за 2000-2008 гг составила 159,8‰ и имела тенденцию роста со 156,0‰ (2000 г) и до 163,7‰ (2008 г), СП - 182,7‰ с ростом от 178,4‰ до 185,8‰.

Заболеваемость ЗН населения Атырауской области в среднем по ИП была 140,2‰, СП-180,6‰, среди мужского населения - 140,1‰, СП – 208,3‰. ИП заболеваемости ЗН женского населения 140,3‰, СП – 152,8‰.

Среднегодовые ИП за заболеваемости ЗН населения Мангистауской области за изучаемый период (2000-2008 гг) были равны 126,6‰, СП - 184,8‰. Интенсивные показатели заболеваемости ЗН мужского населения в среднем составили 120,4‰, СП – 190,9‰, женского населения - по ИП 132,7‰, СП – 178,7‰.




Рисунок 8- Динамика показателей заболеваемости ЗН мужского населения Атырауской области по трехлетним периодам за 2000-2008 гг.




Рисунок 9 - Динамика показателей заболеваемости ЗН женского населения Атырауской области по трехлетним периодам за 2000-2008 гг.




Рисунок 10- Динамика показателей заболеваемости ЗН населения Мангистауской области по трехлетним периодам за 2000-2008 гг.




Рисунок 11- Динамика показателей заболеваемости ЗН мужского населения Мангистауской области по трехлетним периодам за 2000-2008 гг.




Рисунок 12 - Динамика показателей заболеваемости ЗН женского населения Мангистауской области по трехлетним периодам за 2000-2008 гг.

Список литературы

- 1 Чиссов В.И. Избранные лекции по клинической онкологии.- М., 2000. - С. 9-24.
- 2 Трапезников Н.Н., Аксель Е.М. Статистика злокачественных новообразований в России и странах СНГ (состояние онкологической помощи, заболеваемость и смертность). -М., 2001. - 295 с.
- 3 Давыдов М.И., Аксель Е.М. Злокачественные новообразования в России и странах СНГ в 2002 году.- М., 2004.- 280 с.
- 4 Арзыкулов Ж.А. Онкологическая помощь населению Республики Казахстан. Современная ситуация и перспективы // Онкология и радиология Казахстана.- 2002. - № 1. - С. 7-9.
- 5 Мерков А.М., Поляков Л.Е.. Санитарная статистика. - Л., 1974.- 211 с.
- 6 Применение методов статистического анализа: учебное пособие /Под ред. Кучеренко В.З.- М., 2004. - 188 с.

Тұжырым

Г. Д. Сейтказина, Н. Т. Имангалиева, А.Е.Ажмагамбетова, Ж.К.Чингисова

Батыс Қазақстан аймағында қатерлі түзілістердің эпидемиологиялық аспектері.

2000 жылдан 2008 жылдарға дейінгі аралықтағы Республиканың Батыс аймақтарындағы тұрғындардың қатерлі және өспелер ауруларына қортындылар жа- салды. Қатерлі және өспелермен тіркелген 35306 науқастар. Қатерлі жаңа өспелердің таралуы бойынша көп орын алған Батыс Қазақстан (44,0%) және Ақтөбе облысы (27,8%), бұдан кейін Атырау облысы (16,6%), Маңғыстау облысында - аздау (11,6%).

Батыс Қазақстан облысы бойынша қатерлі және өспелердің жылдық орташа көрсеткіші 278,7‰.

Ақтөбе облысы бойынша 159,8‰, Атырау облысы 140,2‰, Маңғыстау аймақтарында 126,3‰. Тұрғындар арасында әйелдердің қатерлі жаңа өспелерінің жылдық орташа көрсеткіші облыс аймақтарында -265,4 – 131,8‰ дейін болды. Ер адамдар – 293,0 – 121,2‰ облыстар бойынша аурудың салыстырмалы жағдайлары осылай болды.

Түйінді сөздер: қатерлі түзілістер, аурушаңдық, Батыс аймағы.

Summary

G.Z.Seytkazina, N.T.Imangaliyeva, A.E.Azhmagambetova, Z.K.Chingissova

Kazakh Scientific Institute Oncology and Radiology
Epidemiological aspects of cancer incidence in the western region of Kazakhstan

The analysis of the incidence of MN population of the West Region of the Republic from 2000 to 2008. During the study period, 35 306 patients were registered Cancer. For the dissemination of the diseased areas in SA found that the largest share cancer was in West Kazakhstan (44.0%) and Aktobe regions (27.8%), followed - in Atyrau (16.6%) and the lowest - in Mangistau (11.6%) regions. Annual average SA totaled 278.7‰ on WKO, 159.8‰ of Aktobe, 140.2‰ - Atyrau, 126.3‰ - Mangystau. Average annual incidence rates of cancer female population in the region were within 265.4-131.8‰, male - 293.0-121.2‰ respectively rank position of general morbidity regions.

Keywords: cancer, disease, West region.