

УДК:616-006(574.1)

Г.Д.Сейтказина, Н.Т.Имангалиева, А.В.Петухов, А.Д.Манжуева
Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Оценка заболеваемости злокачественными новообразованиями в Западно-Казахстанской области за десять лет

Аннотация. Заболеваемость злокачественными новообразованиями в Западно-Казахстанской области выше средних республиканских показателей. Изучение поло- возрастных особенностей распространения ЗН за длительный временной период является актуальным.

Цель исследования - Изучить пространственное и временное распределение злокачественных новообразований в Западно - Казахстанской области за 10-летний период.

Материалы и методы. Материалом служили данные канцер -регистра по Западно- Казахстанской области (ЗКО) за 10 лет.

Методами анализа заболеваемости ЗН служили расчеты экстенсивных, интенсивных и стандартизованных показателей по годам, полу, возрастным группам.

Результаты. Проведен анализ заболеваемости злокачественными новообразованиями по Западно-Казахстанской области за 10 лет по годам и пятилетним периодам: первый-2002-2006 гг., второй-2007-2011гг.

Заболеваемость ЗН в ЗКО в течение 10 лет была выше средних данных по республике и находилась постоянно на 8-ом ранговом месте среди 14 областей и 2 городов (Астана, Алматы) ранжированных относительно показателей заболеваемости ЗН РК (в 10 регионах были выше данных РК, остальные ниже).

Ключевые слова: заболеваемость, оценка, стандартизованные и интенсивные показатели.

Злокачественные новообразования (ЗН) являются проблемой не только медицинской, но и социальной. Это связано с большим ущербом, который наносят ЗН населению, что в свою очередь влияет на демографическую ситуацию. Статистика заболеваемости ЗН свидетельствует об увеличении частоты рака во всех экономически развитых странах мира (1,2,3). Меняется структура онкологической патологии и смертности, их возрастное-половая распространенность, географические и этнические признаки (4,5).

В связи с этим для эффективности противораковой борьбы изучение изменения уровней заболеваемости, их территориальной, возрастной, национальной и других особенностей является актуальной.

Западно-Казахстанская область является нефтегазовым регионом. Заболеваемость злокачественными новообразованиями области достаточно высока. Поэтому показателю она на восьмом ранговом месте среди 14 областей Республики (6). Особый интерес представляет изучение особенностей распространения ЗН за длительный временной период.

Цель исследования

- изучить пространственное и временное распределение злокачественных новообразований в Западно-Казахстанской области за 10 лет.

Материалы и методы

Материалом для выявления территориально-временной особенности заболеваемости злокачественными новообразованиями (ЗН) служила база данных канцер-регистра по Западно-Казахстанской области (ЗКО) за 2002-2011 гг на 12760 больных с онкопатологией впервые установленным диагнозом ЗН.

Методами анализа заболеваемости ЗН служили:

- Международная классификация болезней IX и X пересмотров и 1995 гг.

- Расчеты экстенсивных, интенсивных и стандартизованных показателей по полу, возрастам, и годам а также по 5-летним периодам проведены по программе мед.статистики.

- Стандартизованные показатели рассчитаны прямым методом на основе мирового стандарта [7,8].

Результаты исследования

Проведен анализ заболеваемости злокачественными новообразованиями по Западно-Казахстанской области за 10 лет по двум пятилетним периодам: первый – 2002-2006гг, второй – 2007-2011гг.

За изучаемый период зарегистрировано 12760 больных злокачественными опухолями в Западно-Казахстанской области, что составляет 4,4% по отношению всех ЗН по республике.

В динамике показатели заболеваемости злокачественными новообразованиями всего населения Западно-Казахстанской области за 2002-2011 гг. (рисунок 1) имели тенденцию снижения с 232,1‰ (2002 г) до 208,2‰ в 2011 году. При этом темп изменения распространенности ЗН в области по абсолютным значениям не снижался, что обусловлено ростом численности населения в последние годы в этой области.

Среднегодовые интенсивные показатели заболеваемости злокачественными новообразованиями всего населения Западно-Казахстанской области (рис. 2) по изучаемым периодам (2002-2006гг и 2007-2011гг) составили 210,5‰ (1 период) и 208,4‰ (2 период). Стандартизованные показатели (мировой) соответственно 199,3‰ и 190,5‰. Попятилетним периодам интенсивные показатели (ИП) заболеваемости обоего пола населения во втором периоде были снижены на 2,1‰.




Рисунок 1- Динамика заболеваемости злокачественными новообразованиями населения ЗКО за 2002-2011 годы




Рисунок 2- Заболеваемость ЗН населения ЗКО по пятилетним периодам (2002-2006; 2007-2011гг)




Рисунок 3- Заболеваемости ЗН населения ЗКО по возрастам и пятилетним периодам (2002-2006; 2007-2011гг)

Аналогичные изменения отмечены при стандартизации показателей заболеваемости мировым стандартом со снижением на 8,8‰. Стабилизация интенсивного показателя заболеваемости всего населения злокачественными опухолями в течение 10 лет при росте абсолютных значений объясняется ростом численности населения области.

Показатели заболеваемости злокачественными новообразованиями по поло-возрастному составу всего населения области (рисунок 3) в обоих периодах исследования имели унимодальный тип роста с пиком в возрасте 60-69 и 70 лет и старше. Показатели заболеваемости в возрастных группах, начиная с 40 лет и старше, имели тенденцию снижения, затем отмечается рост у лиц

старше 70 лет с 1824,7‰ до 1977,35‰ во втором периоде исследования. При этом показатели заболеваемости злокачественными опухолями среди лиц 50-59 и 60-69 лет во втором периоде (523,21‰ и 1312,64‰, соответственно) были ниже по сравнению с таковыми первого периода исследования (567,96‰ и 1385,85‰).

За изучаемый период зарегистрировано 6369 больных злокачественными опухолями среди мужского населения, что составляет 49,9% от всех ЗН в области.

В динамике показатели заболеваемости злокачественными новообразованиями мужского населения в Западно-Казахстанской области за 2002-2011 гг. (рисунок 4) имели тенденцию снижения с 255,1‰ (2002 г) до 207,6‰ в 2011 году. Однако стандартизованные показатели (СП) (296,4‰ в 2002 году – 232,4‰ в 2011 г) были выше, чем интенсивные (соответственно годам), но тенденция снижения в динамике СП сохранилась.

Среднегодовые интенсивные показатели заболеваемости злокачественными новообразованиями мужского населения Западно-Казахстанской области (рисунок 5) по изучаемым периодам (2002-2006 гг и 2007-2011 гг) составили 217,8‰ (1 период) и 215,3‰ (2 период). Стандартизованные показатели (мировой) соответственно периодам были 250,4‰ и 243,5‰. При сравнении по пятилетним интервалам интенсивные показатели (ИП) заболеваемости мужского населения во втором периоде были незначительно ниже, т.е. на 2,5‰. Несколько больше изменения отмечены при стандартизации показателей заболеваемости мировым стандартом с разницей 6,9‰.

Повозрастная заболеваемость мужского населения области (рисунок 6) во втором периоде среди лиц 70 лет и старше стала выше на 15,2‰, достигнув 1977,35‰. Более низкие показатели установлены в четырех возрастных группах по сравнению с предыдущим периодом исследования. Среди лиц 40-49 лет интенсивные показатели снизились на 36,2‰, 50-59 лет – на 44,6‰, 60-69 лет – 73,2‰. В то же время в молодых возрастных группах мужчин уровень заболеваемости злокачественными опухолями был относительно одинаков и стабилен.

За изучаемый период (10 лет) зарегистрировано




Рисунок 4 - Динамика заболеваемости ЗН мужского населения ЗКО за 2002-2011 гг




Рисунок 5 - Заболеваемость ЗН мужского населения ЗКО по пятилетним периодам (2002-2006; 2007-2011 гг)




Рисунок 6 - Заболеваемость ЗН мужского населения ЗКО по возрастам и пятилетним периодам (2002-2006; 2007-2011 гг)

6349 больных злокачественными опухолями среди женщин, что составляет 50% по отношению данных всех ЗН населения Западно-Казахстанской области.

Динамика тренда показателей заболеваемости злокачественными новообразованиями женского населения области за 2002-2011 гг. (рисунок 7) была с небольшим снижением с 210,6‰ (2002 г) до 208,8‰ в 2011 году. ИП и СП соответственно 175,2‰ в 2002 и 168,7‰ в 2011 годах. При этом темп изменения уровня заболеваемости в области был более стабильным по интенсивным

показателям во втором периоде исследования.

Среднегодовые интенсивные показатели заболеваемости злокачественными новообразованиями женского населения Западно-Казахстанской области (рисунок 8) по изучаемым периодам (2002-2006 гг и 2007-2011 гг) составили 201,9‰ (1 период) и 201,0‰ (2 период). Стандартизованные показатели (мировой) соответственно 167,3‰ и 160,8‰. Интенсивные показатели (ИП) заболеваемости женского населения по пятилетним периодам оставались на одном уровне. Небольшие изменения отмечены при стандартизации показателей заболеваемости мировым стандартом, которые незначительно ниже.

Повозрастная заболеваемость женского населения области (рисунок 9) во втором периоде среди лиц 70 лет и старше снизилась до 921,4‰, т.е. на 58,5%, в группе 60-69 лет - до 693,5‰, т.е. на 30,3%. В группах среднего возраста 40-49 и 50-59 лет изменения показателей заболеваемости незначительны и можно трактовать их как стабильными. Однако показатели ИП в группе 50-59 лет в 2 раза выше, чем в группе 40-49 лет (405-397,3 и 206-210,7% соответственно). В то же время в молодых возрастных группах женщин уровень заболеваемости злокачественными опухолями был значительно ниже с небольшими изменениями. Так в группе 30-39 лет показатели ИП - 65‰ и 71,4‰ соответственно периодам.

Таким образом, анализ заболеваемости злокачественными опухолями населения Западно-Казахстанской области в динамике за 10 лет выявил наибольшее снижение показателей ИП в первый год исследования с 255,1‰ до 210,3‰ и в следующий год

(ИП - 201,5‰). В 2004 году показатели поднялись до 215,0‰. Во второй пятилетний период исследования рост ИП продолжается и доходит до 221,0‰ в 2010 году.

В целом заболеваемость ЗН всего населения области за 2002-2011 гг имела тенденцию снижения на 23,9‰. При этом темп распространенности ЗН в области по абсолютным значениям не снижался, что объясняется ростом численности населения в последние годы в этой области.

Показатели заболеваемости ЗН по поло-возрастному




Рисунок 7 – Динамика заболеваемости ЗН женского населения ЗКО за 2002-2011 гг




Рисунок 8 – Заболеваемость женского населения ЗКО по пятилетним периодам (2002-2006; 2007-2011 гг)




Рисунок 9 – Заболеваемость ЗН женского населения ЗКО по возрастам и пятилетним периодам (2002-2006; 2007-2011 гг)

состав всего населения области за весь период исследования имели унимодальный тип роста с пиком в возрасте 60-69 и 70 лет и старше.

Показатели заболеваемости злокачественными новообразованиями мужского населения в области за 10 лет в ди-

намике с тенденцией снижения на 47,5‰.

Динамика тренда показателей заболеваемости злокачественными новообразованиями женского населения области за 2002-2011 гг. была с незначительным снижением на 1,8‰. При этом темп уровня заболеваемости среди женщин в области во втором периоде был более стабильным. Так в группах среднего возраста 40-49 и 50-59 лет изменения показателей заболеваемости были незначительны, т.е. без существенной разницы.

Таким образом, анализ распространенности онкопатологии за 10 лет (2002-2011 гг) выявил снижение показателей заболеваемости ЗН по Западно-Казахстанской области на 23,9‰. По ранговому распределению заболеваемость ЗН в ЗКО всегда была выше средних данных по республике и находилась постоянно на восьмой позиции, т.е. среди 14 областей и 2 городов (гг Астана, Алматы) при ранжировании проводится относительно показателей заболеваемости ЗН РК (до 10 регионов были выше данных РК, остальные – ниже).

В ЗКО заболеваемость мужского населения по показателям на 100 тыс. населения была значительно выше, чем среди женщин на 15,9-14,3‰ соответственно периодам исследования.

Список литературы

1. Заридзе Д.Г. Эпидемиология и этиология злокачественных новообразований / В кн. Канцерогенез. – М.: Медгиз, 2004. – С.29-85.
2. Santibanez M., Viogue J. et al. Occupational exposures and risk of pancreatic cancer // Eur. Epidemiol. -2010. –Vol.25, №10. – С.721-730.
3. Эфендиев В.А., Исмаилов А.М. Анализ заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований в Калужской области до и через 15 лет после Чернобыльской аварии // Росс. онкол. журнал. -2002. -№2. -С.40-45.
4. Залуцкий И.В., Аверкин Ю.И., Артемова Н.А., Машевский А.А. Основные тенденции заболеваемости ЗН в Республике Беларусь за 35 лет // Мат 1У съезда онкологов и радиологов СНГ. – Баку, 2006. – С.11.
5. Ефимова Г.С., Винник Ю.А., Кразов Ф.Л. Заболеваемость злокачественными новообразованиями населения Харьковского региона в 1990-2004 годы // Мат 1У съезда онкологов и

радиологов СНГ.-Баку, 2006.-С.11.

6 Мерков А.М., Поляков Л.Е. Санитарная статистика. -Л., 1974. - 211 с.

7 Применение методов статистического анализа: учебное пособие / Под.ред. Кучеренко В.З.- М.: ГЭОТАР, 2004.- 188 с.

Тұжырым

Г.Д.Сейтказина, Н.Т.Имангалиева, А.В.Петухов, А.Д.Манжуева

Қазақтың онкология және радиология ғылыми-зерттеу институті

Соңғы 10 жылда Батыс Қазақстандағы қатерлі жана түзімдері бар аурушылдықты бағалау

Батыс Қазақстан облысындағы қатерлі жаңа өспелер ауруларының жоғары-орта Республикалық көрсеткіштері.

Қатерлі жаңа өспелердің таралуын жынысы мен жас ерекшеліктеріне байланысты ұзақ уақыт аралығында анықтау өзекті мәселе болып саналады.

Зерттеудің мақсаты- Батыс Қазақстан облысындағы қатерлі жаңа өспелердің 10-жыл аралығындағы кеңістіктегі және уақытша таралу себептерін анықтау.

Материалдар мен әдістер. Материалға Батыс Қазақстан облысы (БҚО) бойынша 10 жыл ішіндегі көрсеткіштер алынды.

Қорытындылардың әдісіне қатерлі жаңа өспелер ауруларын анықтау үшін экстенсивті, интенсивті және стандартталған әл жылдардағы топтардың жынысы мен жас ерекшеліктеріне байланысты көрсеткіштері алынды.

Қорытынды. Батыс Қазақстан облысы бойынша 10 жыл арасындағы әр жылдар және бес жылдық мерзімде қатерлі жаңа өспелер ауруларына зерттеулер жасалды.

Алғашқы 2002-2006 жж, екінші 2007-2011 жж.

Батыс Қазақстан облысында 10 жыл аралығында қатерлі жаңа өспелер аурулары берілген орта есеппен жоғары болды, Республикада үнемі алдыңғы 8-ші орында. 14 облыс және 2 қала (Астана, Алматы) арасында. Қазақстан Республикасы бойынша қатерлі жаңа өспелер ауруларының жалпы көрсеткіштері (10 аймақта жоғары қалғандарында төмен).

Түйінді сөздер: аурушылдық, жаңа түзілімдер, стандарттау, интенсивті көрсеткіштер.

SUMMARY

G.Z.Seytkazina, N.T.Imangaliyeva, A.V.Petukhov, A.D. Manzhueva

Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology
Evaluation incidence of malignant tumors in the West Kazakhstan region for 10 years

The incidence of malignant tumors in the West Kazakhstan region above the national average figures.

Purpose. Study of the spatial and temporal distribution of cancer in the West Kazakhstan region for 10 years.

Materials and methods: Cancer registry data for the West Kazakhstan region for 10 years, estimates of the extensive, intensive and standardized datas by year, sex and age.

Results. The analysis of cancer incidence in the West Kazakhstan region: first data 2000-2006, second data 2007-2011.

The incidence of malignant tumors in the West Kazakhstan region for 10 years was higher than the averages of the country and it is always up to 8th place among 14 regions and 2 cities (Almaty, Astana).

Keywords: disease, malignant neoplasms, standardized, intense performance.