

УДК: 616.6:615.277

М.З.Моларишвили

КГП «Костанайский областной онкологический диспансер»

Использование Актовегина при химиотерапии злокачественных образований по материалам Костанайского областного онкологического диспансера 2013 г.

Аннотация. Важное значение имеет поиск путей устранения либо уменьшения токсического воздействия цитостатиков. С этой точки зрения был использован препарат Актовегин для изучения влияния препарата на токсичность противоопухолевых препаратов у больных раком молочной железы и раком желудка. Актовегин применялся в дозе 200мг с 1-го по 12-й либо 14 дни в зависимости от курса ПХТ. Использование Актовегина позволило уменьшить, гематологическую токсичность цитостатиков, Улучшило эпителизацию язвенных метастазов.

Ключевые слова: рак желудка, рак молочной железы, химиотерапия, Актовегин.

Лекарственное лечение злокачественных новообразований является одним из основных видов специфической терапии опухолей. Следует отметить, что серьезным отягчающим моментом при химиотерапии опухолей является побочные эффекты, связанные с токсическим действием цитостатиков на здоровые ткани и органы. В связи с этим важное научное и практическое значение имеет поиск путей устранения либо уменьшения токсического воздействия цитостатиков. С этой точки зрения был использован препарат Актовегин. Использование Актовегина преследовало цель изучить влияние препарата на токсичность противоопухолевых препаратов при проведении химиотерапии у больных с раком молочной железы и раком желудка.

Материалы и методы исследования

Актовегин применялся у 10 больных со злокачественными опухолями, которым проводилось противоопухолевая терапия цитостатиками на фоне ежедневного парентерального ведения 200 мг. Актовегина (таблица 1).

Таблица 1 - Исследуемая группа больных

Локализация опухоли	Получили	
	I курс	II курса
Рак молочной железы	3	1
Рак желудка	4	2
Всего	7	3

У 3 больных были проведены 2 курса ПХТ, у остальных по 1 курсу.

Возраст больных от 45 до 65 лет, в среднем 55 лет (таблица 2).

Таблица 2 - Возраст больных

Локализация опухоли	Средний возраст
Рак молочной железы	45
Рак желудка	65
Всего	55

У всех больных использовались стандартные схемы химиотерапии в дозах, рассчитанных, на площадь поверхности тела. Преобладали больные с раком желудка 6 человек (таблица 3).

Таблица 3 - Рак желудка IIIB стадия (T3N1M0)

Вид лечения	Проведено	
	I курс	II курса
Профилактическая ПХТ	1	2
Лечебная ПХТ	3	-
ВСЕГО	4	2

Использование Актовегина при химиотерапии рака молочной железы у 4 больных (таблица 4).

Таблица 4 - Рак молочной железы IIIB стадия (T3N1M0).

Вид лечения	Проведено	
	I курс	II курса
Профилактическая ПХТ	1	-
Лечебная ПХТ	2	1
ВСЕГО	3	1

Результаты и обсуждения

У всех больных проводилось исследование анализа крови до начала ПХТ, и в последующем 2-3 раза в неделю. Изучение токсического действия среди больных раком желудка и молочной железы показало, что ни в одном из случаев не отмечено проявлений гематологической токсичности в виде лейко - или тромбоцитопении. Нарушение азотовыделительной функции либо токсического действия на миокард на фоне терапии с использованием Актовегина не зарегистрировано. У всех больных наблюдалась аллопекция от умеренной до тотальной у одного пациента. Актовегин применялся в дозе 200мг с 1-го по 12-й либо 14 дни в зависимости от курса ПХТ. Заслуживает внимание факт полной эпителизации опухолевых язв при метастазах молочной железы на коже передней грудной стенки. Эпителизация наступала через 7 дней после окончания курса ПХТ.

Выводы

Использование Актовегина позволило уменьшить, гематологическую токсичность цитостатиков.

Улучшило в ряде случаев функциональные показатели печени и почек.

Улучшило эпителизацию язвенных метастазов.

Переносимость Актовегина во всех случаях была хорошей, аллергической реакции на его введение не отмечалось.

Список литературы

1. Арзыкулов Ж.Н., Сейтказина Г.Ж. и соавт. Показатели онкослужбы Республики Казахстан за 2008 год. - Алматы, 2008.
2. Высокие технологии в онкологии // Мат. V-го Всероссийского съезда онкологов. - Казань, 2000. - Т. III.
3. Справочник Видаль 2007. Лекарственные препараты в Казахстане. Издание 4-ое. АстраФармСервис.

Тұжырым

М.З.Моларшвили

Костанайлық облыстық онкологиялық диспансері

Қостанай облыстық онкологиялық диспансерінің мәліметі бойынша Актовегиді қатерлі ісік түзілділеріне химиотерапия кезінде қолдану

Цитостатиктердің токсикалық әсерін жою немесе әсерін азайтуындағы жодарын табу аса маңызды болып табылады. Сол себептен сүт безі қатерлі ісігі

және асқазан қатерлі ісігі бар науқастарда ісікке қарсы препараттардың токсикалық әсеріне Актовегин препаратының әсері зерттелінді. Актовегин ПХТ курсына байланысты 200 мг мөлшерде 1-ші күннен 12 немесе 14 күнге дейін жасалынды. Актовегинді қолдану цитостатиктердің гематологиялық токсикалық әсерін азайтуға мүмкіндік берді. Содай-ақ жаралы метастаздардың эпителизациясын жақсартты.

Түйінді сөздер: асқазанның қатерлі ісігі, сүт безінің қатерлі ісігі, химиотерапия, Актовегин.

Summary

M.Z.Molarishvili

Kostanayskiy Regional Oncology Center

Actovegin use in chemotherapy of malignant tumors based on Kostanay Regional Oncology Center in 2013

Important to find ways to eliminate or reduce the toxic effects of cytotoxic drugs. From this point of view has been used to study the drug Actovegin effect of the drug on the toxicity of anticancer drugs in patients with breast cancer and gastric cancer. Actovegin was used at a dose of 200 mg of 1-th to the 12 th or 14 days depending on the course of PCTs. Using Actovegin allowed to reduce, hematologic toxicity of cytostatics, improve ulcer epithelization metastases.

Keywords: gastric cancer, breast cancer, chemotherapy, Actovegin.