

УДК: 616.64-006.6-036.22(574)

Н.С.Нурғалиев, А.Ж.Ажмагамбетова, Г.Т.Сейсенбаева
Казахский НИИ онкологии и радиологии

Эпидемиология рака мочевого пузыря по Республике Казахстан за 2004-2013 годы

Аннотация. В мир рак мочевого пузыря (РМП) занимает 9-е место среди всех злокачественных новообразований. Ежегодно диагностируется более 330 000 новых случаев РМП. Около 130 000 человек умирают от данного заболевания.

Цель исследования - изучение заболеваемости населения Казахстана раком мочевого пузыря за 10-летний период.

Материалы и методы. За 10-летний период исследования в Республике доля рака мочевого пузыря в структуре злокачественных опухолей составила 2,07%. В динамике интенсивные показатели являются стабильными с незначительной тенденцией к снижению, с 4,0‰ (2004) до 3,8‰ (2013).

Лидирующую позицию по заболеваемости РМП занимает Северо-Казахстанская область (7,7‰), Костанайская (7,0‰), Акмолинская (5,8‰) области и г. Алматы (5,7‰).

Наиболее низкие показатели заболеваемости РМП отмечены в Южно-Казахстанской (1,4‰), Атырауской (1,4‰) и Мангистауской (1,9‰) областях.

Ключевые слова: рак мочевого пузыря, заболеваемость, смертность, интенсивные показатели.

Рак мочевого пузыря (РМП) занимает 9-е место среди всех злокачественных новообразований в мире. Ежегодно диагностируется более 330 000 новых случаев РМП [1,2,3]. Около 130 000 человек умирают от данного заболевания, при этом мужчины 3,8 раза чаще заболевают, чем женщины.

За 10-летний период исследования в республике

зарегистрировано 6174 больных раком мочевого пузыря, что составляет в структуре злокачественных опухолей – 2,07%. В начале 2013 года на учете находилось 3266 больных [4,5]. Ежегодно выявляется более 600 новых случаев (642 случая в 2013 году). Нами проведен анализ заболеваемости РМП в Республике Казахстан (РК) за период 2004-2013гг в зависимости от возраста, пола и распространенность в регионах нашей страны.

Анализ среднегодовых интенсивных показателей заболеваемости рака мочевого пузыря в республике в возрастных группах в динамике за изучаемый период показал, что данные показатели имели тенденцию к росту. Так, среди лиц 00-29 лет данные показатели зарегистрированы только у мужчин (0,1‰). В возрастных группах 30-39 лет аналогичные показатели варьировались с 0,4‰ до 0,8‰. В возрастных группах 40-49 лет идет рост данных показателей, среди женского населения они были ниже (0,9‰) по сравнению с показателями среди мужчин (4,1‰) и оба пола (2,4‰). Показатели заболеваемости рака мочевого пузыря среди лиц 50-59 лет варьировались с 2,4‰ до 15,3‰. Заметный рост заболеваемости данной локализации в республике зарегистрирован среди лиц 60-69 лет. У мужского населения – 43,2‰, среди женщин – 5,6‰ (рисунок 1).

Высокая заболеваемость рака мочевого пузыря наблюдается среди лиц в возрастных группах 70 лет и старше – 31,3‰, данный показатель среди мужского населения составил 73,9‰, а у женщин 10,3‰.

Повозрастные показатели заболеваемости рака мочевого пузыря мужского и женского населения республики за период исследования выросли с увеличением возраста населения. Пик заболеваемости у всего населения в воз-




Рисунок 1 - Среднегодовые половозрастные интенсивные показатели заболеваемости раком мочевого пузыря населения Республики Казахстан за 2004-2013 гг.

растных группах 70 лет и старше, с унимодальным характером роста.

Интенсивные показатели заболеваемости рака мочевого пузыря населения республики за 10 лет свидетельствуют, что в динамике эти показатели имели некоторую тенденцию

снижения с 4,0‰ в 2004 г. до 3,8‰ в конце исследования (2013г) (рисунок 2).

Динамика интенсивных и стандартизованных показателей заболеваемости рака мочевого пузыря мужского населения за изучаемый период свидетельствует о стабильной ситуации с незначительной тенденцией к снижению. Период исследования завершился со значением показателя 6,4‰ (рисунок 3).

Среди женского населения за 10-летний период также отмечается равномерная картина с небольшими колебаниями: рост показателей с 1,4‰ (2004г.) до 1,7‰ в 2008 году, в конце исследуемого периода данный показатель составил 1,3‰ (рисунок 4).

Высокие показатели удельного веса рака мочевого пузыря всего населения республики (рисунок 5) по возрастным группам имели бимодальный характер роста. Пик отмечается в возрастных группах 70 лет и старше: у женского населения 43,7%, у мужчин удельный вес в данной возрастной группе составляет 36,3%.

Общий среднегодовой интенсивный показатель заболеваемости рака мочевого пузыря по республике составил $3,9 \pm 0,0\%$, стандартизованный (мировой) – $3,9 \pm 0,1\%$. Повозрастные показатели заболеваемости рака мочевого пузыря мужского и женского населения республики за период исследования выросли с увеличением возраста населения. Пик заболеваемости у всего населения отмечен в возрастных группах 70 лет и старше, с унимодальным характером роста.

Таким образом, за 10-летний период исследования, в республике доля рака мочевого пузыря в структуре злокачественных опухолей составляет – 2,07%. Изучение интенсивных показателей заболеваемости рака мочевого пузыря населения республики за 10 лет показало, что



Рисунок 2– Интенсивные и стандартизованные показатели заболеваемости рака мочевого пузыря населения Республики Казахстан за 2004-2013гг.




Рисунок 3– Интенсивные и стандартизованные показатели заболеваемости рака мочевого пузыря мужского населения Республики Казахстан за 2004-2013гг.




Рисунок 4– Интенсивные и стандартизованные показатели заболеваемости рака мочевого пузыря женского населения Республики Казахстан за 2004-2013гг.

в динамике эти показатели являются стабильными, с незначительной тенденцией к снижению с 4,0‰ (2004г) до 3,8‰ (2013г).

Лидирующая позиция заболеваемости рака мочевого пузыря установлена в Северо-Казахстанской области (7,7‰). Ряд высоких показателей отмечены в Костанайской (7,0‰), Акмолинской (5,8‰) областях и по г. Алматы (5,7‰).

Наиболее низкими показателями заболеваемости раком мочевого пузыря отмечены в Южно-Казахстанской




Рисунок 5 – Удельный вес рака мочевого пузыря по возрастным группам населения Республики Казахстан за 2004-2013гг.




Рисунок 6 - Среднегодовые показатели заболеваемости раком мочевого пузыря по областям Республики Казахстан за 2004-2013 гг.

-1,4‰, Атырауской (1,4‰), Мангистауской (1,9‰) областях (рисунок 6).

Изучение динамики заболеваемости рака мочевого пузыря отдельно мужского и женского населения проведено в десятилетних временных и возрастных интервалах.

Возрастные особенности распространения рака мочевого пузыря в республике характеризуются тем, что в динамике уровень заболеваемости имеет тенденцию к росту в возрастных группах 70 лет и старше, и носит унимодальный характер роста.

Возраст является одним из основных факторов, с которым наиболее отчетливо связано развитие заболевания. Причем зависимость уровня заболеваемости

от возраста более выражена по сравнению с другими факторами. Касается это и структуры заболеваемости в различных возрастных группах. Интенсивность роста заболеваемости с возрастом хорошо характеризует индекс отношения возрастного пика заболеваемости к уровню заболеваемости в возрасте 70 лет и старше. Для адекватного сравнения уровней заболеваемости между поло-возрастными группами, как правило, используются стандартизованные показатели, исключающие влияние на их значения возможных различий в возрастном составе сравниваемых групп населения.

Чрезвычайно важным является изучение распространения заболеваемости во времени. Сопоставление максимального и минимального

показателей заболеваемости раком мочевого пузыря в регионах республики позволяет заключить, что географические, региональные особенности в уровнях заболеваемости могут быть обусловлены различиями в составе населения сравниваемых регионов.

Более углубленные эпидемиологические исследования показывают, что изучение изменений в частоте, структуре и особенностях распространения рака мочевого пузыря на отдельных территориях республики дает необходимую информацию для планирования лечебно-профилактических мероприятий на государственном и региональном уровнях, способствуя совершенствованию онкологической помощи больным злокачественными новообразованиями данной локализации.

Таким образом, анализ заболеваемости с учетом возрастного-половых особенностей населения республики за 10 лет (2004-2013гг.) показал, что в динамике рост заболеваемости зависит от возрастного состава населения, т.е. чем старше возраст, тем пропорционально растет частота рака мочевого пузыря.

Список литературы

- 1 Чиссов В.И. Онкоурология: национальное руководство.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012.-688 с.
- 2 Онкоурология /Переводсангл. РичДжеромП. ДАмикоЭнтониВ.М.М.:Бином, 2011.-896 с.
- 3 Ploeg M., Aben K.K., Kiemeny L.A. The present and future burden of urinary bladder cancer in the world //World. J. Urol.- 2009.-Nol. 27.-P.289-93.
- 4 АрзыкуловЖ.А., СейтказинаГ.Д. исоавт.Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2004-2009 гг.(статистические материалы).-Алматы, 2005-2020гг.
- 5 Нургазиев К.Ш., Сейтказина Г.Д., Байпеисов Д.М. и соавт. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2010-2013 гг.(статистические материалы).-Алматы, 2011-2014 гг.

Тұжырым

Н.С.Нурғалиев, А.Ж.Ажмағамбетова, Г.Т.Сейсенбаева
Қазақтың онкология және радиология ҒЗИ

Қазақстан Республикасының 2004-2013жж аралығындағы қуықтың қатерлі ісігінің эпидемиологиясы

Дүние жүзінде қуықтың қатерлі ісігі (ҚҚІ) басқа дерттердің ішінде 9 орынды алып жатыр. Жыл сайын

330 000 астам адам ҚҚІ шалдығып, 130 000 науқас бұл аурудан көз жұмады.

Зерттеудің мақсаты – Қазақстан халқының 10 жыл көлеміндегі кезеңде ҚҚІ шалдығуын анықтау.

10 жыл көлеміндегі кезеңде Республикамызда ҚҚІ бүкіл дерт ауруларының арасында 2,07% алып отырғаны анықталды. Динамикада ҚҚІ интенсивті көрсеткіштері тұрақты болып, 4‰₀₀₀ (2004)-тен 3,8‰₀₀₀ (2013)-ге дейін азғана төмендеу тенденциясы байқалған.

ҚҚІ кездесу жиілігі көбінесе Солтүстік Қазақстан (7,7‰₀₀₀), Қостанай (7,0‰₀₀₀), Ақмола (5,8‰₀₀₀) облыстарында және Алматы қалаласында (5,7‰₀₀₀) болған.

Бұл дерттің ең аз кездесетін жерлері Оңтүстік Қазақстан (1,4‰₀₀₀), Атырау (1,4‰₀₀₀) және Маңғыстау (1,9‰₀₀₀) облыстарында.

Түйінді сөздер: қуықтың қатерлі ісігі, ауруға шалдығу, жітім, интенсивті көрсеткіштері.

SUMMARY

N.S.Nurgaliev, A.Zh.Azhmagambetova, G.T.Seysenbaev
KazakhResearch Instituteof Oncology and Radiology
Epidemiologyof bladder cancerin the Republic
ofKazakhstan

for2004-2013yy

In the world of bladder cancer ranks 9th among all malignancies. Diagnosed each year more than 330 000 new cases of bladder cancer. about 130 000 people die from the disease.

Purpose of the study - the study of diseases of the population of Kazakhstan bladder cancer over a 10-year period.

10-year study period in the countrysharebladder cancermalignancycomposes-2.07%. In the dynamics ofintensive parametersare stablewith a slightdownward trendwith4% (2004) to 3.8%(2013). Leadingpositionincidenceof bladder cancertakes-North Kazakhstan(7.7%), Kostanay(7.0%), Akmolaregion(5.8%) andAlmaty(5.7%). ThelowestincidenceofbladdercancerreportedinsouthernKazakhstan(1.4%), Atyrau(1.4%)andMangistauregion.

Key words: bladder cancer, morbidity, mortality, intensive indicators.