


# ỐNG DẪN TRỨNG VÀ MỘT SỐ BỆNH LÝ LIÊN QUAN

ThS.BS Phan Thị Thúy Vân

Bộ môn Phụ Sản, Khoa Y – ĐH Nguyễn Tất Thành


# Mục tiêu

- Biết được vị trí giải phẫu ống dẫn trứng
- Biết được mô học ống dẫn trứng
- Nắm được chức năng ống dẫn trứng
- Biết được một số bệnh lý tại ống dẫn trứng

# Phôi thai học ống dẫn trứng

Tuần thứ 6 của thai kỳ, phôi thai nam và nữ đều có hai cặp ống sinh dục: ống Wolff và ống Muller

Nếu là nữ, ống Wolff sẽ thoái triển, ống Muller sẽ phát triển thành tử cung, ống dẫn trứng và 1/3 trên âm đạo





**Hình 1:** Cơ quan sinh dục sơ khai (A) và biệt hóa của các ống Wolff và ống Muller, khi vắng mặt (B) hay có mặt gene SRY (C).

Nguồn: embryology.ch

# Giải phẫu ống dẫn trứng

Ống dẫn trứng= vòi trứng = vòi Fallope = vòi tử cung


- Là 2 ống dài khoảng 7-12cm, chạy ngang từ góc bên tử cung tới buồng trứng
- Nằm giữa 2 lá của bờ tự do dây chằng rộng



# Giải phẫu ống dẫn trứng


Gồm 4 đoạn:


- Đoạn phễu: loe ra hình phễu, lỗ ngoài thông với ổ bụng đón nhận trứng. Xung quanh lỗ có khoảng 10 tua vòi, tua dài nhất dính vào buồng trứng
- Đoạn bóng: phình to, dài nhất
- Đoạn eo: là đoạn hẹp nhất, dính vào góc bên tử cung
- Đoạn nội thành (đoạn kẽ): nằm trong thành tử cung, dài khoảng 1cm, thông vào thành tử cung bởi lỗ tử cung



# Giải phẫu ống dẫn trứng


Hình ảnh vùng chậu qua nội soi ổ bụng:





# Giải phẫu ống dẫn trứng


- Động mạch và tĩnh mạch vòi trứng là các nhánh vòi trứng từ mạch tử cung và mạch buồng trứng, nối nhau dọc bờ dưới vòi trứng
- Bạch huyết đổ về hạch bạch huyết vùng thắt lưng
- Thần kinh: tách từ đám rối buồng trứng





# Mô học ống dẫn trứng

Thành ống dẫn trứng 3 lớp, từ trong ra: niêm mạc, cơ, thanh mạc

- Niêm mạc: nếp gấp dọc, nhiều ở đoạn bóng, được phủ bởi biểu mô trụ đơn (tế bào trụ có lông chuyển và tế bào chế tiết)
- Lớp cơ: cơ trơn dày, cơ vòng lớp trong, cơ dọc bên ngoài, vận chuyển noãn hoặc hợp tử về tử cung
- Lớp thanh mạc: là phúc mạc tạng






# Chức năng ống dẫn trứng

- Là nơi xảy ra hiện tượng thụ tinh giữa trứng và tinh trùng
- Cung cấp dinh dưỡng và đẩy noãn về phía tử cung
- Sự di chuyển của lớp dịch về phía tử cung giúp cản trở sự xâm nhập của vi trùng từ tử cung vào khoang phúc mạc
- Chất tiết từ vòi trứng giúp kích thích hoạt động của tinh trùng
- Lớp cơ nhạy cảm với steroid sinh dục, estrogen tăng co thắt cơ, progesterone giãn cơ




# Hình ảnh học ống dẫn trứng

- Các kỹ thuật hình ảnh có thể không thấy được ống dẫn trứng bình thường
- Khi vòi trứng xẹp, không có dịch ổ bụng sẽ không thấy được vòi trứng trên siêu âm, MRI
- Ống dẫn trứng bình thường có thể thấy được nhờ có dịch ở bụng, máu trong vùng chậu




# Hình ảnh học ống dẫn trứng




Ống dẫn trứng trên siêu âm (mũi tên trắng)

# Hình ảnh học ống dẫn trứng




a. b.

Normal fallopian tube surrounded by ascites in a 40-year-old woman undergoing continuous ambulatory peritoneal dialysis. Consecutive coronal T2-weighted MR images (b obtained 7 mm anterior to a) show a normal left fallopian tube (solid arrows) near a large amount of peritoneal fluid (A). C = right ovarian cyst, U = uterus, open arrow = round ligament.

# Hình ảnh học ống dẫn trứng


Chụp X-quang buồng tử cung vòi trứng có cản quang (Hysterosalpingography – HSG)

- Giúp đánh giá sự thông thương của vòi trứng
- Chỉ định: bệnh nhân hiếm muộn cần khảo sát vòi trứng
- Chống chỉ định: có thai, đang viêm nhiễm vùng chậu
- Một loạt phim (ít nhất 4 phim) được chụp sau khi bơm thuốc cản quang→ khảo sát buồng tử cung và vòi trứng

# (Hysterosalpingography – HSG)




# Hình ảnh học ống dẫn trứng



Siêu âm đánh giá ống dẫn trứng bằng chất tương phản dạng bọt (HYFOSY)


- Giúp đánh giá thông thương của ống dẫn trứng chính xác
- Ít xâm lấn, không nhiễm xạ, ít đau hơn so với HSG



# Bệnh lý tại vòi trứng

Viêm tắc, ứ dịch vòi trứng :

- Ống dẫn trứng bị tắc và ứ dịch bên trong
- Trở nên căng phồng, có thể có đường kính vài cm
- Thường xảy ra ở cả 2 ống dẫn trứng
- Gây vô sinh, thai ngoài tử cung



# Bệnh lý tại vòi trứng




Viêm tắc, ứ dịch vòi trứng

Nguyên nhân:

- Viêm vùng chậu do các bệnh lây truyền qua đường tình dục như Lậu, nhiễm *Chlamydia trachomatis*
- Lao ống dẫn trứng
- Dính do phẫu thuật vùng bụng, viêm ruột thừa vỡ
- Lạc nội mạc tử cung
- Ung thư ống dẫn trứng, buồng trứng

# Bệnh lý tại vòi trứng

Viêm tắc, ứ dịch vòi trứng

Triệu chứng:


- Có thể không triệu chứng
- Đau bụng dưới hoặc vùng chậu tái phát
- Vô sinh
- Thai ngoài tử cung

# Bệnh lý tại vòi trứng


Viêm tắc, ứ dịch vòi trứng

Chẩn đoán:


- Siêu âm
- HSG
- MRI
- Nội soi ổ bụng





# Ứ dịch vòi trứng trên siêu âm



Vòi trứng bình thường trên HSG





Ứ dịch vòi trứng trên HSG



Ứ dịch vòi trứng


# Hội chứng Fitz-Hugh–Curtis








- Viêm dính quanh gan cùng với viêm dính vùng chậu do nhiễm *Chlamydia trachomatis*
- *Chlamydia trachomatis* là một vi khuẩn nội bào bắt buộc, gram âm, lây qua đường tình dục, gây viêm vùng chậu
- Chẩn đoán: xét nghiệm PCR dịch cổ tử cung, âm đạo. Xét nghiệm tìm kháng thể IgG đánh giá tiền căn bệnh nhân đã từng nhiễm *Chlamydia trachomatis*








Vòi trứng bình thường, thông khi bơm xanh methylene

Vòi trứng ứ dịch, tắc nghẽn, xanh methylene không thể thoát ra ổ bụng





# Viêm dính vùng chậu do lạc nội mạc tử cung

# Bệnh lý tại vòi trứng

Viêm tắc, ứ dịch vòi trứng


Điều trị:


- Phẫu thuật nội soi tái tạo vòi trứng mở đầu bị tắc khi tắc đoạn xa, tái tạo loa vòi, cắt các dây dính
- Cắt vòi trứng bị ứ dịch
- Vô sinh → Thụ tinh ống nghiệm

# Bệnh lý tại vòi trứng

Áp xe vòi trứng – buồng trứng (Áp xe phần phụ)

- Là khối nhiễm trùng phức tạp của phần phụ, phần lớn có liên quan đến viêm phúc mạc
- Thường là hậu quả của viêm vùng chậu
- Khối áp xe có nhiều vi khuẩn, ưu thế vi khuẩn kỵ khí
- Mầm bệnh đi lên từ viêm âm đạo hoặc viêm cổ tử cung hoặc từ các cơ quan trong ổ bụng như viêm ruột thừa hoặc từ đường máu



# Bệnh lý tại vòi trứng

Áp xe vòi trứng – buồng trứng (Áp xe phần phụ)

Lâm sàng

- Đau vùng bụng dưới, sốt, tiết dịch âm đạo bất thường (dịch đục mủ)
- Khối u ở phần phụ
- Bạch cầu tăng

Áp xe vỡ có thể gây nhiễm trùng huyết, đe dọa tính mạng

Điều trị: kháng sinh phối hợp± phẫu thuật cắt vòi trứng


# Bệnh lý tại vòi trứng




Nang nước cạnh vòi trứng

- Nang chứa chất lỏng nằm cạnh buồng trứng
- Kích thước từ 0,5cm đến 20cm, có thể nhầm với u buồng trứng nếu nằm gần
- Hình thành từ di tích của ống Wolf





# Bệnh lý tại vòi trứng


Nang nước cạnh vòi trứng

Triệu chứng:

- Đa số không có triệu chứng, được phát hiện tình cờ qua siêu âm
- Có thể có các triệu chứng: khối u vùng hạ vị, nặng vùng chậu, đau bụng, táo bón, đi tiểu thường xuyên

Điều trị:

- Nếu nang nhỏ, không triệu chứng có thể theo dõi
- Phẫu thuật bóc nang là phương pháp điều trị chính




# Bệnh lý tại vòi trứng

Nang nước cạnh vòi trứng

Biến chứng:


- Xoắn phần phụ gây thiếu máu nuôi buồng trứng và vòi trứng: đau bụng đột ngột, dữ dội, sốt, buồn nôn, nôn. Là một cấp cứu phụ khoa
- Vỡ nang gây xuất huyết trong ổ bụng





# Bệnh lý tại vòi trứng

Thai ngoài tử cung

- Khi thai làm tổ bên ngoài buồng tử cung
- Hơn 95% thai ngoài tử cung có vị trí làm tổ là vòi trứng
- Vị trí thường gặp nhất là đoạn bóng
- Nếu không chẩn đoán và điều trị kịp thời → vỡ khối thai gây xuất huyết nội







Thai ngoài tử cung ở vòi trứng Trái

# Tài liệu tham khảo

Y học sinh sản đại cương - ĐH Y Dược TP HCM 2020

Williams Obstetrics,26thEdition

Williams Gynecology – 4th edition


THANKS FOR
LISTENING