

เอกสารให้ความรู้ในการรับประทานยารักษาวัณโรค

วิธีการรับประทานยารักษาวัณโรคที่ถูกต้อง

1. รับประทานยาขณะท้องว่าง ให้ห่างจากมื้ออาหารอย่างน้อย 2 ชั่วโมง แนะนำให้รับประทานก่อนนอน
2. รับประทานยาในเวลาเดียวกันต่อเนื่องทุกวัน ห้ามขาดยา หรือหยุดยาเอง
3. หากเกิดอาการผื่นผดจากการรับประทานยา ห้ามหยุดยาเอง หากเกิดอาการที่รุนแรง ให้รีบมาพบแพทย์ทันที
4. ห้ามบด และห้ามเคี้ยวยา
5. หลีกเลี่ยงการรับประทานยารักษาวัณโรคกับยาลดกรดกระเพาะ หรือรับประทานห่างกันอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
6. หลีกเลี่ยงการรับประทานแอลกอฮอล์ขณะที่มีการรับประทานยารักษาวัณโรค

อาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นหลังจากรับประทานยา

- **คลื่นไส้หรือ อาเจียน หรือ เบื่ออาหาร หรือ ปวดท้อง** หากเกิดขึ้นในสัปดาห์แรกสามารถรับประทานยาต่อไปได้และแจ้งให้แพทย์ทราบเมื่อไปพบแพทย์ตามนัด หากมีอาการคลื่นไส้ อาเจียนรุนแรง หรือเกิดหลังจากได้รับยามากกว่า 1 สัปดาห์ให้รีบมาพบแพทย์โดยด่วน
- **อ่อนเพลียไม่มีแรง** ท่านสามารถรับประทานยาต่อไปได้
- **ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ** ท่านสามารถรับประทานยาต่อไปได้ หากมีอาการรุนแรงให้รีบมาพบแพทย์โดยด่วน โดยสามารถรับประทานยาแก้ปวดข้อได้เพื่อบรรเทาอาการปวด
- **ชาตามปลายมือ หรือเท้า** ท่านสามารถรับประทานยาต่อไปได้โดยต้องแจ้งให้แพทย์ผู้ทำการรักษาทราบเมื่อมาพบแพทย์ตามนัด
- **ผื่นหรือคันเล็กน้อย** ท่านสามารถรับประทานยาต่อไปได้ หากมีอาการรุนแรงให้รีบมาพบแพทย์โดยด่วน
- **ปัสสาวะเป็นสีส้มแดง** ไม่เป็นอันตราย เป็นอาการผื่นผดหลังจากได้รับยา

หากผื่นผดติดต่อนี้ให้รีบมาพบแพทย์โดยด่วน !!

- คลื่นไส้ อาเจียนรุนแรง
- ได้ยินเสียงผื่นผดติดหู
- ผื่นทั้งตัว ผื่นพร้อมกับมีไข้ ผื่นพร้อมกับมีแผล
- พุพองที่ปากหรือตาแดง
- เวียนหัว รู้สึกบ้านหมุน
- ตัวเหลือง ตาเหลือง
- ตามัว มองเห็นไม่ชัด เห็นสีผื่นผด
- จำเลือดออกที่ผิว
- แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก
- บวม ปัสสาวะไม่ออก หรือออกน้อยมากผื่นผด

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยารักษาวัณโรค กรุณาโทรได้ที่ 045799114 ต่อ 107